

৫৭৬

# উদ্ভিদ অভিধান

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ



3939  
25.3.87



# উদ্ভিদ অভিধান

## অমূল্যাচরণ বিখ্যাতভূষণ

শ্রীমদ্রস্কুমার ঘোষ কর্তৃক সংকলিত



সাহিত্যালোক II ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ :

ডিসেম্বর, ১৯৮২

প্রকাশক :

নেপালচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যলোক

৩২/৭, বিডন স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০০৬

© শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

মুদ্রাকর :

নেপালচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স

৫৭/এ, কারবালা ট্যাক্স লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :

অমিয় ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ মৃদুগ :

লক্ষ্মীনারায়ণ প্রসেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

বাঁধাই :

নেপালচন্দ্র ঘোষ

বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স

৫৭/এ, কারবালা ট্যাক্স লেন

কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : দ্বিশ টাকা

S.C.E.R.T. West Bengal

Date 25-3-87

Acc. No. 3939



## বিবাদন

অতি প্রাচীনকালে আধুনিক কালের মতো বর্ণানুক্রমিক কোন অভিধান ছিল না, ছিল কোষগ্রন্থ, সংস্কৃতে সুদল্লিত ছন্দে গ্রথিত। ভাষাকে স্মৃতিভাবে জানতে হলে বিদ্যাথীদের বহু বছর ধরে কোষগ্রন্থ মুদ্রণ করতে হত। তবেই তারা শব্দ সঙ্গ্রহ করতে সমর্থ হত। প্রাচীনকালের এই সব কোষগ্রন্থ কালে রূপান্তরিত হয় আধুনিক অভিধানে।

অভিধান সংকলন করার মতো সহিষ্ণুতার কাজ খুবই বিরল। আবার অভিধান তৈরি করার কত যে আনন্দ তা যারা না করেছেন তারা অনুভব করতে পারেন না। অভিধান তৈরি করার মতো পরিশ্রম বৃদ্ধিও আর কোন কাজে দেখা যায় না। কেউ বলেন—অভিধান যারা তৈরি করেন তারা বিদ্যামান্দরের ‘মজদুর’—তারা গাল-মসলা তৈরি করে দেন, আর অন্যেরা সেই মসলা দিয়ে মান্দুর গাধেন। আবার কেউ বলেন এটা একটা সুবিশাল সৌধ, সেই সৌধের প্রতিটি ঘর অগণিত শব্দ আর ভাষার ভাণ্ডার। কিন্তু তার প্রবেশদ্বার তালাবন্ধ। উন্মোচন করতে হলে চাই ‘চাবি’। এই শব্দ ও ভাষার ভাণ্ডারের চাবি হচ্ছে অভিধান।

এখন আর কেউ কোষগ্রন্থ মুদ্রণ করে না, অ-কারাদি বর্ণক্রমে শব্দমালা সাজিয়ে অভিধান সংকলন করা হয়। ১৯ শতকের আগে শব্দগুলিকে বর্ণমালা অনুসারে সাজাবার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। ইংরেজরাই এই প্রথার প্রবর্তক বলে আমার মনে হয়। কারণ ১৮০৭ খ্রীঃ কোলব্রুক সাহেব (Colebrooke, H. T.) অমরকোষকে সুসংযুক্ত করে সুপাদন করেন। তাতে তিনি পরিশিষ্টে বর্ণমালা অনুসারে শব্দগুলি সাজিয়ে দেন। অমরকোষের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় অভিধানের আবিস্কার হয়। ইংরেজদের অনুকরণে বাংলা অভিধানের অ-কারাদি ক্রমে সাজানোর রীতি এই সময় থেকে দেখা যায়।

স্মৃতিভাবে ভারতীয় গাছ-গাছড়ায় কোন কোষগ্রন্থ বা অভিধান ছিল না। বৌদ্ধ গ্রন্থে, মহাকাব্যে, আয়ুর্বেদগ্রন্থে, কালিদাস প্রভৃতি কবিদের কাব্যে গাছ-

গাছড়ার কিছ, কিছ, পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক কালে ইংরেজি ভাষায় বৈজ্ঞানিক নাম সংযুক্ত করে উদ্ভিদ-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ-অভিধান যাকে বলে বাংলা ভাষায় তা নেই।

এখন আমাদের কথায় আসা যাক। এই উদ্ভিদ-অভিধান প্রকাশ পরি-কল্পনার কারণ কি? আমার পরম পুজনীয় পিতৃদেব পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁর সুবিখ্যাত কোষগ্রন্থ, 'বঙ্গীয় মহাকোষ' (Encyclopaedia Bengalensis) রচনার সময় (১৯০০-৪০) তাতে সংযোজনের জন্য ভারতীয় গাছ-গাছড়ার একটি অভিধান সংকলন করেছিলেন। সেই সংকলন-পর্বে বর্তমান নিবেদক সহকারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। বঙ্গীয় মহাকোষ মাত্র ২ খণ্ড প্রকাশের পর অকস্মাৎ পিতৃদেবের মৃত্যুতে (১৯৪০) আরম্ভ কার্য মহাকোষ বন্ধ হয়ে যায়। সংকলিত পাণ্ডুলিপি প্রায় অধঃশতাব্দী কাল অরক্ষিত অবস্থায় থেকে কীটদন্ড হয়ে লুপ্ত হবার উপক্রম হয়। সেই কীটদন্ড পাণ্ডুলিপি-গুলি দেখে প্রকাশক শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ অভিধানটিকে স্মৃতিভাবে প্রকাশযোগ্য করে দিলে তিনি পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে সম্মতি জানান, কারণ এ জাতীয় উদ্ভিদ-অভিধান বাংলা ভাষায় পূর্বে কখনও সংকলিত হয়নি। তৎকালীন কয়েকটি অভিধানে নাম-মাত্র কয়েকটি উদ্ভিদের পরিচিতি আছে। এই অভিধানে পর্যায় শব্দও দেওয়া আছে। এক শব্দের অনেক মানে, আবার এক মানের অনেক শব্দ। সেগুলিকে সংস্কৃতে পর্যায় বলে—পর্যায় শব্দগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই সংকলনে যে সব গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে তার তালিকা গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে পরিশিষ্টে বৈজ্ঞানিক নামের ও উদ্ভিদগোত্রের পরিভাষাও সংযোজিত হল।

অভিধানটি মুদ্রণকালের সময় উদ্ভিদগুলির বৈজ্ঞানিক নামের যথার্থ-পরীক্ষার্থে হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেডের প্রধান পরি-চালক প্রমোদ শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্ট মহাশয় তাঁর গ্রন্থাগারের বহু মূল্যবান পুস্তক ব্যবহার করতে দিয়ে আমাকে বিশেষ উপকৃত করেছেন—তাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ব্যবসায়িক সাফল্যের কথা না ভেবে 'সাহিত্যলোক'-এর কর্ণধার শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় বাংলাভাষায় এই প্রথম 'উদ্ভিদ-অভিধান' গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে বাংলা ভাষার দীর্ঘদিনের একটা অভাব পূরণ করলেন।



এজন্য তিনি শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই কাছে ধন্যভাজন। ছাড়িয়ে থাকা পাশ্চ-  
লিপির একত্রীকরণ, প্রেসকপি তৈরি এবং আনুষঙ্গিক শ্রমসাধ্য কাজ একা আমার  
পক্ষে করা সম্ভব ছিল না। একাজে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে সাহায্য করেছেন আমার  
স্নেহাস্পদা কন্যা শ্রীমতী অনুরাধা বসু, অনুরাজ শ্রীসত্যেন ঘোষ, পুত্র শ্রীমান  
প্রদীপ ঘোষ ও অনুরাজপ্রতিম শ্রীদীপঙ্কর নন্দী। এদের সকলকেই আমার  
স্নেহাশিস জানাই।

এ ধরনের অভিধান প্রকাশে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করা সত্ত্বেও কিছু  
ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। এ ব্যাপারে আমি পাঠকদের কাছে দায়-  
বদ্ধ। যাই হোক এই অভিধান যদি অননুসন্ধিসৃজনৈর সামান্যতম প্রয়োজনে  
লাগে তা হলেই আমার স্বর্গগত পিতৃদেবের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে।

আশ্বিন ১৩৮৮

১২বি মোহনবাগান লেন

কলিকাতা - ৭০০০০৪

শ্যামসুন্দর ঘোষ

## সাক্ষতিক চিহ্ন

অঁ—অন্ধ	ফাঁ—ফাসী
অভি°—অভিধান-চিন্তামণি ( হেমচন্দ্র- কৃত )	ব-ম°—বঙ্গীয় মহাকোষ
অভিধা°—অভিধান-রত্নমালা (হলারদ্র)	বেল°—বেলফোর, সাইক্লোপিডিয়া
অম°—অমরকোষ	বৈদ্য-নি°—বৈদ্যক-নিবন্ধ
অস°—অসমীয়া	বৈদ্য-শ°—বৈদ্যকশাস্ত্রসিদ্ধ
আ°—আবী	বো°—বোম্বে
আপ°—Apte, V. S. : Sanskrit- English Dictionary	ব্রজ°—ব্রজবুলি
ই°—ইত্যাদি	ভাবপ্র°—ভাবপ্রকাশ
ইং—ইংরেজ	ভৈষজ্যর°—ভৈষজ্যরত্নাবলী
উ°—উত্তর প্রদেশ	ম°—মরাঠী
উইল°—Wilson, H.H : Sanskrit- English Dictionary (১৮৯৯)	মনি°—Monier Williams, Sir : Skr-Eng. Dictionary
উপ°—উপবনবিবোধ	মলয়°—মলয়ালম
ও°—ওড়িয়া	মে°—মেদিনীকোষ
কর্ণা°—কর্ণাট	রত্নমা°—রত্নমালা
কুমার°—কুমারসম্ভব	রত্না-চ°—রত্নাবলীচন্দ্রিকা
কেরি°—কেরি সাহেব	রাজনি°—রাজনিবন্ধ
চরক°—চরকসংহিতা	রাজব°—রাজবল্লভ
চক্র°—চক্রদন্ত	শব্দ°—শব্দকল্পদ্রুম ( রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরকৃত )
তা°—তামিল	শব্দ-চ°—শব্দচন্দ্রিকা
তে°—তেলেগু	স°—সংস্কৃত
দ্ব°—দুটব্য	সমর্থ°—সমর্থকোষ
দ্রাব°—দ্রাবিড়	স্য-প-প—সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকা
দ্রবাদ°—দ্রব্যগুণদর্পণ	সুশ্রু°—সুশ্রুতসংহিতা
প°—পঞ্জাব	হি°—হিন্দী





পণ্ডিত অমল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

# উদ্ভিদ-অভিধান

[ অ ]

- অংশুমৎফল—কদলী, *musa sapientum*, কদলী দ্র° ।  
 অংশুমৎফলা—কদলীবৃক্ষ । কদলী দ্র° ।  
 অংশুমতীফলা—কদলীবৃক্ষ ।  
 অংসপারিক—মহানিন্দুবৃক্ষ । মহানিন্দু দ্র° ।  
 অকরা—[ *emblic myrobalan* ] আমলকী, *phyllanthus emblica* L আমলকী দ্র° ।  
 অকরাকরভ—গাঁদাজাতীয়, আকরকরা, *anacyclus pyrethrum*. পর্যায়—অকরাম্ভক, অকর্কর, অকলকর, অকলপ, আকলপ ।  
 অকরাস্তক—আকরকরা দ্র° ।  
 অকর্কর—আকরকরা দ্র° ।  
 অকলকর—আকরকরা দ্র° ।  
 অকলকা—জ্যোৎস্না দ্র° ।  
 অকট—ফলবৃক্ষবিশেষ । আগইফল । আগইফল দ্র° ।  
 অক্লিকা, অক্লীকা—নীলী, নীলগাছ, [ ইং the indigo plant ]; *indigofera tinctoria*.  
 অক্ষধর—আসশেওড়া, *trophis aspera*.  
 অক্ষিক—মাধবীলতা, *dalbergia oujeinensis*, রঞ্জনদ্রুম, আচ-ফুলের গাছ ॥ রত্না-চ° বাচ° শব্দ° রত্নমা° ॥  
 অক্ষিব—সজিনা, *hyperanthera moringa*.  
 অক্ষিভেবজ—বৃক্ষবি° । লোহিতলোধা° । রাজনি° ॥  
 অক্ষোট—পর্বতজাত পীল, *juglans regia*. আখরোট দ্র° ।  
 অখট—পিয়াল, *buchanania latifolia* । পিয়াল দ্র° ।  
 অখরোট—আখরোট দ্র° ।  
 অখিলিকা—[ হি° করেলী ছোটী ] ক্ষুদ্র কারবল্লী, উচ্ছে, *momordica charantina*.  
 অগদ—দ্রুমবৃক্ষ, দাদমর্দন গাছ, *cassia alata* ॥ রাজনি° ॥ দ্রুমর্দনী দ্র° ।  
 অগরা, অগরী—এক প্রকার তৃণ । সাধারণত 'দেওতাড়' নামে পরিচিত, *androgogon serratus*. দেবদালিকা দ্র° ।



অগরু, অগরুদ—[ ইং aloe wood, eagle wood, হি° ও গুজ°  
অগরু ; তা° অগ্গলিবন্দ, অগরু ;  
তে° হরুগুহ-চেট্ট ] অগরুচন্দন,  
গুগ্গল, দীর্ঘ চিরশ্যামল বৃক্ষ,  
aquilaria agallocha, aquil-  
laria ovata, amyrus agallo-  
cha. পৰ্যায়—বংশিক, বাজাহ,  
লোহ, ক্রিমিজ, ক্রিমিজ, জোজক,  
অনার্যজ, বংশক, লঘু, পিচ্ছিল,  
ভৃক্ষ, কৃষ্ণ, লোহাখ্য, রাতক,  
বর্ণপ্রসাদন, অনার্যক, অসার,  
অশ্বিনকাষ্ঠ, ক্রিমিজশ্ব, কাষ্ঠক।  
উৎপত্তিস্থান—হিমালয়ের পূর্বাংশ,  
অসম, ভূটান, খাসিয়াপাহাড়, শ্রীহট্ট,  
ত্রিপুরা-পাহাড়, বর্মী প্রভৃতি।  
অগরু পাঁচ প্রকার—১ কৃষ্ণাগরু,  
২ দাহা গরু, ৩ শ্বাঘগরু, ৪ মল্ল্যা-  
গরু, ৫ কাষ্ঠাগরু ॥ রাজনি° ॥  
কৃষ্ণাগরু, কালাগরু ॥ রঘু° ॥  
কালবর্ণের অগরু (কামরূপে  
পাওয়া যায়)।

অগস্তি, অগস্তিদ্রু—[ হি° অগস্তিয়া,  
হতিয়া, বফুল হৃদা ; গুজ°  
অগাথিয়া ; ম° অগস্তা, কন্নড়  
অগসেয়মরু ; তে° লম্বয়  
বিসেচেট্ট, অনীসে, অবিসি ; তা°

অগাতি ] মর্নিদ্রু, পাশুপত,  
বক, বসু, মর্নি, কুম্ভবোনি,  
বকফুলের গাছ, বাসকোণা ফুলের  
গাছ, • বকফুল ॥ ব-ম° ॥  
sesbania grandiflora (Carey),  
aeschynomene grandiflora  
(Wilson), Agati grandiflora.  
এর ফুল সাদা, লাল, নীল ও  
পীতভেদে চার প্রকার—ভারতের  
সর্বত্র জন্মে। সাধারণত ২০ হাত  
উঁচু, কান্ড সরল, ফুল বড়। কর্ণাড়  
অবস্থায় চন্দ্রকলার ন্যায় বাঁকা।

অগ্নিগভা—১ শমীবৃক্ষ, সহিগাছ,  
accacia suma. শমী দ্রু° ২  
মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, বড়লতা  
ফটকী।

অগ্নিজার—সাগরসমুদ্র ওষধিবি°।  
॥ রাজনি° ॥

অগ্নিজিহ্বা, অগ্নিজিহ্বিকা—[ হি°  
করিহাবী ; মহা° কললাবী ]  
লাফলীবৃক্ষ, বিষ লাফলিয়া,  
methonica superba ॥ রত্নাচ° ॥  
লাফলী দ্রু°।

অগ্নিজালা—১ গর্জাপপলী, scin-  
dapsus officinalis. পিপলী  
দ্রু° ২ জলপিপলী, grislea

tomentosa, ও ধাতকী, ধাইগাছ

॥ রাজনি° ॥ ৪° অশ্বিনজার,

॥ রাজনি° ॥ ৫ লাক্সলীবৃক্ষ ।

অশ্বিনদমনক, অশ্বিনদমনী—[ ম° ধম্মা-

ভেদ, অশ্বিনদমনা, কেহ কেহ শোলা

বলিয়া থাকে ] পর্যায়—বহ্নিদমনী,

বহ্নদকণ্টকা, বহ্নিকণ্টকাড়িকা, গৃচ্ছ-

ফলা, ক্ষুদ্রফলা, ক্ষুদ্রকণ্টকারী,

ক্ষুদ্রদর্শী, ক্ষুদ্রকণ্টকারিতা,

মতেন্দ্রমাতা, দমনী ] ক্ষুদ্রকণ্টক

বৃক্ষ, গণিকারী, গণিরী, গণিয়ারী,

species of cantacarica,

narcotic plant, solanum

jacquini. দুরালভাভেদ

[ দুরালভা দ্র° ] ।

অশ্বিনীর্ষাস—অশ্বিনজার বৃক্ষ ।

॥ রাজনি° ॥

অশ্বিনমণ্ড—[ হি° অনেথা, অণী,

গণিয়ারী; কোচ° গণ্ধদারী,

গণেন্দারী, ও° অগ্ন্যাকং;

গৃজ° অরণী; তা° মৃশে; ম°

চামার ] পর্যায়—গণিকারিকা,

শ্রীপর্ণ, হবিমণ্ড, বহ্নিমণ্ড,

ইত্যাদি । গণিয়ারী, গণিরী,

অগ্ন্যাক, premna integrifolia,

premna spinosa. গণিকারিকা,

ক্ষুদ্রাশ্বিনমণ্ড premna serati-

folia. ॥ ব-ম° ॥ উৎপত্তিস্থান—

ভারতের সমুদ্রোপকূল, শ্রীহট্ট ।

অশ্বিনমালা—জলপম্পলী, grislea

tomentosa.

অশ্বিনশিখা—লাঙ্গলিকী, জয়গাড়াশাক

॥ অম° ॥ নামান্তর—অনন্তা, কলি-

হারী, হলিনী, লাঙ্গলী, বিশল্যা ।

অগ্রপর্ণী—শুকশিখারী, আলকুশী গাছ,

carpopogon pruriens,

অজলোমাবৃক্ষ ॥ রত্নমা° ॥ আলকুশী

দ্র° ।

অগ্রবীজ—কুব্জাটাদি বীজাগ্র বৃক্ষমাত্র,

কলমের গাছ, যেমন—gom-

phroena globosa. ॥ অতি° ॥

অগ্রিমা—লবণীফল, লবলীফল,

লোণাফল, amnora reticulata.

অশ্বিনাপ্রিয়—অশোকবৃক্ষ, jonesia

asoca.

অজারপর্ণী—বামনহাটি গাছ, clero-

dendron siphonanthus.

অজারমঞ্জরী, অজারমঞ্জী—রক্তকরঞ্জ,

মহাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, caesalpinia

bonducella. ॥ রাজনি° ॥

অঙাশ্বিনামক—দমনকবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অঙাশ্বিনপর্ণিকা—অঙাশ্বিনা,

অঙাশ্বিন-

বল্লিকা, চিত্রপর্ণীবৃক্ষ, পৃষ্ণ-

পর্ণী বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ



hedysarum lagopodiodes.

অজকেশী—নীলীবৃক্ষ, নীলগাছ ।

অজক্ষীরনাশ—শাখোটবৃক্ষ, শ্যাওড়া

গাছ, streplus asper. সম্ভবত

ইহা ভক্ষণে ছাগীর দধ নষ্ট বা

শুদ্ধ হইয়া যায় বলে এই নাম ।

শ্যাওড়ার ক্ষীর বা আঠা ২৪ ফোটা

দধে দিলে দধ জমিয়া দধিতে

পরিণত হয় শোনা যায় । ॥ ব-ম ॥

অজটো—ভূম্যমলকী, ভুই-আমলা দ্র ।

অজড়া—আলকুশী, শুকশিম্বী ।

অজদণ্ডী—ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ, বামনহাটী

গাছ ॥ রাজনি ॥

অজপ্রিয়া—ফুলগাছ ।

অজবলা—কৃষ্ণতুলসী, কালো তুলসী ।

অজভক্ষ—বধূরবৃক্ষ ॥ রাজনি ॥

অজমল—গোধূম, গম ।

অজমোদ—[সঁ অজাজী] দীপ্য, যমানী,

যোয়ান, cummin-seed.

অজমোদা—রান্ধনী, রাধুনি, pinipi-

nela. apium involu-

cratum—eppich ligusticum

ajowan. পর্যায়—খরাহুবা,

বস্তমোদা, উগ্রগন্ধা, মকটী, মোদা,

গন্ধদলা, হস্তিকাবরী, গন্ধপত্রিকা,

মায়ূরী, শিখিমোদা, মোদাঢা,

বহির্দীপিকা, ব্রহ্মকুশী, বিশালী,

হয়গন্ধা, উগ্রগন্ধিকা, মোদিনী,

ফলমুখ্যা, বিশাল্যা ॥ ব-ম ॥

অজমোদিকা—অজমোদা ।

অজহা—শুকশিম্বী, আলকুশী দ্র ।

অজাগর—ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ, eclipta or

verbescina prostata.

অজাজি, -জী—শ্বেতজীরক, cuminum

cyminum, কৃষ্ণজীরক, nigella

indica, কাকোদম্বরিকা ficcus

oppositifolia. ॥ মনি ॥

অজনাথিকা—কৃষ্ণকাপাস বৃক্ষ ।

কালাজনী দ্র ।

অজনী—কটুকাবৃক্ষ, কটুকী গাছ

black hellebore, picrorri-

hiza karroa, কালাজনীবৃক্ষ

॥ রাজনি ॥

অঞ্জলিকারিকা—লজ্জালু (স্পর্শমাত্র

ইহার পত্র সম্বন্ধ হইয়া যায়)

mimosa natans, mimosa-

pudisa ॥ রাজনি, ভাব-প্র ।

পর্যায়—রক্তপাদী, শমীপত্রা,

সমুদ্রা, নমস্কারী, গন্ধকারী, স্পর্শ-

সঙ্কোচপর্ণিকা, স্পৃহা, খদিরপত্রিকা,

সঙ্কোচনী, প্রসারিণী, সপ্তপর্ণী,

খদিরী, গণ্ডমালিকা, লজ্জিকা,

স্পর্শলজ্জা, অমরোদিনি, রক্তমূলা,

তাম্রমূলা, স্বগুপ্তা ॥ রাজনি,

ধম্বস্তরি-নি° ॥

অঞ্জীর, অঞ্জীরক—বড় জাতীয় পেয়ারা  
গাছ [ হি° অঞ্জীর ও আমরুথ ],  
আঁজীর, *ficus carica*, *psidium*  
*pomiferum*.

অটরুধ, —বাসক দ্র° ।

অটুহাসক—কন্দুবৃক্ষ, কন্দফুলের গাছ,  
*jasminum multiflorum* বা  
*hirsutum*. ॥ রাজনি° ॥

অড়র, অড়হর [স° আঢ়কী—আঢ়ক—  
আড়হর; হি° অড়হর, রহর, ঢহর;  
ম° তর, তুর; ও° হরড়; গুজ°  
তুরদান, তুবীয়ো; তা° তুবরই,  
থোবারে; তে° কন্দল; ফা°  
শকুল; পাবনায় অড়োল]  
শিম্বাদিবর্গের কৃষিজাত  
কল্যাণবিশেষের গাছ, অড়হর গাছ,  
*cajanus indicus*. ডাঃ ওয়াট  
বলেন—এই গাছ আফ্রিকা হইতে  
ভারতে আসিয়াছে ।

অণু—সূক্ষ্ম ধান্যবিশেষ । চীনা ধান,  
*panicum miliaceum*.

অণুরেবতী—দন্তীবৃক্ষ, *croton*  
*polyandrum*. ॥ রাজনি° ॥

অশ্বকোটরপদুস্পী—অজান্তীবৃক্ষ, নীল  
রাসনা, নীলবৃহ ।

অতসী—তিসি, *linum usitalessi-*

*mum*. মসিনা, অলসী ।

পর্যায়—চণকা, উমা, ক্ষৌমী,  
রুদ্রপত্রী, সুবচলা, পিচ্ছিল্লা,  
দেবী, মদগন্ধা, মদোৎকটা, ক্ষুদ্রমা,  
হৈমবতী, সুনীলা, নীলপদুস্পিকা  
॥ শব্দ° ॥ প্রাচীনকালে আৰ্যগণ  
মসিনা গাছ আবিষ্কার করিয়া,  
উহার সূত্র দ্বারা বস্ত্র প্রস্তুত  
করিতেন । তিসি দ্র° । যে  
ফুলকে সচরাচর আমরা ‘অতসী’  
বলিয়া থাকি তাহার প্রকৃত নাম  
‘বিলবনবান’, *crotalaria seri-*  
*cea*, এই প্রকার আর একপ্রকার  
গাছকে আমরা বন-আতুসী *crota-*  
*laria retusa* বলে ।

অতিকেশর—কৃষ্ণকবৃক্ষ, কাঁটা  
সেঁউতি ॥ রাজনি° ॥

অতিগন্ধ—১ চম্পকবৃক্ষ, চাঁপাগাছ  
॥ রাজনি° ॥ ২ ভূতৃণ ॥ রাজনি° ॥

অতিচর—স্থলপদ্ম, *hibiscus muta-*  
*bilis* ॥ অম° রাজনি° ॥

অতিছত্র—বেঙের ছাতা, কোড়িক,  
কোড়ি, *agaricaceae*, *agaricus*  
*campestris*. or *psalliata*  
*campestris*. ইং mushroom  
toadstool. পর্যায়—ছত্রা, ছত্রাক,  
শিলীশ্ম, শিলীশ্মক, ভূমিছত্র



॥ অম° শব্দ° ভাব-প্র° ব-ম° ॥

অতিচ্ছত্রক—১ ভূততৃণ, গন্ধতৃণ; ২  
ছত্রবৃক্ষ, ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, গোরক্ষ-  
চাকুলিয়া ॥ রাজনি° শব্দ° ভাব-প্র° ॥

অতিচ্ছত্রা—শতপুষ্পা, শুল্ফা,  
peacedanum graveolens or  
sowa. অতিচ্ছত্রা বা শুল্ফা  
রবিশস্যের শ্রেণীভুক্ত ।

অতিতীক্ষ্ণ—১ শোভাজনকবৃক্ষ, সজিনা  
গাছ । ২ অজমোদা ।

অতিতীক্ষ্ণা—রক্তসর্বপ ।

অতিতীক্ষ্ণা—গণ্ডদুর্বা, গাটদুর্বা,  
॥ রাজনি° ॥

অতিদীপ্য—রক্তচিহ্নকবৃক্ষ, রাঙাচিতা,  
plumbago rosea. পর্যায়—কাল-  
ব্যাল, কালমূল, মার্জার, অগ্নি,  
দাহক, পাবক, চিত্রাঙ্গ, রক্তচিহ্ন ॥  
শব্দ° ॥

অতিপত্র—হস্তিকন্দবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥  
শাকবৃক্ষ, সেগুন গাছ ।

অতিপত্রা—বলা, বেলেড়া, sida  
cordifolia.

অতিবলা—পীতবলা, পীতবর্ণ বেলেড়া,  
পীতবাকুলি, sida rhombifolia.

অতিমজ্জা—বিষুবৃক্ষ, aegle  
marmelos.

অতিমৃক্ত—১ তিনিশবৃক্ষ, dalbergia

oujeinensis, ২ মাধবীলতা ।

অতিমোদা—১ নবমল্লিকা, jasminum  
heterophyllum or arbo-  
reum, ২ সেউতি ।

অতিরক্তা—জ্বাপদ্রুপবৃক্ষ ॥ বৈদ্যানি° ॥

অতিরসা—১ মূর্বা, মূরগা sanse-  
biera zeylanica. ॥ বৈদ্যানি° ॥  
২ বর্ষিমধু ॥ রাজনি° ॥

অতিলোমশা—নীলবৃহা, ছাগলাবেঁটে  
concolvulus argenteus.

অত্যা—তিস্ত্রী ফল, তেঁতুল  
॥ রাজনি° শব্দ° ॥

অত্যা—বনবীজপুরক, ট্যাবালেবু,  
a species of citron.

অত্যা—রক্তচিহ্নকবৃক্ষ, রাঙাচিতাগাছ,  
plumbago rosea. ॥ রাজনি° ॥

অত্যা—নীল শেফালিকা ॥ অ° ॥  
নীলপদ্রুপনিসিন্দা, যে নিসিন্দার  
পদ্রুপ নীলবর্ণ ।

অদল—হিজলবৃক্ষ, ন্যাড়া সিঁজ  
॥ শব্দ° ॥

অদিকর্ণী—অপরাজিতা, clitoria  
ternatea ॥ রাজনি° ॥

অদ্রিজা—সিংহল দেশীয় পিপ্পলী,  
সৈংহলী বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ শব্দ° ॥

অদ্রিভূ—অপরাজিতা লতা, আখরুণী  
বা ইন্দুরকানি নামক পর্বতীয়

লতাৰি° ॥ ব-ম° ॥

অধঃপদ্পী—১ অবাকপদ্পী, মজল্যা,  
অমরপদ্পিকা, *pimpinella*  
*anisum*, ২ গোজিহ্বানামক  
ক্ষুদ্রপৰি°, চোরকাটা, ভাঁটুই,  
*elephantopus scaber* ॥ রত্না-৫° ॥

অধোঘটা—অপামার্গ, *achyranthes*  
*aspera* ॥ রত্না-৫° ॥ শীঘ্ৰে নীচে  
ঘটাত মত ফল ।

অধোবিণী—ব্রাক্ষীশাকৰি° *herpestis*  
*monneiria*, জলনিম ।

অধোমার্গব—অপামার্গ, আপাং গাছ ॥  
রাজনি° ॥

অধোমুখ—অনন্তমূল লতা, *hemides-*  
*mus indicus*.

অধোমুখী—গোজিহ্বা লতাৰি°, *pre-*  
*mna escubenta*. ॥ রাজনি° ॥

অধ্বগভোগ্য—আম্রাতক, আম্রাত,  
আমড়া, *spondias mangifera* ॥  
ত্রিকা° ॥

অধ্বজা—স্বর্ণদলীবৃক্ষ, স্বর্ণপদ্পীবৃক্ষ,  
সোনাগাছ ।

অধ্বশল্য—অপামার্গ, আপাং গাছ ॥  
রাজনি° ॥

অধ্বাসি°ধক—সিন্দুবারবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

অধ্বাস্ত্রশাট্রব—শ্যোনাবৃক্ষ, শ্যোনাগাছ,  
*bignonia indica*, উইলসন মতে

*cassia fistula* (*cathartocar-*  
*pus fistula Pers*) । ইহা ছায়ার  
প্রক্ষুদ্রিত হইয়া থাকে ॥ আপ° ॥

অধ্যাডা—১ কপিপকছদ্, শুকেশি°বী বা  
আলকুশী, ভু°ই-আমলা, *flacou-*  
*ritia cataphracta*. ॥ রত্না-৫° ॥  
২ কুলেখাড়া ॥ মদনপাল ॥ অজ-  
শৃঙ্গী, *carpopogon pruri-*  
*ens*. ॥ অম° ॥

অনংশমৎফলা—কদলী, কলাগাছ,  
*musa paradisiaca* ॥ ব-ম° ॥

অনভুজিহ্বা—গোজিহ্বা (অনন্তমূল),  
*elephantopus scaber* ॥ রাজনি° ॥

অনদ্য—গৌরসর্বপ, শ্বেতসরিষা,  
রাইসরিষা ।

অনন্ত—সিন্দুবার, নিসিন্দাগাছ, *vitex*  
*trifolia* ॥ আপ° ॥

অনন্তমূল, অনন্তা—লতাজাতীয় বনৌ-  
ষধি বি° । [হি° সালসা ; ম° অনন্ত-  
মূল ; গুজ° কালীবেল্য ; ও° গুয়া-  
পানমূল ; তা° নম্মারি ; বোম্ব°  
উপলসার ; পারস্য° বাস ননে-  
বাৰি ; তে° মদ্রপদলগম ; মলয়°  
নারদনিউতি ; ই° Indian *sarsa-*  
*parilla*] ইহার বৈজ্ঞানিক নাম  
*hemidesmus indicus*,  
Roxburgh তাহার Flora

Indica-তে ইহাকে asclepias pseudosarsa নামে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা অর্ক-গোত্রীয় (asclepiadaceae) বৃক্ষ। পর্যায়—ধবলা, শারিবা, গোপী, গোপকন্যা, কুশোদরী, স্ফেটা, শ্যামা, গোপবল্লী লতা, আশ্ফাতা ও চন্দনা ॥ ব-ম° ॥

অনন্তমূলী—রক্তদূরালভা।

অনন্তা—অনন্তমূল। পর্যায়—দর্বা, স্বর্ণক্ষীরী, শ্বেত ও নীল দর্বা, হরীতকী, আমলকী, গুরুচী।

অনল—১ অর্নিচিহ্নক, রক্তচিহ্নক, রাঙচিতা, plumbago zeylanica and rosea ॥ রাজনি° ॥ ভল্লাতক, ভেলা, semicarpus anacardium ॥ রাজনি° ॥

অনলপ্রভা—জ্যোতিষ্মতীলতা বা লতাকটুকী, cardiospermum halicacabum L. ॥ রাজনি° ॥

অনল-বিবর্ধিন—ককটিকা, কাঁকুড়গাছ।

অনলি—বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ, agati grandiflora ॥ ত্রিকাণ্ড° ॥ sesbana g.

অনাক্তান্তা—তর্গবি°, কণ্টকারিকা solanum jacquini ॥ রত্নমা° ॥

অনার্যক, অনার্যজ—অগুরু কাষ্ঠ ॥ রাজনি° ॥

অনার্যতিক্ত (ক)—কিরাততিক্ত বা চিরতা, gentiana chirata ॥ অম° ॥

অনিষ্ক—ইষ্কদৃশ কাশবি°, নাটা আক, নাটা ঘাস saccharum spontaneum ॥ রত্নমা° ॥

অনিমক—মধুক বৃক্ষ, মহুয়া গাছ। ॥ বো-রো° ॥

অনির্মাল্যা—পুষ্কা বা পিড়িং শাক ॥ রত্না-চ° ॥

অনিলঘ্নক—বিভীতকবৃক্ষ, বহেড়া গাছ, terminalia bellerica Roxb. ॥ রাজনি° ॥

অনিলপুষ্প (বিলাতী) উদ্ভিদবি°। anemone.

অনিলনির্ধাস—পিয়াল; পিয়াশাল—বৃক্ষ ॥ বৈদ্য-বি° ॥

অনিলান্তজ—১ ইণ্ডুদীবৃক্ষ, অংগার-পুষ্প ॥ রাজনি° ॥ ২ জীয়াপর্দিত বৃক্ষ, পানমরিচ গাছ।

অনিষ্টা—নাগবলাবৃক্ষবি° sida alba Lin. ॥ রাজনি° শব্দ° ॥

অনুকুলা—দন্তীবৃক্ষ, croton polyandrum.

অনুপুষ্প—শরবৃক্ষ, খাগড়া গাছ saccharum sara Roxb. ॥ শব্দ° ॥



অনুলোমন—হরীতকী ॥ ভাবপ্র° ॥

অনুক্ষ—উৎপল, *nymphaea caerulea* ॥ রাজনি° ॥

অনুক্ষবাল্লিকা—নীলদুর্বা, *panicum dactylon* ॥ রাজনি° ॥

অনুপজ—আদা দ্র° ।

অন্তঃকোটরপুষ্পী—নামাস্তর—অন্ড-কোটরপুষ্পী । নীলবৃহা, ছাগল-বেংটে । ইহার ফুল পাতার ভিতর ঢাকা থাকে ॥ রত্না° ॥

অন্তঃসলিলা—নারিকেল, তরমুজ প্রভৃতি ।

অন্তর্গভ—কলাগাছ, কুশ । ভিতরে মাইজ বা শীষ যুক্ত ।

অন্তমূল—[ হি° অন্তমূল, জংলী—পিক্‌রাল; ও° মেদী] অর্কাদিবর্গের লতাবি°, *tylophora asthmatica*.

অস্তিকা—*echites scholaris*.

অস্ত্রপাচক—ভেষজবি°; *aeschynomene grandiflora*. ॥ সুশ্রু° ॥

অস্ত্রমোড়া—আবর্তনী, আঁতমোড়া, *helicteres isora*. ফলের গায়ে অশ্রের মত পাক দেওয়া আছে ।

অন্তর্বাল্লিকা, অন্তর্বল্লী—১ মহিষবল্লী-লতা ॥ রাজনি° ॥ ২ সোমবল্লীলতা ॥ বৈদ্য-শ° ॥

অশ্বমৃষিকা—দেবাতাড়বৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

অশ্বদল—শিরীষবৃক্ষ, *acacia sirissa* ॥ শব্দচ° ॥ ইহার পুষ্প দেখিলে বিয়োগী অশ্বপ্রায় হয় ॥ ব-ম° ॥

অপূরং—বেতগাছের মত, *calamus species*. বেত ও ফলের ন্যায় রঞ্জন রং—red resin—East Indian dragonis blood. আসল অপূরং অন্য গাছ (*dracoena*) ইহাতে পাওয়া যায় । ভারতে এ গাছ জন্মায় না ।

অপাঙ্ক—অপামার্গ দ্র° ।

অপরাজিতা—[স° অশ্বভরা, অশ্বেত ; ম° গোকর্ণী, কণ্ঠী, পন্ডরী, গুজ° গরণী ; তে° নীলগন্ডনা ; তা° কফেকানন্ কদি ; হি° বিষ্ণু-ক্রান্তি, সফেদ কোয়ল, নীলীকোয়ল] লতাবৃক্ষবিশেষ । ১ নীল বা শ্বেত ফুলের গাছ, *clitoria ternatea*, পর্যায়—আশ্বেতা, গিরিকর্ণী, বিষ্ণুকান্তা, গবাক্ষী, অববধুরী, শ্বেতা, শ্বেতভণ্ডা, গবাদনী, অদ্রিকর্ণী, কটভী, দধিপদ্মপিকা, সিতপদ্মপী, শ্বেতস্পন্দা, ভদ্রা, সুপদ্মী, বিষহন্ত্রী, নগপর্যায়কর্ণী, অম্বাহ্বাদিখরুরী, গর্দভী ॥ অম° রত্না-চ° শব্দ° ॥ ১ অপরাজিতা লতা

ও পদ্ম ভারতের সবস্থানেই হয় ।  
ফুল সাধারণত নীলাভ; শাদা ও  
বেগুনী রঙের হয় । ফুল  
প্রায় দুই-তিন ইঞ্চি লম্বা হয় ।  
২ জয়ন্তীবৃক্ষ, *aeschynomene*  
*sesban*, ৩ অশনপর্ণী, *marsilla*  
*quadrifolia*, ৪ শেফালী,  
*nyctanthes arbor-tristis*, ৫  
শমী, শমীভেদ, লঘুশমী, *mimosa*  
*suma*, ৬ শাখিনী, ৭ হপদ্মভেদ  
॥ ব-ম ॥

অপশোক—অশোকবৃক্ষ ॥ আপ্ ॥

অপাকশাখ—আদা দ্র ॥

অপাঙ্গক—অপামার্গ ॥ মর্নি ॥

অপামার্গ—[ স্ অপামার্গ ; হি  
চিরাটিটী, লটাঙ্গরা ; বোম্ব ॥ ও  
ম্ অষদ, আঘাড়া ; ও অঘেজে ;  
ক্ উত্তরণে, চিচিরা ; ফা খারবাস-  
গোতা ; অ্ অৎকম ; পঞ্জা  
কুদ্রি ; তে অপ খ্যারেরাজ্জম ; তা  
ন-যদ্বিভট ] আপাং গাছ, অপাঙ্গ,  
অপাং, আপাঙ্গ *achyranthes*  
*aspera*, বর্ষজীবী উদ্ভিদ ।  
পর্বায়—ময়ূরক, খরমঞ্জরী, শিখরী,  
প্রত্যকপদুপী, কিনিহী, পঙ্কি-  
কন্টক, ক্ষরক, ধামার্গ, কীশপর্ণী,  
কাণ্ডীরক, মকটী, কটুমঞ্জরিকা,

কন্টী, পান্ডুকন্টক, কুন্ড, অধ্বশলা,  
পরাকপদুপী ॥ শব্দ ব-ম ॥

অপালক—সোঁদাল গাছ, *cassia*  
*fistula* ॥ আপর ॥

অপদুপ—[ ম্ ফনস ] পনসবৃক্ষ,  
উদ্ভব বৃক্ষ, *jack tree*, *arto-*  
*carpus integrifolia*.

॥ গোব্দ ॥

অপেতরাক্ষসী—তুলসী ॥ আপ্ ॥

অফলা—১ ভূম্যালকী, ভুই-আমলা,  
২ ঘটকুমারী ।

অবাকপদুপী—অধঃপদুপী দ্র ॥

অব্জ—নিচলবৃক্ষ, *barringtonia*  
*acutangula*.

অব্জবীজভূৎ—শেতবকরবী বৃক্ষ ।

অব্দ—মুস্তা, মুতা; নাগরমুতা  
॥ শব্দ ॥ *cyperus rotundus*.

অব্দনাদ—কাঁটা নটে, মেঘনাদ ক্ষুদ্র ।

অব্দনাদা—শাখিনী লতা ।

অধিবৃক্ষ—শাখিমূলবৃক্ষ ।

অভয়া—[ ম্ হিবড়া ] হরীতকী,  
*chebula retz*.

অভয়দা—ভুই-আমলা, আমলকী ।

অভীরু—শতমূলী ।

অভীষ্ট গন্ধা—মাধবীলতা ।

অমর—কয়েকটি বৃক্ষ—১ ইন্দ্রবারুণী,  
২ বটী, ৩ মহানীলী, ৪ ঘট-

কুমারী, ৫ পনুহী, ৬ গড়ুচী,

৭ দর্বা ॥ শব্দ ॥

অমরজ—খদিরবৃক্ষবিশেষ ।

অমরতরু, অমরদারু—ইন্দ্রের পারিজাত

কানের বৃক্ষ ॥ আপ্ ॥

অমরদ্রু—বিটখদিরবৃক্ষ, গুল্মেবাবলা ।

অমরপদ্ম, অমরপদ্মক—কেতব, চুড়,

ভৃগুবিশেষ । পদ্মফল, সুপারী,

কাসতৃণ, আশ্র ।

অমরপদ্মিকা—অধঃপদ্মীবৃক্ষ ॥ আপ্ ॥

*anethum sowa.*

অমরবল্লরী, অমরবেল—[ ম° আংশলা ]

আকাশবল্লী লতা ।

অমরাগন্ধক—কাপুর্, *gratisloi-*

*des r*, গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ।

অমরাবেল—[স° আকাশবল্লী] অলোক-

লতা, স্বর্ণলতা, *reflexon Rox.*

অমলকুচি—[ হি° বাকেরি মল ]

কাঁটামূল গুল্ম, *digyne Rox.*

অমলা—১ সাতলাবৃক্ষ, ২ ভূই-

আমলা ।

অমলাজুটা—ভূই-আমলা ।

অমলাতকা—মহারাজতরুণীপদ্ম বৃক্ষ,

চামেলী, বেলফুল ॥ হল্য ॥

অমলা—অগ্নিশীলা, *methonica*

*superba lam.*

অমৃগাল—অভয় দ্র° ।

অমৃত-উদ্ভব—বিশ্ববৃক্ষ ।

অমৃতজটা—জটামাংসী ।

অমৃতফলা—পটোল, পারাবত, দ্রাক্ষা,

আমলকী ।

অমৃতলতা, অমৃতলিতিকা—লতা-

বিশেষ, গড়ুচী ।

অমৃতসম্ভবা—গড়ুচী, গুল্ম ।

অমৃতশ্রব—রুদ্রস্তী বৃক্ষবিশেষ ॥ আপ্ ॥

অমোঘ—পাটলীবৃক্ষ, বিড়ঙ্গ, কুম্মিষ ।

অম্বরদ—কার্পাসবৃক্ষ ।

অম্বরাত—আম্রাতকবৃক্ষ ।

অম্বরীপ—আম্রাতকবৃক্ষ ।

অম্বষ্ঠা, অম্বষ্ঠা—চারাবিশেষ । পর্যায়

—গণিকা, যুথিকা, পাটা, চুটিকা,

অঙ্গারা ।

অম্বষ্ঠিকা, অম্বষ্ঠিকা—ব্রাক্ষী । আক-

নাদি দ্র° । *siphonathus*

*indica.*

অম্বদুকন্দ—পানিফল, শৃঙ্গাটক ।

অম্বদুক্কা—জলপিপ্পলী ।

অম্বদুকের—ছোমক্ষবৃক্ষ ।

অম্বজ—হিজলবৃক্ষ, জলবেতস-

*eugonia acutangula.*

অম্বদ—*cyprus rotundus.*

অম্বদুট—অম্মন্তকবৃক্ষ, পাহাড়ী শিরীষ ।

অম্বদিশ্রবা—ঘৃতকুমারী ।

অম্বদপ—চাকুন্দা গাছ ।



অম্বুবল্লিকা—কারবেল্লী, করেলা ।  
অম্বুবাসী—পাটলাবৃক্ষ, *bignonia*  
*suaveolens*.

অম্বুবাহ—অম্বুদ দ্র° ।  
অম্বুভৃৎ—অম্বুদ দ্র° ।  
অম্বুসারা—কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ ।  
অম্বোজা—ষষ্ঠিমধুলতা ।  
অম্বোদ—অম্বুদ দ্র° ।  
অম্বোদর—অম্বুদ দ্র° ।  
অম্বাত—আমড়াগাছ ।  
অম্বানিম্বক—গোড়ালেবু, *citrus*  
*acida*.

অম্বপত্র—১ অম্বস্তকবৃক্ষ, ২ তুলসীগাছ  
॥ রাজনি° ॥ *caesalpinia oloco-*  
*perma*.

অম্বপত্রক—১ অম্বকুচাই, ২ আমরুল  
॥ রাজনি° ॥

অম্বপনস—মান্দার, লিকুচবৃক্ষ, *arto-*  
*carpus lacucha*.

অম্বপর্ণিকা, অম্বপর্ণ—বৃক্ষবিশেষ ।

অম্বপাদপ—তেঁতুলগাছ ।

অম্বরূহা—মালবদেশজাত নাগবল্লী  
॥ রাজনি° ॥

অম্ববতী—আমরুলতা দ্র° ।

অম্ববাটক, অম্ববাতক—আম্বাতকবৃক্ষ,  
আমড়াগাছ দ্র° ।

অম্ববাস্ক—চাশেরী, আমরুল দ্র° ।

অম্ববাস্তুক—শাকবি° । টকপালং,  
অম্ববেতস ।

অম্ববিন্দুল—অম্ববেতস ।

অম্ববেতস—ক্ষুদ্রপাৰি° । [হি° অমলবেৎ ;  
কোচ° থৈকড় ; মহা° চুকা ; গুজ্জ°  
অচবেত ; ফা° তুর্ষক, সংগুয়হা ]  
অম্ববেতস, চুকাপালং, টকপালং,  
*rumex vesicarius*.

অম্বশাক—টকপালং ।

অম্বটো—আমরুল ।

অম্বসার—১ চুক্র, চুকাপালং, ২ নিম্বক,  
৩ হিহাল ।

অম্বস্তম্ভনিকা—তিস্তড়ী, তেঁতুল ।

অম্বহরিদ্রা—আমহরিদ্রা, শঠিবৃক্ষ আম-  
হলদের গাছ ।

অম্বা—১ তেঁতুল, ২ আমরুল, ৩  
বনমাতুলবৃক্ষ, ৪ অম্ববেতস, ৫  
বর্ষামল্লিকা ।

অম্বাতকী—পলাশীলতা ।

অম্বাদান—কুরটকবৃক্ষ ।

অম্বান—১ আমলা বা আঁবলাফুলের  
গাছ, ২ বাহুলীবৃক্ষ, ৩ পম্বা ।

অম্বানা—মহাসেবতী পদ্মপবৃক্ষ, বড়  
সেউতী গাছ ।

অম্বোটক—অম্বপত্র দ্র° ।

অম্বগ পলাশ—বৃক্ষবিশেষ ।

অম্বমুচ্ছদ—সপ্তমুচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিমগাছ ।

অমৃৎপর্ণ—সপ্তপর্ণবৃক্ষ ।

অরুণ্ড, আরুণ্ড—সোঁদালগাছ, *cassia fistula*.

অরুণি, অরুণী—গণিকারিকা, দরালভা, শ্যোনা গাছ, চিত্রকবৃক্ষ ।

অরুণিসেতু—মহাশ্মিনমন্ত বৃক্ষ, বড় গণিয়ারী গাছ, *prema spinosa*.

অরুণ্যকণা—১ কটু জীরক, ২ বন পিপ্পলী ।

অরুণ্যঘোলিকা, অরুণ্যঘোলী—বনঘোলী গুল্ম ।

অরুণ্যশালি—অরুণ্যধান্য, নীবার ।

অরুণি—পশ্ম ।

অরুণ—শ্যোনা গাছ ।

অরুণক—[ স° বাসক, সিংহমুখী, সিংছপর্ণী ; হি° অরুণ ; তা° এধাডোড ; তে° আদাসরা ] বাসক *vasica nees*.

অরিমেদ—বিটুখদির, গুল্মেবাবলা, *acacia farnesiana* ; *mimosa*.

অরিষ্ট—১ রিঠা বা রীঠা গাছ, ২ নিম্ব বা ফেনিলা *soapberry plant* ।  
শ্রীকণ্ঠ° ॥

অরিষ্টা—নাগবল্লী ।

অরুণা—[ হি° পদ্মেরী ] পোঁড়রীক

নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষ, *root stock of nymphaea plant*, ২ জবা, ৩ ইন্দ্রাবারুণী, ৪ গুল্লা, ৫ পদুর্নবা, ৬ মন্ডিটকা বা মন্ডিডরী বা বড় থলকুড়ী *sphaeranthus indicus*.

অরুহা—ভুই-আমলা ।

অক—আকন্দগাছ *calotropis gigantea*.

অক—কান্তা—হুড়হুড়িয়া দ্র° ।

অকপত্র, অকদল—আদিত্যপত্র দ্র° ।

অকপাদপ—নিমগাছ ।

অকপদ্মী—১ সর্ববল্লী, অকদনা, শ্বেত হুড়হুড়ে, ২ রক্তাপরাজিতা, ৩ ক্ষীরুই গাছ ।

অকমলা—[ স° রুদ্রজটা ; স্তম্ভা বা হি° ইশের মূল ; তে° দুরাগবেলা ; তা° পেরু মারিন্দ্র ], ইশের মূল ।

অকমাস—গন্ধতৃণবিশেষ ।

অজর্দন—[ স° কঙ্কভ ; হি° অজর্দন ; তা° ভেল্লাইমরুদমারুদম ; তে° জারমাদি ; ম° শ্যাদল ; গুল্ম সজ্জন ] । অজর্দন গাছ, *terminalia arjuna* ॥ রঘুব° ॥ ৩০৩২ হাত উঁচু, কান্ড অতি মূল । বীরভূম অঙ্গে প্রচুর জন্মে । আরুণ্যবৃক্ষ । পাতার আকার

মানুষের জিহ্বার মত ।

অর্শোয়ী—তালমুলী, *curculigo orchioides*.

অলকুশী—আত্মগুপ্তা ।

অলব্দুবা—১ লজ্জাবতী লতা, ২ ভূই-কদম, ৩ কুকসিম ।

অলক—শ্বেত আকন্দ । আকন্দ দ্র° ।

অলকলতা—[ স° অমরাবেল, আকাশ-বল্লী ; হি° আকাশাবল ] স্বর্ণলতা ।

অলাম্ব—লাউ, তুন্দ্রী, *lagenaria vulgaris ser.*

অশোক—[ স° অশোক, কাকৈলি ; গুজ°

অশোপলভ, কঙ্কন° আস্বনকার ]

অশোক গাছ ( কথিত আছে—

গৌরী এই বৃক্ষমূলে তপস্যা

করে সিদ্ধমনোরথ ও বিগত শোক

হইয়াছিলেন বলিয়া এই নাম

কুমা° ), *jonesia asoka*,

*saraea indica*, ২ বকুল গাছ ।

পর্যায়—অফ্রানাপ্রিয়, শোকনাশ,

বিশোক, বণ্ডুলদ্রুম, মধুপদুম,

অপশোক, কক্কেলি, কেলিক,

রক্তপল্লব, চিত্র, বিচিত্র, পল্লবদ্রুম,

হেমপদুম । উৎপত্তিস্থান—দক্ষিণ-

ভারত, আরাকান, বঙ্গে বহুস্থানে

দেখা যায় । ২৫-৩০ হাত উঁচু ।

পাতা ছোট ; পাতার অগ্রভাগ সরু,

পাতা ৩-৯ ইঞ্চি, ঘন । ঔষধে ব্যবহৃত হয় ।

অশ্মশ্রু—পাষণভেদক বৃক্ষ. পাথরকুচি গাছ, *calcus aromaticus*.

অশ্বকর্ণ—শালগাছ, সম্ভ্র-শাল ( যার নির্ধাস থেকে ধুনা হয় ), *ghorea robusta*.

অশ্বগন্ধা—ক্ষুদ্রপাণ্ডেশ, *withania somnifera*, *physatis flexuosa*.

অশ্বকাতরা—[ হি° ঘোড়েকাথর ] ঘোড়াকাতরা গাছ ।

অশ্বপু—করবী ।

অশ্বখ—[ স° গজভক্ষ, ক্ষীরদ্রুম,

পিপল ; হি° পিপল ; গুজ°

জোরি ; মলয়° অরেল ; মে°

রাগী ; কন° আরলী ; তে°

বারিচেট্ট ; তা° অশ্বমরম ;

সাওতাল—হেসাক, ইং *foplar*

*leaved fig tree* ] অশ্বখগাছ,

*ficus religiosa*. পর্যায়—

অচ্যুতবাস, চলপত্র, পবিত্রক,

শুভদ, বোধিবৃক্ষ, যান্ত্রিক, শ্রীমান্

ক্ষীরদ্রুম, বিপ্র, মজ্জা, শ্যামল,

পিপল, গুহ্যপদুম, সেব্য, সত্য,

শুদ্ধিদ্ৰুম, চৈতদ্ৰুম, ধর্মবৃক্ষ

শব্দ° । উৎপত্তিস্থান—হিমালয়



প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বঙ্গদেশ। বহু  
শাখাবিশিষ্ট বড় গাছ; পাতা  
পাতলা, চামড়ার মত, উপরদিকে  
উজ্জ্বল।

অশ্ববলা—পালংশাক।

অশ্বন, অসন—[ স° বীজক; হি°  
তা° কুরূপ, মারুতা ] পিয়াশাল,  
tomentosa bedd. ইহা ৮০।৯০  
লম্বা হয়।

অসিতা—১ অল্পকা, তে°তুল, ২  
নীলীবৃক্ষ।

অস্থিভঙ্গ—হাড়ভাঙ্গা গাছ, cissus  
quadrangularis.

অস্থিসংহার—হাড়জোড়া গাছ।

quadrangularis wall.

অশ্বেত—অপরাজিত।

অহিংস্রা—কণ্টকপান, কুলেখাড়া,  
capparis sopiasia.

অহিফেন—লতানে গাছ, আফিং গাছ,  
somniaferum l.

অহিভয়—ভু°ই-আমলা।

অহিভুক—গন্ধনাকুলী।

অহিলতা—গন্ধনাকুলী, ২ তাম্বানি-  
লতা।

অহিমার—গুয়েবাবলা, mimosa-  
farnesiona.

অহীন্দ্র—অনন্তমূল, শারিবা।

অহেরু—অনন্তমূল, শতমূল।

## [ অ ]

অইষ—লিচুজাতীয় গাছ, আঁষ ফল,  
nephelium longana. ফল  
গোলাকার মসৃণ। লিচুর ফলদল  
নাই, আঁষফলের আছে। শাঁসে  
আঁমিষ গন্ধ।

আঁকোড়—অকোড় দ্র°।

আঁটকা কলাই—[ হি° আকড়ী ]  
লতানিয়া গাছ, শিষাদিবর্গের বন্য  
কলাইবিশেষ, vicia sativa.

আত্মোড়া—[ স° আবর্তকী, অজ্ঞশৃঙ্গী,  
রক্তপদুম্পী, বামাবর্তী, আবর্তনী;

হি° কুপাইসি, জোয়াকা ফল,  
মাড়োর ফলী; তে° শয়ামলী;  
তা° বলাম্‌বিরিকৈ; ফা° পিচক।  
বন্ধুকাদিবর্গের বৃহৎ ক্ষুদ্র-  
বিশেষ। ফল পিপুলের মত  
কিন্তু ক্ষুর মত প্যাচ আছে,  
isora corylifolia, helictares  
isora.

আইচ—আউছ দ্র°।

আউছ—[ স° আচছক; ও° আছ ]  
আছকাদিবর্গের ছোট ক্ষুদ্র

বিশেষ ; আচ, *morinda*  
*citrifolia*.

আউস—ধান্যবিশেষ । ধান্য দ্র° ।

আক, আখ—[স° ইক্ষু, পদ্ম, কান্তার,  
কম্বল ; হি° ইখু, উ°খ, উক ;  
গম্বা, গাঁড়া ; ম° উ°স ; গদ্বজ°  
শেরডী ; ক° কবু, কাম্বন মেরু ;  
তে° চিরকু ; ফা° নেশকর ; অ°  
কম্ববুস শকর ; ও° আখু ; ঢাকায়  
আউখ, ফরিদপুরে কুবইর ] মিষ্ট  
রসাল দণ্ডের ন্যায় বৃক্ষ, *saccha-*  
*rum officinarum*, পর্যায়  
—ইক্ষু, ককটিক, বংশ, কান্তার,  
সুন্ধমারক, অসিপত্র, মধুতৃণ, বৃষ্য,  
গদ্বজতৃণ । বর্ষজীবী ঔষ্ধ ।  
কান্ড ৬-১২ ফুট উঁচু, মোটা  
গাটবৃত্ত ও নিরেট । গাট হইতে  
শিকড় বাহির হয় । প্রকারভেদ—  
দেশী পড়ী, কান্ডারী, খড়ী,  
শ্যামসাদা, কাজলা, কাজলী,  
বোম্বাই ।

আকন—আকন্দ দ্র° ।

আকনাদি—স° বিম্বকর্ণী, অবিম্বকর্ণী,  
কর্ণ, নিম্বকা ; হি° আকনাদি ;  
ও° অকানবি°ধি ] লতাবিশেষ,  
গদ্বজতরী মত, *stephania*  
*hernandifolia*. আকনাদি ও

নিম্বকা এক কিনা সে বিষয়ে  
সন্দেহ আছে । পর্যায়—অম্বষ্ঠা,  
অম্বষ্ঠিকা, প্রাচীনা, পাপটেলিকা,  
যুথিকা, স্থাপনী, শ্রেয়সী, বিম্ব-  
কর্ণিকা, একাষ্ঠিলা, কুচেলী,  
দীপনী, বনতিস্তিকা, তিস্তপদ্ম,  
বৃহত্তিস্তা, শিশিরা, বৃকী, মালতী,  
বরা, দেবী, বৃন্তপর্ণী ॥ শব্দ° ॥

আকন্দ—[ স° অক, মন্দার, তুলফল ;  
হি° আক, মদার ; ও° অরষ ]  
অকাদিবর্গের ক্ষীরীক্ষুপবিশেষ ।  
আকন, আকন্দ, *calotropis*  
*-gigantea*, ছোট আকন্দ *calo-*  
*tropis herbacea*. আকন্দের  
প্রকার—শ্বেত আকন্দ, রক্ত  
আকন্দ । পর্যায়—সাধারণ—  
ক্ষীরদল, পুচ্ছী, প্রতাপ, ক্ষীর-  
কান্তক, বিক্ষীর, ক্ষীরী অকপর্ণ,  
খজুর, শীতপদ্মক, জম্বন,  
ক্ষীরপর্ণী, বিকীরণ, সদাপদ্ম,  
সূর্যাস্ত, আক্ষেপাতক, শকফল,  
বস্ক, আক্ষেপাত ; শ্বেত আকন্দ—  
অলক, রাজাক, প্রতাপস,  
গগরুপী ; রক্ত আকন্দ—বিশ্বোর,  
সদাপদ্মী, রূপিকা, আদিত্য-  
পদ্মিকা, দিব্যপদ্মিকা, অক  
॥ শব্দ° ॥

আকরকড়া—গুলদাড়ী বা গুলচিনি  
বলিয়া পরিচিত, *pyrethum*  
*indicum*.

আকরকরা—[ সঁ আকরকরড, অকর,  
অকরকরড ; হিঁ আকরকরা ; তেঁ  
অকলকরা ; গুজ্জঁ অকীরকরম ; ইঁ  
spanish pelitory ] সোমরাজি-  
বর্গের শাকবিশেষ, *anacyclus*  
*pyrethum*. সোমরাজিবর্গের  
শাকবিঁ। শব্দ মূল ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত হয়। মূল লম্বা ও  
সঙ্কটচিত। উপরের রং কটা  
কিন্তু কাটিলে সিতরে শাদা।  
স্বাদ প্রথমে অল্প মিষ্ট ও পরে  
কাল। আকরকরা ও বচ বিভিন্ন  
বস্তু।

আকরোট—অথরোট দ্র°।

আকরকরড—আকরকরা দ্র°।

আকাশমাংসী—জটামাংসী দ্র°।

আকাশমূলী—কুম্ভিকা, পানা ; *pistia*  
*stratiotes*.

আকাশবল্লী—[ হিঁ অমরবেল, আকাশ-  
বালি, আকাশবেল, *cassya*  
*filiformis*, সরু পত্রহীন হরিষর্গ-  
লতাবিশেষ।

আকাশবেল—আকাশবল্লী দ্র°।

আকুশ—*rottlera laceifera*।

আক্ষিক—রঞ্জকবৃক্ষ।

আক্ষীব—অক্ষীব দ্র°।

আক্ষোট, আক্ষোড়—১ পর্বতীয় পীল-  
বৃক্ষ, ২ আথরোট গাছ।

আথরোট—( ইং *candelnut tree*)  
*alaristes tribola*, জুজলা  
আথরোট ( বেল ), হিজলী বাদাম  
( বেল )।

আথু—দেবতাভূষণ।

আথুকর্ণপর্ণিকা, আথুকর্ণী, আথু-  
পর্ণিকা—ইন্দুরকানিলতা।

আথোট—শৈলপীলবৃক্ষ, আথরোট-  
গাছ।

আগমকি, আগমী—[ ইং *brissly*  
*bryony* ]। আগমুখী—*mukia*  
*scrabrella*।

আঘটুক—রক্ত অপামার্গ, রাঙা আপাং  
গাছ।

আঘাট—আপাং গাছ।

আওলা—আমলকী দ্র°।

আঙ্কোল—অঙ্কোট দ্র°।

আজ্জুর—[ সং দ্রাক্ষা ; ফাঁ অজ্জুর ;  
ইং *vine, grapes* ] দ্রাক্ষালতার  
ফল, *vitis vinifera*. দ্রাক্ষা দ্র°।  
দুই রকম ফল—কিসমিস, মনকা।

পষায়—দ্রাক্ষা, মৃদ্বীকা, গোস্তনী,  
স্বাদী, মধুরসা, চাড়ফিলা, কৃষ্ণা,



প্রিয়লা, তাপসপ্রিয়া, গন্ধফলা,  
রসালা, অমৃতফলা, রসা ॥ শব্দ ॥

আচ—আউছ দ্র° ।

আচারী—হেলগলতা ।

আচু—[ ইং rasp berry ] একপ্রকার  
কাঁটাগাছ rubus paniculatus.

আচ্ছক—আইচবৃক্ষ ।

আজ্ঞম্বরভিপত্র—মরবকীবৃক্ষ ।

আঞ্জীর—[ ফা° অঞ্জীর (পেল্লারা ফল),  
স° অঞ্জীর (ডুমুর) ], ficus  
cunia.

আটকপালি—অঞ্জীর দ্র° ।

আটকে-কলায়—[ স° বৃকানক ; হি°  
মুজফলি ; তা° বাকদলাই ; তে°  
বাণসানা গা-কায় ] চীনাবাদাম,  
মাটকলাই, arachis hypogaea.  
চীনাবাদাম দ্র° ।

আড়স—অবগম্ভা ও আড়শ এক অথবা  
এক নয় ।

আচকী—অড়হর, শমীধান্যবি° ।

আতবী জাম্বীর—[ ও° নারগদলি ;  
ইং wild lime ] ছোট গুল্ম-  
জাতীয় উদ্ভিদ, atlantia  
morophylla c.

আতা—[ স° আতপ্য, গণ্ডগাছ ; হি°  
আতা, সীতামূল, শরীফা ; ফা°  
আতা, শরীফা ; তা° সীতাপল্লম ;

তে° সীতাপল্লম ; ও° আতা ;  
ইং sweet shop, castard  
apple ] ফলতরুবি°, anona  
squamosa. ফলের গা উঁচু-  
নীচু । ২ নোনা আতা [ ইং  
bullock's heart ] anoma  
reticulata—মাকারি গাছ,  
১০—১৫ ফুট উঁচু । ফল শাসাল,  
মিষ্ট, সুস্বাদু ।

আতাইচ, আতিষ—[ স° অতিবিষা ;  
হি° অতীস্ ; ম° অতিবিষা ; গুজ°  
অতনসনাকলা ; ক° অতিবিষা ;  
তে° অতিবাসা ; আসাম, সিকিম—  
শেতোবিধুম ; উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে  
—সফেদ বিখ ] ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র-বি°,  
aconitum heterophyllum, a.  
palmatum. পর্যায়—বিশ্বা,  
বিষা, প্রতিবিষা, উপবিষা, শৃঙ্গী,  
অরুণা, শ্বেতকন্দা, ভজুরা,  
ঘৃণবল্লভা, অতিসারঘ্নী ॥ শব্দ ॥

আতিষ—অতিবিষা দ্র° ।

আতপ্য—আতা দ্র° ।

আত্মগুপ্তা—আলকুশী দ্র° ।

আত্মমূলা—দুরালভা লতা দ্র° ।

আত্মরক্ষা—মহেন্দ্রবারুণী বৃক্ষ, মাকাল  
গাছ ।

আত্মোন্মত্তা—মাষপণী বৃক্ষ, glycine

debills.

আদা—[ স° আদ্রক ; হি° আদ্রক ;  
ম° আনং ; গুজ° আদ্র ; ক°  
অন্ন ; তে° অন্ন ; ফা° জিঞ্জি ;  
অ° জিঞ্জিবিলতর ; ইং ginger ]  
হরিত্রাঘর্ণের মূল শাকের কন্দের  
নাম আদা, *Zingiber officinale*  
শুকাইলে শঠ। পর্যায়—অদ্রক,  
শুষ্কীবের, শৃষ্ঠী, গুজ্জমূল,  
মূলজ, কন্দল, বর. মহাজ,  
একবেণ্ট, অন্দপজ, অপাকশাক ই°।  
প্রকারভেদ—বন আদা, *Z. casu-*  
*munar* ; জঙ্গলী আদা, *Z.*  
*capitatum*.

আদানী—হস্তিঘোষাবৃক্ষ।

আদা-বর্ণী—[ ইং thyme-leaved  
herpestis ] ব্রাক্সী, *herpestis*  
*monniera*.

আদারিবিষী—আনেরী (?), অল্প-  
বেতসের তুল্য পুষ্পযুক্ত  
লতাবি°।

আদিত্যপত্র—ক্ষুপাবি°। অর্কপত্রের  
মত পাতা। পর্যায়—অর্কপত্র,  
অর্কদল, সূর্যপত্র, তপনচ্ছদ,  
কুম্ভারি, বিটপ, সূপত্র, রবিপ্রিয়,  
রশ্মিপতি, রুদ্র ॥ শব্দ°।

আদিত্যপদ্মপিকা—রক্তপদ্মপ, অর্কবৃক্ষ,

রাঙা আকন্দ গাছ।

আদিত্যভস্মা—হুড়হুড়িয়া, *achyran-*  
*thes aspera*, *cleome*  
*viscosa*. পর্যায়—বরদা,  
অর্কভস্মা, সুবর্ণনা, সূর্যলতা,  
সূর্যাবর্তা, অর্ককাস্মা, মণ্ডকপর্ণী,  
সুরসম্ভবা, সৌরী, স্নেহজা,  
অর্কহিতা, বরিষ্ঠা, মণ্ডুকী,  
সপ্তনামা, দেবী, মার্কণ্ড-বল্লভা,  
বিক্রান্তা ভাস্করেণ্টা ॥ শব্দ°।

আদ্রক—আদা দ্র°।

আধর্ষিক—অড়হর দ্র°।

আনন্দী—আনকপাতা।

আনার—[ ফা° অনার ; ইং pomeg-  
ranate ] ডালিম, *punica*  
*granatum*.

আনারস—[ স° অনংনাস ; হি°  
অনানস্ ; তা° অনাস পকাম ;  
তে° অনসপদ্ম ; ফা° সফরদি ;  
ম° অনলস ; গুজ° সহরী ; ইং  
pine apple, European jack  
fruit (?) ]। কোকাজাতীয় গাছ,  
*ananas sativa*, *bromelia*  
*ananas*, *cleome viscosa*.  
আমেরিকায় ব্রেজিল দেশে  
'ননস' (*nanas*) জন্মিত—  
পত্রগোঁজ ভাষায় 'অনানস'। ঐ

স্থান হইতে ভারতে আসে।  
বির্লিতি আনারস (বেল), *agave americana*. জঙ্ঘলী আনারস (ঐ), গদগাছ (যো), বন আনারস (নৃত্য), বিলাতী কৈয়া (নৃত্য)।

আপস্তম্বিনী—লিঙ্কনী লতা (?)।

আপাঙ্ক, আপাঙ্ক—অপামার্গ দ্রু।

আবটা—[সং অশ্বত্থক] অশ্বত্থক দ্রু।

আপেল—আপেল গাছ, *pyrus malus*.

আপ্য—কুণ্ডবৃক্ষ।

আফিং, আফিম—[সং আপস, অফেন, অহিফেন; ইং *opium*] ছোট গাছ, অনেকটা শিয়ালকাটা গাছের মত, *papaver somniferum*. ফল যাহাকে চেঁড়ী (সং খসখস) বলে, চেঁড়ী ভাঙিলে যে আঠা বাহির হয় তাহাকে আফিং ও ভিতরের বীজকে পোস্ত (সং খসতিল) বলে। ভারতে পূর্বে জানা ছিল না, গ্রীকরা ইহার আবিষ্কার, তাহারা ইহাকে *opion* বলিত (গ্রীক *opos*)।

আবলদুস—[সং তিন্দুক; হি ও ফা আবনদুস; ইং *Indian ebony*] বৃক্ষবি। গাছে কাঠ ফল, *diospyros ebenum*.

আবটা ফল—অশ্বত্থক ফল দ্রু।

আম, আম্র—[সং আম্র, আম্রতাম্র, চূত; হি আম; মং আম্রা, আঁবা; গুজ্জ আম্রো; কং মাবিন ফল; তেং মাঁবাড; ফাং আম্রা; অং অশ্বজ; ওং আম্রতাম্র] মিষ্ট রসাল ফল, *mangifera indica*. নানাপ্রকার আম আছে তন্মধ্যে কয়েকটি—দেশী, লেঙ্কড়া, বোম্বাই, কিসনভোগ, মালদহ, সুন্দর-সা, গোপালভোগ, বিশ্বনাথ চাটুজ্যো, বৃন্দাবনী, মোহনভোগ, মাম্রাজী, ফজলি, গোলাপখাস ইত্যাদি।

এ ছাড়া লতা আম, বুনো আম (*mangifera sylvatica*) আছে।  
পৰ্যায়—অম্র, চূত, রসাল, সহকার, কামশর, কামবল্লভ, কামাঙ্ক, কীরেট, মাধবদ্রুম, মদিরা-সখ, ভূতাতীট, সীধুরস, মধুলী, কোকিলোৎসব, বসন্তদ্রুত, অম্রফল, মদাচা, মন্মথালয়, মধ্বাবাস, সুমদন, অনিপ্রিয়, পিকরাগ, নৃপপ্রিয়, প্রিয়াম্বু, কোকিলাবাস, মাকন্দ, ষট্পদার্থিথ, মধুদ্রুত, বসন্তদ্রু, পিকপ্রিয়, শ্রীপ্রিয়, গন্ধবন্দু, সহকার ॥ শব্দ ॥

আম-আদা—[সং আম্রহরিদ্রা; হি

আমহলদী ; জ° সামেদি-আম্রাম ;  
 ভে° কারু-পাশুপদ ; ষাবানিক  
 অমরদা ; ইং mango ginger ]  
 হরিত্রাদিবর্গের মূল শাকবি°, cur-  
 cuma amada, c. indica.  
 পর্বায়—কপূরহরিত্রা, দাবী,  
 মেদা, অন্নগন্ধা, সুরভীদারু,  
 দারু, কপূরা, পম্পপত্রা, সুরভী,  
 সুরনায়কা, হরিত্রা ॥ শব্দ° ॥ ইহা  
 দেখিতে আদার ন্যায়, গন্ধ আমের  
 ন্যায় । গাছ ২-৩ ফুট উচ্চ ।

আমটোকা—Vitis indica.

আমড়া—[স° আন্নাতক ; হি° অম্বড়া ;  
 তা° মরিমণ্ডেতি ; তে° টেরিমনোডী ;  
 ও° অম্বড়া ; ইং wild mango,  
 hog-plum ] অম্লফলবৃক্ষ ;  
 spondias mangifera.  
 প্রকারভেদ—বিলাতী আমড়া ( ইং  
 otaheite apple ) spondias  
 dulcis. পলিনেশিয়ার গাছ ।  
 পর্যায়—আন্নাত, পীতন, কপীতন,  
 বর্ষপাকী, পীতনক, কপিচড়া,  
 অলবাটিক, ভূঙ্গীফল, রসাতা,  
 তমুকীর, কপিপিপ্র, অম্বরাতক,  
 অম্বরীশ, কপিচড়া, আন্নাবর্ত ।

আমুড—এরুডবৃক্ষ দ্র° ।

আমদ—হরিত্রাবি°, curcuma amada

॥ বেল° ॥

আমন্দ—ভ্যারাডা গাছ দ্র° ।

আময়—কুড় ।

আমরুড—পেয়ারা দ্র° ।

আমরুল—শাকবি°, অম্বষ্ঠা, oxalis  
 corniculata. পর্বায়—চাকেরী,  
 চুক্তিকা, দশুশঠা ।

আমরুল—[ স° অম্ললোনী ; হি°  
 আমবোতি ; ও° আম্লিতি ]  
 অম্লরসযুক্ত ছোট শাকবি°, oxalis  
 corniculata. পর্যায়—অম্লবতী,  
 অম্লবাসুক ।


আমতকী—সোনামুখী দ্র° ।

আমলক, আমলী, আমলকী, আমলা—  
 আমলক ; হি° আমরা, দৌলা,  
 আঁওকা, অওরা ; ম° আম্বঠঠা ;  
 গুজ° আঁবলা ; ক° নেল্লি ; তে°  
 উমরকায় ; উ° অম্বা ; ফা°  
 আমলক, আ° অমলক ; ও°  
 অএলা ] অতি বৃহৎ আরণ্যগাছ,  
 emblica officinalis, emblica  
 myrobalan, ভূঁইআমলা, ছোট  
 লতাবি°, phyllanthus niruri,  
 p. urinaria. পর্যায়—তিষ্যফলা,  
 অমৃত, বয়স্কা, কায়স্কা, গ্রীফলা,  
 ধাত্রিকা, শিবা, শান্তা, ধাত্রী,  
 অমৃতফলা, বৃষ্যা, বৃক্ষফলা,

S.C.E.R.T. West Bengal

Date 25-3-87

Acc. No. 3939





রোচনী, কৰ্ণকলা, তিৰ্য্য। মাঝারি  
গাছ, ২০—২৪ ফুট উঁচু পত্রদণ্ড  
লম্বা, বোটা ছোট, ফুল ছোট।  
ফল সবুজ আভাষুক্ত পীতবর্ণ।  
স্বাদে কষায়, অগ্ন্যমধুর।

আমলকুচি—অম্লকুচি দ্র°।

আমলি—[ স° আল্লীকা ] তেঁতুল,  
*tamarindus indica*. তেঁতুল  
দ্র°।

আম-হলদী—আমআদা দ্র°।

আমহলদ—আমআদা, *curcuma*  
*reclinata*, পৰ্যায়—কচুঁর,  
দ্রাবিড়, কশ্য, দুর্লভ, গন্ধমূলক,  
বেধমুখ্য, গন্ধসার, জটীল, কম্পক,  
শটী।

আমুখ—বেউড়, বাঁশ।

আমুপ—কাঁটাযুক্ত বাঁশ।

আমুরলাতমী—আমুরা দ্র°।

আবুহু—বৃক্ষবি°। আমুর-লাতমী  
*amoora cacullata*.

আম্বহলদ—আমআদা দ্র°।

আম্বগন্ধক—আমআদা দ্র°।

আম্বাত, আম্বতক, আম্ববত—আমড়া  
দ্র°।

আম্লকুচি—আমলকুচি *caesalpinia*  
*digyna*.

আম্ববেতস—তেঁতুলগাছ।

আম্বা, আম্বিকা—তেঁতুলগাছ।

আম্বতচ্ছদা—কলাগাছ।

আম্বাপান—সোমরাজিবর্গের শাক-  
বিশেষ, *eupatorium ayapana*,  
*e. repandum*. আমেরিকা হইতে  
আনীত।

আম্বধর্মিনী—জয়ন্তীবৃক্ষ দ্র°।

আর—রেফলবৃক্ষ।

আরবধ—সোনাল দ্র°।

আরটী—১ স্থলপশ্ম, ২ বামনহাটি।

আরণ্যমুগা—মকাপণী°।

আরস, আড়স—লোনাভাটি, *solanum*  
*verbascifolium*.

আরামশীতলা—সুগন্ধিপত্রবৃদ্ধ বৃক্ষ-  
বি°।

আরারুট—এরারুট। হরিদ্রাদিবর্গের  
মূলশাকবি°। [ হি° তিখুর  
(টিখুড়), চিখুড় ] ১ শটি  
গাছের মত গাছ, *curcuma*  
*angustifolia*. ২ বিদেশী গাছ,  
*maranta arundinacea*.

আরেবত—সোঁদাল গাছ।

আগবধ—সোঁদাল গাছ।

আতর্গল—নীলবাঁটি।

আদ্রক, আদ্রশাক—আদা।

আধবিক—অড়হর দ্র°।

আলকুশী—[ ইং cowage ] বর্ষজীবী

লতা, *mucuna pruriens* de.  
 ইহার লতা ও পাতা সীমগাছের  
 ন্যায় ও ছোট ছোট লোম দ্বারা  
 আবৃত। এই লতা স্পর্শ মাত্রেই  
 চিড়িচিড় করিয়া জ্বলে ও স্পর্শতাজ  
 ফুলে। কিন্তু বীজ উপকারী।  
 পর্ষায়—আত্মগুপ্তা, অজহা, অজড়া,  
 আষভী, অধ্যস্তা, ঋষ্যপ্রোক্তা,  
 কণ্ডুরা, কপিপ্রভা, কপিকন্দু,  
 কুণ্ডলী, কপিरोম ফলা, গুপ্তা,  
 চন্ডা, গুরুর, জড়া, তীক্ষ্ণ,  
 দূরভিগ্রহা, দূষণী, প্রাব্যায়ণী,  
 প্রাব্য, প্রাব্যেণ্য, বদরী,  
 বহরিকা, বনশুকরী, কীশরোম,  
 বানরী, মকটি, মহর্ষভী,  
 রোমবল্লী, রোমাল, শিপী,  
 শুকপিণ্ডী, শুকশিষ্য, শুকশিষ্যী,  
 স্বগুপ্তা, স্বয়ংগুপ্তা।

আলগলতা—লতাবি, *cymbidium*  
*tessaloides*.

আলগোছ—[ স° অমরবল্লী,  
 ব্যোমবল্লিকা, দূষণী; ও°  
 নিম্বলী ] কলম্বাদিবর্গের  
 পরবৃক্ষজীবীলতা, *cuscuta*  
*reflexa*. কোথাও কোথাও ইহাকে  
 ‘আলপুশী’ লতা বলে।  
 ‘আকাশবল্লী’ হইতে স্বতন্ত্র।

আলগোসা—[ ইং round headed  
 dodder ] *cuscuta capillata*.

আলাধ-ফেনা—*opuntia dillanii*.

আলিষপাইস—[ ইং allspice ]  
*pimenta vulgaris*.

আমেরিকার গাছ।

আলু—[ স° আলু, গলিতিকা, সংস্কৃত  
 নামের আলু বিলাতী গোল আলু  
 নহে। উড়িয়ায় আলু অর্থে  
 ‘খাম-আলু’ বৃক্ষায়। আলু বিবিধ  
 প্রকার—(১) শকরকন্দ আলু—[ স°  
 খণ্ডকর্ণ ] কলম্বাদিবর্গের লতাবি,  
*Ipomoea batatas*. মিঠাআলু  
 শকরাখণ্ড আলু, লালবর্ণ বলিয়া  
 রক্তআলু, রাঙাআলু, (২) গোল-  
 আলু—বিলাতী আলু *solanum*  
*tuberosum*. আদিস্থান—  
 আমেরিকা। (৩) নীল আলু,  
 (৪) পির আলু, *raudia*  
*uliginosa*. (৫) খাম-আলু [ স°  
 দাডালু; ও° অম্বআলু (স্তম্ভাকারী)]  
*dioscorea alata*. (৬) চুপড়ী-  
 আলু—[ স° পিডালু, ও°  
 হাণ্ডিয়া আলু ] *d. alata*  
*var. rubella*. (৭) লাল গরানিয়া  
 আলু, *d. alata var. purpu-*  
*rea*. (৮) কুকুর আলু—বন্য আলু

d. anguina. (৯) রতালদ বা বুনো আলদ—বৃহৎলতা, d. bulbifera. সবুজবর্ণ, (১০) কাঁটা আলদ—কশ্বকপূর্ণ লতা, আলদ বড়, d. pentaphylla. (১১) মো আলদ—[স° মধ্বালদ] d. spinosa. (১২) ছোট কাঁটা আলদর গাছ—নামান্তর স্কুয়নি আলদ, d. fasciculata. (১৩) শাখআলদ—শাখের মত আকার ও রঙ pachyrhizus angulatus. (১৪) গজা আলদ—গম্বা আলদ, নিকৃষ্ট আলদ manihot utilisima. নামান্তর শিমুলী আলদ।

আলদবখরা—[স° আরদক, আলদক ; হি° আলদবোখারা ; কা° অলদ ; ই° bokhara plum] আলদবোখারা, prunus insititia, p. bokariensis, p. communis. কাম্বীর ও আফগানিস্তানে জন্মায়, পঞ্জাবেও জন্মায়। বদরীর মত মাংসল মিষ্ট ফলতরদ।

আবর্তকী—ভদ্রদাঁড়িকাবৃক্ষ।

আবর্তিন—অজশৃঙ্গীবৃক্ষ, গাড়ল-শৃঙ্গ।

আবিন—পানি-আমলাবৃক্ষ।

আবেগী—বৃক্ষদারকবৃক্ষ। con-volvulus argenteus.

আশন, আসন—[স° অসন, পীতশাল ; হি° অসনা, সজ ; উ° সহজদ্র, ফলাসহজদ্র ; আ° অমরী ; ম° বিবঠ্ঠা, বিবঠ্ঠাপ গোদ ; গুজ্জ° বীরাং, হীরাদখন, বীরাণোগর্দ ; ক° কর্ণমহোণে ; তে° মর্দি ; ফা° করমকশ ; ও° অসন] বৃহৎ বন্যবৃক্ষ, জীবকবৃক্ষ, terminalia tomentosa, pentaphore t. হরীতক্যাদিবর্গের পত্রত্যাগী বন্য গাছ। প্রায় অজুর্নগাছের মত দোঁখতে। খুব বড় ও দীর্ঘজীবী। ফুল পীতবর্ণ। কাঠ-শক্ত, খয়ের রং, অধিকাংশ কালো। গাছ হইতে নিৰ্বাস বাহির হয়। ফুল ছোট ও দ্বিধ্বং হরিতাভ শাদা। ফাল্গুন-ঊর্ধ্বে প্রস্ফুটিত হয়। পৌষ মাসে ফল পাকে। প্রকার ভেদ :- (ক) কালী আসন [ও° মহিষা আসন], কাঠ খয়ের রং। (খ) ভূঁড়ী আসন [ও° আম্বুয়া আসন], কাঠ দ্বিধ্বং খয়ের রং। (গ) নীলাসন।

আশয়—পনসবৃক্ষ, কাঁঠাল গাছ।

আশফল, আঁশফল—[স° আমিষ] বড় বড় ক্ষুদ্রপৰ্বি, nephallium

longan, scytalia l. লিচুর মত  
 শসীলো ফল কিন্তু আম্র গন্ধ ।  
 আশশেওড়া আশশোড়া—[স° আশ্য-  
 শাখোট ; ও° সাহাড়ী] শাওড়া দ্র°,  
 limonia pentaphylla,  
 glycomis p. নিম্বকাদিবর্গের  
 আরণ্যক্ষুদ্রপ । পাতা পঞ্চপর্ণ ।  
 ফুল ও ফল ছোট । ইহার ডালে  
 লোকে দাঁতন করে ।  
 আশ্রুদ্রু—colocasia anticquorum.  
 আশ্রুপত্রী—শল্লকীলতা, boswellia  
 serrata.  
 : আশ্রুর্বাঁহ—আউশধান ।  
 আশ্রু—অশ্রু বৃক্ষ ।

আশ্রয়াশ—চিতারগাছ ।  
 আসবদ্রু—তালগাছ ।  
 আসসেওড়া—trophis aspera  
 আসরুই—রাইসরিষা ।  
 আশ্ফাট—১ আকন্দ গাছ, ২ নব-  
 মল্লিকা ।  
 আশ্ফাটক—আকরোট ।  
 আশ্ফাটা—বনপদ্মপ, বনমল্লি ।  
 আশ্ফাত, আশ্ফাতক—১ আকন্দ  
 গাছ, ২ কোবিদারবৃক্ষ, পলাশবৃক্ষ ।  
 আশ্ফাতা—১ সরিষা, হাপরমালি দ্র°,  
 ২ অপরাঞ্জিতা, ২ বনকাপাস, ৩  
 গন্ধভাদ্রুলে ।  
 আস্যাপত্র—পদ্ম দ্র° ।

## [ ই ]

ইকড়া—একজাতীয় তৃণবি° ।  
 ইক্ষু—আক দ্র° ।  
 ইক্ষুকাণ্ড—কাশবৃক্ষ, মঞ্জগাছ,  
 saccharum spontaneum.  
 ইক্ষুগন্ধা—গোখরুই, কাশতৃণ, tribu-  
 lus terrestris, berberia  
 longifolia.  
 ইক্ষুগন্ধিকা—ভূমিকুস্মাণ্ড, con-  
 vulvus paniculatus.  
 ইক্ষুদ্রু—saccharum sara.  
 ইক্ষুদ্রুভা—তৃণবি° ।

ইক্ষুপত্র—যাবনাল ধান্যবি°, জোয়ার  
 ধান ।  
 ইক্ষুবল্লরী, ইক্ষুবল্লী—ক্ষীরবিদারী  
 বৃক্ষ, ক্ষীরকন্দ ।  
 ইক্ষুবাটিকা, ইক্ষুবাটী—পাঁড়ি আক ।  
 ইক্ষুবালিকা—কাশিয়া, কেশে ।  
 ইক্ষুর—১ কুলখাড়া, ২ কোলিকাগাছ,  
 ৩ গোখরুই, ৪ আক, ৫ কেশে ।  
 ইক্ষুরাকু—তিতলাউ ( এই গাছ প্রায়  
 ইক্ষুক্ষেত্রে হয় বলিয়া ) ।  
 ইক্ষুরার—কাশতৃণ, কেশে ।



ইক্ষবালিকা—খাগড়া ।

ইক্ষিড়—ইক্ষুদবৃক্ষ ।

ইক্ষুদ, ইক্ষুদী—[ স° অক্ষরপুষ্প,

তীক্ষ্ণকটক, ক্রোড়ফল, তৈলফল,

পুতিগন্ধ, শূণ্যারি, অনিলাস্তক ;

হি° হিজন, হিজন ; তে°

নজনদন, সরিকেট্র, রিংগীন ;

ম° হিজনবেঠ ] তাপসতরু, bala-

nites Rox, b. indica, b.

egyptica. মোঁ-গাছ ॥ রঘুব° ॥

২ জ্যোতিষ্মতীবৃক্ষ, জীয়াপুতা,

নয়াকটকী । গাছ প্রায় ১৩।১৪

হাত উচ্চ হয় । পূর্বে ঋষিরা

এর বীজতেল ব্যবহার করিতেন ।

পাতা প্রায় কাঠালি পাতার ন্যায় ।

ফুল ছোট ছোট শাদা ঈষৎ

হরিদ্রাভ । বীজ তৈলময় ।

ইঁচড়—কাঠাল দ্র° ।

ইক্ষুক—ট্যাবালেবুর গাছ ।

ইজ্জল—হিজল গাছ, জিউলি গাছ,

নিচুলবৃক্ষ ।

ইংকট—ওকড়া গাছ ।

ইদকার্যা—দরালতা লতা ।

ইদানী—বটপত্নীবৃক্ষ ।

ইনানী—বটপত্নীবৃক্ষ ।

ইন্দিরালয়, ইন্দিরাবর, ইন্দিবর—

নীলোৎপল

ইন্দীবর—নীলপদ্ম, সাধারণ উৎপল,  
নীল শালুক ।

ইন্দবরী—শতমূলী ।

ইন্দীবরণী, ইন্দীবর—নীলপদ্ম ।

ইন্দুক—অমলকবৃক্ষ ।

ইন্দুকমল—শরুপদ্ম ।

ইন্দুকলিকা—কেয়াফুল, কেতকী,  
pandanus tascicularis F.P.

ইন্দুপদ্মিকা—বিষলাঙ্গলা, কলিকার  
গাছ ।

ইন্দুবল্লী—সোমলতা, asclepias  
acida.

ইন্দুভূষণ—নীলপদ্ম ।

ইন্দুরকানি—মুখিকানী, উপচিচ্রা,  
croton polyandrum.

ইন্দুরকানি পানা, ইন্দুরিণী পানা—

[ স° উন্দুরকণী আখুরকণী,

মুখাকণী, মুখিকা ; হি° ও ম°

ভোপালী ; তে° টেম্বুয়াটানি, তা°

নেরিটাইকিরে ] বর্ষায় পানাবি,

salvinia cucullata. পাতা

ইন্দুরের কানের মত । লতাবি° ।

আখুরকণী দ্র° ।

ইন্দুরাজ—কুমুদ ।

ইন্দুরেখা, ইন্দুরলেখা—১ সোমলতা,  
২ গুল্ম ।

ইন্দুর—pinus devataru.

ইন্দ্রদারু—দেবদারু ।  
 ইন্দ্রদ্রু—অজর্দন গাছ, কুটজবৃক্ষ ।  
 ইন্দ্রদ্রুম—অজর্দন গাছ ।  
 ইন্দ্রপণী—নীলপত্রভুক্তি বৃক্ষবি° ।  
 ইন্দ্রপদ্ম—জবহ, ইন্দ্রযব ।  
 ইন্দ্রপদ্মপা—জাঙ্গলীবৃক্ষ, বিষলাঙ্গলা ।  
 ইন্দ্রবজ্ররী—রাখালশসা দ্র° ।  
 ইন্দ্রবজ্রী—পারিজাত লতা, রাখালশসা ।  
 ইন্দ্রবারুণিকা, ইন্দ্রবারুণী—[ স°  
 ইন্দ্রবারুণী ; হি° ছোট-ইন্দ্রারুণ ;  
 তা° পেট্রোউম্‌ম্‌ট্রি ] রাখালশসা,  
*citrullus colocynthis schrad.*  
 পষায়—ঐন্দ্রী, অরুণা, মৃগাদনী  
 গবাদনী, ক্ষুদ্রমহা, ইন্দ্রবিভিটী,  
 বিষল্লী, বিষাপহা, অমৃতা, পীত-  
 পদ্মপী, বালকপিপ্পা, রক্তেবঁরু,  
 বিশালা, গজবিভিটী, মৃগেবঁরু,  
 হেমপদ্মপী ই° ॥ শব্দ° ॥  
 ইন্দ্রবীজ—ইন্দ্রযব, কুরচি দ্র° ।  
 ইন্দ্রবৃক্ষ—দেবদারু দ্র° ।  
 ইন্দ্রভেষজ—শঠ, শঠটী ।  
 ইন্দ্রযব—[ স° কুটজ, কলিঙ্গ ] কুরচি  
 দ্র° । তিত্তবীজবি°, *wrightia*  
*tintoria.* পষায়—শক্রাস্রা,  
 শক্রবীজ, বৎসকবীজ, ভদ্রজা,  
 কুটজাফল, ভদ্রজবা, কলিঙ্গবীজা ।  
 ইন্দ্রলাজী—ধান, কলা ।

ইন্দ্রসুরস—নিসিন্দা, সিদ্ধদারবৃক্ষ ।  
 ইন্দ্রসুরা—রাখালশসা দ্র° ।  
 ইন্দ্রসুরিস—নিসিন্দা ।  
 ইন্দ্রসূত—অজর্দনবৃক্ষ দ্র° ।  
 ইন্দ্রা—১ কাটা জামির, ২ রাখালশসা ।  
 ইন্দ্রানিকা—১ নিসিন্দা, ২ সিদ্ধদার-  
 বৃক্ষ ।  
 ইন্দ্রাণী—১ সোঁদাল, ২ নিসিন্দা ।  
 ইন্দ্রায়—মাকাল দ্র°, *trichosanthes*  
*palmata Roxb.*  
 ইন্দ্রাশন—১ ভাজ, সিঁধি, ২ কর্ণচফল ।  
 ইভ—নাগকেশর গাছ, *mesuaferria.*  
 ইভকণা—গর্জাপ্পলী, *pothos*  
*officinalis.*  
 ইভকেশর—নাগকেশর ।  
 ইভগন্ধা—নাগদন্তী, অত্যন্ত বিষাক্ত  
 বৃক্ষ ।  
 ইভদন্তা—নাগদন্তী ।  
 ইভনিমালিকা—ভাজ, সিঁধি ।  
 ইভয়া, ইভষা—স্বর্ণক্ষীরীবৃক্ষ ।  
 ইভাখা—নাগকেশরবৃক্ষ ।  
 ইভোষণা—গর্জাপ্পলী, লম্বাপিপ্পা ।  
 ইভাকা, ইভায়া, ইভ্যিকা—শল্পকীবৃক্ষ,  
 বাবলা গাছ ।  
 ইরাবান—বটপত্রীবৃক্ষ ।  
 ইবঁরু—কঁকড়, *cucumis momor-*  
*dica.*

ইবঁরদুশ্চিক্কা—কাঁকড়িবিং, ফুটি ।

ইষলাজলা—[স° অগ্নিশিখা, লাজ্জল ;

ও° আঙালিয়া ] অনন্তা, লাজ্জলকী,

gloriosa superba. রজনী-

গন্ধাদিবগের বন্যরোহিণী ।

ইষলাজ্জলী—[স° লাজ্জল ] কাকড়া ।

hydrolea zeylanica.

ইষীকা—কেশে ।

ইষদ, ইষের মূল, ইষদর মূল—[স°

ঈশ্বরমূল, স্নানন্দা, বিপপহা ; হি°

রুদ্রজটা ; জারাবান্দি হিন্দী ; তা°

ইচ্ছরামলী ; তে° ইষবাব বেরু ]

বন্যলতাবিং, অক'মুলা, aris-

tolochia indica. পাতা একোস্তর

বাণের মত । ফুল বিচিত্র । ফল

প্রায় ষটকোষ ।

ইষদপুপ্পা—শরপুপ্প গাছ ।

ইষ্টা—শমী গাছ ।

ইষ্টিকা—এরুড গাছ ।

ইষ্টিকাপাথক—উশীর, বেনা, লামজ্জক  
তৃণ ।

ইসপগদুল, ইসফগদুল, ইসবগোল—[স°

ইষদগোল, অশ্ব ; হি° ঈশবগদুল ;

গুজ° উখমুজীরগ, তা° ইক্ষলবি-

রৈ ; তে° ইষ্পগদুল ; ফা° ইষ্পজা ;

অ° বজরীকতুলা ; পাশী° ভাষায়

ইষ্পঘদুল (ঘোড়ার কান) ]

ঘোড়ার কান বা নৌকার মত

ছোট বীজযুক্ত বৃক্ষবিং,

plantago ovata. পারস্যদেশ

থেকে ভারতে আসে । ইহার কোন

স্বাদ বা গন্ধ নাই । বীজ ছোট

অশ্বকর্ণ বা নৌকার মত ।

ইষ্পন্দ—নারাজাদিবগের শীতকালের

ছোট ক্ষুপবিং, ruta graveo-

lens. পাতায় উৎকট গন্ধ ।

## [ ৮ ]

ঈরিকা—বৃক্ষবিং ।

ঈবঁরদু—কাঁকড়ি ।

ঈষলাজলিয়া—ইষলাজলা দ্র° ।

ঈশানী—শমীবৃক্ষ ।

ঈশ্বরমূল—ঈষের মূল ।

ঈশ্বরী, ঈশ্বরী—লিঙ্কানীবৃক্ষ, বন্যা-

ককোটকীবৃক্ষ, রুদ্রজটা লতা ।

ঈষলাজলিয়া—ইষলাজলা ।

ঈষিকা—কাশতৃণ ।

## [ উ ]

উকণ্ড—*ageratum cordifolium*.

উথল—ভূরিপত্র তৃণবি° ।

উগ্রকান্ড—করলা দ্র° । *momordica charantia*.

উগ্রপত্র—১ হিঙ, ২ রসুন, ৩ কটফল, ৪ অর্জকবৃক্ষ, ৫ চম্পক, ৬ অজ-মোদা, জোয়ান, ৭ কচ ।

উচনুতি—[ স° উগ্রকান্ডী, রক্তপদ্মপী, কণপদ্মপী ] সরল বৃক্ষবি°, *ageratum conyzoides*. সোম-রাজ্যাদিবর্ণের শাকবি° । পাতা অভিন্নমুখী ।

উচ্চটা—১ গুঞ্জা, কঁচ, ২ ভুই আমলা, ৩ লশুনবি°, ৪ নাগরমুখা, ৫ চোচ্ বা চেচুয়া, *cyperus compressus*.

উচ্ছা, উচ্ছ্যা, উচ্ছে—[ম° কড়লুঙ্ঘী ; ও° উছাঁ ; ইং *spiked bitter gourd*] কুম্ভাসাদিবর্ণের প্রতানী-লতা, করলা, *momordica muricata*, m. *charantia*. ফল তিক্ত, ছোট, অবদ্‌দময় । বর্ষাকালে জন্মে । পর্যায় ; কঠিল্লক, সুষবী, শৃষবী, সুশবী, সুকান্ত, উগ্রকান্ত, কঠিল্ল, কারবেল্ল, পট্ট ।

উচ্ছলীম্ব—কোড়ক, ছাতা ।

উজ্জটী—পদ্মবি°, *bileria ciliata*.

উট—ঘাসপাতা ।

উড়ীধান—[স° নীবার] বন্য ধান গাছ ।

উড়ীগাব—গাব গাছবি° ; *diospyros ramiflora*.

উদ্‌ম্বর, উদ্‌ম্বর—১ [স° ক্ষীরক, কাকোদ্‌ম্বরিকা ; হি° কঠুম্বর ; ম° কাঠাউম্বর, বোখাডা ; গদ° টেউউম্বর ; ক° কাঅতি, তে° রসমেডিচেট্ট, কাকীবাডুবেট্ট ; ফা° অঞ্জীবেদন্তী ; অ° তনবারি ; কা° থোকসা] ডুম্বর, *figs glomerata*. ডুম্বর দ্র° । ২ যজ্ঞ-ডুম্বর [স° উদ্‌ম্বর ; হি° গলর ; ম° উম্বর ; গুজ° উম্বরো ; ক° অতি ; তে° বাডুচেট্ট ; ফা° আঞ্জীরে আদম ; অ° জমীবেট্ট] কাশী অঞ্চলে, তরকারীতে ব্যবহৃত হয় । যজ্ঞডুম্বর দ্র° । পর্যায় : জম্বুফল, তপসাজ, ক্রিমিফল, শীতবৎকল, যজ্ঞাঙ্গ, বিষবৃক্ষ, হেমপদ্ম, ক্ষীরবৃক্ষ, সদাফল, হেমদাম্বক, কালম্বক, যজ্ঞযজ্ঞ, সুপ্রতিষ্ঠিত, পদ্মশূন্য, পবিগ্রক,



সৌম্য ॥ শব্দ ॥ ডুমুর দ্র° ।

উড়ুস্বরপণী—দস্তীবৃক্ষ ।

উৎকট—১ তেজপাত, ২ শর; ৩

রক্তেকদ্র, ৪ দারচিনি ।

উৎকট—সৈংহলী লতা ।

উৎকট—গজপিপ্পল ।

উৎকরাদি—উৎকর; সংফল; শফর,

পিপ্পল, পিপ্পলীমূল, অশ্বন,

সুবর্ণ, খলাজিন, তিক, কিতব,

অগর, গৈবণ, পিচুদ্র, অশ্বথ, কাশ,

ক্ষুদ্র, ভগ্না, শাল, জন্যা, অঞ্জির,

চর্মণ, উৎকোশ, ক্ষান্ত, খদির,

শূর্পাণ্য, শ্যাবন্য, নৈবাকব, তৃণ,

বৃক্ষ, শাক, পলাশ, বিজিগীষা,

অনেক, আতপ, ফল, সম্পর, অর্ক,

গর্ভ, অগ্নি, বৈরাগক, ইড়া, অরণ্য,

নিশাস্ত, পর্ণ, নীচায়ক, শঙ্কর,

অবরোহিত, ক্ষার, বিশাল, বেত্র,

অরীহণ, খণ্ড, বাতাগর, মস্তগাই,

ইন্দ্রবৃক্ষ, নিতাস্তবৃক্ষ, আদ্রবৃক্ষ

—এইগুলি উৎকরাদি ॥ পার্গনি ॥

উৎকৃষ্টকা—কালোজীরা ।

উৎকট—ছত্র, ছাতা ।

উৎপল—[ হি° কমল, বোম্বা° কন্বল,

তা° অম্বল, তিস্ত—উৎপল ]

কমল । পদ্ম দ্র° ।

উৎপলশারিবা—শ্যামালতা, echites

fruteocens.

উৎপলিনী—[ হি° ছোট কোঞ ]

জলজপদ্পবি° । পর্যায়—

কৈরবণী, কুমুদতী, কুমুদিনী,

চন্দ্রটা, কুবলয়িনী, ইন্দ্রবারণী,

নীলোৎপলিনী ।

উৎপাদিকা—১ হিলমোচিকা, হিষ্টা

শাক । ২ পুতিকা, পুইশাক ।

উতাস—echites cymosa

উত্তমা—দুর্গন্ধাবৃক্ষ, ক্ষীরাই ।

উত্তমারণী—ইন্দ্রবরণী, শতমূলী ।

উত্তানক—উচ্চটা বৃক্ষ ।

উত্তানপত্রক—লাল ভেরাণ্ডা ।

উদক—মদনকটকবৃক্ষ ।

উদুজ্জাতি—রসুন গাছ দ্র° ।

উদুস্বর—উড়ুস্বর দ্র° ।

উদুস্বরদলা, উদুস্বরপণী—দস্তীবৃক্ষ ।

উদুস্বল—উড়ুস্বর দ্র° ।

উদুজাতি—justicia dentata.

উদ্দাল—বহুবাকবৃক্ষ, কুড়ক  
ধান্যাবিশেষ ।

উদ্দালক—বহুবাকবৃক্ষ ।

উদ্বেগ—গুবাক, শূপারি ।

উদ্ভরকণী—salvinia cucullata.

উদ্ভাস্ত—১ ধুস্তর, ধুতরা, ২

মুচুকুন্দবৃক্ষ ।

উপকৃষ্টকা—১ জীরা দ্র°, ২ তুত ।

উপকৃষ্ণি—ছোট এলাইচ দ্র° ।

উপচিষ্টা—১ মৃষিকপণী, ইন্দুরকানি,

২ দস্তীবৃক্ষ ।

উপবট—পিয়াল, পিয়ালশাল গাছ ।

উপবল্লিকা—অমৃতস্রবা লতা ।

উপবাক—যব দ্র° ।

উপবাকী—ইন্দ্রযব দ্র° ।

উপবিষা—আতবিষা দ্র° ।

উপমেত—শালগাছ দ্র° ।

উপস্থপত্র—অশ্বখবৃক্ষ ।

উপাস—বিষাক্ত বৃক্ষবি° । ৫০১৬০

হাত দীর্ঘ । এই বৃক্ষের নিষাস

তীরে মাখাইয়া শত্রু বধ করে ।

ষষধীপে জাত ।

উপোতী—পদ্মশাক দ্র° ।

উপোদকী, উপোদিকা—পদ্মশাক দ্র° ।

উপলভেদী—হাড়জুড়ী, *plectran-*  
*thus aromaticus*. পর্যায়—

শ্বেতা, পলভিৎ, শিলগভর্জ,

অশ্বেদী, শিলাভেদ, নগভিন্নক,

ভেদক, অশ্ময়, গিরিভিৎ,

ভিন্নযোজনী, পাষণভেদ ।

উমা—১ হলদ, ২ অতসী ।

উরণ, উরাণাক্ষ, উরাণাক্ষক—

চাকুন্দাগাছ দ্র° ।

উরুকাল—মাকাল দ্র° ।

উরুকালক—মহাকাল লতা ।

উরুবক—লাল ভেরেণ্ডা গাছ ।

ভেরেণ্ডাবৃক্ষ দ্র° ।

উবারু—কাঁকড় দ্র° ।

উলকিপানা—*salvinia verticillata*.

উলটকম্বল—ওলটকম্বল—[ইং *devil's*

*cotton*] উলটাকম্বল, *abroma*

*augusta*. বন্ধুকাদিবর্গের ছোট

তরু । শাখা সরু ও লোমশ ।

ফুল ঘোর রক্তবর্ণ, বর্ষাকালে

ফোটে । ফল পাঁচকোণা ।

উলটচডাল—*glorisa superba*.

উল, উলখড়—[ সং উলকা, উলক ]

কাশতৃণ । ধান্যাদিবর্গের

দীর্ঘায়ু তৃণবি° । সবুজ পাতা,

অল্প অল্প রোয়া আছে । কোথাও

উল্লেখ্য বলে । *Imparata*

*arundinacea*, *I. cylindrica*,

*saccharum cylindricum*.

পর্যায়—উলক, শ্বলক, দভা,

সূচাগ্র, উলপ, উলপ ।

উলপ—উলখড় দ্র° ।

উশীর, উশীর—বেণা, খসখস,

গন্ধবেণার মূল । বেণা দ্র° ।

উশীরী—ছোট কেশে । পর্যায়—মিষি,

গুঁড়া, অশ্বাল, নীরজ, শর ।

উষণ, উষণা,—পিপুল মূল, শিট, চই ।

উষবৃদ্ধ—রক্তচিটা দ্র° ।

উদ্ভটকাণ্ডী—পদ্মপৰি । পর্যায়—  
রক্তপদ্মপী, করভকাণ্ডিকা, রক্তা, উদ্ভটপাদী, মদলনাগীবৃক্ষ ।  
লোহিতপদ্মপী, কর্ণপদ্মপী । পর্যায়—শাতভীর, ভদ্রবল্লী,  
ভূমিমত্তা ।  
উদ্ভটধূসরপদ্মচ্ছিকা—১ বিচট্টি, ২ উষ্ণরশ্মি—আকন্দগাছ ।

[ উ ]

উরুস্তম্ভা—কদলীবৃক্ষ । শ্বেলাস ।  
উর্ধ্বকণ্ঠী—শতমূলীবি । উর্ধা—দেবতাড়ক তৃণ ।  
উর্ধ্বাসিত—করলা দ্রু । উষ্ণ—মরিচ, শরীঠ, পিপ্পলমূল,  
উর্বাক্ষ—গোময় ছত্রিকা । পর্যায়— চিতা ।  
দিলীর, শিলীশ্বক, বশারোহ,

[ ঞ ]

ঞক্ষ—সোনা গাছ । অজারী ।  
ঞক্ষগন্ধা—বিশ্ণুড়ক গাছ, ঞ্বিজাজল ঞক্ষগন্ধিকা—কৃষ্ণভূমি কুম্মাণ্ড । পর্যায়  
গাছ, *argyrea speciosa* —ক্ষীরবিদারী, মহাশ্বেতা,  
sweet, ক্ষীরবিদারীবৃক্ষ । ক্ষীরিকা ।  
পর্যায়—ছাগলাশ্রী, আবেগী, ঞ্বভা—*cissus quadranguiaria*  
বৃদ্ধদারক, জুজ, শ্যামা, ঞ্বিজাজলিকী—ঞক্ষগন্ধা দ্রু ।  
ছাগলাশ্রিকা, দীর্ঘবাহুকা, ঞ্বিপোক্তা—মাষপণীবৃক্ষ ।  
যুগাক্ষিগন্ধা, ছগলা, মহাশ্যামা, ঞ্ব্যগতা—১ শতমূলী, ২ আলকুণী,  
জাজলী, জীর্ণবল্লক, জুজক, ৩ অতিবলা ।  
বৃদ্ধা, কোটরপদ্মপী, ঞ্ব্যগন্ধা, ঞ্ব্যগন্ধা—ঞক্ষগন্ধা দ্রু ।  
ছাগলাশ্রী, অশ্রী, জুজা, ছগলী,

## [ এ ]

একতীর—*ophioglossum reticulatum*.

একপত্রিকা—গম্পপত্রবৃক্ষ।

একপত্রোৎপত্তিক—যে সকল বৃক্ষের  
অঙ্কুর সময়ে একটিমাত্র পত্র উদ্গত  
হয়। যেমন ১ -নারিকেল, ২  
খজুর্দর, ৩ তাল, ৪ কদলী  
ইত্যাদি।

একপলাশ—একটিমাত্র পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ।

একপদ্মপা—বৃক্ষবি°।

একবীর—বৃক্ষবি°। পর্যায়—মহাবীর,  
সকৃবীর, স্রবীরক।

একমূলা—[ স° শালপর্ণী ] শালপাইন,  
অতসী।

একরজ—ভৃঙ্গরাজ দ্র°।

একান্তিল, একান্তীল—নিম্নইগাছ,  
বকগাছ।

একোশিকা—আকনা গাছ

এরকা—তৃণবি°। পর্যায়—গন্ধদ্রুমলা,  
শিম্বী, গন্ধদ্রা, শরী।

এরুড—[ স° এরুড, রুবু, রুবুক;  
উরুবুক ; হি° অন্ডসফেন্দ;  
অন্ডলাল ; কো° হে°ডা ; ম° এরুড,  
এরুডোলী ; গ্দ° খোলোএরুড;  
রাতেএরুড ; ক° এরুডু ; তে°  
আমুডামু, আমিদপুচেট্ট ; ফা°

বেন্দজীর, সুখেমাবেন্দজীর ; অ°  
থিবা°, হব্দলথিরুবা ] রেডী, তেল-  
ভারান্ডা, *ricinus communis*,  
গাছ প্রায় ৬।৭ হাত উঁচু হয়।  
পাতা অনেকটা মানুষের হাতের  
মত দেখিতে। ফল হইতে বীজ  
হয়। এরুড দুই প্রকারের হয়  
শ্বেত এরুড ও লোহিত এরুড।  
শ্বেত এরুড পর্যায়—আমুড, চিত্র,  
গম্ধবৃহন্ত, পঞ্চাঙ্গুল, বর্ধমান,  
দীর্ঘদন্ড, অদন্ড, বাতারি, তরুণ ;  
লোহিত এরুড পর্যায়—রুবুক,  
উরুবু, রুবু, ব্যাঘ্রপুচ্ছ, বাতারি,  
চণ্ডু, উত্তানপত্রক। এরুড অর্থাৎ  
ভারান্ডা বীজ হইতে তৈল  
উৎপন্ন হয়।

এরুডপত্রিকা, এরুডফলা—দন্তীবৃক্ষ।

পর্যায়—লঘুদন্ডী, বিশল্যা,  
উদ্ভবরপণী, শীঘ্রা, শ্যোনঘটা,  
ঘৃণপ্রয়া, বারাহাজী, নিকন্তু,  
মকুলক।

এবারু—কাঁকুড়বি°। কাঁকুড় দ্র°।

এলা, এলাচি, এলাইচ—১ ছোট এলাইচ

[ স° উপকুঞ্জি, এলিকা, কোরঞ্জী,  
এলা, হি° ছোটী এলায়চি,  
গ্দ° ইলারচি, এলচিকাগদী ;



ম° বেলচি ; তে° এলাক্ ; দ্রবি°  
এলোকুল্লোকাপদ্ ; ফা° হৈল্ ; অ°  
কাকিলেসিগার ] ২ বড় এলাইচ  
[ স° স্থলৈলা, ত্রিপুটা ; হি° বড়ি  
ইলায়চি, লাল ইলায়চি ; ম° ;  
থোরবেলা, বেলদোড়ে ; গ্ৰ° মোটা  
এলাচী, এল্চা ; ক° পরডুলকী ;  
তে° পেজএলাকল্ ; তা° এলম্ ;  
ফা° হৈলফলাং ; অ° কাকুলেকিবার]  
*elettaria cardamomum,*  
*amomum subeletum, a.*  
*paradisi.* ভারতবর্ষের পশ্চিম ও  
দক্ষিণ প্রদেশে জন্মায়। ছোট  
এলাচি মালাবারে ও বড় এলাচি  
মহাশূরে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।  
পর্ষায়—বড় এলাচি—পৃথিবীকা,  
চন্দ্রবালা, নিস্কুটি, বহুলা, শ্বলা,

মানেরা, তাড়কাফল ; ছোট এলাচি  
বা গুজরাতি এলাচি—উপকুণ্ডিকা,  
তুখা, কোরম্বী, ত্রিপুটা, ব্রুটি,  
বয়স্থা, তীক্ষ্ণগন্ধা সূক্ষ্মগন্ধা।  
॥ বিশ্ব ॥ বড় এলাচি নেশালী  
এলাচি ( এলাফলের মত দেখিতে  
বলিয়া ) হরিদ্রাদিবর্গের প্রথম  
স্থায়ী শাক। পাতা লম্বা,  
আমপাতার ন্যায়। ফুলের মঞ্জরী  
ঘন শীষের মত, কন্দ হইতে  
জন্মে। বংগদেশে বহু পরিমাণে  
জন্মায়। একটি গাছের বহুবিস্তৃত  
মূলবৎ কন্দ হইয়া বহু স্থানে  
নতুন গাছ জন্মায়।  
এলাপণী—রাশ্না, কাঁটা আসন্নুলি বা  
এলাণি। রাশ্না দ্র°।  
এলাবতী—এলালতা।

[ ঐ ]

ঐন্দ্রী—১ রাখালশসা, ২ এলাচ।  
ঐভী—হস্তিঘোষালতা।  
ঐরাবত—লকুচবৃক্ষ।

ঐরাবত ফল—লেবু।  
ঐরাবতী—বটপত্রাবৃক্ষ।

[ ৩ ]

ওআওয়া ( দেশজ )—বৃক্ষবি°।  
*tetranthera fruticosa.*  
ওকড়া—[ স° ইংকট, উচ্ছটা ] পাটাদি-

বর্গের বন্যক্ষুদ্র, *trumfetta r.*  
ওকড়া (বন) —জবাদিবর্গের বন্যক্ষুদ্র,  
*urena lobeta.*

ওজারা ( দেশজ )—বৃক্ষবিং ।

ওড়াকা ( দেশজ )—দীর্ঘ গাছ,  
souneratia acida. ভারতের  
পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে জন্মায় ।

ওড়পুপ—জবা ।

ওড়ফুল—জবাফুল ( ওড়পুপ ),  
tribicus rosa-scivansis.

ওড়িল, ওড়ী—উড়িধান । পর্যায়—  
ওড়ী, নীবার ।

ওড়্র—জবা ।

ওদনপাকী—নীলকিণ্টি ।

ওদনার্হ—sida cordifolia.

ওদনিকা—বলা, বেড়েলা ।

ওদনী—বেড়েলা ।

ওদোধান—ধানবিং ।

ওয়াপিচ—চীনা ওয়াপি গাছ,  
cookia punctata.

ওল—[ স° শুরগ, রক্তকন্দ, স্থূলকন্দ ;

ওল্ল, ওল্ল ; হি° ওল, জমীনকন্দ ;

ও° ওলুখ ; তা° করুন ; তে°

মৃগাকন্দ ] শ্বেত ও রক্তাভশ্বেত

দুই রকমের কন্দ আছে.

amorphophallus campanu-

latus, arum cam. কচু-

আদিবর্গের কন্দ গাছ । প্রতি গাছে  
একটি পাতা, যে গাছে ফুল হয়  
সে গাছে পাতা থাকেনা । ওল  
বনে জঙ্গলে আপনা-আপনি  
জন্মে । পর্যায়—শুরগ, কন্দ,  
কন্দল, অর্শ্ব ।

ওলটকম্বল—উলটকম্বল দ্র° ।

ওষধি—ফল পাকিলেই যে গাছ  
শুকাইয়া যায় । ওষধির নামভেদ  
—১ অজগরী, ২ শ্বেতকাপোতী,  
৩ গোনসী, ৪ কৃষ্ণকাপোতী, ৫  
বারাহী, ৬ ছত্রা, ৭ অতিছত্রা, ৮  
কন্যা, ৯ করেগু, ১০ অজা, ১১  
চক্রকা, ১২ আদিত্যপার্বণী, ১৩  
ব্রহ্মসুবর্ণলা, ১৪ শ্রাবণী, ১৫  
মহাশ্রাবণী, ১৬ গোলোমী, ১৭  
অজলোমী, ১৮ হংসপাদী, ১৯  
শঙ্খপুপী, ২০ বেগবতী, ২১  
সোম ।

ওষধিপতি—১ কপূর, ২ সোমলতা ।  
ওষ্ঠী, ওষ্ঠোপমফলা—বিষফল,

তেলাকুচা ।

ওষ্ঠোপুপ—বৃক্ষদৃক ফুল ।

[ ৩ ]

ওরাচাপা—বৃক্ষবিং, sphenocarpus grandiflorus.

[ ক ]

কক্‌থটপত্র—*corchorus olitorius*.

পৰ্ণায়—পটু, বাজশল, শানি, চিম ।

ককজংঘা—[সং কাকজংঘা, পারাবতপদী,

লোমশা ; হি° কাকজংঘা ; মসী,

কাউরাঠুটী, কাউরাঠে'ডা ; কো°

কাউরাঠোকা ; ম° কাঙ্গাচে'ঝড়ে ;

ও° অঘেডী ; ক° জীরী'চলেচ ;

তে° লালদু'চানিকে] কাকজংঘা,

কাকশসা, *leea tiorta*, l.

*aequata*. বন্য ক্ষু'পবি° । কাকের

জংঘার ন্যায় শাখা বলিয়া এই

নাম । জলাভূমিতে জন্মে ।

ককুভ—অজু'ন দ্র° ।

ককোর, কোর—[হি° কায়েল ; প° কমল

বা করম্ ; ম° কদম ; তা° নীর-

কদম্ব বা বোটকদিম ; তে° বট-

করমী] বড় গাছবি°, *nandea*

*parvifolia*.

কক্ষরুহা—নাগরমুখা দ্র° ।

কক্ষোথা—ভদ্রমুস্তা, নাগরমুখা ।

কক্ষ্যা—বহতী ।

কক্ষরোল—নিকোচকবৃক্ষ, *momordica*

*mixta*, কাকরোল দ্র° ।

কক্ষটোরি—হরিদ্রা, হলদু ।

কক্ষশত্রু—পশ্চিমপণী, চাকুন্দে ।

কক্কেলি—অশোকবৃক্ষ ॥ রত্নকো° ॥

কক্কড় ॥ কালিদাস ॥

কক্কুল—বকুল ।

কক্কানাটি—*amaranthus atropur-*  
*purens*.

কক্কিয়া—*roscoea pentandra*,  
*congea p*.

কক্কু, কক্কুনী, কাক্কুনী—[স° কক্কু,

শুকধান্য, হি° কক্কুনী ; ম° কাংগা ;

ক° নবেন ; তে° কোরল্ ; কো°

কাউন্ ; ফা° গল] কাউন্, কাঙ্-

নাদানা, *setaria italica*,

*panicum italicum*. তৃণধান্য-

বিশেষ । কোচবিহারে ও বোম্বাই

প্রদেশে প্রচুর জন্মায় । পৰ্ণায়—

প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গা ।

কক্কুজুড়িয়া—তৃণধান্যবিশেষ । পৰ্ণায়

—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহি,

রুচি, চিনক, জ্যোতিকা, পারাবত-

পদী, পণ্যলতা, পীততডুলা,

সুকুমারী, কুকুন্দনী ।

কক্কচিয়া—*papyrus legetiformis*.

কক্কনার ( দেশজ )—*bauhinia*

*purpurea*.

কক্করিপুফলা—শমীবৃক্ষ ।

কঁচিরি—কচু-জাতীয়, *arum fornicatum*.

কচবী, কচু—[ স° কচুর ; ও° সারু ]

কচু, কন্দবিশেষ, *colocasia antiquorum*. কচুর প্রকারভেদ—(১)

বনকচু, ঘেটকচু, ঘন্টাকর্ণকচু;

*typhonium trilobatum*, (২)

সারকচু—[ উ° তেলিয়া সারু ]

*c. nymphaeifolia*, (৩) কাঁটা-

কচু, *lassia heterophylla*,

(৪) মানকচু, *c. indica*, (৫)

গর্দভকচু, (৬) কালোকচু; (৭)

আতকচু ।

কচুরিপানা—পানা দ্র° ।

কচু, কচুক—তুলবৃক্ষ, তর্দগাছ ।

কচুরুহা—দর্বা ।

কচুরা—শুকশিম্বী, দদরালভা, শঠি,

যবাস, গ্রাহিণী, ক্ষীরদুইবৃক্ষ ।

কচুমতী—শুকশিম্বী, আলকুশী ।

কচেহার—শটী ।

কচবী—কচু ।

কজ—কমল, পদ্ম ।

কণ্ট—জলজ শাকবি° । কাঁচড়া ।

পর্ষায়—জলভু, লাঙ্গলী, শারদী,

তোয়্যাপ্পলী, শকুলানদী, জল-

তুড়ুলী ।

কণ্ড—কাঁচড়াবি° ।

কণ্ডকী—১ যব, ছোলা, জোড়কবৃক্ষ,  
২ ক্ষীরীণবৃক্ষ ।

কঞ্জ—পদ্ম ।

কঞ্জর—আকন্দ গাছ ।

কঞ্জলতা—*pergularia odoratissima*.

কঞ্জকা—ব্রাহ্মণঘণ্টিবৃক্ষ, বামনহাটি  
গাছ ।

কটকরঞ্জা—করঞ্জা দ্র° ।

কটকী—[ স° কটুকা ] কন্দবি,  
*gentiana kurroo*.

কটফল—চিতাবৃক্ষ ।

কটফলেরী—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা ।

কটফল—[ স° কটফল ; হি° কায়ফল ;

ম° কুসুম্যচীশাল, কঠু ; গ্ৰ°

কায়ফল ; তে° পাপরবুডম ; ফা°

উদলবৃক্ষ ; অ° দার্শীশবান ]

কন্নাফল, *myrica nagi*, m.

*sapida*. পর্ষায়—শ্রীপর্ণিকা,

কুম্ভিকা, কুম্ভী, কৈটব, সোমবৃক্ষ,

সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ,

প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী,

রামসেনক, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক,

কফাল, পরুষকুম্ভদী ভারতের

উত্তরাংশে, নেপালে ও ব্রহ্মদেশের

পাহাড়ে জন্মায় । ছাল ফিকে

লালবর্ণ, মোটা ও শক্ত । ইহার



চুর্ণ নাকে দিলে হাঁচি হয় । উগ্র  
গন্ধ ও কষায় । ফুল জায়ফলের  
চেয়ে বড় ও নরম । কাটা ফল  
ছুঁইলেই হাতে জড়াইয়া যায় ।  
ছাল ঝাণী ও সুগন্ধ । ঔষধার্থে  
ব্যবহার হয় ।

কটফলা—গাম্ভারী, বৃহতী, কাকমাচী,  
বাতাকী, মৃগেবীর দেবদালী ।

কটবেল—কথবেল দ্র°, *feronia*  
*elephantum* .

কটভী—১ জ্যোতিষ্মতী লতা, নয়-  
কটকী, ২ অপরাজিতা, ৩ কাটা  
শিরীষ ।

কটম্বর—১ শোনা বৃক্ষ, ২ কটভীবৃক্ষ ।

কটম্বর—গন্ধভাদুলে, পদনবৎ ।

কটশর্করা—গাম্ভেষ্টী লতা, নাটাকরঞ্জা ।

কটায়ন—বেণামূল ।

কটিরা, কটিলা—[হি° কতীরা] গাছের  
আঠাবি° ।

কটিলেক—করলা ।

কটু—১ চাঁপা, ২ পটোল, ৩ কটীলতা,  
৪ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ৫ রাইসর্বপ ।

কটুক—১ পটোল, ২ সুগন্ধি তণ্ড, ৩  
কটুজবৃক্ষ, ৪ আকন্দবৃক্ষ, ৫  
রাজসর্বপ, ৬ নাটা ।

কটুকট—আদা ।

কটুকন্দ—১ সজিনা গাছ, ২ আদা,  
৩ লশুন ।

কটুকরঞ্জ—নাটাকরঞ্জ ।

কটুকা—১ কটকী দ্র°, ২ কুলিকবৃক্ষ,  
৩ রাইসরিষা, ৪ তিত লাউ ।  
পর্ষায়—জননী, তিত্তা, রোহিণী,  
তিত্ত-রোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্য-  
পিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী,  
শতপর্বা, দ্বিজাঙ্গী, মলভেদিনী,  
অশোকরোহিণী, কৃষ্ণভেদী, মহো-  
ষধীকটী, অঞ্জনী, কাণ্ডরূহা, কটু,  
কট, কেদারকন্দুকা, অরিষ্ঠা, পানয়ী,  
কটম্বর, কচুম্বর, অশোকা ।

কটুকালাব—তিত লাউ ।

কটুগ্রান্থি—১ পিপ্পলী মূল, ২ শর্দিষ্ঠ ।

কটুগ—শোনাগাছ ।

কটুচ্ছদ—টগরবৃক্ষ ।

কটুকটত—শর্দিষ্ঠ

কটুতত্ত্বক—শোণ গাছ, চিরতা ।

কটুতুঙ্গী—লতাবি, তিত্ত ঝিঙা ।

কটুতুঙ্গী—তিত্ত অলাব । পর্ষায়—  
ইন্দ্রাক, কটুকালাব, নৃপাঙ্গজা,  
কটুতিত্তিকা, কটুফলা, তুঙ্গিনী,  
কটুতুঙ্গিনী, বৃহৎফলা, রাজপদমী,  
তিত্তবিজা, তুঙ্গিকা ।

কটুদলা—কাঁকড় ।

কটুনিম্পাব—নদীতীরে উৎপন্ন নিম্পাব  
ধান্যবি° ।

কটুপত্র—পপটি, ক্ষেতপাপড়া ।

কটুপত্রিকা—কটকারীবৃক্ষ ।

কটুফল—পটোল ।

কটুফলা—শ্রীবল্লীবৃক্ষ ।

কটুবর্গ—পিপড়, চই, চিতা, আদা,

মরিচ, গর্জাপিপলী, করেণ্ডাকা,

এলা, ষবানী, ইন্দ্রধব, আকনাদি,

জীরা, সর্ষপ, মহানিস্বফল, হিঙ্গ,

বায়নহাটি, মধুরস, আতইচ, বচ,

বিড়ঙ্গ, কটকী, সুরসা, শ্বেতসুরসা,

ফণিজ্বক, অর্জক প্রভৃতি তুলসী-

সকল, গন্ধতৃণ, স্নগন্ধক, স্নমুখ;

কালমাল, কাসমর্দ, খবক, খরপুপ;

কটফল, নিসিন্দা; কদলাহক;

ইন্দ্রকানি, পুরাতন আমলকী,

কাকমাছী, বিষমর্দািঠ, সজিনা;

মধুশিগ্র নামক অন্যবিধ সজিনা;

মুলা; লশুন; মোরি, কুড়;

দেবদারু, বলগুজফল, গুগ্গল,

মুখা; লাক্ষলিকী, শুকনাশা, পীলু

প্রভৃতি দ্রব্য ।

কটুবাতীকী—শ্বেতকটকারী ।

কটুবীজ—পিপুলী দ্রু ।

কটুভঙ্গ—শুকঠা ।

কটুভদ্র—শুকঠা, আদা ।

কটুমঞ্জরিকা—অপামার্গ, আপাং ।

কটুস্তরা—কটকী, গন্ধভাদলে ।

কটুরোহিণী—কটকী দ্রু ।

কটুশৃঙ্গাল—গোরসুবর্ণ শাক-বি ।

কটুসেনহ—সর্ষপ, শ্বেতসর্ষপ, রাই-  
সরিষা ।

কঠিঞ্জর—তুলসীবৃক্ষ । পর্যায়—পর্ণাস,

কুঠেরক, লোণিকা, জাতুকা, পর্ণিকা,

পাড়ুর, জীবক, সুবচনা, কুরুবক,

কদন্তলিকা, কদুরাটকা, তুলসী;

সুরসা, গ্রাম্যা, মূলভা, বহুমঞ্জরী,

ভূতল্লী, দেবদন্দুতি ॥ শব্দ ॥

কঠিল্ল—কারবেল্ল, করেলা ।

কঠিল্লক—করেলা, পুনর্ণবা, তুলসী ।

কড়ুক—*rottboella perforata*.

কড়মা—[ স° কলম ] ধান্যাদিবর্গের

দীর্ঘায়ু ঘাস । দূর্বাসাসের মত;

লতাইয়া যায় কিন্তু মোটা ।

কড়ু—কদম্ব দ্রু ।

কড়ু—কলমী শাক ।

কড়িলা—*alysicarpus vaginalis* .

কণজীর—শ্বেতজীরক ।

কণজীরক—ক্ষুদ্র জীরা ।

কণা—জীরা; শ্বেতজীরা; পিপড় ।

কণিকা—অগ্নিমস্ত; গণিকারিকাবৃক্ষ ।

কণীচি—গুজা; কঁচ ।

কর্ণিয়ার—বৃক্ষবি,

*petrospermum macerifolium*.

কণের, কণের—কর্ণিকারবৃক্ষ।

সোনালুগাছ।

কণ্টকদ্রুম—শাল্মলিবৃক্ষ, বাবলা।

কণ্টকপঞ্চমূল—করমচা, গোক্ষুর,

ঝাঁটি, শতমূলী, কেলেকড়া।

কণ্টকপ্রাবৃত্ত—বৃতকুমারী।

কণ্টকফল—কাঁঠাল গাছ, গোক্ষুরবৃক্ষ।

কণ্টকবৃন্তাকী—বার্তাক, বেগুন।

কণ্টকপ্রণী—কণ্টকারী।

কণ্টকাঢ়—কুব্জকবৃক্ষ।

কণ্টকার—শিমূল গাছ, ব'ইচ গাছ।

কণ্টকারী—[স' কণ্টকারিকা, কণ্টকারী;

হি' কটেরী, লব্ধকটাই, ভটকাটরা,

রেফনী; ম' রিফনী, ভু'ইরিফনী;

লঘুদিফনী; গু' যেঠিতোরিফনী;

ক' নেল্লুন্ন; তে' বেরটীমুল্লা,

রাবুটিচেট; ও' কণ্টমারিষ]

কাটিকারি, কে'টিকারি, *solanum*

*jacquini*, s. *diffusum*, s.

*xanthocarpum*. কাঁটাপূর্ণ

লতাবি'। বহ্নাদিবর্গের ক্ষুদ্র।

নদীর চরে ও উচ্চ শৃংখলভূমিতে

জন্মায়। মাটিতে গুটাইয়া বৃদ্ধি

পায়; কাঁটা ১-৪ ফুট লম্বা,

সবুজবর্ণ, পাতা ডিম্বাকৃতি, ফুল

নীলবর্ণ, ফল পাতবর্ণ। পর্যায়—

নির্দিষ্টকা, পুশী, ব্যাঘ্রী, বৃহতী,

প্রচোদনী, কুলি, ক্ষুদ্রা, দৃশ্যপার্শ্ব,

রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা ভটাকী, সিংহী,

ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী,

দৃশ্যপার্শ্বী, নির্দিষ্টা, ধাবনী,

ক্ষুদ্রকাটিকা, বহুকাটা, ক্ষুদ্রফলা,

কণ্টানিকা, চিত্রফলা। ২ শ্বেত-

কণ্টকারী—[স' লক্ষ্মণা;

তা' কন্দনযত্রী; তে' বকুদকায়ী

বা নোলমুল্লকু] ফুল শাদা ও

দৃশ্যপা।

কণ্টকাল—১ কাঁটাল গাছ, ২ মাদার।

কণ্টকালক—যবাসবৃক্ষ।

কণ্টকিনী—১ বেগুন, ২ শোণঝিঁটি,

৩ মধুখজুরী।

কণ্টকিল—বেউড় বাঁশ।

কণ্টকিলতা—শসার লতা।

কণ্টকী—১ খদিরবৃক্ষ, ২ ময়না গাছ,

৩ গোক্ষুর গাছ, ৪ বেউড় বাঁশ,

৫ ফুল গাছ, ৬ কাঁটাল, ৭ কাঁটা

বেগুন।

কণ্টকীদ্রুম—১ খদিরবৃক্ষ, ২ বার্তাকী

বৃক্ষ।

কণ্টকীকল—কাঁটাল।

কণ্টকুরট—ঝাঁটি।

কণ্টকন—বৃহতী।

কণ্টকলা—কেতকী ফুল।

কণ্টকপত্র—১ বিকক্কতবৃক্ষ, ব'ইচ গাছ,

২ শৃঙ্গাটক, শিলায়া, পানিফল।

কণ্টকপত্রক—পানিফল।

ক'টপত্রফলা—ব্রহ্মদেবী বৃক্ষ ।

ক'টপাদ—ব'ইচ গাছ ।

ক'টফল—১ ছোট গোন্ধূর, ২ কাঁটাল,

৩ ধতুরা, ৪ লতাকরঞ্জ,

৫ তেজঃফল, ৬ এর'ড ফল ।

ক'টফলা—দেবদালী লতা ।

ক'টবল্লী—গ্রীষ্মজীবী বৃক্ষ ।

ক'টবৃক্ষ—তেজঃফল বৃক্ষ ।

ক'টল—বাবলা গাছ । পর্যায়—বাবল,

স্বর্ণপদ্ম, সূক্ষ্মপদ্ম ।

ক'টাকারী—বিকক্কতবৃক্ষ, ব'ইচ গাছ ।

ক'টফল—কাঁটাল ।

ক'টাত'গতনা—নীল ঝিণ্ট ।

ক'টাল—১ বাঁশবি, ২ বৃহতী, ৩

বার্তাকী, ৪ বাবলা ।

ক'টকারী—[ স' ব্যাঘ্রী, নিদিগ্ধকা ;

হি' কটেরী ; তে' কদা ; তা'

কান্দনকাটোর ] । ক'টকারী দ্র' ।

ক'ঠালা—রামদুহাটী ।

ক'ঠারবী—বাসকবৃক্ষ ।

ক'ঠাল—রামদুহাটী ।

ক'ডুর—১ করলা লতা, ২ কুম্ভর তৃণ ।

ক'ডুরা, ক'ডুরকী—১ শ্বেতকশিষী,

আলকুশী, ২ অত্যম্লপর্ণী ।

ক'ডুয়—১ আরণ্যধ, সোঁদাল, ২

শ্বেতসর্ষপ ।

ক'ডুরবর্গ—চন্দ, বেণামূল, সোঁদাল,  
করঞ্জ, নিম্ব, কটজ, সর্ষপ, মৌল,  
দারহরিদ্রা, মৃধা ।

ক'ডুরা—আম্রগুপ্তা, আলকুশী ।

কৎ—খদির ।

কৎবেল—কথবেল দ্র' ।

কত—নির্মলীবৃক্ষ ।

কতক—[ তা' তেতমরম, তেএকোস্ত ;

ও' কতোক ; তে' কতকসু ;

দাক্ষিণাত্যে—চিলবিজ্ঞ ; সিংহলে—

ইজিবি ] ১ নির্মলীবৃক্ষ,

strychnos potatorum. এই

এই বৃক্ষ ৩০—৬০ ফুট উচ্চ হয় ।

পর্যায়—অম্বুপ্রসাদ, কত, তিত্ত-

ফল, রুচ্যা, ছেদনীয়, গুচছফল,

তিত্তমরিচ ॥ সুশ্রু' মনু' ॥ ২ কুচিলা ।

কতৃণ—[ হি' সৌধিয়া বা রোহিয়া ] ১

সুগন্ধি তৃণ-বিশেষ, রামকপূর ।

পর্যায়—পোর, সৌগন্ধিক, ধ্যান,

দেবজন্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত,

সুশীতল, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক,

শ্যামক, ধ্যামক পাত, মৃদুগল,

দেবগন্ধক । ২ পৃষ্ঠপর্ণী, চাকুলে ।

কথবেল—[ স' কপিথ ; হি' কয়েথ,

কথ, ভুইকোঞ, ম' ক'বঠ, কবিঠ ;

গু' কোঁট, কাঠ, কোঠবতী ; ক'

বেলদ্র ; তে' এলাংগাকায় ; ও'



ক'ইথ ; মলয়—বেলু ] কংবেল,  
কটবেল, কয়েত, কয়েদবেল,  
teronia elephantum. নারঙ্গী-  
বগের শল্যতরু। পর্যায়—কপিথ,  
দধিথ, গ্রাহী, মন্মথ, দধিফল;  
পদ্মফল, দন্তশঠ, কর্ণিথ, মালদ্র,  
মহলা, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল;  
চিরপাকী, গ্রাথিফল, কুচফল,  
গন্ধফল, কপাঠ, দন্তফল,  
করভবল্লভ, কাঠিন্যফল, করঞ্জফলক  
॥ রাজর্নি ॥

কদ—কদবেল ।

কদম, কদম্ব—[ স° নীপ, গিরিকদম্ব ;  
হি° কদম, কেল কদম ; ও° কুরুম,  
কেলিকদম্ব ; তা° কোদম্ব, রুদ্ধথা,  
কাদিমীমাল, বা কদপ চেতু ; কর্ণা°  
কদরেদু ] কদম, কেলিকদম,  
nuclea cadamba, বিখ্যাত  
তরু ॥ অম° ॥ ৭০-৮০ ফুট উঁচু ।  
অনেক ফুল গোলাকারে সন্নিবিষ্ট  
থাকিয়া কন্দকের ন্যায় দেখায় ।  
পর্যায়—প্রিয়ক, হর্লিপ্রিয়, কাদম্ব,  
বটপদেষ্ঠ, প্রাবৃষণ্য, হরিপ্রিয়,  
বৃন্তপদ্ম, সুরভি, ললনাপ্রিয়,  
কাদম্বর্ষ, সৌধুপদ্ম, মহাচ্য,  
কর্ণপারেক । (১) ধারাকদম্ব—[ স°  
স্ববাসঃ, প্রাবৃষণ্য ] antho-

cephalus cadamba. ৪০-৫০  
ফুট উঁচু সরল গাছ । ফুল ফিকে  
লেবুর রং-বিশিষ্ট । রাতে ফুলের  
সুগন্ধি বাহির হয় । ফল ছোট  
লেবুর রংয়ের ন্যায় । ফুল বর্ষা-  
কালে হয় । (২) কেলিকদম্ব, ধূলি-  
কদম্ব—[ হি° হলদী, কদমী ; তা°  
সজ্জকদমী ; তে° লুখকদমী ; ম°  
মঞ্জকদম্ব ] ধূলিকদম্ব, adina  
cordifolia. পর্যায়—ধূলিকদম্ব,  
ক্রমুকপ্রসন্ন, বসন্তপদ্মপী, বলভদ্র-  
সংজ্ঞক, পরাগপদ্মপী, মকরন্দরাস,  
ভূজপ্রিয়, রেণুকদম্ব ॥ শব্দ° ॥ গাছ  
২০-৩০ ফুট উঁচু, পাতা শরৎকালে  
ঝরে যায় । ফুল পীতবর্ণ, ফল  
সুপুত্রীর মত । (৩) নীপ—বড়  
কদম্ব । বর্ষাকালে ফোটে ।

কদম্বক—১ দেবতাড়বৃক্ষ, ২ হরিদ্রা, ৩  
সর্বপ, ৪ দারুহরিদ্রা ।

কদম্বদ—সর্বপ ।

কদম্বপদ্ম—মৃন্ডিতিকাবৃক্ষ,  
মৃন্ডিরী ।

কদম্ববাদী—নীপজাতীয় কদম্ববি° ।

কদম্বী—দেবদালী লতা ।

কদর—শ্বেতখদির, কাঁটা বাবলা ।

পর্যায়—সোম্ববৃক্ষ, ব্রহ্মসল্য, খদি-  
রোপম, শ্বেতসার, খদির ।

কদল—১ কলা দ্র° । ২ চাকুলে লতা,

৩ শিমূল ।

কদলক—কলাগাছ ।

কদলা—১ চাকুলে, কজলী গাছ, ৩  
ডিম্বকা, ৪ শিমূল ।

কদলী—কলা দ্র° ।

কদা—অলাব দ্র° ।

কদ্রাব—শস্যবি°, *paspalum*  
*serobiculatum*.

কনক—১ পলাশ, ২ নাগকেশর, ৩  
ধতুরা, ৪ কাণ্ডনালবৃক্ষ, ৫ কালীয়  
বৃক্ষ, ৬ চাঁপা, ৭ কালকাসুন্দা, ৮  
কণগদুগ্গদুল, ৯ লাক্ষা গাছ ।

কনককরবীর—[ হি° কলিয়র কনের ]  
বোধ হয় হলুদা কলিকা ফুল  
( যোগেশচন্দ্র রায় ) ।

কনকচাঁপা—[ স° কর্ণিকার, কনকচম্পক ]  
বৃক্ষাদিবর্গের বৃহৎ তরু,  
*pterosperrum acerifolium*,  
*ochua squamosa*. গাছ ৪০-৫০  
ফুট উঁচু । শাখা বিস্তৃত, কাঠ  
লালবর্ণ, গাঁড়ি গোলাকার । পাতা  
লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ডিম্বাকৃতি ও  
লম্বা ।

কনকবিজা—বৃক্ষবি°, *polygonum*  
*elegans*.

কনকধতুরা—[ স° কনক ; মহা° কাল-

ধতুর ; কর্ণা° করিয়াসদ-কুণিকে ]  
কালধতুরা, স্বর্ণবর্ণ ফুল, *datura*  
*fastuosa*. বর্ষাজীবীগুল্ম-বি° ।

কনকপ্রভা—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা ।

কনকপ্রসবা—স্বর্ণকেতকী ।

কনকরম্ভা—স্বর্ণকদলী ।

কনকা—*ehrelia umbellulata*.

কনকারক—রক্তকাণ্ডনবৃক্ষ, কোবিদার ।

কনকরাঙ্গা—বৃক্ষবি°, *amaranthus*  
*gangeticus*.

কনকাহর, কনকাহর—১ নাগকেশ ফুল,  
২ ধতুরা ।

কনড়কা—*commelina bengale-*  
*nsis*.

কনিষ্ঠক—শুকতৃণ ।

কনীচি—কুঁচ ।

কনের—কর্ণিকারবৃক্ষ ।

কন্ধারী, কন্ধারী—বৃক্ষবি° । পর্বায়—  
কন্ধ্যা, দুর্ধর্ষা, তীক্ষ্ণ, কষ্টকা,  
তীক্ষ্ণগন্ধ্যা, ক্রুরগন্ধ্যা, দংশপ্রবেশ ।

কন্দগুড়চী—গুড়চীবী° । গুলগু  
(বেল°), *cocculus cordifolius*.  
পর্বায়—কন্দোম্ভবা, কন্দাম্ভত,  
বহুদীক্ষা, বহুগ্রহা, পিণ্ডাল,  
কন্দরোলিনী ।

কন্দট—শ্বেতোৎপল, সাদা সর্দি  
ফুল ।

কন্দফলা—ছোট করলা, উচ্ছে।

কন্দবহুলা—ত্রিপিণ্ণিকা বৃক্ষ।

কন্দবর্ধন—ওল।

কন্দবল্লী—বন্দ্যাকর্কোটকী।

কন্দমূল—মুলো।

কন্দর—১ আদা, ২ গুল, ৩ গাজর।

কন্দরাল—১ গর্দভাউবৃক্ষ, ২ পাকুড় গাছ, ৩ আখোটগাছ।

কন্দরালক—প্রক্ষবৃক্ষ, পাকুড় গাছ।

কন্দরোদ্ভবা, কন্দরোহিণী—গড়ু-চাঁবি°।

কন্দপর্জীব—কাঁঠাল।

কন্দল—কদলীবিশেষ, ভূমিকদলী।

কন্দলতা—মালাকন্দ (?)।

কন্দলী—১ গুল্মবি°, ২ কদলী, ৩ ভুইচাঁপা, ৪ কলাফুল, ৫ বেঙের ছাতা [ ইং mushroom ] ॥ মেঘ° ॥

কন্দশাক—আলু, ওল, মুলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুস্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেশর, শালুক।

কন্দশরগ—ওল।

কন্দাঢা—ভূমিকুস্মাণ্ড।

কন্দামৃতা—গড়ুচাঁবি°।

কন্দালু—কাসালু, ভূমিকুস্মাণ্ড, ত্রিপিণ্ণিকা।

কন্দরী—লজ্জালবৃক্ষ।

কন্দী—ওল।

কন্দুরি—coccinia grandis, momordica monsdelpa.

কন্দোট—১ স্বেতোৎপল, ২ নীলোৎপল।

কন্দোত—কুমুদ, হেলাফুল।

কন্দোদ্ভবা—গড়ুচাঁবিশেষ।

কন্দ্রী—জললীপিয়াজ, scilla indica.

কন্দ—মুখাবি°।

কন্দর—মারিষ শাক, নটেশাক।

কন্যাকা—ঘৃতকুমারী।

কন্যা—ঘৃতকুমারী, বড় এলাইচ, ভূমিকুস্মাণ্ড, বন্দ্যাকর্কোটকী, মহোবাধিবি° (ময়ূরপঙ্কের ন্যায় ১২টি পাতা, স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ আটা ও কন্দ হইতে উৎপত্তি—সুশ্রুত)।

কপটেবরী—শ্বেতকন্টকারী।

কপি—আমলকী, করঞ্জবি°।

কপি—সর্ষপাদিবর্ণের শাকবি°, brasic oleracea. প্রকারভেদ—ফুলকপি [ ইং cauliflower ] (ফুল চাড়ার মত হয়), বাঁধাকপি, তালকপি [ ইং cabbage ] (পাতা গুটাইয়া তালের মত হয়), ওলকপি [ ইং kuol kohl ] (মূল ওলের মত ক্ষীত

হয় )। বিদেশ হইতে এদেশে,  
আনীত, শীতকালে জন্মায় ।

কপিকছুরা—আলকুশী দ্র° ।

কপিকছুরাফলোপজা—জতুকালতা ।

কপিকছুরা—আলকুলশী দ্র° ।

কপিকা—নীল সিন্ধুবার বৃক্ষ,  
নীলনিসিন্দা গাছ ।

কপিকোলি—শৈয়াকুল ।

কপিচুড়া—আমড়া গাছ ।

কপিচুত—আমড়া ।

কপিথা—কদবেল দ্র° ।

কপিপিপলী—১ রক্ত অপামার্গ, ২  
সূর্য্যবর্ত বৃক্ষ ।

কপিপ্রভা—১ আলকুশী, ২ অপামার্গ ।

কপিপ্রিয়—১ আমড়া, ২ কদবেল ।

কপিবল্লী—গর্জাপ্পলী ।

কপিভক্ষ্য—কদলী ।

কপিময়না—এক প্রকার ময়না গাছ,  
*sanguiria spinosa* .

কপিরোমফল,—আলকুশী (ফল বানরের  
লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শব্দ দ্বারা  
আবৃত ) ।

কপিল—বরুণবৃক্ষ (?) ।

কপিলদ্রাক্ষা—দ্রাক্ষাবি° । পৰ্যায়—  
মৃদ্বীকা, গোস্তনী, কপিলফলা,  
অমৃতরসা, দীর্ঘফলা, মধুবল্লী,  
মধুফলা, মধুলী, হরিতা, হারহারা,

সুফলা, মৃদ্বী, হিমোস্তরা, পথিকা,  
হেমবতী, শতবীৰ্যা, কামরী ।

কপিলফলা—দ্রাক্ষাবি° ।

কপিল শিংগপা—শিংগপাবৃক্ষবি° ।

পৰ্যায়—কপিলা, পীতা, সারিণী,

কপিলাক্ষী, ভঙ্গগভী, কুশিংগপা

॥ শব্দক° ॥

কপিলা—শ্যামলতা (?) ।

কপিলাক্ষী—১ মর্গেবারু,

কপিলশিংগপা ।

কপিলামফলা—আলকুশী ।

কপিল্লিকা—গর্জাপ্পলী ।

কপিলা—মাধবীলতা ।

কপীকছুরা—আলকুশী ।

কপীজ্য—ক্ষীরিকাবৃক্ষ ।

কপীত—বেতবৃহাবৃক্ষ ।

কপীতন—আমড়া গাছ, গদভান্ডবৃক্ষ,  
গান্ধিভাট, শিরীষ, অশ্বখ, জুপারি  
গাছ, বেল গাছ ।

কপীষ্ট—১ রাজাদনীবৃক্ষ, ২ কপিথ,  
কদবেল ।

কপোতচরণা—ক্ষীরিকা (?) ।

কপোতবণ্ডা—ব্রাক্ষী (?) ।

কপোতবর্ণী—ছোট এলাইচ ।

কপোতবল্লী—ব্রাক্ষী ।

কপোতবেগা—ব্রাক্ষী শাক ।

কফলী—আউচবৃক্ষবিশেষ ।



কক্ষবর্ধন—পিণ্ডীতগরবৃক্ষ ।

কফাস্তক—বাবলা গাছ ।

কফারি—শঠ ।

কফেল—শ্লেষ্মাতকবৃক্ষ ।

কমন্ডল—১ অশ্বখবৃক্ষ, ২ গর্ধাভাণ্ড,  
গাঁধিভাট ।

কমন—অশোকবৃক্ষ ।

কমল—[ স° পদ্ম, সরসিজ, উৎপল ;  
ইং Indian sacred bean, lotus ]

পদ্ম, মৃগাল, নল, পঙ্কজ,  
nelumbium speciosum.

প্রকারভেদ—( ১ ) পদ্মডরকি,  
শ্বেতপদ্ম, ( ২ ) সৌগন্ধিক, blue  
lotus,—নীলকমল, নীলপদ্ম,  
শাপলা, nymphoea cyanea—  
( ক ) ছোট নীলপদ্ম, nymphoea  
stellata; ( খ ) বড় নীলপদ্ম, n.  
major. ( ৩ ) রক্তপদ্ম—

‘রক্তকমল,’ ( ৪ ) কুমুদ ( শালদ্রক  
ফুল ); শালদ্রকের ফুলের ভিতর  
সর্ষপের বীজ থাকে । তাহাকে  
ভাট বলে । ভাটের খইয়ের মোয়া  
উত্তম খাদ্য, ( ৫ ) স্থলপদ্ম,  
থলপদ্ম, hibiscus mutabilis  
plenus. পর্যায়—পদ্ম, নল,  
নলিন, অম্বোজ, অম্বুজশ্ম, অম্বুজ,  
শ্রী, অম্বরুহ, অম্বুপদ্ম, স্রজন,

অম্বোরুহ, সারস, পঙ্কজ, সরসীরুহ,  
ফটপ, পাথোরুহ, পদ্মকর, বার্জ,  
তামরস, কুশেশয়, কঞ্জ, কজ,  
অরবিন্দ, শতপত্র, শতদল,  
বিসকুম্বম, সহস্রপত্র, মহোৎপল,  
বারিরুহ, সরসিজ, অনিলজ,  
পঙ্কেরুহ, বাজীব, কমল ।  
শ্বেতপদ্ম—শতপদ্ম, মহাপদ্ম,  
পদ্মডরকি, সিতাম্বুজ, নল, সরোজ,  
নলেন, অরবিন্দ, মহোৎপল ;  
রক্তপদ্ম—কোকনন্দ, রক্তোৎপল,  
হল্লক, রক্তসান্দিক, রক্তসরোরুহ,  
রক্তাম্ব, অরুণকমল, রবিপ্রিয়,  
রক্তবারিজ ; নীলপদ্ম—নীল,  
ইন্দীবর, নীলোৎপল, মৃদুৎপল,  
কমলয়, নীলাবধ, নীলমৃৎপল,  
ভদ্র ।

কমলক—কমল ।

কমলাগর্দভ, কমিলা—কম্পিত দ্রষ্টব্য ।

কমলালেবু—[ স° কমলানিস্বদ ; হি°  
অমৃতফল, সুস্থর, নারিকী,  
সম্ভর, নারেঞ্জ ; নেপালী—সুস্তল ;  
গ্° নারুজী ; পঞ্জা° সম্ভর, নারিকি,  
নারঞ্জ ; বোম্বা°, নারজীশম্ভ,  
নারিকশাল ; ম° সন্ধুনিখব,  
নারিকশাল, নারিক ; তে° গঞ্জনিখ,  
কিষ্ঠলি, কিষ্ঠলিপদ্ম,

নারিঞ্জপন্দ্র ; তা° কিচিল, কেচু, কল্দ্রকীপল্লম ; কণা° কিস্তনেপন্দ্র, কিস্তবৈপে ; মালয়—মাহুর নারম্বা কোলাঞ্জি নরকম ; মহীষদুর—ফেরদুক, সিম ও মিনিস ; সিংহল—নারংগকা, দোদন ; আবা°—নারংগ ; ফা°—নারংগ ] নারংগা, কাকি, খাটজমিয়া, *citrus aurantium*. দুই হাজার বছর পূর্বে ভারতবর্ষে—কমলালেবু ছিল না—প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ নাই । গ্রীক জাতিরা বর্ণনা করে নাই । কমলালেবু চীন হইতে ভারতে আসিয়াছে ।—*de Candole*. কমলালেবু প্রধানত চারি প্রকার—(১) সস্তর বা মোগলাই কমলা—ছাল পরিষ্কার, পীতভ, স্বক বড় আলগা, (২) কেওন্লা বা নারিঙ্গী, (৩) লাল কমলা, *malta orange*; (৪) মাল্দারিন । পর্ষায়—নারংগ, নাগরংগ, সুরংগ, তগংগ, স্বকংগ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, মৃদুপ্রিয়, ঐরাবত, বক্ত্রবাস, যোগীরংগ, নগর, বরীষ্ঠ । বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গাছ । নতুন শাখা সবুজবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ । পাতা বক্র, ডিম্বাকৃতি

ও অগ্রভাগ মোটা । ফুল সাদা । ফল গোলাকার । উভয় দিকে কিশিৎ চাপা ।

কমলিনী—পশ্চিম গাছ বা গুল্ম ।

কমলোত্তর—কুসুম ফল ।

কম্পল—কম্পল দু° ।

কম্পল, কম্পলক—[ স° কম্পল, কক°শাচন্দ্র ; ম° কপীলা ; ও° কপীলো ; হি° কবীলা কম্বলা ; ক° কম্পলকং ; ফা° কম্বলয় ; অ° কম্বার ; উ° কমলাগুড়ি ] কমলাগুড়ি বা কমলা নামক এক জাতি বৃক্ষ, *mullotuo phillippensis*, *trotlera tinctora*. স্নানাদিবর্গের ছোট আরণ্য তরুণী° । ভারতের প্রায় সকল দেশেই জন্মায় । গাছ বড় হয় না । ডুমুরের পাতার মত পাতা । ফল ফলসার মত । পাকা ফলের গায়ে একপ্রকার গন্ধবিহীন ও স্বাদবিহীন ছোট ঘোর লালরংগের দানাদার পদার্থ থাকে তাহাকে কমলাগুড়ি বলে । উহা দ্বারা পাট ও তসর রং করা হয় । ঔষধার্থেও ব্যবহৃত হয় ; পর্ষায়—কম্পল্য, কম্পাল, কম্পলক, রক্তাংগ, রেচী, রেচনক

রঞ্জক, লোহিতাংগ, রক্তচূর্ণক ।

কম্বুকা—অশ্বগন্ধাবৃক্ষ ।

কম্বুকাস্থা—অশ্বগন্ধা ।

কম্বুপদ্মপী—শম্পগুপীবৃক্ষ ।

কম্বুমালিনী—শম্পগুপী ।

কম্ভারী—গাম্ভারীবৃক্ষ ।

কয়ত, কয়েত, কয়েদ—কথবেল দ্র°

করক—১ দাড়িম্ববৃক্ষ, ২ করঞ্জবৃক্ষ, ৩

পলাশবৃক্ষ, ৪ বকুলবৃক্ষ, ৫

কোবিদার, রক্তকাণ্ডনবৃক্ষ ।

করকাস্তাঃ—নারিকেলবৃক্ষ ।

করক, করকশালি—ইক্ষু-বিশেষ ।

করচিমালা—বৃক্ষবিশেষ, *bridelia*  
*lancaefolia*.

করচিয়ব—অজুন গাছ, *pentaptera*  
*arjuna*.

করচ্ছদ—সেওড়া গাছ ।

করচ্ছদা—সিন্দুর পদ্মপবিশেষ ।

করজ—করঞ্জবৃক্ষ ।

করজোড়—হাড়জোড়া গাছ ।

করঞ্জ, করঞ্জা—করমচা । করঞ্জা বা

করমচা প্রধানত তিন প্রকারের—

(১) ডহরকরঞ্জা [ স° কটুকরঞ্জ,

নক্তমাল ; চিরবিলম্ব ; হি° করঞ্জ,

কটুকরঞ্জ, কিরমাল, সুখচিন ; ম°

চাপড়া করঞ্জ, ঘাণেরা করঞ্জ,

বার্ভাঠা ; গু° চরেলকণ্ঠসে ; ক°

নাপসায়িমবর্ণ, বারদুর্বার্হিলিগল ;

তা° পদ্ম, পদ্মমারং ; র° থয়েন

পিরিজ ; তৈ° কান্দুগেট্ট ; কঞ্জ°

ও° কোজয় ; প° সুখচেন ]

*pongamia indica*. ডহরকরঞ্জা

জলাশয়ের পাশেই জন্মিয়া থাকে ।

উচ্চতায় ৪০-৫০ ফুট । বহু

শাখাবিশিষ্ট, ফুলের রং নীল,

গ্রীষ্মকালে ফোটে । শিম্বাদিবর্গ ।

(২) নাটাকরঞ্জা—[ স° পদ্মিতকরঞ্জ,

প্রবীৰ্য, পদ্মিতক ; হি° কাটকরঞ্জ,

করঞ্জবা ; ম° সাগরগোটা ; গু° কাঁকচ

তেনাংফল কাকচিয়া ; ক° করঞ্জভেদু ;

তৈ° কচকাই, গু° চোপকা ; ফা°

থায়, ইবলিশ ; অ° অস্তসজ্জ ; কো°

নাটাচিতা ; ও° কোবিপোল ]

পদ্মিতকরঞ্জ ; *caesalpinia*

*bonducella*, *guilandina b.*,

কাঁটাবহুল বড় লতাৰ্ণ ।

পদ্মকিরণীর পাড়ে বা সমুদ্রের ধারে

বহু পরিমাণে দেখা যায় ।

শিম্বাদিবর্গের কৃষ্ণচূড়াদি

অনুবর্গের গাছ । (৩) কাঁটাকরঞ্জা,

টককরঞ্জা—[ স° কর-মদক,

মহাকরঞ্জ, বিষম্বী, হস্তিচারিণী,

কাকয়ী, সুমনা, মদহস্তিনা,

হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী, মধুমতী ;  
 হি° করোন্দা ; ও° করঞ্জকোলি ]  
 বহু শাখাবিশিষ্ট কটকময় ক্ষুপ,  
*carissa carandas*. ইহা ছাড়াও  
 চারিপ্রকার করঞ্জা বাঙলা দেশে  
 আছে—(ক) অল্পকরঞ্জ [ স°  
 করমর্দক ], (খ) বিষকরঞ্জ [ স°  
 অশারবল্লী ], (গ) মাকড়াকরঞ্জ  
 [ স° মকটী ], (ঘ) গোটেকরঞ্জ  
 [ স° ষড়গ্রন্থ ]। বৃহদাকার  
 করঞ্জকে ‘মহাকরঞ্জ’ বলে।  
 রীঠাকরঞ্জ, লতাকরঞ্জও আছে।  
 করঞ্জাকে বাংলায় করমচা বলে,  
*carisaa carandas*. পর্যায়—  
 কুম্ভপাকফল, অবিগ্ন, সুষেগ,  
 পাকফল, বলানয়, করান্ন, শাণিমর্দ  
 ইত্যাদি।

করঞ্জক—করঞ্জ দ্র°।

করঞ্জফল,—ফলক—কপিথবৃক্ষ।

করট—কুম্ভবৃক্ষ।

করড—শৈবালবিশেষ।

করদ্রুম—কারক্ষরবৃক্ষ।

করপণ—১ তিণ্ডাতকবৃক্ষ, ২ রক্ত  
 এরণ্ড।

করপত্রবাণ—তালবৃক্ষ।

করবী—[ স° করবীর, গোরীপদ্মপ,  
 সিদ্ধপদ্ম ; হি° সফেদকনের,

কনের, লালকনের, পীলীকনের,  
 ফুলকীকনের ; ম° মহের পাণ্ডরী,  
 তাংবড়ী, পিংবঠঠী ; গদ্° কনের,  
 ঘোলনাং ফুলরী, রাতা ফুলনী,  
 গুলাবীফুলনী, পীলাফুলনী ; ক°  
 বাকনলিঙ্গে, কেলনলিঙ্গে ; তে°  
 কানেরচেট্টু, ফা° খরজেহহরা ; অ°  
 স্তমূল, হিমারদুকলী ; তা° অনারী]  
 করবী, *nerium odorum*;  
 তারাদিবর্গের পদার্থ। ফুলের  
 রংভেদে চারিপ্রকার—(১) শ্বেত  
 করবী [ স° করবীর, শতকুণ্ড,  
 অশ্বল্প ] (২) রক্তকরবী [ স°  
 রক্ত করবীক, চণ্ডক, লগুড় ], (৩)  
 পীত করবী (কলকে ফুল), (৪)  
 কৃষ্ণকরবী। পদ্মকরবী বৃহদল  
 করবী। পর্যায়—প্রতিহাস,  
 শতপ্রাস, চণ্ডাত, হরমারক, হয়ারি,  
 অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি,  
 অশ্বহা, হরয়, শতকুন্দ,  
 শ্বেতপদ্মপক, নখরাহর, অশ্বনাশন,  
 স্থলকুমুদ, দিব্যপদ্ম, ইত্যাদি।  
 ১০-১২ হাত উঁচু বহু শাখাবিশিষ্ট  
 সরল গাছ, ফুল গোলাপী, শ্বেত।  
 ফল কতকটা গোল। শ্বেত-করবী  
 ও রক্তকরবীর গাছ উদ্যানে রাখে।  
 পীত-করবীর গাছ প্রায় আশ্র-



সম্ভূত । কৃষ্ণকরবীর গাছ কচিৎ  
দেখা যায় ।

করবীরক—অজুর্নবৃক্ষ ।

করবীর ভুজা, করবীর ভূয়া—অড়হর ।

করভকাণ্ডিকা—উষ্ট্রকাণ্ডীবৃক্ষ ।

করভাপ্রয়া—ক্ষুদ্র দুরালভা ।

করভবল্লভ—১ উষ্ট্রপ্রিয় পীলবৃক্ষ, ২

কপিথবৃক্ষ ।

করভাদনী—ক্ষুদ্র দুরালভা ।

করমচা—করঞ্জ দ্র° ।

করমট্ট—১ সুপারিগাছ, ২ পানি আমলা  
গাছ ।

করমর্দ—করঞ্জ দ্র° ।

করমর্দক—১ পানি আমলা, ২ করোন্দা,  
করমচা ।

করম্ভ—১ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ, ২ শতাবরী,  
শটী, শতমূলী ।

করলা—[ স° উদ্ভাসিত, কারবেল্ল,  
সুসবী ; হি° করেলা ; গু° কারেলা,  
কণ্ডবাবেলা ; ম° কারলে, ক্ষুদ্র  
কারলী ; ক° হাগল ; তে° করিলা ;  
উ° শলরা ; কা° কারেলাহ ;  
অ° ফিস্‌সা, উলহিমার ; ও° কলরা ]  
করেলা, *momordica charan-*  
*tia*, m. *muricata*. বড়গুলি  
করেলা, ছোটগুলি উচ্ছে । কুম্ভা-  
দিবর্গের লতাবি° । ফল তিত ।

করামর্দ, করম্বক, করাম্বক—করমচা ।

করাল, করালক—কৃষ্ণ কুঠেরক, কালো  
তুলসী ।

করলা—শারিবা, অনন্তফুল ।

করিক—বিট খদির (†) ।

করিকণবল্লী—চই ।

করিপত্র—তালীশ পত্র ।

করিপিপলী—গজপিপলী ।

করিশ—গুন্মবি° ; *dalbergia reni-*  
*formis*.

করী—নাগকেশর ।

করীর—[ স° করীর, হি. করীল ]

করীল, *capparis aphylla* . ১

বাঁশের কোড়া—বংশ দ্র° । ২

কণ্টক ক্ষুদ্রবি° । মরুভূমিতে  
জন্মে । *C. spinosa*.

বরুণাদিবর্গের বৃক্ষ, কাটা  
গুড়কামাই । পর্যায়—করক,

গ্রন্থিল, নিষ্পটিকা, গুড়পত্র, করক,

তীক্ষ্ণপত্র । পাতা ছোট,

কেবলমাত্র শাখাগ্রে দেখা যায় ।

করীরকুণ—করীর শাকবি° ।

করুণ, করুণা—লেবু দ্র°, *citrus*  
*decumana*.

করুণী—পদ্মপত্রবি° । পর্যায়—

গ্রীষ্মপদ্মপী, রক্তপদ্মপী, চারিণী,

রাজপ্রিয়া, রাজপদ্মপী, সূক্ষ্ম,

রক্তচারিণী ।

করুবক—ফলসা ।

করেণ্ড—ওষধি বৃক্ষবি° । অতিশয় ক্ষীর-  
যুক্ত এবং মূলদেশ যাহার গজাকৃতি,  
হস্তিকর্ণ, পলাশপত্রের ন্যায় দুইটি  
মাত্র পত্রযুক্ত ।

করেন্দুক—ভূ-তৃণ, গন্ধতৃণ ।

করেলা—করলা দ্র° ।

কর্ক—বৃক্ষবি°, কাকড়াশৃঙ্গী ।

কর্কট—বৃক্ষবি° । পর্যায়—কর্ক,  
ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রাফলক, কর্ক ফল ।

কর্কটক—[ স° বৃক্ষটক ; ও° কাকড় ]

কাকরোল, *momordica cord.*

কুমাণ্ডবর্গের লতাবি° । গাছ খুব  
লম্বা হয় । ফলের গায়ে উজ্জের  
মত অবদ আছে ।

কর্কট-শৃঙ্গিকা, কর্কটশৃঙ্গী—[ হি°  
কাকড়াশৃঙ্গী ; ম° কাকরাশৃঙ্গী ;  
ও° কাকড়াশিঙ্গী ; ক° কর্কট-  
শৃঙ্গী ; তৈ° কর্কটশৃঙ্গী ]

কাকড়াশৃঙ্গী, *rhus succe-*  
*danea*. লম্বা, ফাপা, দুইপাশ

ক্রমশ সরু । ঈষৎ লালবর্ণ,

টিপসেই ভাঙ্গা যায় । পর্যায়—

কর্কটাহর, মহাঘোষা, শৃঙ্গী,

কুলীরশৃঙ্গী, চক্রাঙ্গী, কুলিঙ্গী,

কাসনাশিণী, ঘোষা, বনমুখজা,

চক্রা, শিখরী, কর্কটাঙ্গা, কর্কটী,

বিধানিকা, কোলীরা, চন্দ্রাপঞ্জা,  
বলাঙ্গা । গাছ ২৫-৩০ ফুট উঁচু ।

ফুল ছোট, অনেক জন্মায় । পীত  
ও সবুজ, ফলের আঁটি শক্ত । ফল  
প্রচুর হয় ।

কর্কটাঙ্গ—কাকড় ।

কর্কটাঙ্গা—কাকড়াশৃঙ্গী ।

কর্কটাহর—বেলগাছ ।

কর্কটাহ্রা—কাকড়াশৃঙ্গী ।

কর্কটিনী—দারুহরিদ্রা ।

কর্কটিভিটি—সাদা ফুটি ।

কর্কটী—১ শাল্মলীফল, শিমূল ফল,

২ দেবদালী লতা, ৩ কাকড়াশৃঙ্গী,

৪ এর্বারু, ৫ ঘোটিকবৃক্ষ, ৬

কাকড় । পর্যায়—কটুদলী, ছদা-

পাণকা, পীনস, মূত্রফলা, ত্রপুষা,

হস্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মূত্রলা,

বহুকন্দা, কর্কটাক্ষ, শান্তনু,

চিউটী, বালুকী ।

কর্কন্দ—ক্ষুদ্র বদর ফল, শিয়াকুল,  
কুলফল ।

কর্কফল—ক্ষুদ্র আমলকী ।

কর্কশ—১ কমলাগুড়ী, ২ কাসমর্দ,

কালকাসিন্দা, ৩ ইক্ষু ।

কর্কশচ্ছদ—১ পটোল, ২ শেওড়া গাছ ।

কর্কশচ্ছদা—১ কোশাতকী, ঝিঙে, ২

দধিবৃক্ষ (?) ।

কর্কশদল—১ পটোল, ২ শেওড়াগাছ।

কর্কারু—লাল কুমড়া। ইহাকে বিলাতি

কুমড়া বা সহরে লাউ বলে।

কর্কারুক—কালিঙ্গবৃক্ষ, খেঁড়ো।

কর্কী—কাঁকড়া।

কর্কোটক—১ বেলগাছ, ২ ইক্ষু,

৩ কাঁকরোল।

কর্কোটকী—১ পাত ঘোবা। পর্যায়—

কটুফলা, মহাজালিনী, ধামাগর্ব,

রাজকোষাতকী, ২ কাঁকড়।

কর্কুব—কচু ॥ রাজনি° ॥

কর্ণিকার—কর্ণিয়ার বা ছোট সোনালু

॥ রাজনি° ঋতু° ॥ সৌদাক।

কপূর—১ কন্দরাল, ২ আখরোট,

৩ কাপাস গাছ। পর্যায়—

কাপাসী, তুন্ডিকেরী, সমুদ্রান্ত।

কপূর—[ হি° কপূর; ফা° কাপূর;

অ° কাফূর; ও° ভাস্কর; গু°

কপূর; তৈ° কপূরাম্ ] কপূর।

কপূর সাধারণত দুই প্রকার—

(ক) চীন, ফরমোসা ও জাপানী

কপূর, *cinnamomum*, *cam-*

*phora*। (খ) বোর্নিও ও সুমাত্রা

কপূর, *dryobalanops arom-*

*tica* = অপকৃ কপূর, ভীমসেনী

কপূর। রাজনিঘণ্টকার ১৪ রকম

কপূরের উল্লেখ করেছেন—(১

পোতাস, (২) ভীমসেন (বরস),

(৩) সিতকর, (৪) শঙ্করাবাস, (৫)

প্রাংশু, (৬) পিঞ্জ, (৭) অশ্বসার,

(৮) হিমবদুতা, (৯) বালুকা, (১০)

জুটিকা, (১১) তুষার, (১২) হিম,

(১৩) শীতল, (১৪) পচিচকা

(পাণ্ডিকা, পান্ডিকা)। ভারতেও,

কপূর জন্মায়—উত্তর ও দক্ষিণ

ভারতে নাগাই কপূর, *blumea*

*camphora*। হিমালয়ে, খাসিয়া

পাহাড়ে, ও বাঙলায় *lymnophila*

*gratioloides*। জলাভূমিতে

জন্মায় কপূরগন্ধী শাকবি°।

পাতা গুচ্ছাকার, পাতায় এক

প্রকার চিহ্ন থাকে। ফুল পাঁচ দল

ও রক্ত চিহ্নিত সাদা। ফল বহুবীজ

পূর্ণ। প্রায়ই লতাইয়া পড়ে।

বর্ষায় ফোটে। কাল কপূর (*L.*

*roxb.*) ফুল ছোট, বেগুনে রং,

পাতা গুচ্ছাকারে না হইয়া মৃৎখো-

মুখী দুইটি হয়। আবার নানা

জাতীয় বৃক্ষ হতে কপূর হয়—

(ক) তামাক পাতা চোয়াইয়া। (খ)

পাচুলী গাছ হইতে পাচুলি কপূর।

(গ) নারোগা লেবু. “নিবোর্নি

ক্যাম্ফার”।

কপূরা—হরিদ্রাবি°, আমাদা।

কব্দাদার—১ কবিদারবৃক্ষ, ২ শ্বেত-  
কাণ্ডন, ও নীলকণ্ঠী ।  
কব্দার—ধূতুরাবৃক্ষ ।  
কব্দার—১ শঠী, ২ দ্রাবিড়ক, কাঁচা  
হলুদ ।  
কব্দারক—কাঁচা হলুদ, কাল হলুদ,  
আমাদা ।  
কব্দারদল—সাকব্দারবৃক্ষ ।  
কব্দার—কৃষ্ণতুলসী, পারুল,  
বাবুই-তুলসী ।  
কর্মকরী—১ মর্বারতা, ২ বিম্বিকা  
লতা, তেলাকচাঁর লতা ।  
কর্মজ—বটগাছ ।  
কর্মফল—কামরাঙা ফল ।  
কর্মমূল—কুশ তৃণ ।  
কর্মরজ—কামরাঙা ৮ ॥ রাজনিং,  
রাজবং ॥  
কর্মার—১ বাঁশ, ২ কামরাঙা ।  
কর্মারক—সেওড়া গাছ ।  
কর্ম—বহেড়া গাছ ।  
কর্মণী—ক্ষীরণীবৃক্ষ ।  
কর্মফল—বহেড়া গাছ । পর্যায়—  
বিভীতক, অক্ষ, কনিদ্রুম, ভূতবাস,  
কলিঙ্গপালয় ।  
কল—১ শেয়াকুলবৃক্ষ, ২ শাল গাছ ।  
কলন—বেতসবৃক্ষ, বেত গাছ ।  
কলন্দ—ঘোলীশাক ।

কলভ—ধূতরা গাছ ।  
কলভবল্লভ—পীলবৃক্ষ ।  
কলভী—চণ্ডবৃক্ষ ।  
কলম—শালিধান্য, কড়মা । ধান্যাদি-  
বগের—লতানে ঘাস ( দর্বার মত,  
কিন্তু কিছু মোটা ) বিশেষ ।  
কলমী—[ স° কলম্বী ; ও° কলম ; হি°  
কলমী ] কলমী । কলম্বাদিবগের  
জলশাকবিং, calonyction  
roxb., convolvulus reptans.  
প্রকারভেদ—(১) বনকলমী,  
ipomoea striata (২) নীলকলমী  
—নামাস্তর কালাদানা ( বাঁজ কালো  
বলিয়া ) লোমশ রোহিণী,  
pharbitis nil, i. mil ( ৩ )  
দুধকলমী—বন্য রোহিণী, C.  
bona-nox. বঙ্গদেশের বহু  
জলাশয় ও জলাভূমিতে জন্মায় ।  
পাতা বড় । ফুল বড় ও সাদা ।  
কলমোত্তম—গন্ধশালি, স্নগন্ধি ধান্য ।  
কলম্ব—কদম্ব ।  
কলম্বক—ধারাকদম্ব ।  
কলম্বিকা—কলমী শাক ।  
কলম্বী—কলমী শাক ॥ রাজবং ॥  
convolvulus reptans. পর্যায়—  
কড়ম্বী, কলম্ব, কলম্বিকা ।  
কললজোত্তম—শালগাছ ।

কলশি, কলশী—চাকুলে ।

কলসনাড়—একপ্রকার চোঁচ ঘাস ।

কলা—[স° কদলী ; হি° কেরা, কেলা ;

ম° কেঠ্ঠ ; গুজ্জ° কেন্য ; তৈ°

অরিতি, চন্দ্রাকেলী ; তা° বাঠেঠ,

রন্ত ; হুগালী ; অ° মেয়জ ; ফা°

মাজ্ ; ও° বেস্তল° ; মহা° কেলি ;

সিং° কহিকাং ; ব্র° নেপিয়ান বা

জ-হেট ; বালিদ্বীপ—বিষদু ; মলয়—

পিস্যাং ; জাপানী—গড়ং ;] *musa*

*sapientum*. শ্রেণী বিভাগ—

বাঙলায়—রামরন্তা, *musa rubra*,

অনুপাম, মালভোগ, অপরিমিত্য,

মর্ত্যমান ( চাটিম, শাঁস খুব সাদা

ও মাখমবৎ কোমল, পাকিলে বর্ণ

পীতভ হয় ও গায়ে ফোঁটা দাগ

হয়, পুষ্ট হইলে স্নগোল ও সরল ),

চম্পক. ( চাঁপা—পাকিলে ঘোর

পীতবর্ণ হয় । পুষ্ট হইলে

স্নগোল অথচ খর্বাকৃতি, শাঁস

অল্পরসযুক্ত, স্নগন্ধ, খোলা পাতলা);

চিনিচাঁপা, কানাইবাঁশী ( প্রায় ১

ফুট লম্বা হয় ); ঘিয়ে; ( ঘূতের

ন্যায় স্নগন্ধ); কালিবউ (বেশ মোটা)

কাঁঠালী ( ঢাকার—কবরী কলা ।

মাঝে মাঝে বাঁজ হয়—পাকিলে

ঈষৎ পীত হয়, পুষ্ট হইলে ঈষৎ

বক্ৰ, শাঁস কিছু কড়া, খোসা পুরু )

মদনী, মদনা, তুলসী, মনুষা;

রক্তবীর, পোড়া রক্তবীর, দ'য়ে কলা,

ডোগরেকলা ( বাঁচা কলা, 'ফল

খাওয়া যায় না, (কিন্তু মোচা সুস্বাদু)

সয়াকলা, চিনিচাঁপা, সফরীকলা ।

আসামে—আঠিয়া, জেপা আঠিয়া,

ভীমকলা, কনক-ধোল, বরংমানি,

ছৈনিচম্পা, মনুহর, ভোট মনুহর,

পুদুরা, মালভোগ, জাহাজ,

দাঘজোয়া । মাদ্রাজে—রসখলি,

গাণ্ডি, পাহা, পেবেলি, সেবেলি

বন্দে, বেংগলা, যমেই, পে, সেরবা,

মেনেপানিয়ামনে পিদিমোথে ।

বোম্বাই—রসরই, মনুখলি,

তাম্বাড়ি, বজেলি, লোখাণ্ডি,

সোনকেলি, বেসকেলি, করঞ্জেলি,

নরসিঙ্গ । সিঙ্গাপুরে মালয় ও

ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রায়

৪০ রকম কলা জন্মে । মালয়দ্বীপে

—*musa gaucha*. মরিসাসে—

গোলাপী কলা ; *musa*

*vosacea*, পাহাড়ের কলা—*m.*

*ornata*, দাক্ষিণাত্যে পর্বতজাত

বুনো কলা—*m. superba*,

নেপালী কলা—*m. nepalensis*,

সিন্ধুরে কলা বা চীনে কলা,



কাবুলে কলা—*m. covendishi*,  
কাঁচাকলা—*m. paradisisea*,  
ইত্যাদি। পর্যায়—কদলী,

বারগবুসা, রম্ভা, মোচা (মোচক  
রম্ভা), অংশুমলফলা, কদল (যাহা  
জলেই পুষ্টি প্রাপ্ত হয়)। কাষ্ঠল,  
বারবুসা, সুরফলা, সুরুমার, সুরুমফলা  
(বৎসরে একবার মাত্র ফল হয়),  
গুচ্ছফলা, হস্তিবিধাণী, গুচ্ছদন্তিকা  
নিঃসারা, রাজেশ্টা, বালকপিপ্পা,  
উরুস্তম্ভা, ভানুকলা, বনলক্ষ্মী,  
কদলক, মোচক, রোচক, লোচক,  
বারগবলম্ভা, চমৎবতী। কলার  
পাতার সংলগ্ন বাসনা সহ কাণ্ড  
৫-১০ ফুট উঁচু। পাতা প্রায়  
৫-৬ ফুট লম্বা উপরের দিক  
সবুজ, নিচের দিক ফিকে সবুজ।

কলাই—কলায়, মাষকলাই।

কলাকর—দেবদারী, *unona longi-  
flora*.

কলাজাজী—কলোজাবক্ষ।

কলাপিনী—নাগরমুখা (?)।

কলাপী—অশ্বথ গাছ।

কলালক—কলমধান।

কলামোচা—ধান্যাবি, *andropogori  
lanum*

কলায়—মটর, মাষকলাই, কলায়শর্দূট।

পর্যায়—সতীকলা, হরেন্দ্র, খাঁড়ক,  
ত্রিপুট, অতিবতুল। বনকলায়—  
*glycine labialis*.

কলায়—গাউদবাঁ।

কলি—বহেড়া গাছ।

কলিকা—[সং কলিকা; ওং কণিঅর]

তগরাদিবর্গের পুষ্পতরু। পাতা  
সরু-সরু, একোস্তর, দীর্ঘ; ফুল  
হলুদ রংয়ের, ফল সক্রোণ। দক্ষিণ  
আমেরিকার গাছ, এখন ভারতে হয়।

কলিকাটা—কুলেখাড়া দ্রু। *hygro-  
phyla spinosa*.

কলিকার—পুতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ।

কলিকারী—বিষলাক্ষলিয়া। পর্যায়—  
লাক্ষলী, হলিনী, গর্ভপাটনী,  
দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, ব্রহ্মহুং,  
পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা,  
বহিঃশিখা, নস্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা,  
বিদ্যাজ্জবালা, অগ্নিজিহ্বা।

কলিঙ্গ—১ ইন্দ্রধব, ২ পুতিকরঞ্জ, ৩  
কুটজ গাছ, ৪ শিরীষ গাছ, ৫  
অশ্বথ গাছ।

কলিঙ্গন—বক্ষবিং, *alprinia  
galanga*.

কলিদ্রুম—বহেড়া গাছ।

কলিন্দ—বহেড়া গাছ।

কলিপ্রিয়—বহেড়া গাছ।

কলিমারক, কলিমালক, কলিমাল্য—

পাতিকরঞ্জ, কাটাকরঞ্জ ।

কলিবৃক্ষ—বহেড়া গাছ ।

কলিহারী—বিষলাফলিয়া ।

কঙ্কফল—দাড়িম গাছ ।

কঙ্কাসন্দা—বৃক্ষবি° ।

কম্পতরু, কম্পদ্রু, কম্পদ্রুম—

দেবলোকের বৃক্ষবি° (?) ॥ রঘু° ॥

দেববৃক্ষ—মন্দার, পারিজাত,

সম্মান, কম্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই

ওঁটি দেববৃক্ষ ।

কম্পনাথ—বৃক্ষবি°, *justicia paniculata*.

কম্পপাদপ—১ সম্মানবৃক্ষ, ২ মন্দারবৃক্ষ,  
৩ পারিভদ্রবৃক্ষ, ৪ হরিচন্দনবৃক্ষ ॥  
বিশ্বকো° ॥

কম্পবল্লী—কম্পলতা ।

কল্মাষ—গন্ধশালি ।

কল্যা—হরীতকী ।

কল্যাণবীজ—মসুর ।

কবক—ছত্রাক, বেঙের ছাতা ।

কবচ—গর্দভাণ্ডবৃক্ষ ।

কবচপত্র—ভূজপত্র ।

কবার—পদ্ম ।

কবিকা—কচুকপদুমপ ।

কবেল—পদ্ম, শর্দূদিফুল ।

কশাড়—[ স° কেশরাজ, কসেরু, ক্ষুদ্র

মুকা, শ্বেকরেণ্ট, গন্ধকন্দক ; হি°

কসেরু, চিচোড় ; ম° কচরা,

ফুরডা ; ক° সেকিনগড়ে ; তে°

ইটিকোতি ; ও° কেশুর ] কেশুর,

কেশাড়, কশাড়, *scirpus grossus*,

s: *kysoor*. মৃস্তাদিবর্গের

তৃণবি° । নীচু, জলাভূমিতে

বড় জন্মে । ডাঁটার মত গাছ । নীচে

কন্দ থাকে, তাহাই কেশুর ।

কেশুরে কিছু মৃৎথার ন্যায় গন্ধ

থাকে ।

কশাত—তৃণবি°, কেবো ।

কশেরু, কসেরু—কেশুর দ্র° । বড়

কেশুর, রাজকশেরু । ছোট

কেশুরকে দেশ-বিদেশে ‘চিচোড়’

বলে ।

কশ্মীরজ, কশ্মীরজন্ম—কুস্কুমবি° (?) ।

কষায়—গোনা গাছ ।

কষায়বর্গ—ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি,

প্রিয়ংবাদি, লোধাদি, গ্রিফলা,

শল্লকী, জাম্ব, আম, বকুল, তিস্তদুক,

ফলিনী, কতকশাক, পাষাণ-ভেদী,

বনস্পত্যীফল, সালসারাদি, কুরুবক,

কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী, পানকী,

অনিষগ্ন, নীবার, মৃৎগ ।

কষায়া—ক্ষুদ্র দুরালভা । পর্যায়—

যাস, যবসা, দৃশপার্শ, ধন্ব্যাস,

কুনাশক, দুরালভা, সমুদ্রাস্তা,  
রোদিনী, গান্ধারী, কছুরা, অনস্তা,  
হরবিগ্রহা, দুরভিগ্রহা ।

কষায়ী—১ শালবৃক্ষ, ২ লচুকবৃক্ষ, ৩  
খজুরবৃক্ষ ।

কষেরুকা—কেশর ।

কসনোৎপাটন—বাসকবৃক্ষ ।

কসাগিলা—বৃক্ষবিং, *dolichos*  
*hexandra* .

কস্তুরী—শাকবিং । দুই প্রকার—(১)

কালকন্তুরী—যবাদিবর্গের শাকবিং,  
*hibiscus abelmoschus* . প্রায়

দুই হাত উচ্চ হয় । গাছের বীজে  
কস্তুর গন্ধ । ফল বড়, মাঝে

লাল । ফল পাঁচকোণা । (২)

লতাকন্তুরীকা—[ স° লতাকন্তুরী,

জটাকন্তুরী ; হি° মৃসক্দানা,

মৃসক্দিদি ; গ্° মৃসক্দান ; তা°

কটুক-কন্তুরী ; তে° কন্তুরীবেড়া

ভিটল্দ ] শাকবিং । শাকে কন্তুরীর

গন্ধ । আর এক জাতীয় গাছ আছে

তাহা দেখিতে ভেরান্ডা গাছের

মত, *amaryllis zelanica* .

কস্তুরীবল্লিকা—লতাকন্তুরী ।

কন্তুরীমল্লিক—লতাকন্তুরী । দুই

রকমের গাছ—একপ্রকার লতানিয়া,

অন্যটি ভেরান্ডা গাছের মত ।

কহর—ককুভ গাছ, *pentaptera*  
*glabra* .

কহলার—শ্বেত উৎপল, শ্বেত শর্দদি,  
হেনা ফুল, *nymphoea edulis* .

পর্যায়—সৌগন্ধিক, কতুণ, গন্ধক ।

গন্ধযুক্ত নীল শালুক, ॥ কালিদাস ॥

কাঁইবীচি (দেশজ)—বীজের শীষে

কাঁইবং আটা থাকে, বোধ হয় তাই

কাঁইবীচি নাম হইয়াছে । তে° তুল ।

কাঁকড়াশুঙ্গী—ককটশুঙ্গী দ্র° ।

কাঁকরোল—ককটিক দ্র° ।

কাঁকড়—[ স° এবারু, ককটী ; হি°

ককড়ী ; ম° ও গুজ° কাঁকড়ী ; ক°

কোয়সোত ; তে° দোসকায়া ; কা°

খ্যাট্জাব ; অ° কিস্‌সাকদম ]

কুম্মাণ্ডবর্গের শশাসদংশ

প্রতানীবিশেষ, *cucumis utilis-*

*imus* . পাতা খরখরে, ফল লম্বা,

গোল ডোরাকাটা, পাকিলে রং লাল

হয় । একজাত পাকিলে ফাটিয়া

‘ফুটি’ (*melon*) হয় । খরমুজা ।

বর্ষজীবী লতা, জমিতে লতাইয়া

বৃদ্ধি পায় ।

কাঁকড়ী—কাঁকড় দ্র° ।

কাঁথরা—ঈষলাঙ্গলা *hydrolec*

*zeylanica* .

কাঁচ-কলা—কলা দ্র° ।

কাঁচড়াওয়াড ( দেশজ )—ঘাসবিশেষ ।

কাঁচড়াদাম—কেসরদাম দ্র° ।

কাঁচীসম ( দেশজ )—বৃক্ষবি°,  
dolichos lignosus.

কাঁট-জাতি—basleria prionilis.

কাঁটাআল—আলবি°, dioscorea  
pentaphylla.

কাঁটাকচু—কচুবি°, lasia loureiri,  
pothos laesia.

কাঁটাকরঞ্জা—[ স° পদ্মিতকরঞ্জা ; হি°  
কাঠকালেজা ] নাটা, নাটাকরঞ্জা,  
caesalpinia bonducelle.

। করঞ্জা দ্র° ।

কাঁটাকারী ( দেশজ )—কণ্টকারী ।

কাঁটাকুলিকা—১ কোকিলাক্ষ বা কুলে-  
খাড়া, asteracantha longifolia,  
hygrophyla spinosa, ২  
কুলবি, ruellia longifolia.

কাঁটাগড়গড়—coix barbata.

কাঁটাগড়কামাই ( দেশজ )—কাকমাটি  
দ্র°; capparis . sepiarica,  
monetia barbrioides.

কাঁটাগোলাপ ( দেশজ )—গোলাপবি°,  
rosa chinensis.

কাঁটাকাটা—[ স° কুদ্রুটক. বজ্রদান্তি ]  
ঘন প্রশাখাবিশিষ্ট গুল্ম, harbria  
prionitis.

কাঁটানটিয়া ( দেশজ )—[ স° মারিষ,  
বাস্পক; মার্ব ] amaranthus  
spinosus. দুই প্রকার ( ১ ) পাদা  
কাঁটানটে, ( ২ ) লাল কাঁটানটে ।

কাঁটাবাটনা ( দেশজ )—বৃক্ষবি°,  
quercus acuminata.

কাঁটাবাশ ( দেশজ )—বেড় বাশ;  
bambusa spinosa.

কাঁটাবাবলা ( দেশজ )—বাবলাগাছ,  
mimosa arabica.

কাঁটামান ( দেশজ )—বৃক্ষবি°,  
pothos heterophylla.

কাঁটাল—কাঠাল ।

কাঁটা লাল বাটানা ( দেশজ )—বৃক্ষবি°,  
quercus armata.

কাঁটালি কলা—কলা দ্র° ।

কাঁটাশিখর ( দেশজ )—বৃক্ষবি°,  
quercus armata, পদ্ববক্ষে  
বিস্তর জন্মে ।

কাঁটাশিরীষ—শিরীষ গাছ ।

কাঁটাশূনা—বৃক্ষবি°, panex digitata.

কাঁটাসিঙ্গ ( দেশজ )—তেকাটা সিঙ্গ ।  
“বড়ি ভাজা বিতরন বদরীর বাঁজ ।

কলামূলো ভেজে দিল কাঁটা-কাঁটা  
সিঙ্গ ।” —শিবায়ণ

কাঁঠাল—[ স° পনস, কণ্টকি ফল ;  
উত্তর পশ্চিমে—কাঁঠাল ; বোম্বাই

—ফণস ; তা শিলা] *artocarpus integrifolia*. পর্যায়—  
কটকিফল, কণাজ, অতি বৃহৎ  
ফল, মহাসজ, ফালন, ফলবৃক্ষ,  
শ্বল, কটফল, মূলফল,  
অপুপফলদ, চুতফল, চম্পকোষ,  
চয়ান, রসাল, মৃদুগদল, পনস,  
পনসতালিকা। সবুজ পাতাযুক্ত  
বড় গাছ প্রায় ৫০-৬০ ফুট উঁচু।  
উপরের কাঠ ফিকে, ভিতরের কাঠ  
হলদে। ফল প্রায় ১০ হইতে ২৫  
ফুট লম্বা ও মোটা। ফলের গায়ে  
কাঁটা থাকে। শাঁস কাঁচা ও পাকা  
উভয় অবস্থায় খায়। বীজও সিন্ধু  
ও ভাজা খায়।

কাঠালীকলা—কলা দ্র°।

কাঠালীচাঁপা—চাঁপা দ্র°।

কাঁদড়া, কাঁদলা (দেশজ)—বৃক্ষবি°,  
*commelina nudiflora*.

কাওয়া—১ কাফি, *coffee tree*.

আফ্রিকাদেশের আচ্ছুকাদিবর্গের  
ক্ষুদ্রবি°, *coffea arabica*,  
*garsinia mangostana*.

ভারতবর্ষের দক্ষিণে, সিংহলে ও  
পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে জন্মায়।

বনকাওয়া, *coffea bengalensis*.

২ পদ্মাগ সদৃশ শ্যামপত্র দীর্ঘ

তরুবি°, *gracina cowa*.  
পাঁতবর্ণ। বিহার ও চট্টগ্রামে  
জন্মায়।

কাওয়াঠেটী—গুল্মবি°, কাকজঙ্ঘা।

কাক—পাটলাদিবর্গের বন্য বৃক্ষবি°,  
*millingtonia hortensis*  
(*Indian cork tree*)। সুন্দর  
দেখিতে বলিয়া বড় বড় রাস্তার  
ধারে রোপিত হয়। ফুল বড় বড়  
শ্বেতবর্ণ, সুগন্ধী, শীতকালে  
অধিক পরিমাণে ফোটে। শাঁটী  
লম্বা, বীজে পাখা আছে।

কাককগু—কাকপ্রিয় কজর, ধান্যবি°।

কাককলা—কাকজঙ্ঘা।

কাকয়ী—মহাকরঞ্জ।

কাকচিণ্ডা, কাকচিণ্ড, কাকচিণ্ডিক,  
কাকচিণ্ডী—কঁচ, গুজা।

কাকজঙ্ঘা—১ কেওয়া ঠেঙ্গা গাছ,  
কাকনাশা ॥ রাজবি° ॥ *leca*

*aquata*. গাছ ৪-৫ হাত বড়।

ইহার কান্ডসন্ধির মধ্যভাগ উন্নত  
দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত।

যশোহরে বিস্তর জন্মায়। পর্যায়  
—কাকাজী, কাকণ্ডী, কাকনাসিকা,

কৃষীবল, কাকাহা, সুলোমশা,  
পারাবতপদী, দাসী, নদীকান্তা।

২ গুজা, মৃদুপর্ণী লতা।



কাকজম্বু—১ ভূমিজম্বু, ক্ষুদ্র জাম,  
বনজাম । ২ জলজাত জামবিং,  
ardisia humilis, কাকজাম,  
পানিশউনি । পর্যায়—কাকফলা,  
নাদেয়ী, কাকবল্লভা, ভূক্ষেটা,  
কাকনীলা, ধূমাক্ষুদ্র, জম্বু,  
ধনিপ্রস্না ।

কাকভূমুর—[ স° কাকোদম্বরিকা ;  
কাকভম্বর ॥ রাজনি° ॥ ] কৃষ্ণভূমুর,  
ক্ষুদ্রভূমুর, ভূমুর প্র° ।

কাকণ—গুঞ্জা, কঁচ ।

কাকর্ণাশ্বী, কাকনস্তী, কাকনী—কঁচ ।

কাকতিজ্ঞা—১ কাকজম্বু, ২ গুঞ্জা,  
কঁচ ।

কাকতিন্দুক—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥,  
diospyros tomentosa. মাকডো  
গাব, মাকডাকেন্দ্র, কাকতেন্দ্র ।  
পর্যায়—কাকেন্দ্র, কুলক,  
কাকপীলক, কাকপীল, কাকাড,  
কাকক্ষুর্জ, কাকাহর, কাকবীজক ।

কাকভূডকা—গুঞ্জা ।

কাকভূডফলা—কেওরাঠোটী (?) ।

কাকভূডী—কেওরাঠোটী, asclepias  
eurassorica, বনকাপাস । পর্যায়  
—কাকাদনী, কাকপীল, কাক-  
শিম্বী, রওলা, ধূমাক্ষনখী, বক্র-  
শল্যা, দ্রুমোহা, বায়সাদনী,

বায়সী, কাকদাস্তিকা, ধূমাক্ষদণ্ডী ।  
বহু বর্ষজীবী সবল উদ্ভিদ ।

কাকদ্রুম—বৃক্ষবি°, dalbergia  
rimosa.

কাকনস্তী—কুঁচ ।

কাকনামা—বকফুলের গাছ ।

কাকনাস—বিকটক, বঁইচ গাছ ।

কাকনাসী—[ হি° কাউয়াচৌরী,  
কেউয়াবঁটী ; মহা° বডিল  
কহর্ডনি ; তে° কাকিদোডচেট্টু ]  
hygrophila salicifolia. পর্যায়  
—কাকতুঁডা, বায়সী, জুরঙ্গী,  
ধূমথনাসা, কাকপ্রাণা, সুনাসিকা ।

কাকনীলা—জামবি° ।

কাকপণী—মৃদুগপণী ।

কাকপীল—১ কাকতিন্দুক,  
কাকতুঁডী, ৩ শ্বেত কুঁচ ।

কাকপীলক—মাকডাকেন্দ্র ।

কাকপুষ্প—গন্ধপুষ্প ।

কাকফল—নিমগাছ ।

কাকফলা—কাকজম্বু, বনজাম ।

কাকভণ্ডী—মহাকরঞ্জ । ইহা মৃদু  
দিলে জলপ্রাব হয় ।

কাকমর্দ—মহাকাল লতা, মাকাল ।

কাকমাচী—[ স° কাকাহরা, বায়সী ;  
হি° মকোয়, কঁবৈয়া ; ম° লঘুদকা-  
বঠ্ঠী, কামেনি ; গুজ° পীলডী ;

ক° কাবইকাকে ; কা° রোবাতরীখ ;  
অ° এনবুস্‌সালব্ ] কহিস্তাশাক,  
গুড়কামাই, *solanum rubrum*,  
*s. nigrum*. ফলপাকাড

ক্ষুপৰি° । গাছে কাটা নাই ।  
ফুল সাদা দোঁখতে প্রায় লঙ্কাফুলের  
ন্যায় । ফল বৃহত্তর মত, কটু ।  
পাকা ফলের রং বেগুনে, মধুর  
স্বাদ, বালকে খায় । কোচাবহারে  
বহুল পরিমাণে জন্মায় । ছাপড়া  
জেলায় ইহাকে ভাটকংগা বলে ।

(১) কাটাশূন্য কাকমাচী—  
গুড়কামাই । ফল ছোট গোল ।  
ফুল সাদা গোছা-গোছা । কাটা  
নেই, ব্যঞ্জনাদিবর্গের বর্ষায় বন্য  
শাক । পাতা অ°ডাকার । (২)

গুড়কামাই—কাটা কুলিকা,  
*capparis sepiaria*, ইহার গায়ে  
ছোট-ছোট কাটা । বরুণাদিবর্গের  
ক্ষুপৰি° । পৃষ্ণকরিণীর পাড়ে;  
বনে জঙ্গলে জন্মে । ফুল সাদা  
ও স্নিগ্ধ । পর্যায়—কাকাদনী,  
বারসাহা, সৰ্বতিস্তা, বহুফলা,  
বটফলা, রসায়নী, কাকমাতা,  
স্বাদুপাকা, সুন্দরী, তিজিকা,  
বহুতিস্তা, গুণ্ধনখী ।

কাকমাতা—কাকমাচী ।

কাকমারি—গুরুচ্যাদিবর্গের লতাবি° ।  
*cocculus indicus*. পাতা পানের  
মত । ফুলে দল নাই । ফল বাঁকা  
গোলাকার ও বিষাক্ত ।

কাকমুদগা—মুদগপণী গাছ ।

কাকরুহা—বন্দাবক্ষ, পরগাছা ( ? )

কাকলীদ্রাক্ষা—কিসমিসাদি । ॥ রাজনি° ॥  
পর্যায়—জুবুকা, ফলোত্তমা,  
লঘুদ্রাক্ষা, নিবীজা, সুবৃতা,  
রসাধিকা ।

কাকবল্লভা—কাকজম্বু, বনজাম ।

কাকবল্লরী—স্বর্ণবল্লরী ।

কাকশিশ্বী—কাকতু°ডী, কেওয়াঠেটী  
গাছ ।

কাকশীর্ষ—বকফুলের গাছ ।

কাকস্ত্রী—বকফুলের গাছ ।

কাকক্ষুর্জ—কার্কাতিন্দুক বৃক্ষ ।

কাকা—১ কাকনাসা লতা, ২ কাকোলী  
গাছ, ৩ কাকজংঘা, ৪ রক্তিকা লতা,  
৫ মলপু গাছ, ৬ কাকমাচী ॥ মে° ॥  
কাকাসা, কাকাজী, কাকান্তী—কাকজংঘা  
গাছ ।

কাকাড—১ মহানিষ, ২ কার্কাতিন্দুক,  
কোলশিশ্বী ।

কাকাডী—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা ।

কাকাডোলা—কোলশিশ্বী ।

কাকাদনী—১ কু°চ, ২ শ্বেতকু°চ ।

কাকায়ু—স্বর্ণবস্ত্রী লতা ।

কাকিনী—কঁচ ।

কাকুড়—কাকুড় ।

কাকতিন্দুক—মাকড়াগাব । কেন্দ্র দ্র° ।

কাকেক্ক—নলখাগড়া ।

কাকেক্ক—কুলিকবৃক্ষ, মাকড়াকেক্ক  
গাছ ।

কাকেক্ট—নিম গাছ ।

কাকোডুম্বর—কাকডুম্বর ।

কাকোডুম্বরিকা—[হি° থোপসা ; পঞ্জা°  
ধূরা, দেগর] থোসা ডুম্বর, ডুম্বরী,  
ficus oppositifolia. পর্যায়—  
ফলগু; মলপদ জঘনেফলা, মলয়,  
ফলগুফলা, পত্রজী, রাজিকা;  
কুম্ভোদ্রুম্বরিকা, ফলগুবাটিকা;  
ফলগুনী, কাকোডুম্বর, ফলবাটিকা,  
বহুফলা, কুণ্ঠয়ী, অজাজী, চিত্র-  
ভেবজা, ধ্রুমাঙ্কনায়ী, কাকো-  
দুম্বরিকা ।

কাকী—অড়হর ।

কাকীবক—সজিনা গাছ ।

কাখড়া—শিট দ্র° । curcuma  
zedoaria, c. zarumbet.

কাগজিলেবু—লেবু দ্র° ।

কাঙ্কা—কাকজংঘা গাছ ।

কাঙ্কাম্য ( দেশজ )—তৃণবি°, cyperus  
jalmotha ( ? )

কাকুরা—[আসামে—রিহা ; ইং rhea]  
boehmeria nivea, জালের শক্ত  
সূতা হয় ।

কাক্ষী, কাক্ক—কাক্ষান ।

কাচ, কাচগড়গড়—গড়গড়ে দ্র°, coix  
lachryma jobi.

কাচড়াদাম—জলজবি°, jussiaea  
repens

কাচনার—কাণ্ডনফুল, bauhinia  
variegata.

কাচস্থালী—পারুল গাছ, bignonia  
suaveolens. পর্যায়—পাটনি,  
পাটলা, অমোঘা, মধুদত্তী,  
ফলেরহা, কৃষ্ণবস্ত্রা, কুবেরাক্ষী,  
কালস্থালী, অগ্নিবল্লভা, তাম্রপদম্পী ।

কাচিম—[ স° ভঞ্জর ] দেবকুলোৎপন্ন  
বৃক্ষ ( ? ) ।

কাজলগোরী ( দেশজ )—বৃক্ষবি°,  
lacca integrifolia.

বরাহীকন্দ দ্র° ।

কাজলবাঁল ( দেশজ )—বৃক্ষবি°, alpinia banglium buch.

কাজুপতী—[ স° কায়াপট্টী ]  
কাজুপটি, বহু বৃক্ষবি°, melaleuca cajeputa. অস্ট্রেলিয়া  
ও মালয় উপদ্বীপে জন্মায় । ইহার

পাতা হইতে তেল হয়, m.  
leucodendron.

কাণ্ডা—[ স° কণ্ট ; ও° কনাসিরি ]  
কাঁচড়া, ঢোলাপাতা, commelina  
bengalensis. আরণ্য লতানিয়া  
শাকবি° । ঘাসের মধ্যে বর্ষাকালে  
বহুল পরিমাণে জন্মায় । পাতা  
অণ্ডাকার, পাতার বোঁটায় নীল  
থাকে । ফুল ছোট ও নীল  
রঙের । পানীকাণ্ডা—কাঁচড়া  
গাছের মত । ডাটা সরু ও লম্বা,  
c. salicifolia.

কাণ্ডন—[ স° যদুম্পত্রক ; হি° কচনার,  
সোনা ; তা° সেগাছ ; মহা°  
কাণ্ডন ; মল° চোবনসুন্দরী ; ও°  
বোরোঠা ] পদ্পক্ষুপবিশেষ ।  
পর্যায়—কোবিদার, চমরিক,  
কুন্দাল, কাণ্ডনার, কণকারক,  
কান্তপদ্প, করক, কান্তার, ষমলচ্ছদ,  
কাণ্ডনাল, তাম্রপদ্প, কুদার, বিদল,  
কাণ্ডনক গাডারি, শোণপদ্পক ;  
তিন প্রকার (১) শ্বেত কাণ্ডন, সাদা  
বড় বড় ফুল, বারমাস ফোটে,  
baubinia acuminatal, (২)  
রক্তকাণ্ডন—[ স° কাণ্ডনার,  
কোবিদার ] b. variegata (৩)  
দেবকাণ্ডন—ফুল পাটলবর্ণ,

হেমন্তকালে ফোটে, b. purpurea.  
কাণ্ডনক—১ ধান্যবি°, ২ কাণ্ডনফুলের  
গাছ ।

কাণ্ডনকদলী—চাঁপাবলা ।  
কাণ্ডনকারিণী—শতমূলী ।  
কাণ্ডনক্ষীরী—ক্ষীরিণীলতা ।  
কাণ্ডনপদ্পক—আহুলা গাছ ।  
কাণ্ডনপদ্পী—গণিয়ারী গাছ ।  
কাণ্ডনবুড়া ( দেশজ )—ফুলগাছবি°,  
koempferia angustifolia.  
ফল বড়, রং শাদা, ধার বেগুনে ।  
পশ্চিমে 'মদননিবিশী' বলে ।

কাণ্ডনার—কাণ্ডন ফুলের গাছ ।  
কাণ্ডনাল, কাণ্ডনারক—কাণ্ডন গাছ ।  
কাণ্ডনাহরয়—নাগকেশর ।  
কাণ্ডনী—১ হরিদ্রা ( ? ), ২ স্বর্ণক্ষীরী  
গাছ ।  
কাণ্ডী—কুঁচ ।  
কাঞ্জিকা—১ জীবন্তীলতা, ২  
পলাশীলতা ।  
কাঞ্জী—মহাদ্রোণী ।  
কাটক—বৃক্ষবি° ( ইং the clearing  
nut plant ), strychnos  
potatorum.  
কাটিহারা ( দেশজ )—বৃক্ষবি°, ardisia  
cathiara buch.  
কাটচাঁপা—গরুড়চাঁপা দ্র° ।

কাটছাতা ( দেশজ )—বেঙের ছাতা ।  
 কাঠআলু—[ সঁ কাষ্টালুক ] ।  
 কাঠগোলাব—গোলাব দ্র°, *rosa indica*.  
 কাঠছাতিয়া ( দেশজ )—বেঙের ছাতা ।  
 কাঠজাম—জামাবি°, *eugenia operculata*.  
 কাঠটগর ( দেশজ )—ফুলবি°, *tabernaemontana coronaria*,  
 কাঠডুমুর ( দেশজ )—উড়ুস্বরবি°, *figus oppositifolia*.  
 কাঠবিষ—আতিষ দ্র° ।  
 কাঠবেল ( দেশজ )—ফুলবি°, *jasminum multiflorum*.  
 কাঠমল্লিকা—[ ইং arabian jasmine ]  
 মল্লিকা দ্র° ।  
 কাঠমুলী ( দেশজ )—বৃক্ষবি°, *canthium agustifolium*.  
 কাঠরাঙ্গা ( দেশজ )—এক জাতীয় বড়  
 গাছ, *ehretia levis*.  
 কাঠশালুক ( দেশজ )—কন্দবি°, *nymphaea pubescens*.  
 কাঠশিম ( দেশজ )—শিম দ্র° ।  
 কাঠশোনা—গাছবি°, *aeschyaomene palubosa*.  
 কাঠরা রামরাম ( দেশজ )—বৃক্ষবি°, *orchis uniflora*.

কাঠিন—খেজুর ।  
 কাঠিন্য ফল—কদবেল গাছ ।  
 কাণ্ড—১ শর গাছ, ২ অক্ষোষ্ঠ বৃক্ষ ।  
 কাণ্ডকটুক—করলা ।  
 কাণ্ডকান্তক—কাশতৃণ ।  
 কাণ্ডগন্ড—গন্ডনামক তৃণবি° ।  
 কাণ্ডগী—রামদত্তী নামক লতাবি° ।  
 কাণ্ডভিত্ত, কাণ্ডভিত্তক—চিরতা ।  
 কাণ্ডনীল—লৌহ ।  
 কাণ্ডপদ্মপা—১ শরপদ্মপা গাছ ২ দ্রোণ  
 পদ্মপা ।  
 কাণ্ডরুহা—কটুকী, কটুকী ।  
 কাণ্ডহীন—মুখাবি°, ভদ্রমূলক ।  
 কাণ্ডকা—১ লক্ষ্যনামক ধান্যবি°, ২  
 বালুকা নামক কাঁকড় ।  
 কাণ্ডী—আপাং দ্র° । ॥ রাজনি ॥  
 কাণ্ডীরা, কাণ্ডীরী—মঞ্জিষ্ঠা ।  
 কাণ্ডেক্ষ—১ কুলেখাড়া গাছ, ২  
 কাশতৃণ ।  
 কাণ্ডেরী—নাগদন্তীবৃক্ষ ।  
 কাণ্ডেণ—রোহিষ নামক তৃণবি° ।  
 কাণ্ডেশ—১ কদমগাছ, ২ ইক্ষু ।  
 কদম্ববৃ—কদম্ববৃক্ষ ।  
 কাদম্বা—কদম্বপদ্মপা লতা, মন্ডিরা  
 লতা ।  
 কানক—জয়পাল বাঁজ ।



কানকুর ( দেশজ )—কঁকুড়, *cucumis*,  
*utilissimus*.

কানছিড়ে ( দেশজ )—[ স° কানচটা ;  
হি° কানছিরে ] লতানে গাছ,  
*commelina bengalensis*  
বাংলাদেশের সর্বত্র হারাময় স্থানে  
অথবা জলের ধারে জন্মায় ।

কাননারি—শমীবৃক্ষ ।

কানরাজ—উদ্ভিদবি°, *baubinia*  
*candida*.

কানালা—শ্বেত হৃদহাড়িয়া,  
*gynandropsis pentaphylla*.

কালীবৃক্ষ—ইন্দুরকানিপানা দ্র°,  
*salvania cucullala*.

কানড় ( দেশজ )—কান্দুর, *crinum*  
*toxicarium*, *c. asiaticum*.

কান্ত—১ কুঙ্কুম, ২ হিজল গাছ ।

কান্তপদ্ম—রক্তকাণ্ডন গাছ ।

কান্তলক—নন্দীবৃক্ষ, কুঁদ গাছ ।

কান্তা—১ প্রিয়ঙ্গু, ২ বড় এলাইচ, ৩  
নাগরমুখা ।

কান্তাঙ্ঘ্রিদোহদ—অশোক গাছ ।

কান্তচরণদোহদ—অশোক গাছ ।

কান্তার—১ পদ্মবি, ২ কাজলি আক, ৩  
কোবিদারবৃক্ষ, ৪ বাঁশ ।

কান্তারক, কান্তারী—কাজলি আক ।

কান্তীর—অপাঙ্গ দ্র° ।

কান্দলি—উদ্ভিদবি°, *ancilena*  
*nudiflorum*.

কান্দুলি ( দেশজ )—কেলেকোঁড়া গাছ,  
*commelina nudiflora*.

কাপাল—কেলেকোঁড়া গাছ ।

কাপাস, কাবাস,—[ স° কাপাস ; হি°  
কপাস, রুই, বিনোলা ; ও° কপা ;

ম° কাপসী, কাপুস, সরকী ; গুজ°

বনরুকাপাস ; ক° হতি, কাতহতি ;

তে° পিঁড়িচেট্ট ; তা° পঞ্জি ; ফা°

কুতুন ; আ° কতান, কুতন ] তুলা

গাছ-বি°, *gossypium herba-*

*ceum*. কয়েকটি প্রকারভেদ—(১)

তুঁড়কেরী—থেরো কাপাস ।

বাংলার জন্মে, *g. arboreum*,

*var, neglecta*, বড় বলিয়া থেরো ।

(২) সমুদ্রান্তা—বোম্বাই প্রদেশের ।

(৩) কাপাসী—ওলনাকাপাস,

দেবকাপাস, রামকাপাস, গাছ-

কাপাস । গাছ বড় হয় না বলিয়া

রামকাপাস । বাংলা, বিহার,

উড়িষ্যা জন্মে । (৪) বদরা—

বনকাপাসিকা । নিরুষ্ণ জাতের, *g.*

*arboreum*, *var, assamica*;

*var, rosea*. আসাম প্রদেশের

পর্বতে ও মাদ্রাজে জন্মে । কাপাস

গাছ পূর্বকালে প্রত্যেক গৃহস্থের

বাড়ীতে হইত। গাছ প্রায় ৩৪ হাত উঁচু হয়। ফুল পীতবর্ণ, ফলের ভিতর বীজ ও তুল্য থাকে। বীজে তৈল আছে। অরণ্য-কার্পাসীকে [হি° বনকাপাস ; কো° বনকাপাসি ; ম° কাঠঠা কাপাসি ; ও° হিরণ্যকপাসিয়া ; ক° হন্তি ; কডহাঁও ; তে° কাপাসামু ; ফা° পুংবেদনা ; আ° হবুলকুতন] 'বনচ'্যারস' বলে, কারণ ইহার গাছ ও ফল দেখিতে ঠিক চ'্যারসের মত—কেবল আকৃতিতে কিছু ছোট, *hibiscus vilifolius*. মার্কিন তুলা—*g. barbadense*.

কাফির মরিচ—ধানিলকাবি, *capsicum grossum*.

কাফল—কটফল।

কাফি—[ হি° কাওয়া, বন, কফী, কফি ; মহা° কাফি, বন বন্দ, বুন ; তা° কাপি-কোড়াই, কাপি-কোট ; চট্টগ্রাম—হরীণা ফল ] কাফি। আরবদেশে জন্মান, *coffea arabica*, কাফি বীজ বড়, একদিকে গোল অপর দিক চ্যাণ্টা। স্বাদ মধুর, কটু। রং পীত। আচ্ছাদিবর্গের ক্ষুদ্রপৰ্ব। গাছ ১৫-২০ ফুট লম্বা হয়। শাদা

ফুল। প্রতি ফলে দুইটি বীজ। আজকাল আর্বির্সিনিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, ভারতের নেপালে, আসামে ও খাসিয়া পাহাড়েও জন্মান। বাংলার কফি ফল ঈষদ্-আম্রতাকার, *c. bengalensis*, সুগন্ধি কফি শ্রীহট্ট ও টেনেসোরিয়ামে হয়, *c. fragrans*, আসামী কফি ফল ঈষৎ ডিম্বাকার, *c. jenkinsu*. খাসিয়া কফি ফল ঠু ইণ্ড মোটা, *c. khasiana*, ত্রিবাকুরের কফি ফল লম্বায় ছোট ও চওড়ায় বড়, *c. travancorensis*, ঝালাবরী কফি ফল ত্রিবাকুরের মত, কেবল একদিকে গভীর একটি টোল খাইয়া যায়, *c. wightiana*.

কাবরী—[ ম° চোচ ] তেজপত্র দ্র°।

কাবার্চিনি—[ ম° কক্কোলক, কৃতফল, সুগন্ধিমরিচ ; হি° শীতলচিনি ; ও° চনকবার ; তা° বলমলকু ; তে° সলবসিরায়লিয় ; ফা° হব্-এন্-আম্-সু ; আ° কবারা ] তাম্বা-লাদিবর্গের লতা, *piper cubeba*. জাভা ও মলকু স্বীপে জন্মে। ভারতবর্ষেও অল্প পরিমাণ চাষ হয়।

কাবলি মটর—মটর দ্র°।

কাবাস—কাপাস দ্র° ।  
 কামখড়গনলা—স্বর্ণকৈতকী গাছ ।  
 কামদতিকা—নাগদন্তী ।  
 কামদতী—পারুল গাছ ।  
 কামফল—মহারাজাম্বুক্ষ ।  
 কামবতী—দারুহরিদ্রা ।  
 কামবাণ—১ পশু, ২ অশোক, ৩ শিরীষ,  
 ৪ আম্র, ৫ উৎপল ।  
 কামবৃক্ষ—বন্দাক, পরগাছা ।  
 কামবৃদ্ধি—গুড্মবি° ।  
 কামবৃন্তা—পারুল গাছ ।  
 কামমথ—আমগাছ ।  
 কামরাঙ্গা—[ স° কর্মরঙ্গ, ধারাকল;  
 গীতফল; হি° কর্মরথ; ম° কর্মরে°;  
 গদ° কয়ারক; তা° তমারটম মরম্;  
 তে° তমারটা করা; ও° করমঙ্গা ]  
 প্রসিদ্ধ অন্নফল তরু, *averrhoa*  
*carambola*. ফল পাঁচশিরা,  
 দুইবার ফলে, শরৎকালে ও  
 শীতকালে । চীনা কামরাঙ্গা—  
 ফল ছোট কিন্তু মিষ্ট ॥  
 কামরাণি লেবু (দেশজ)—বৃক্ষবি° ।  
 কামরূপিনী—অশ্বগন্ধা গাছ ।  
 কামলতা—কুঞ্জলতা, তরুলতা দ্র°,  
*ipomoea quamolit*.  
 কামশর—আম ।  
 কামহোগলা (দেশজ)—বৃক্ষবি°,  
*typha angustifolia*.

কামাঙ্ক—আমগাছ ।  
 কামায়ুধ—আমগাছ ।  
 কামিনী—[ স° বৈদ্যক ] নিম্বুকা  
 দিবর্গের পদ্যবৃক্ষ, *murraya*  
*exotica opaniculata*, বন্দা,  
 পরগাছা, দারুহরিদ্রা । ফুল সাদা,  
 সুগন্ধ, পাঁচদল, সম্ভাষ্য ফোটে ও  
 সকালে ঝরিয়া পড়ে ।  
 কামিনীশ—সজিনা গাছ ।  
 কামীন—রামসুপারী ।  
 কামদুক—১ অশোক গাছ, ২ অতিমদুস্তক  
 লতা ।  
 কামদুকান্তা—অতিমদুস্তকতা, মাধবী-  
 লতা । কাম্পিল্ল, কাম্পিল্লক, কাম্পিলকা  
 —কমলাগর্দভি ।  
 কাম্পীলক—কমলাগর্দভি, পলাশগাছ ।  
 কাম্বুকা—অশ্বগন্ধা ।  
 কাম্বোজ—পদ্মগাবৃক্ষ ।  
 কাম্বোজি—১ কঁচ, ২ হাকুচ ।  
 কায়ফল (দেশজ)—কটফল ।  
 কায়স্থা—১ হরীতকী, ২ আমলকী, ৩  
 বড় ও ছোট এলাচ, ৪ তুলসী ।  
 কায়িরী (দেশজ)—বৃক্ষবি°, *mimosa*  
*rubicanlis*.  
 কায়াপটী—কাজুপতী দ্র° ।  
 কারণদুর্বা (দেশজ)—তৃণবি°, *poa*  
*karunduli buch*.

কারণফল ( দেশজ )—ফুলবিঁ, *clausena heptaphylla*.

কারণ্ট ( দেশজ )—বৃক্ষবিঁ ।

কারবী—১ মোরী, ২ কৃষ্ণজীরা, ৩ হিঙ্গু পত্ৰী, ৪ ছোট করেলা, ৫ করেলা, ৬ তেজপাতা ॥ দ্রব্যগুণ-দর্পণ ॥

কারবেল্ল—করেলা, উচ্ছে ও কাকিরোলকে কারবেল্ল কহে ॥ পর্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুযবী, ক'ডুর, কা'ডকটুকু, সুকা'ড; উগ্রকা'ড, কঠিল্ল, নাসাসন্দেদন, পটু ।

কারবেল্লক—করেলা ।

কারবেল্লিকা, কারবেল্লী—ছোট করেলা উচ্ছে ॥ ভাবপ্র' ॥

কারম্বা—প্রিয়তমবৃক্ষ ।

কারসী ( দেশজ )—বৃক্ষবিঁ, *grewia hispida buch.*

কারস্কর—বৃক্ষবিঁ । পর্যায়—কি-পাক, বিবতিতদ্দ, করদ্রুম, রম্যফল, কুপীল, কালকুট ।

কারাক্বেট ( দেশজ )—বৃক্ষবিঁ, *calamus latifolius*.

কারাফ ( দেশজ )—বৃক্ষবিঁ, *gratiola amara*.

কারিকা—কণ্টকারী ।

কারী—কণ্টকারী ও আকর্ষকারী নামে দুই প্রকার ।

কারুজ—নাগকেশর ।

কারোলা ( দেশজ )—বৃক্ষবিঁ, *cleome pentaphylla*.

কারোলা—বিদেশী শাকবিঁ, *carum bulbocastanum*; কাওরা, *c. carui*, ইহার ফল দ্বারা পানীয় সুগন্ধীকৃত হয় ॥

কাথরা ( দেশজ )—বৃক্ষবিঁ, *curcuma zerumbet*.

কাতিবশালি—যে ধান কাতি'ক মাসে পাকে ।

কার্পাস—কাপাস দ্র' ।

কামরুক—১ বাঁশ, ২ শ্বেত খদির, ৩ হিজল, ৪ মহানিস্ব ।

কার্বা—কারীবৃক্ষ ।

কামরী—১ গাছাড়ী গাছ, ২ শ্রীপণী' বৃক্ষ ।

কাঞ্চী—শতমূলী ।

কাষ—শালগাছ ।

কাল—১ কাসমদ'বৃক্ষ, ২ রক্তচিতা ।

কালআঁড়া—অকোট, কাল আঁড় ।

কালকচু—বৃক্ষবিঁ, *colocasia antiquorum*.

কালকজ—নীলপদ্ম ।

কালকণ্ঠ, কালকণ্ঠক—পীতসারবৃক্ষ ।

কালকলার—১ কাল মটর, কাল মাসকলাই ।

কালকম্বুরী—লতাকম্বুরী, *hibiscus abelmoschus*.

কালকাসুন্দা ( দেশজ )—[ স° কাশমর্দ; অরিমর্দ; কাসারি; ককশ; হি° বৃহৎচিহ্ন ] কাসুন্দে । কাসমর্দ দ্র° ।

কাল-কুঁচ—বৃক্ষবি°, *abrus melanospermus*.

কালকটক—কালশকরবৃক্ষ ।

কালকেরা—বৃক্ষবি°, *capparis brevispina, c. acuminata*.

কালকেশী—নীলগাছ ।

কালক্লীতক—নীলগাছ ।

কালকৃত—কালকাসুন্দে ।

কালচক্ৰমা ( দেশজ )—গাছবি°, *quercus fenestrata*.

কালজাতী—বৃক্ষবি°, *eranthemum pulchellum*.

কালজাম—[স° নীলফল; হি° জমান; গুজ° জম্বুডো; তে° নাকরেডু; তা° ননগদম, নভিল; মল° নভল; ক° নয়রান্দ; ইং *jambul, black plum or berry*] *syzygium jambolaleum* or *eugenia jambolana*.

বাংলাদেশে কালজাম সাধারণ ফল । গাছ উঁচু; সারা ভারতেই

জন্মে; ফল মিষ্টি এবং সুস্বাদু । জম্বু দ্র° ।

কালজীরা—শুলজীরক, *nigella sativa*.

কালকাঁটি—গুল্মবি°, *eranthemum nervosum*.

কালতাল—তমাল গাছ ।

কালতিন্দুক—কুপীলবৃক্ষ ।

কালতিল—কৃষ্ণতিল, *sesamum indicum*.

কালতুলসী—[স° কৃষ্ণার্জক; কৃষ্ণতুলসী] *ocimum sanctum*. কৃষ্ণতুলসী ।

কালদেবধান—গবেধুক দ্র° ।

কালধান—কৃষ্ণশালি, শ্যামশালি ।

কালধতুরা—কৃষ্ণধতুরক, *datura jactusa*.

কালনাটা ( দেশজ )—গুল্মবি°, *caesalpinia bonducella*.

কালপর্ণ—তগরবৃক্ষ ।

কালপর্ণী—কৃষ্ণতুলসী ।

কালপীল, কালপীলুক—কুপীল ।

কালপদ্ম—মটর, কলায় ।

কালপদ্মগ—কালসুপারী ।

কালপেশী, কালপেশী—শ্যামলতা ।

পৰ্বায়—মহাশ্যামা, সুমদ্রা. উৎপল-সারিবা, দীর্ঘমুলা, পানিন্দী, মসুরবিদলা ।



কালবিহুটি ( দেশজ )—গুল্মবি° ।

কালবিষহরী ( দেশজ )—গুল্মবি° ।

কালবৃন্ত—কুলথ ।

কালবৃন্তিকা, কালবৃন্তী—পারুলগাছ ।

কালমরিচ—মরিচ দ্র° ।

কালমান, কালমার—কালতুলসী ।

কালমারিষ—বড়নটে শাক ।

কালমাল—কালতুলসী ।

কালমৃগ—কৃষ্ণমৃগ, কৃষ্ণমৃগ, মাষকলায়  
অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি, *phaseolus*  
*melanos permus*. কৃষ্ণমৃগ দ্র° ।

কুলমৃগ—ঘণ্টাপারুলি বৃক্ষ ।

কালমূল—রক্তচিটা ।

কালমেঘ—[ স° যবতিষ্ঠা, কিরাত,  
মহাতিষ্ঠ ; হি° কিরয়াত ; ও° ভূই  
নিম্ব ] বাসকাদিবর্গের বর্ষায়  
শাকবি° । বাংলাদেশে সুপরিচিত ।  
গাছ সোজা, পাতা মাছের আকার,  
রোমশূন্য, ধার অর্থাৎডত, ফুল  
সাদা, চিড়ের মত চ্যাপ্টা ফল ।  
কালমেঘ তিল্ড, কুইনাইনের  
পরিবর্তে, ব্যবহৃত হয়; *andro-*  
*graphis*. *paniculata*,  
*justicia* p.

কালমেশিকা - সোমরাজী, শ্যামলতা ।

কালমেশী, কালমেধিকা, কালমেঘী—

কালমেশিকা দ্র° ।

কালশাক—[ হি° নরচা শাক ] ১ শাক-  
বি°, ২ তিল্ড পুতিকা, ৩ কুলথ  
শাক । পর্ষায়—নাড়িক, শ্রাশ্ব  
শাক; কালক ।

কালশানি—ধান্যবি° ।

কালসিম, কালশিম—*canavelia*  
*virosa*.

কালসার—কালতুলসী ।

কালস্কন্ধ—১ তমাল গাছ, ২ তিহক  
গাছ, ৩ জীবক, জীওল গাছ, ৪  
দুষখদির, ৫ যজ্ঞভূম্বর ।

কালহলদী—হরিদ্রা দ্র° ।

কালহান—লোধগাছ ।

কাল—১ নীলগাছ, ২ কালজীরা, ৩  
অম্বগন্ধা, ৪ পারুল গাছ; ৫  
মঞ্জিষ্ঠা, *cardanthera triflora*.

কালাগুরু—অগুরু দ্র° ।

কালাজনী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, কালিকর্ণ-  
সিকিনী । পর্ষায়—অঞ্জনী,  
রেচনী, শিলঞ্জনী, কৃষ্ণাভা, কালী,  
কৃষ্ণাজনী ।

কালাদানা—[ স° কালদানা, কৃষ্ণবীজ,  
শ্যামবীজ ; হি° কালাদানা ; গুজ°  
তীরজিবি° বিবৈ, কান্তিকতন-  
বিবৈ ; তে° কোল্লিবিজুল, ফা°  
তুষম ই-নীল ; অ° হম্বদনীল ]  
কলমীআদিবর্গের বর্ষায়

লতাবি°, *ipomoea hederacea*.  
 নীলকলমী শাক, ফুল নীলবর্ণ;  
 শীতকালে রোপিত হয়, বীজের  
 নাম কালাদানা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত  
 হয়।

কালাদেবধান—তৃণধান্যবি°।

কালানুসারক—ভগবৎ।

কালানুসার্য—শিশুপাবৃক্ষ।

কালাবড়ক—বৃক্ষবি°, কালিয়াকড়া।

কালান্থলী—পারুলগাছ।

কালিন্দ—১ তরমুজ, ২ ভূমি ককঁর।

পর্ষায়—কালিন্দক, কৃষ্ণবীজ,  
 ফলবতুল।

কালিন্দিকা—দ্রিৎ, তেউড়ী।

কালিন্দ, কালিন্দক—তরমুজ।

কালিয়ক—দারুহরিদ্রা।

কালীকোড়া (দেশজ)—*guarea*  
*paniculata*.

কালীকাপ (দেশজ)—[ ইং *wolly*  
*brake* ] ক্ষুদ্রলতাবি°, শাকবি°,  
*pteris lurulata odiantum*.

পাতার ডাঁটার রং কালো। ডাঁটার  
 একপাশে পর্ণ থাকে। বর্ষাকালে  
 দেওয়ালে জন্মায়। ফুল হয় না।

কালিয়ক—হরিচন্দন বা পীতচন্দন  
 ॥ স্বত° ॥

কালিয়াকড়া (দেশজ)—কেলেকোড়া।

কালীয়াজীরা (দেশজ)—কৃষ্ণজীরা।

কালেন্ন—কুস্কুম (?), দারুহরিদ্রা  
 ॥ কুমা° ॥

কাম্প, কাম্পক—হরিদ্রাবি°, কাঁচা  
 হলুদ। পর্ষায়—কব্দর, দ্রাবিড়ক;  
 দ্রাবিড়ভূতিক।

কাল্যক—কাঁচা হলুদ।

কাশ—[ স° শারদ, সিতপদ্মপক ]

কেশো ॥ কুমা° ॥ খাগড়া,

তৃণবি, *saccharum sponta-*

*neum*. ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু

উন্নত ঘাসবি°। পাতা সরু চেষ্টা,

ডাঁটা শ্বেত লোমশ। বিভিন্ন

প্রকার—(১) খাগড় (কাশভেদ)

—খাগড়া, কাশের মত তৃণ, কাণ্ড

কাশের চেয়ে মোটা।

খাগড়া, ভাল কলম হয়। পূর্বে

খাগড়ায় লেখা হত, *s. fuscum*.

(২) শরপত্র—উল্লুখড়, *s.*

*cylindricum*. গুহাচ্ছাদনের জন্য

ব্যবহৃত হয়, কাণ্ড খুব সরু ও

পত্রবহুল; (৩) হোগলা—দড়ি

দিয়া বাঁধিয়া আচ্ছাদন তৈরী

হয়। নদীতীরে, জলাজমিতে

জন্মে। ইহার কাণ্ড নাই। লম্বা

৫০ হাত হয়। পর্ষায়—ইক্ষুগন্ধা,

পোটগল; কাস, কাশী, কাশা,

বায়সেস্ক, কাণ্ডেস্ক, অমর পদ্মপক;  
কাসক, বনহাসক; ইক্ষুয়ারি,  
কাকেস্ক, ইক্ষুকাণ্ড; শারদ,  
সিতপদ্মপক, নাদেয়, দর্ভপত্র,  
লেখন; কাণ্ডকাণ্ডক, কচ্ছুলকারক  
॥ শব্দ অম ॥ কাশের ফুল ও  
মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

কাশক—কাশ দ্রু।

কাশন্দ (দেশজ)—*cassia esculenta*.

কাশমর্দ—কাশুন্দে, কালকাশুন্দা।

কাশমর্দন—কালকাশুন্দা;

কাশা—কাশতৃণ।

কাশাম্পলি—কুটশাল্মলি বৃক্ষ।

কাশিমলা—[ সঁ কুটশাল্মলি,  
কাশল্মলি; ওঁ মই ] জিওল  
কাশিমোলা, আয়াদিবর্গের পত্র-  
ত্যাগী তরুণি, *odina wodier*.  
উচ্চতরুণিবেশ। বসন্তকালে সব  
পাতা ঝরিয়া যায়। কাঠ সাদা,  
খুব হালকা। চৈত্র মাসে ফুল  
ফোটে ॥ ফুল ছোট, হরিদ্রাবর্ণ।  
গাছে আঘাত করিলে বহুল  
পরিমাণে আঠা নির্গত হয়। ফলে  
কঠিন আঁঠি আছে।

কাশুকার—সুপারি।

কাশ্মরী—গাভারীবৃক্ষ, *gmelina*  
*arborea*. ফাগুন মাসে ফুল

হয়, কাঠ হালকা, রঙ ফিকা।  
পর্যায়—গাভারী, ভদ্রপর্ণী,  
শ্রীপর্ণী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মরী,  
হীরা, কাশ্মব, পীতরোহিণী,  
কৃষ্ণবৃষ্ণা, মধুরনা, মহাকুসুমিকা  
॥ শব্দ ॥

কাশ্মীরা—অতিবিষা, আতাইচ।

কাশ্মরী—গাভারী।

কাশ্মীষ—কুঙ্কম।

কাশ্য (দেশজ)—কাশতৃণ।

কাষ্ঠকদলী—কাষ্ঠবৎ কঠিনা কদলী,  
কাঠকলা ॥ রাজনি ॥ পর্যায়—  
সুকাষ্ঠা, বনকদলী, কাষ্ঠিকা,  
শিলারভ, দারুকদলী, ফলঢা,  
বনমোচা, অশ্বকদলী।

কাষ্ঠজন্ম—ভূইজাম বা কাষ্ঠজাম।

কাষ্ঠদ্রু—পলাশবৃক্ষ।

কাষ্ঠধাত্রী ফল—আমলকী ফল।

কাষ্ঠপাটলা—শ্বেত পারদুল। পর্যায়—  
মৃক্ষক, মোক্ষক, ঘণ্টাপাটলি।

কাষ্ঠবল্লিকা—কটুকা (?)।

কাষ্ঠশারিবা—অনন্তমূল।

কাণ্টা—দারুহরিদ্রা, *curcuma*  
*xanthorhiza*.

কাষ্ঠালুক—আলুদ্রিবেশ, কাঠআলু।

কাষ্ঠীল—রাজাকবৃক্ষ।

কাষ্ঠীলা—কলাগাছ।

কাঠেকদ্রু—ইক্ষুবিশেষ ।

কাঠোড়ুবরিকা—কাকডুম্বর ।

কাঞ্চি, কাসনি (দেশজ)—[ হি° কাসনি ;

তা° কাশিনি চিরৈ ; তে° কাসিনি

বিস্তল ; গজ° কাসনি ; প°

সুচল, হান্দ ] কাসিনি, সোমরাজি

বর্গের লতাবিশেষ । কাসনি দ্র° ।

কাস—সজিনা গাছ ।

কাসকন্দ—কাসালুনামক কন্দবি° ।

কাসল্লী—কটকারী ।

কাসজিৎ—ভাগী, বামনহাটি ।

কাসনাশিনী—কাঁকড়াশুষ্কী ।

কাসনি—সোমরাজিবর্গের শাকবিশেষ,

cichorium endivia, c.

intybus. পঞ্জাবপ্রদেশে জন্মে ।

কাসনী—কাসনি ।

কাসন্দা—কালকাসন্দা ।

কাসমর্দ, কাসমর্দক—[স° কাশমর্দ ;

হি° কসৌদী, কসোন্দী ; কো°

কালকাসন্দা ; গজ° কসন্দী ; ও°

কাকডা ; তা° পোন্নভেরাই ; তে°

নর্দীকাসিন্দা ; ই° negro coffee]

বন্যফুল, কাশন্দা, চাকুন্দা, ছোট

কাজকাসন্দা, cassia sophera,

বড় কালকাসন্দা c. occiden-

talis, senna sophera, ক্ষুদ্র

যেখানে সেখানে জন্মান । উদ্ভিদ-

গুলি ঘন সন্নিবদ্ধ । বর্ষজীবী ।

ফুল ছোট, পীত ; দর্গম্বযুক্ত ।

কাসমর্দন—পটোল ।

কাসারি—কালকাসন্দা ।

কাসালু—কোফন দেশজাত আলু ।

পর্ষায়—কামকন্দ, কন্দালু,

আলুদক, বিশালপত্র, পত্রাণু ।

কাসন্দা—কাসমর্দ ।

কাহলাপুঙ্গু—ধুতুরা ।

কাহান ( দেশজ )—bridelia

lanceœfolia.

কাহী—কুটজ গাছ ।

কাহুয়া ( দেশজ )—অজর্দন গাছ ।

কিংশুক—১ পলাশবৃক্ষ । পলাশ দ্র° ।

২ নন্দীবৃক্ষ । পর্ষায়—পলাশ,

পর্ণ, বাবপোথ, ত্রিপর্ণক,

আশ্বকাত, ব্রহ্মবৃক্ষ, হস্তি-

কর্ণদল, কৃতী ।

কিংশুলক—পলাশবৃক্ষ ।

কিকি—নারিকেল ।

কিকিনি—১ অন্নরসযুক্ত বৃক্ষ, ২

জলজাম বৃক্ষবি, ৩ বিককত বৃক্ষ,

বর্হিচ গাছ ।

কিকিরাত—১ অশোক গাছ ॥ রাজনি°

ভাবপ্র° ॥ ২ রাঙা কাঁড়ি বৃক্ষ, ৩

পুঙ্গুবিশেষ গাছ । পর্ষায়—

হেমগৌর, পীতক, পীতভদ্রক,  
পীতান্নান, ষট্পদানন্দ ।

কিঙ্করি—ব'ইচি গাছ ।

কিঙ্কপর্ব—১ ইক্ষু, ২ বাঁশ, ৩  
নলখাগড়া ।

কিঞ্জ, কিঞ্জল, কিঞ্জলক—নাগকেশর  
পুষ্প, পশ্মফুলের কেশর  
॥ রাজানি ॥ পৰ্শ্ব—মকরন্দ,  
কেশর, পশ্মকেশর, শীতপরাগ,  
তুঙ্গ, চাম্পেরক ।

কিনি—আপাঙ্ক গাছ ।

কিতব—ধুতুরা গাছ ।

কিস্তন ( দেশজ )—*lauras obtresi-  
folia*.

কিরাত, কিরাতক, কিরাততিক্ত, কিরাত-  
তিক্তক, চিরতা ॥ রাজব ॥ পৰ্শ্ব—  
—ভূনিষ্ব, অনাষ্বতিক্ত, কৈরাত,  
চিরতিক্ত, তিক্তক, স্নতিক্তক, কটুতিক্ত,  
রামসেনক, কাণ্ডতিক্তক ।

কিরিটি—হিস্তাল ফল ।

কিমি—পলাশ গাছ ।

কিমির—নাগরঙ্গ, নারঙ্গালেবুর গাছ ।

কিমিরঙ্গক—নারঙ্গাগাছ ।

কিলাটী—বাঁশগাছ ।

কিলাসল্ল—কাঁকরোল । পৰ্শ্ব—

ককোটক, তিক্তপত্র, সুগন্ধক ।

কিলিম—দেবদারু ।

কিসমিস—পাকা বাঁজশূন্য শূখান  
আঙুর । বড় বাঁজ হইলে মনুন্ধ  
বলে । ছোট বাঁজ কিসমিস ।  
পৰ্শ্ব—স্বাদুকলা, দ্রাক্ষা, মধুরসা,  
মৃধীকা, হারহুরা ।

কীটপাদিক—হংসপদী গাছ ।

কীটভুক উদ্ভিদ—১ বিহারের মাঠে ও  
পাহাড়ের ঢাল, জঙ্গলগায় হয় । পাতা  
ছোট গোল, লাল । পাতার চারি-  
ধারে কেশরযুক্ত পত্রাণ্ড আছে । এই  
পাতার অগ্রভাগে চিড়িতনের ন্যায়  
একটি গুটি দেওয়া মত আছে ।  
মূল পত্র ঠোঁড়ের মত, তাহাতে  
তরল পদার্থ থাকে, আঠার মত  
চট্‌চটে । পত্রাদি স্পর্শ মাত্র সন্ধুচিত  
হয়, *drosera burmani*. ২  
বাঁজি । বাংলাদেশে পদুকুরে হয় ।  
বাঁজির পাতাগুলি সূক্ষ্ম নলাকার  
পত্রাণ্ড মাত্র । পত্রাণ্ডের মূখে একটি  
ঢকনি থাকে । উহার ভিতরে  
আঠাবৎ রস থাকে । ৩ আমেরিকায়  
জন্মে, *venus' fly trap*, ৪  
তামাক গাছের কচি পাতা ও ডাটা  
হইতে যে চট্‌চটে রস বাহির হয়  
তাহাতে কীট-পতঙ্গ আটকাইয়া  
ধায় । কীটভুক নহে । ৫ লাল  
ভেরাডার গায়ে কীটাদি বসিলেই



গাভ্রবর্ণ কাল হইয়া যায় ও কেশবর্ণ  
পরাণগুদালি হইতে রসনিগত হইয়া  
তাহাকে গলাইয়া ফেলে ও বৃক্ষ  
শরীর উহা শুষিয়া লয়। ও আর  
একপ্রকার বৃক্ষ আছে। তাহার  
পত্রের অগ্রভাগ হইতে পৈঁচাল  
শীষের ডগায় একটি ভাণ্ডাকার পত্র  
হয়। ঐ ভাণ্ডের মধ্যে রস থাকে  
ও তাহার মূখে ঢাকনি থাকে।  
কীট ভাণ্ডে পড়িবামাত্র ঢাকনি বন্ধ  
হইয়া যায়।

কীটমাতা—হংসপদী গাছ।

কীটমারী—[ স° কীটমারি ; হি°  
মুখজালী ; ইং insectivorous  
plant ] ছোট আরণ্যশাকবি°,  
drosera burmanni, বর্ষাকালে  
জন্মায়। পাতা ছোট, পাতার  
লোমের মাথায় আঠা থাকে, কোন  
কীট পাতায় বসিলে সন্ধুচিত হয়ে  
তাহাকে বধ করে। বাঁকুড়ায় ইহাকে  
'ছু'ইচাপা' বলে।

কীটশত্রু, কীটারি—বৃক্ষবি°।

কীড়ের—নটেশাক।

কীরক—বৃক্ষবি°।

কীরমালা—বৃক্ষবি°, artemesia  
maritima, পশ্চিম হিমালয়ে  
জন্মে। ইহার বীজ হইতে  
কৃমিঘ্ন ঔষধ হয়।

কীরেট—১ আমগাছ, ২ আখরোট গাছ,  
ও জলঘটিমধু গাছ।

কীলসংস্কর্ণ—গাব গাছ।

কীশপর্ণ, কীশপর্ণী—আপাং গাছ।

কঁচ = [ স° গজা, গুজ ; হি° ঘর্ষচি,  
চিরমিটি ; ম° গুজা ; তে°  
গুলদ্বিবেদ ; তা° করিন ; ও° রুজ ;  
ফা° চশ্মেখ রুশ ; অ° হব  
[ সুখ, সফেদ ; ইং wild jamica,  
liquorice ] শিম্বাদিবর্গের  
রোহিণী লতাবি°, abrus  
precatorius, ভাদ্র-আশ্বিনে ফুল  
হয়। তে°তুল পাতার মত পাতা,  
শিম ফুলের মত ফুল, তবে কিছু  
বড় ও গোলাপী রংয়ের। শিম্ব  
ছোট, ভিতরে ২-৬টি কঁচ থাকে।  
প্রকারভেদ—(১) রক্তকঁচ—সমস্ত গা  
রক্তবর্ণ, মূখের কাছে কালো।  
(২) শ্বেতকঁচ—সমস্ত গা শাদা।  
মূখের কাছে কালো। কঁচের  
মূলের চেয়ে পাতার স্বাদ মধুর।

কঁচিলা—[ স° রিক্টমর্শ্চি ; ফা°  
ইজরকী ; তা° থেস্তিকোট্র ]  
strychnos nux vomica,

কঁদ—[ স° কুন্দ ; ইং dawny  
jasmine ] মল্লিকাদিবর্গের পুষ্প  
ক্ষুপবি°, jasminum pubescens,

j. pirsatum. শীতকালে অসংখ্য  
ফুল হয়, ফুল শাদা, নিগন্ধ।  
বড় কুন্দ—[ইং woody jasmine]  
jasminum arborescens.

কঁদার—কুম্ভাদিবর্গের বন্য  
প্রতাপীর্ষ, trichosanthes  
cucumerina. পটোলের মত গাছ।  
ফুল ছোট, ফল অণ্ডাকার, পাকলে  
লাল হয়।

কঁদারকী (দেশজ)—গন্ধাবিরজা  
লতাবি° ॥ বেল° ॥ bos wellia  
thurifera.

কুকঁসম (দেশজ)—[স° কুলাহল,  
অলম্বদ্ব্য, গোছাল, ভুঁকদম্ব]

কুকঁশমা—[স° কুকঁরদ্র; ও°  
পোকশোক্ষা] সোমরাজ্যাদি-বর্গের  
বর্ষায় লোমশ শাকীর্ষ, blumea  
lacera. পাতায় গন্ধ, ফুল  
পীতবর্ণ, vernonia cinerera.

কুকঁশমে—[স° কুলাহল, কুকঁদ্র]।  
একপ্রকার তাঁর গন্ধযুক্ত গাছ,  
celsia coromandeliana.  
শীতকালে যেখানে-সেখানে প্রচুর  
জন্মায়। ডাঁটায় ও পাতায় রৌয়া  
আছে। ফুল হলদেবর্ণ, ঈষৎ  
তিস্ত।

কুকঁর—গ্রীষ্মপর্ণী নামক বৃক্ষীর্ষ।

কুকঁর-আল—আরণ্য আল লতাবি°,  
diascoria anguina. পাতা  
অস্প লোমশ। উভর বর্গে ও  
দক্ষিণ বর্গে জন্মে।

কুকঁর-চিতা—চিরশ্যামল বন্যতরুর্ষ°,  
tetranthera apetala, litsaea  
pebefera, ফুল ছোট গ্রীষ্মকালে  
ফোটে, স্ত্রী ও পুং পুষ্প পৃথক  
গাছে হয়। বড় কুকঁর-চিতা—t;  
monopetala.

কুকঁর-চুড়—[স° পপ্পান; ও° কুকঁর-  
হেলিয়া] আচ্ছাদিবর্গের ছোট  
ছোট আরণ্য তরুর্ষ°, pavetta  
indica. ফুল শাদা, অস্প  
গন্ধযুক্ত ও চতুর্দল, গুচ্ছাকারে  
হয়।

কুকঁর-ছিট-কী—ছোট ক্ষুর্ষীর্ষ, leea  
staphylea. ডোল-সমুদ্র গাছের  
মত। ফুল ছোট, বর্ষাকালে হয়।

কুকঁর-ছিহা—ক্ষুর্ষ বৃক্ষীর্ষ, ixora  
undulata.

কুকঁরজেল (দেশজ)—উলটচঁডাল,  
gloriosa superba.

কুকঁরশুক্ষা, কুকঁরশোঁকা—[সং  
কুকঁন্দর; হি° কুকঁরোন্দা]  
কুকঁশমা, বনমূলো, blumia  
lacera. ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।

প্রায় ২ ফুট উঁচু। কাণ্ড ও পাতা  
রোমশ। কদ্রুর এই গাছ শরৎকালেই  
মুঠ ত্যাগ করে বলে এর নাম  
কুকুরশৌকা। কদ্রুসিমা ও  
কদ্রুরদ্র বা কদ্রুরশৌকা এক  
গাছ নয় ॥ বিশ্ব ॥

কদ্রুরসুন্দা—কদ্রুরশিমে।

কদ্রুরিয়াবাদল (দেশজ)—একজাতীয়  
শিম গাছ, *dolicos lignosus*.

কদ্রুটশিখ—কদ্রুসুন্দা ফুলের গাছ  
(কদ্রুটশিখার ন্যায় কদ্রুসুন্দা ফুল  
ও রক্তবর্ণ)।

কদ্রুটী—শিমুল গাছ।

কদ্রুরদ্র—কদ্রুরশৌকা গাছ। পর্যায়—  
কদ্রুসুন্দা, পীতপুষ্প, কদ্রুরদ্রুম;  
মদ্রুসুন্দা; তাম্রচূড়।

কুগুম (দেশজ)—*dalbergia rimosa*.

কদ্রুম—[ স° কদ্রুম; হি° কেসর সিং  
কোকুম; ক° কদ্রুম; গুজ° কেসর;  
তৈ° কদ্রুমপদ্র; কা° লরকীমাস;  
অ° জাফরান; ইং saffron ]  
কন্দ শাকবি°, *crocus sativus*.  
ইহার ফুলের কেসরকে কদ্রুম  
বলে। আজ-কাল ভারতে কেবল  
কাশ্মীরে ইহার চাষ হয়। উত্তম  
কদ্রুম গাঢ় লেবু রঙের, অধম  
কদ্রুম পীত বা কাল। প্রকার-

ভেদ—আরগ্যকদ্রুম, আবাদী  
কদ্রুম। কাশ্মীর-জাত উত্তম,  
বাহলীকজাত মধ্যম, ঈষণ শাদা,  
পারস্যজাত অধম। কাশ্মীরজাত—  
কেশরগুঁলি সুক্ষ্ম। রক্তবর্ণ গন্ধ  
পুষ্পের মত। বাহলীকজাত—সুক্ষ্ম  
কেশর, পাণ্ডুবর্ণ, গন্ধ কেসাফুলের  
মত। পারস্যজাত—মোটা কেশর,  
পাণ্ডুবর্ণ, মধুর ন্যাস গন্ধ।  
পর্যায়—কাশ্মীরজ, অগ্নিশিখ, বর,  
বাহলীক, পীতন, রক্ত, সঙ্কোচ,  
পিপ্পল, ধীর, লোহিত চন্দন, চারু,  
বরবাহলীক, রক্তচন্দন, অগ্নিশিখর,  
অস্ক, পীতক, রুধির, শঠ;  
শোণিত, ঘৃসৃগ, বরেন্য, অরুণ-  
কালৈয়ক, জাশুড়, কাণ্ড, বর্হিশিখ;  
কেশর-বর, গৌর, হরিচন্দন, খল,  
দীপক, সৌরভ, চন্দন।

কদ্রুমী কদ্রুনী—মহাজ্যোতিষ্মতী  
লতা।

কদ্রুরদ্র—কদ্রুরশৌকা গাছ ॥ ভাবপ্র°।  
কদ্রুইকাটা (দেশজ)—*mimosa*-  
*octandra*.

কদ্রুড়ি—*exacum tetragonum*.

কদ্রুড়িকা, কদ্রুড়ী—মর্বাঁলতা।

কদ্রুচন্দন—১ কদ্রুম, ২ বৃক্ষবি°।

কদ্রুচফল—দাড়িমগাছ।

কুচাদেরী—চুকাপালং শাক ।

কুচি-কাটা—mimosa rubicaulis.

কুচিলা—[ হি°, ও° কুচিলা; ম° কুচলা; তে° মৃন্টি ; ইং snake wood, nux vomica tree ] বন্য ছোট তরুবি°, strychnos nux vomica. দক্ষিণ ভারত ও উড়িষ্যা প্রচুর জন্মে । বসন্তকালে ফুল হয় । ফল লালবর্ণ, ফলের শাঁস বাদিরে খায়; কিন্তু বীজে ভরানক বিষ আছে ।

কুচিলা-লতা—strychnos colubrina.

কুচেলো, কুচেলী—আকনাদি ।

কুচ্ছ—কুমুদ ফুল, হেলা ফুল ।

কুজিহেলাজ ( দেশজ )—বৃক্ষবি° ।

কুণ্ডলা—কুমড়া ।

কুণ্ডি—১ কঁচ, ২ কণ্ডি, ৩ কৃষ্ণজীরা, ৪ মেথী ।

কুণ্ডিত—তগর ফুল ।

কুঞ্জরকণা—গজপিপলী ।

কুঞ্জরপিপলী—গজপিপলী ।

কুঞ্জরা—১ ধাতকী, ধাইফুল, ২ পারুল গাছ । পৰ্যায়—ধাতুপদুপী, তাম্রপদুপী, স্নিগ্ধা, বহুপদুপী, বীজবালা ।

কুঞ্জরালক—হস্তালা নামক আলুবি° ।

কুঞ্জরাশন—অশ্বখগাছ ।

কুঞ্জলতা—কলংবাদিবর্গের বর্ষায়িত্ত রোহিণী, quamoclit pinnata. ফুল সরু, লাল, পাতা পক্ষিহীন, বীজ চারিটি । বড় কুঞ্জলতা—q. phoebeia. পাতা পানের মত । বীজ লোমশ ।

কুঞ্জবল্লরী—নিকুঞ্জিকায়ী গাছ ।

কুঞ্জিকা—১ কৃষ্ণজীরা, ২ নিকুঞ্জিকায়ী গাছ ।

কুটু—কুটুজ দ্র° ।

কুটুজ—[ স° পাণ্ডুরদ্রুম ] কুটুচিগাছ, কুটুচি, holarrhena antidysenterica. বৃক্ষ মধ্যমাকৃতি, বাঙলার সব জায়গায় জন্মায় । ফুল শাদা, তগরাদিবর্গের আরণ্য ঋতুপবি° । পার্বত্যপ্রদেশে বহু পরিমাণ জন্মে । বৎসরে একবার করে পাতা ঝরে । ফল বা বীজের নাম—ইন্দ্রব [ হি° ইন্দ্রবো ] । প্রকারভেদ—১ সিতকুটুজ [ স° পাণ্ডুরদ্রুম, বরিত্ত, গিরিমালাকা ; হি° কুড়া, কোরেন্সা ; ম°, গুজ° পদ্মাকুড়া ; তা° ভে°পালরিসি ; তে° অমকুটু ; ও° কুড়িয়া ; অ° তিবাজ ]—পুতিকুটুজ, ২ অসিতকুটুজ [ স° কৃষ্ণতুলা ; হি° মিঠা ইন্দ্রবো ;

গুজ্জ° গোদীইন্দ্রবৰ; ফা° তুম্মে  
আহেরি, সিরীল জ্বানে কুজ্জঙ্কি  
সিরীজ; তা° ভেৎপানভিরাই;  
তে° অনকুদু কোদিসা] wrightia  
tinctoria. পর্যায়—শত্রু, বৎসক,  
গিরিমাল্লিকা, কোটজ, বৃক্ষক, কাহী,  
কালিজ, মাল্লিকাপুপ, প্রাবৃষ্য,  
শত্রুপাদপ, বরতিস্ত, যবফল,  
সংগ্রাহী, মাহাগম্ব, পাণ্ডব, কোচ,  
শত্রুশালী। সিতকটুজ বংগদেশে  
প্রচুর জন্মে—কিন্তু অসিতকটুন  
মধ্যপ্রদেশ, গুজ্জরাত, গোদাবরী  
তীর ও রন্ধদেশে জন্মে।

কটুজবীজ—ইন্দ্রবৰ।

কটুনেট—১ শোনাগাছ, ২ কেশর।

কটুর্ণা—তেউড়ী লতা।

কুটিল—তগরপাদিকা ফুল। পর্যায়—  
কালালুশারিকা, বক্স, তগর, শঠ,  
মহোরগ, নত, জিহ্বা দীন,  
তগরপাদিক।

কুটিম—দাড়িমগাছ।

কুঠের—১ তুলসী, ২ বাবুইতুলসী।

কুঠেরক—১ তুলসী, ২ শ্বেততুলসী।

পর্যায়—অজক, শ্বেতপর্ণাস,  
গম্বপত্র, ৩ বাবুইতুলসী। পর্যায়—  
ববরী, ডুবরী, তুজী, খরপুপা,  
অজগঞ্জিকা, পর্ণাস।

কুঠেরজ—শ্বেততুলসী।

কুড়—কুষ্ঠ দ্র°।

কুড়কবালা ( দেশজ )—কুদু বৃক্ষবি°,  
hedysarum bupheuri-  
folium.

কুড়িচ, কুরিচ—কটুজ দ্র°।

কুড়হুগি—উচ্ছে।

কুড়ালিয়া ( দেশজ )—বৃক্ষবি°;  
কুড়কবালা। ইহার আকৃতি  
অনেকটা আমরুলের মত, তবে  
পাতাগুলি ছোট।

কুণ—অবখবৃক্ষ।

কুণজ—বনবেতো শাক ॥ রাজনি° ॥

কুণি—তুঁদ গাছ।

কুণ্ডপায়—সোমলতা।

কুণ্ডল—রক্তকাণ্ডন গাছ।

কুণ্ডলিকা—গড়গড়ে শাক।

কুণ্ডলিনী—১ গুলুগ, ২ আলবুশী, ৩  
কাণ্ডন গাছ, সপিণী গাছ।

কুতৃণ—পানা।

কুংসলা—নীলগাছ।

কুধ—কুণ।

কুদাল—পর্বতীয় বৃক্ষবি°, baubinia  
variegata.

কুদালিয়া—hedysarum triflorum  
desmodium t.



কুদুমবেত ( দেশজ )—এক জাতীয়

বেতগাছ, *calamus polygamus*.

কুন্দল—পর্বতীয় বৃক্ষবি°।

কুন্দার, কুন্দাল—কাণ্ডন গাছ।

কুদান্য—কয়েক প্রকার ধান্যবি°। পর্যায়  
—কোরদৃষক, শ্যামাক, নীবার,  
শাস্তনর, তুবরক, উদ্দালক, প্রিয়ঙ্গু,  
মধুলিকা, নান্দীমুখ, কুরুবিন্দ,  
গবেধুক, বরুক, উদপনী, মুকুন্দক,  
বেগুদৃষব।

কুনট—[ হি° শনহুলী ] সোনা গাছ,  
বানশলহুই। আকৃতি শগপুস্পের  
ন্যায়।

কুনটী—ধনিয়া।

কুনলী—বকবৃক্ষ।

কুনাশক—আলকুশী।

কুনীলী—তৈরিগী গাছ।

কুস্ত—গবেধুক, গড়বাড়ে ধান, *coix*  
*barbata*.

কুস্তল—ঘব।

কুস্তলবর্ধন—ভুক্ষরাজ, ভীমরাজ।

কুসুদ—১ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, *jasmimum*  
*multiflorum*. ২ করবীর গাছ,  
৩ পদ্ম।

কুন্দক—কন্দুরবৃক্ষ, *boswellia*  
*thurifera*.

কুন্দল - *nymphoea cyanea*.

কুন্দুরক—কুন্দুরক বৃক্ষ।

কুন্দুরকী—কন্দুরকী গাছ, *boswellia*  
*thurifera*. পর্যায়—বিস্বী,  
রতাকলা, তুণ্ডী, তুণ্ডকেরা,  
বিস্বকা, ওষ্ঠোপমা, ফলা,  
পীলপণী°।

কুন্দুরমী—*pistacia lentiscus*.

কুপালী—কারস্কার বৃক্ষ, তিস্তদ্রু  
বিশেষ। মকিড়া কেঁদু  
॥ ভাবপ্র° ॥ ইহার ফলের নাম  
কর্দচলা।

কুবের—নন্দীবৃক্ষ।

কুজক—[ হি° কুজা ] পুষ্পবৃক্ষবি°;  
কাঁটাসিউতি, *tropa bispinosa*.  
পর্যায়—ভদ্রতরুণী, বৃহত্তপুস্প,  
অতিকেশর, মহাসহ, কণ্টকাচ্য, খর্ব,  
অলিকুল, সঙ্কুল, বারিকণ্টক।

কুজকণ্টক—শ্বেত-খদির, *white*  
*rimosa*. পর্যায়—শ্বেতসার,  
বাদর, সোমবকল।

কুলা—নীলপদ্ম ॥ ঋতুস° ॥

কুমড়া—[ স° কুম্ভাণ্ড; হি° কদু,  
কদীয়া, কোটী, কোহড়া, কুস্তুরা;  
পেঠা°, ম° ভোঁপলা, কোহঠা°;  
ও° কথারু°, পাণিকথারু°, গুজ°  
ভুরুং কোলুং ] পলকুমড়া, দেশী  
কুমড়া, *benincasa cerifera*,

*cucurbita hispida; c. alba.*

প্রকারভেদ—(১) দেশী কুমড়া [ স°  
শ্বেতকুম্ভাস্ত, পদ্মফল ] ছাঁচ  
কুমড়া বা চালকুমড়া—প্রতাণীলতা  
বিশেষ। ফুল পীতবর্ণ, ফল  
শাদা; গোলাকার লম্বা, (২) বিলাতী  
কুমড়া [ স° পীত কুম্ভাস্ত,  
কোচবিহারে ঘিষুকুমড়া ]

গড়কুমড়া, মিঠা কুমড়া; *cucurbita*  
*maxima.* (৩) ভুইকুমড়া—

[ স° ভূমিকুম্ভাস্ত, বিদারী;  
ক্ষীরবিদারী; হি° বিলাইখন্দ;  
ভুইকথারু ] কলম্বাদিবর্গের

বৃহৎলতাবি°, *ipomoea*  
*paniculata.* মাটিতে মূল খুব

মোটা হয়। পাতা অঙ্গুলাকার,  
ফুল আননীল রক্ত, ডাটা মসৃণ,

বীজ কোণে-কোণে লোমশ।

কুমার, কুমারক—বরুণবৃক্ষ, *capparis*  
*trifoliata.*

কুমারিকা—কুমারী দ্র°।

কুমারী—[ স° কুমারীলতা ;

কুমারিকা ; ও° কুম্ভাটুয়া ]

রজনীগন্ধাদিবর্গের প্রতাণীলতাবি°,  
*similax macrophylla, aloe*

*indica,* কণ্টকপদর্ণ, ফুল ছোট, ২

ঘতকুমারী, ৩ নবমল্লিকা, ৪ বড়

এলাইচ, ও মেদিনীপদ্ম, ৬

তরুণীপদ্ম।

কুমারীপত্র—পত্রজীব, জীয়াপদ্ম (?)।

কুমারীয়া ( দেশজ )—লতাবি°।

কুমুদ—[ স° শ্বেতোৎপল, রক্তোৎপল,  
ইং *white esculent lotus* ]

শাদা শালক ফুল, *nymphaea*

*lotus.* বড় শালক, *n.*

*pubescens,* রক্তোৎপল *n.*

*esculenta.* হেলা, শর্দি। পর্যায়

—কৈরব, চন্দ্রকান্ত, গর্দভ, কুমুদ,

ধবলোৎপল, কল্লার, শীতলক,

শশিকান্ত, ইন্দুকমল, চন্দ্রিকাম্বুজ,

গন্ধসোম, শ্বেতকুমুদলয়।

কুমুদঘ্নী—বৃক্ষবি°, ইহার রস দুগ্ধের

ন্যায় শাদা, বিষাক্ত।

কুমুদবীজ—[ স° কুমুদবীজ,

কৈরবিনীফল ; হি° ভেট ]

সিতোৎপলবীজ, শর্দিনালের বীজ।

নিরম্ব উপবাসে অসমর্থ হইলে

ইহা ( রবিশস্য-জাত নহে বলিয়া )

অনেকে খাইয়া থাকে।

কুমুদা—১ কুন্তিকা, পানা, ২

গম্ভারীবৃক্ষ, ৩ শালপণীবৃক্ষ, ৪

ধাতকীবৃক্ষ, ৫ কটফল।

কুমুদাদি—কুমুদ, শর্করা, নাথোথ,

সঙ্কট, কঙ্কট, গর্ত, বীজ পরিবাপ,

নির্ঘাস, শকট, কচ, মথু, শিরীষ,  
অশ্ব, অশ্বখ, বব্বজ, বব্বাষ, কূপ  
বিকঙ্কট ও দশগ্রাম ।

কুমুদিকা—কট্ ফলবৃক্ষ । পর্যায়—  
কটফল, সোমবল্ল, কৈটম্ব,  
কুম্ভিকা, শ্রীপর্ণী, ভদ্রা, ভদ্রবতী ।  
কুমুদিনী—[ ইং tufted brash  
bear ] *menyanthes cristata*.  
কুমুদবতী—১ পদ্মের বন্ত, ২ বৃক্ষবিং  
( ফল বিষক্ত ), *villarsia*  
*indica*.

কুম্ভিয়া—বৃক্ষবিং ।

কুম্ভ—গ্রীবৃৎ-বৃক্ষ ।

কুম্ভকারিকা—কুলখ-বৃক্ষ ।

কুম্ভজ—দ্রোণপদ্পী ।

কুম্ভতুম্বী—গোল লাউ ৷ রাজনিং ৷  
অলাবদ্রং । পর্যায়—কুম্ভালাব,  
গোরক্ষতুম্বী, গোরক্ষী, নাগালাব,  
ঘটাভিধা, ঘটালাব ।

কুম্ভদাসী—পানা ।

কুম্ভযোনি; কুম্ভযোনিকা—  
দ্রোণপদ্পীবৃক্ষ ।

কুম্ভলা—মুদ্রাভিতকাবৃক্ষ ।

কুম্ভবীজক—করঞ্জবৃক্ষ, রীঠা করঞ্জ ।

কুম্ভাণ্ড, কুম্ভাণ্ডক—কুমড়া ।

কুম্ভালাব—গোল লাউ ।

কুম্ভিকা—১ কচ্ছদেশীয় দাড়িম্ব, ২

পারুল গাছ, ৩ দ্রোণপদ্পী, ৪  
পানা । পর্যায়—বারিপর্ণী,

শ্বেতপর্ণী, অশ্বকৃষ্ণা, পানীয়,  
পূবজ, আকাশমূলী, কৃতং,  
জলবল্লক, কুম্ভী, বারিমূলী,  
খমূলিকা, পর্ণী, পদ্মনী, খমূলি,  
বারিকর্ণিকা, কুমুদা, দলাঢ়ক ।

কুম্ভিনী—[ হি° সৌবিনী ] ১  
মৃগেবারুবৃক্ষ, রাখালশশা, ২  
জয়পালবৃক্ষ, *croton*  
*jamolgate*.

কুম্ভিপাকী—কট্ফলবৃক্ষ ।

কুম্ভী—[ স° কুম্ভী, পপটদ্রুম ]  
জম্বুকাদিবর্গের বৃহৎ তরু বিশেষ,  
*careya arborea*. প্রকারভেদ—  
১ গুগ্গলুবৃক্ষ, ২ পাটলাবৃক্ষ,  
৩ পানা, ৪ কট্ফলবৃক্ষ, ৫  
দণ্ডীবৃক্ষ, ৬ কুম্ভীপদ্পীবৃক্ষ, ৭  
গণিকারীবৃক্ষ, গুগ্গুরী । উড়িয়া  
ও অন্য প্রদেশে অরণ্যে জন্মায় ।  
বসন্তকালে সমস্ত পাতা ঝরিয়া  
নতন পাতা জন্মায় ও ফুল ধরে ।  
ফুল বড় বড় সাদা । ফল কলসীর  
আকার । ছাল খুব শক্ত । কোন  
কোন বৌদ্ধ সম্প্রদায় ইহার ছাল  
পরিতেন ।

কুম্ভীক—১ পুরাগবৃক্ষ, ২ পানা ।

কদম্বীবীজ—জয়পালবীজ ।

কদম্বোভব তরু—বকপদ্পবৃক্ষ ।

কদরকা—শল্লকীবৃক্ষ; boswellia  
thurifera.

কদরম্বিকা—মৃদুপাণী ।

কদরুট, কদরুটক—পীতাম্বান বৃক্ষ;  
পীতবাঁটি । পর্যায়—সৈরেয়ক,

সৈরেয়, শ্বেতপদ্প; কদরুটিকা,  
কটসারিকা, সহাচর, সহচর ।

কদরুড—সাকদরুডবৃক্ষ ।

কদরুডক—নীলবাঁটি ।

কদরব—১ শ্বেত মাদার, ২ লাল বাঁটি  
গাছ; ৩ পীতবাঁটি, ৪ তিলকগাছ(?) ।

কদরবক, কদরবক—১ রক্তবাঁটি, ২  
কদরচি, ৩ কদরবক পদ্প ॥ মে' ॥  
barleria.

কদরী—তৃণধান্যভেদ ।

কদরুদক—মুলা ।

কদরুট—সিতাবর শাক ।

কদরুট—পীতবাঁটি গাছ ।

কদরুটিকা—হস্তিনীবৃক্ষ, হাতীশৃঙ  
গাছ ।

কদরুবা—কুলপালক, কমলালেবু ।

কদরুবা, কদরুম্বিকা—[ হি° গুমা ]  
দ্রোণপদ্পী ।

কদরবক—লালবাঁটি গাছ, পীতবাঁটি  
গাছ ।

কদরুবিদ্—১ মৃদু, ২ মাষকলাই, ৩  
হিজল, ৪ কদমাষ শস্য ।

কদরুবিদক—কদমান্যবিশেষ ।

কদরুবিবক—কদমাষ ।

কদরুস্বী—সৈংহলীবৃক্ষ ।

কদরুজ—কুলগুনবৃক্ষ ।

কদল—[ স° বদর, বদরী ; হি° বের,  
বৈর ; ম° বোর ; গ° মেটা বোরডী ;

ক° বেরগু ; তৈ° রংঘ ; ও° কুড়ি ;  
কা° কদনার ; অ° সীদরনবৃক্ষ ]

কদল, বরুই, zizyphus jujuba.

অতি পরিচিত গাছ । কাণ্ড রেখা-  
বন্ধুর । পাতা গোল, নিম্নপৃষ্ঠ

লোমশ । বীজের শস্য বাদামের  
মত । ঠেঠ মাসে গাছের ডাল

কাটিয়া দিলে প্রচুর ফল জন্মায় ।  
শীতকালে ফল হয় । অল্পমধুর ।

ফল, পাতা ও মূলের ছাল ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত হয় । প্রকারভেদ—(১)

নারিকেল কদল, কদলের চেয়ে বড়,  
স্বাদ স্নিগ্ধ । নারিকেলের মত

আকার বলিয়া নাম । (২)  
বোম্বাই কদল—কদলের চেয়ে একটু

বড় । অল্প কম । (৩) সৈয়াকদল  
—বহুকণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ । ফল

অতি ক্ষুদ্র । কদলের মত ইহার  
ফলও শীতকালে হয় ।

কদলক—১ গাৰগাছ, ২ মট্টয়া ফুলের  
গাছ, ৩ কদপীল, ৪ পটোল, ৫  
পটোল-লতা ।

কদলজ—পটোল ।

কদলজ—গম্ভমূল-বৃক্ষ, 'কদলজন ॥  
রাজান' ।

কদলজন—[ স° কদলজ, গম্ভকদল;  
কদলজ ] কুলিজন দ্র° ।

কদলতি—কদল দ্র° ।

কদলখ—[ স° কালতাম্ববৃক্ষ,  
সিতেতর, কুলখিকা; হি° কুলখি;  
তা° কোল্ল; তে° ওয়ালাওয়াল্লি;  
ইং horsegam ] কদলখ বা  
কুতি'কলায়, কদলখ, কদলখকলায়,  
dolichos biflorus. ত্রিপত্র  
ক্ষুদ্রপৰ্বি° । শাখাপত্র বহুলোমাম্বিত।  
ফুল ছোট হরিদ্রাবর্ণ, প্রত্যেক  
শিম্বীতে কলায় থাকে। ডাঙা  
জমিতে জন্মায়। পৌষমাসে  
পাকে। প্রকার-ভেদ—

ঠাকুরিকলায়, d. pilosus.

কদলখা, কদলখিকা, কদলখী—বন-  
কদলখী। পৰ্যায়—দ্রুপসাদা,  
অরণ্যকুলখিকা, লোচনচিটা,  
চক্ষুদ্যা, কুম্ভকারিকা, কুলখিকা,  
কুলালী, প্রলাপহা। ॥ শব্দ° ॥

কদলদ্রুম—এই বৃক্ষ ১০ । প্রকার—

গ্লেখ্মাস্তক, বিল্ব, অম্বাখ, কদম্ব,  
নিম্ব, বট, উড়ম্বর, ধাত্রী,  
করঞ্জ, তেঁতুল ।

কুলপত্র, কুলপত্রক—দমনকবৃক্ষ, বাহাকে  
দোলা বলে ।

কুলপালক—কদম্ব, কমলালেবু ।

কুলপি (দেশজ)—১ বৃক্ষবিশেষ, ২  
আক গাছ ।

কুলবর্ণা—রক্তবর্ণ, লাল তেউড়ী !

কদলসম্ময়—পরিপেলবৃক্ষ, কেউটা  
মুতা ।

কুলসোরভ—মরুবকবৃক্ষ; নাগদানা ।

কুলালী—বনকদলখবৃক্ষ ।

কুলাহক—[ হি° তালমাখনা ] রক্তবর্ণ  
কোকিলাক্ষ শাক, রাঙা কুলেখাড়া ।  
পৰ্যায়—কোকিলাক্ষ, কাবেক্ষু,  
ইক্ষুর, ক্ষুর, ভিক্ষু, কাণ্ডেক্ষু,  
ইক্ষুবালাকা, ইক্ষুগম্ভা ।

কুলাহল—কুকসিম গাছ ।

কদলি—কণ্টকারীবৃক্ষ ।

কদলিক—কাকাদনীবৃক্ষ, কোকিলাক্ষ ।

কদলিকা—হাড়জোড়া ।

কদলিকাথ্য—কোলিবৃক্ষ, কদলগাছ ।

কদলিআক্ষী—পেটিকাবৃক্ষ; পেটারী ।

কদলিজন—হরিদ্রাদিবর্গের শাকবিশেষ,

alpinia galanga. ডাটগ্গ



অনেক পাতা হয় । ফুল  
আরক্ত ।

কদলিবেগুন—[ ইং cylindrical  
egg plant ) solanum  
longum.

কদলিশ—হাড়ভাজা গাছ ।

কদলিশদ্রুম—স্নহী-বৃক্ষ, শিশুগাছ ।

কদলি—১ কটকারী-বৃক্ষ, ২ বৃহতী;  
৩ কদলকাটা, কোকিলাক্ষ ।

কদলীনক—বনমৃগ ।

কদলুথ—কদলধ দ্র° ।

কদলেখাড়া—কোকিলাক্ষ দ্র° ।

কদলেচর—ক্ষুদ্র শাক-বিশেষ ।

কদলম্বা—১ অর্ধপত্র যব; *dolichos*  
*biflorus*, ২ রাজম্বা, ৩ মাষাকৃতি  
—পত্রযুক্তবৃক্ষ, কাশ্মীর-দেশে  
তুলসী নামে পরিচিত, ৪  
বনকদলখী ।

কদল্যা—শূলবাতার্ক ।

কদব—১ উৎপল, ২ জলজপদ্মমাত্র ।

কদবকালদুকা—ঘোলী শাক ।

কদবল—১ বদরী-বৃক্ষ, *zizyphus*  
*jujuba*, ২ বদরী ফল, ৩ উৎপল ।

কদবলয়—১ উৎপল; ২ নীল ও  
শ্বেতোৎপল ।

কদবলী—কদলগাছ ।

কদবাস্তকুৎ—কাটাকরমচা, *caesalpinia*  
*bonducella*.

কদবের, কদবেরক—তুঁতগাছ ।

কদবেরাক্ষী—১ পারুল গাছ; ২ লতা  
করজ, ৩ সাদা পারুল [ হি° শ্বেত  
পাড়রী ] । ৪ পেটারী গাছ ।

কদবেল—লাল শর্দি ।

কদশ—[স° সূচীপত্র, মৃদুদর্ভ, কুশের ।  
হি° ডব, কশ; ইং *medow*  
*grass* ] দীর্ঘায়ু তৃণবি°,

*eragrostis cynosuroides*,

*poa ciliaris*, p. roxb. অত্যন্ত

অনুর্বর জমিতেও কদশ জন্মায় ।

পূজার্থে কদশ ব্যবহৃত হয় ।

ইহাতে আসন প্রস্তুত হয় ।

পাতা সরু । সোজা ডাটা । (২)

দর্ভ বা খরদর্ভ, p. *cynosuros*

*ides* । (৩) হরিদগর্ভ—হরিবর্ণ

ফুল, ফুল ও মূল ঔষধার্থে

ব্যবহৃত হয় । পর্যায়—কুথ,

দর্ভ, পাবন, যাজ্ঞিক, হৃদয়গর্ভ,

বহি, কুতূপ, সূচ্যগ্র, যজ্ঞভূষণ ।

কদশপদ্ম—গ্রীষ্ম-পূর্ণ, কুশ ও পদ্ম ।

কদশলী—১ অশাস্তকবৃক্ষ, ২  
ক্ষুদ্রান্নিক ।

কদশলোদর—চালতা ।

কদশা—১ মধুকর্কটী, ২ কুশতৃণ ।

কদশাল্মলি—রোড়া বা ময়না,

রোহিতক-বৃক্ষ ।

কুশিংশপা—কপিলশিংশপাবৃক্ষ ।

কৃশিক—১ শালগাছ, ২ বরুড়া গাছ,  
৩ অশ্বকর্ণবৃক্ষ ।

কৃশিশ্বি—শিশ্বীভেদ ।

কৃশেলয়—পদম ।

কৃশেশয়—১ পশু, ২ কর্ণিকার-বৃক্ষ ।

কৃষ্ঠ—[ স° বাপ্য ; হি° কৃষ্ঠ ; গুজ°

উপনং ; তা° কোষ্ঠম্ ; তে°

গোষ্ঠম্ ; ফা° কৃষ্ঠ-ই-তল্-শ্ ]

কুড় । কাম্বী-প্রদেশে এই উদ্ভিদ

জলাশয়ে জন্মে, *saussurea*

*lappa*, *aplotaxis suriculata*.

সোমরাজ্যাদিবর্গের দীর্ঘ শাকবি° ।

কাম্বী-এর নাম 'চোবইকোট' ।

শালের ভিতর ইহার শিকড় রাখিলে

স্বাসিত হয় ও কীটাদি হতে রক্ষা

পায় । প্রকারভেদ—১ তিস্ত

কৃষ্ঠ, ২ মধুর কৃষ্ঠ । পর্বায়—

কদাথ্য, দৃষ্ট, পরিভাব্য, উৎপল,

আপ্য, জরগ, গদাথ্য, গদাহ্ব,

গদাহ্বয়, কোবের, ভাস্কর, কাকল,

নীরজ, কৃঠিক, রুজা, গদ,

আময়, বাণীরজ, পাবন, পাকল,

পদ্মক° । শব্দক° ॥, কুড় বিষনাশক ॥

বিশ্বকো° ॥

কৃষ্ঠকেতু—মাকী-ডকাবৃক্ষ ।

কৃষ্ঠগন্ধিনী—অশ্বগন্ধা ।

কৃষ্ঠগ্ন—ওষধিবৃক্ষবি° ॥ হিতাবলী ॥

কৃষ্ঠঘ্রী—১ কাকোদম্বরিকা, ২

সোমরাজী ।

কৃষ্ঠনাশন—১ ক্ষীরীশবৃক্ষ, ২ শ্বেত

সর্বপ, ৩ বারাহী কন্দ, ৪ কৃষ্ঠ-

নাশক ওষধিবি° ।

কৃষ্ঠনাশিনী—১ সোমরাজী, ২

হাকুচ ।

কৃষ্ঠনোদন—রক্ত-খদির ।

কৃষ্ঠবৈরী—চালমুগরা । পর্বায়—

শৈলরোহী, মহাগদ, বৈবস্বত ।

কৃষ্ঠসুদন—আরগথবৃক্ষ, সোদাল,

*cassia fistula*.

কৃষ্ঠহস্তী—বাকুচী-বৃক্ষ ।

কৃষ্ঠহর—গুড়ে-বাবলা ।

কৃষ্ঠহা—১ পটোল, ২ ছাতিম ।

কৃষ্ঠারি—১ খদির, *acacia catechu*,

২ বিটখদির, *a. fernesiana*, ৩

পটোল, *trichosanthes*

*disoea*. ৪ অকপত্র ।

কৃষ্ণাড—[ হি° কোহের ; ও°

পানীকথারদ ] কুমড়া । প্রকার-

ভেদ—১ ছাঁচ কুমড়া, ২

কৃষ্ণাডী—গিমা কুমড়া, গোল

ছাঁচ কুমড়া, ৩ শীত-কৃষ্ণাড—

বিলাতী কুমড়া । পর্বায়—

ঘৃণাবাস, তিমিষ, গ্রামককটী,

পদ্মপফল, কুসুম্ভক, কর্কার, শিখিবর্ধক, কুসুম্ভা, কর্কাটিকা, বৃহৎফলা, স্ত্রফলা, নাগপদ্মফলা, গুণী ।

কুসুম্ভক—কুসুম্ভ ।

কুসুম্ভিকা—কুসুম্ভা ।

কুসুম্ভা—১ গিমা কুমড়া, কাঁকরোল ।

কুসুম—১ [সঁ কোশায়, লাক্ষাবৃক্ষ ;

হিঁ গোসম, গোসম ; ওঁ কুসুম]

কোসাম, কুসুম schbicheria trijuga. অবিষ্টাদিবর্গের বৃক্ষ-

বিঁ । মধ্যভারতে জন্মে ।

শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায় ।

বসন্তকালে নতুন পত্রোৎপন্ন ও

পদ্ম হয় । ফুল পীতবর্ণ, বীজ

হইতে তৈল হয় । ২

সোমরাজ্যাদি-বর্গের গাছ । কাঁটায়

ভরা । বীজে তৈল আছে,

earthamus tinctorius.

কুসুমপঞ্চক—অরবিন্দ, অশোক, চূত;

নবমল্লিকা ও নীলোৎপল এই

পাঁচটিকে কন্দপের ফুল বলে ।

কুসুমফুল—কুসুম্ভ দ্রুঁ ।

কুসুমমধ্য—চালতা গাছ । ফুল প্রথমে

গোলাকার হইয়া বিকশিত হয়,

পরে গুটাইয়া আসিয়া ফলরূপ

ধারণ করে । ফুলটি অভ্যন্তরে

থাকিয়া যায় বলিয়া কুসুমমধ্য নাম হইয়াছে ।

কুসুম—শত্ৰুপদ্মী ।

কুসুমধিপ, কুসুমধিরাট—চাঁপাফুলের

গাছ ।

কুসুম্ভ—[সঁ গ্রাম্য-কুসুম্ভ,

বর্হিশিক্ষম্ ; হিঁ কুসুম, কর্ভ ; গুঁ

কুম্ভ । তাঁ সেন্দ্রকম্ ; তেঁ

কুসুম্ভেট্টু ; কুসুম্ভেট্টু ; ফাঁ

খসকদানা, কাজির ; অঁ অখরীজ্

হবুল অস্কর ; shafliower]

কুসুম ফুল, carthamus

tinctorius, c. oxycantha,

crocus indicus. ক্ষুপ

ফলপাকান্ত । শরৎকালে বীজ

বপন, শীতে পদ্মপত্র । পাতা

লম্বা, সরু, কটকময় । ফুল

কুসুমবর্ণাভ । বীজ সাদা, চিকণ,

একদিক মোটা একদিক সরু ।

কোচবিহারের লোকে কুসুমশাক

অন্যান্য শাকের ন্যায় আবাদ ও

ভোজন করে । বীজ হইতে তৈল

হয় । ফুলের রং হইতে পটবস্ত্রের

রং হয় । প্রকারভেদ—১

মহাকুসুম্ভ, ২ হ্রস্বকুসুম্ভ, ৩

বন্যকুসুম্ভ । পর্যায়—লটনা,

মহারজন, কমলোত্তর, কমলোত্তম,

বহির্গাথ, কদ্বর্কটগাথ, পাবক;  
পাত, পদ্মাস্তর, বস্ত্ররঞ্জন,  
অগ্নিগাথ ॥ অম° শব্দক° ॥

কদম্বর—ধনে গাছ ।

কদলি—পুগপুষ্পিকা, পান (?) ।

কুচীকান্ত—mimosa octandra.

কচ্ছলিঙ্গ—কদুর-শৌকা গাছ ।

কট—ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বি° ।

কটঙ্গ—কুরচী । বীজের নাম  
ইন্দ্রবব ।

কটপাশলী—[ স° রোচনা, কৎসিত-  
শাল্মলী; ও° কাশিমালা ] জীবকী,  
কাপলা ।

কদাল—রক্তকাণ্ডপুষ্প-বৃক্ষ ।

কচ°গাথ, কচ°গাথক—১ নারিকেল  
গাছ, ২ জীবকবৃক্ষ ।

কদলক—ক্ষুদ্র ক্ষুপ-বি° ।

ককর—করবীর বৃক্ষ ।

ককলা—পিঙ্গলী ।

কুছারি—বিলববৃক্ষভেদ ।

কর্তিছিদ্রা—বিজ্ঞা ।

কৃত্তা—গ্রামগাবৃক্ষ, বালাডুমুর ।

কৃতফলা—কোলগিংশবী ।

কৃতবেধক—ঘোষাতকী লতা,  
শ্বেতঘোষা ।

কৃতবেধন, কৃতবেধনা—ঘোষাতকী  
লতা, বিজ্ঞা ।

কৃতমাল—১ সৌদাল, ২ কর্ণিকার  
বৃক্ষ, ছোট সৌদাল ।

কুপা—লবঙ্গলতা, luvunga scan-  
dens; lumnitzera racemosa.

কুমিকটক—১ বিড়ঙ্গ, চিতা, উড়ঙ্গ ।

কুমিকোষ—মাজুফল (?) ।

কুমিঘ্ন—১ বিড়ঙ্গ, ২ পলাডু, ৩  
কোলকন্দ, ৪ পালিতা মাদার, ৫  
ভেলা ।

কুমিঘ্নী—১ হরিদ্রা, ২ ধূমপত্রা বৃক্ষ,  
৩ বিড়ঙ্গ ।

কুমিফল—যজ্ঞডুমুর গাছ ।

কুমিবৃক্ষ—কেওরা, কোশাম, কোশাম  
বৃক্ষ ।

কুমিশাণ্ডব—১ বিড়ঙ্গ, ২ রক্তপুষ্পক,  
পালিতা মাদার ।

কুমীলক—বনমৃগ ।

কুমদক—গুবাকবৃক্ষ ।

কুশাখ—ক্ষেত্রপপটি ।

কুশাজী—প্রিয়ঙ্গু লতা ।

কুশিকা—আখকণী লতা, ইন্দুরকানি  
গাছ ।

কৃষ্ণ—কেলেব । আশুধান বিশেষ,  
nigella indica. করমদকবৃক্ষ,  
করমচা গাছ । পর্যায়—নীলবৃক্ষ,  
পিপলী, দ্রাক্ষা, নীলপদনর্বা,

কৃষ্ণজীরা, গাভারী, কটুকা,  
রাজসর্বপ, পর্পটি, সোমরাজী।

কৃষ্ণক—কৃষ্ণসর্বপ।

কৃষ্ণকন্দ—রক্তোৎপল, রক্তসন্দী।

- কৃষ্ণকলি, কৃষ্ণকেলি—[ স° কৃষ্ণকলি,  
সম্ভার্মণি; হি° গুলবাজী;  
গুলাম্বাস; ও° রক্তানি; ইং four-  
o'clock flower ] কেটকলি,  
mirabilis jalapa. আমেরিকা  
হইতে এদেশে আনীত। লাল,  
সাদা, হলদে তিন রকমের ফুলের  
তিন প্রণী গাছ আছে। ফুলে  
ঈষৎ সুগন্ধ। পতুংগীজরা এই  
ফুলের বীজ বিদেশ থেকে আনে  
ভারতে, বাংলায় ব্যাণ্ডেল গির্জায়  
প্রথম বীজ বপন করেন পতুংগীজ  
ধর্ম্মযাজক দাঃভূজ।

কৃষ্ণকপোতী, কৃষ্ণকপোতিকা—  
বৃক্ষবি°। বৃক্ষ রোমশ; রস  
ইক্ষুরসের ন্যায়।

কৃষ্ণকটজ—দৃধকরবী দ্র°।

কৃষ্ণগন্ধা—শোভাঞ্জনবৃক্ষ।

কৃষ্ণগর্ভ—কটুফলবৃক্ষ।

কৃষ্ণচূড়া—[ স° সিংধেশ্বর; গুজ্জ°  
সম্ভেশরী; ক° কোমরী; কোচিন  
চায়না—হোসাফন্দ°; মালাবারে—  
তিসিস্তিমন্দার°; শিলং—মেনো-

রামল, ইং peacock flower ],  
caesalpinia pulcherrima,  
poinciana pul. লাল ও  
পীতবর্ণের দুই রকম ফুলের দুই  
রকম জাত। গ্রীষ্ম ও বর্ষায় ফুল  
ধরে। প্রকারভেদ—বিলাতী  
কৃষ্ণচূড়া, রাধিকাচূড়া—[ ইং gold  
mohur flower ] সুবহুং  
পদ্মপত্র, poinciana regia.  
মাদাগাস্কার দ্বীপ ইহার আদিস্থান।  
মরীসস দ্বীপ হইতে এ দেশে  
আনীত। ফুল বড়-বড়, লাল ও  
হলদে রং মিশ্রিত। গ্রীষ্মকালে  
ফুল হয়। ২ গুঞ্জ, কঁচ ॥ বি° ॥

কৃষ্ণচাড়িকা—গুজ্জা, কঁচ ॥

কৃষ্ণজীরক, কৃষ্ণজীরা—কালো জিরে,  
nigella indica. পর্যায়—  
সুশবী, কাবরী, পৃথবী, পৃথু,  
কাল্য, উপকৃষ্টিকা, সুশবী, কৃষ্ণিকা,  
উপকৃষ্ণ, কৃষ্ণা, জরগা, শালী,  
বহুগন্ধা, পৃথুকা।

কৃষ্ণঝাঁটি—ফুলগাছ।

কৃষ্ণতড়ুলা—কর্ণস্ফোটালতা।

কৃষ্ণতিল—কালো তিল, sesamum  
majus.

কৃষ্ণতুলসী—তুলসী, ocimum  
sanctum. তুলসী দ্র°।



কৃষ্ণদন্ত—কাশ্মীরবৃক্ষ, গাভারীবৃক্ষ ।

কৃষ্ণধন্তর, কৃষ্ণধন্তর, কৃষ্ণধন্তরক,

কৃষ্ণধন্তরক—কৃষ্ণবর্ণ ধন্তর,

কনকধন্তরা ॥ রাজনি ॥

কৃষ্ণপণী—কালোতুলসী ।

কৃষ্ণপাক—করমচা ।

কৃষ্ণপিণ্ডীতক, কৃষ্ণপিণ্ডীর—বৃক্ষবিং ।

পর্যায়—বরাহ ।

কৃষ্ণপদ্প—কালো ধন্তুরা ।

কৃষ্ণপদ্পিকা—প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ ।

কৃষ্ণফল, কৃষ্ণফলপাক—করমদ;

করমচা ।

কৃষ্ণফলা—১ সোমরাজী, ২ আলকুশী ।

কৃষ্ণবর্ষ—বর্ষবৃক্ষবিং, কালোতুলসী ।

কৃষ্ণবল্লী—১ কৃষ্ণতুলসী, ২ শ্যামালতা  
( শারিরা-বিং ) ।

কৃষ্ণবাবুই—কালোতুলসী, ocimum  
sanctum.

কৃষ্ণবীজ—১ কালিঙ্গ, তরমুজ, ২  
রক্তশিগ্রবৃক্ষ, লাল সজনে গাছ ।

কৃষ্ণবৃন্তা—১ পাটলাবৃক্ষ, ২ মাষপণী,  
৩ গাভারীবৃক্ষ ।

কৃষ্ণবৃন্তিকা—১ গাভারীবৃক্ষ, ২  
পেটিকাবৃক্ষ, ৩ মাষপণী ।

কৃষ্ণবেত্র—কালিয়ালতা ।

কৃষ্ণব্রীহি—ধান্যবিশেষ ।

কৃষ্ণভূমিজা—গোমূত্রিকা তণ ।

কৃষ্ণমল্লিকা—কালোতুলসী ।

কৃষ্ণমালক—কৃষ্ণার্জক, কালোতুলসী ।

কৃষ্ণমৃগ—[ সং কৃষ্ণমৃগ ] কালোমৃগ,  
phaseolus melanuspermus.

কৃষ্ণমুখলী—তালমুখলী দ্র ।

কৃষ্ণমূলী—শ্যামালতা ।

কৃষ্ণমুহা—জতুকালতা ( ? ) ।

কৃষ্ণল—১ গুঞ্জাবৃক্ষ, ২ গুঞ্জাফল,  
কঁচ ।

কৃষ্ণলা—১ গুঞ্জা, ২ শ্বেতগুঞ্জা ।

কৃষ্ণশণ—শণবৃক্ষ বিশেষ ( বাহার  
পদ্প কৃষ্ণবর্ণ ) ।

কৃষ্ণশারিবা—শ্যামালতা ॥ স্তম্ভ ॥

কৃষ্ণশারিবা—অনন্তমূল দ্র ।

কৃষ্ণশালি—[ সং শ্যামশালি ] কালো  
ধান ॥ রাজনি ॥

কৃষ্ণশিগ্র—কৃষ্ণশোভাঞ্জন, কালো  
সাঁজনা ।

কৃষ্ণশিম্বিকা—কালো শিম ।

কৃষ্ণশিরীষ—কাঁটাশূন্য গাছবিং ।  
albizzia amara baw.

গ্রীষ্মকালে ফুল ও শীতকালে  
ফল হয় ।

কৃষ্ণসখ—১ অজর্নবৃক্ষ, ২ কৃষ্ণজীরা ।

কৃষ্ণসর্বপ—রাইসারিবা ।

কৃষ্ণসার—১ স্নানহিবৃক্ষ, ২ শিংশপা-  
বৃক্ষ, ৩ খদিরবৃক্ষ ।

কৃষ্ণসারথি—অজুনবৃক্ষ ।

কৃষ্ণসারা—শিল্প গাছ ।

কৃষ্ণশঙ্খ—ভালবৃক্ষ ।

কৃষ্ণা—১ নীল গাছ, ২ দ্রাক্ষা; ৩

নীলপুনর্বা; ৪ কালোজীরা, ৫

গাভারী, ৬ কটুকী, ৭ সারিবা,

৮ রাজসর্ষপ, ৯ কাকোলী, ১০

সোমরাজী ।

কৃষ্ণাগরু—কৃষ্ণবর্ণ সুগন্ধি কাষ্ঠ

৥ রাজনি ভাবপ্র ৥

কৃষ্ণাজনী—কালাজনীবৃক্ষ, কালী-

কর্ণাসিকিনী ৥ রাজনি ৥

কৃষ্ণাবাস—অশ্বখবৃক্ষ ।

কৃষ্ণার্জক—কালোতুলসী ৥ রাজনি ৥

পর্বণ—কলিমাল, মালক;

কৃষ্ণমালক, কৃষ্ণমল্লিকা, গরুল,

বনবর্ষ, বর্ষারী, জাতি, কৃষ্ণবল্লী,

করালক ।

কৃষ্ণাস্থা—পিপলী ।

কৃষ্ণিকা—রাজিকা, রাইসরিষা ।

কৃষ্ণেক্ষু—কাজলি আক ।

কৃষ্ণেয়ক—পদ্মপুষ্প ।

কেউ, কেউ—[ স° কেদুক ; ও°

কউকউকা ] হরিদ্রাদিবর্ণের

আরণ্যবিশেষ, *costus speciosus*.

প্রায় ৪ হাত উঁচু হয় । পাতা

চওড়া, ফুল সাদা বড় বড় ।

পাতা সাপের কুঁড়লের আকারে

ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধরে । তেঁদুগাছকে

কেহ-কেহ কেউ বলে, *diospyros*

*melamonylon*. ( কেদু দ্র° ) ।

কেঁঠ ( দেশজ )—কাল টেঁপারী গাছ,

*solanum nigrum*.

কেঁদ ( দেশজ )—কেদু দ্র° ।

কেঁরেয়াশিম—শিমিণি, *dolichos*

*lignosus*.

কেওড়া—[ স° কোশাল, সুকোশক ]

কেয়া, *souneratia apetala*.

কেতক, কেতকী—[ স° গ্লেম্মিয়া ; হি°

কেবড়া, কেমুয়া ; ও° কেবডো ; ম°

শ্বেতকেবড়া ; ফা° করজ ; অ°

কাদী ] কেয়াফুলের গাছ,

*pandanus odoratissimus*,

আরণ্যগাছ, গাছ অধিক বড় হয়

না । ডালে গাছ হয় । ‘ছিহ্নরুহা’

এজন্য বটগাছের মত কাণ্ড থেকে

শিকড় বাহির হইয়া মাটির ভিতর

যায় । পাতা দীর্ঘ লম্বা, সাদা,

বোমল ও চিকণ । পাতার ধারে

কাটা আছে করাভের মত । এক

গাছে স্ত্রীপুষ্প হয় তাকে কেতকী,

কেতকীক; সিতকেতকী বলে,

অপর গাছে পুরুপুষ্প হয়—তাকে

স্বর্ণকেতকী, হেমকেতকী বলে ।

ফুল সাদা ও পাতার মধ্যে থাকে  
এজন্য 'দলপদ্ম', পদ্ম-পদ্ম  
অত্যন্ত সুগন্ধি, পরাগবহুল, এজন্য  
'ধূনিপদ্মিকা'। ফল নারিকেলের  
মত বড়। ইহার ফুলে শিবপূজা  
হয় না। বর্ষাকালে ফুল ফোটে।  
পর্যায়—সূচীপদ্ম, হলান,  
জম্বুল, জম্বুক, ককচছদ, তীক্ষ্ণ  
পদ্মপা, বিফলা, মেঘা, কটদলা,  
শিবদ্বিষ্টা, নৃপাশ্রয়া, দীর্ঘপত্রা,  
স্থিরগন্ধা, গন্ধপদ্ম, ইন্দুকলিকা,  
পাংশুনা।

কেদারক—ঘাটধান।

কেন্দড়া (দেশজ)—জলাভূমি জাত  
গাছ, *commelina nudiflora*.

কেন্দ্র—[ সঁ কাকেন্দ্র ; হি° এবং ও°  
কেন্দ্র ] গাব, *diaspyros*  
*melamonylon*, *d. embryo-*  
*pteris*, তমলাদিবর্গের বৃক্ষ-  
বি°। পাতা মসৃণ মোটা। ফুল  
সাদা সুগন্ধযুক্ত। ফল রোমশ;  
মিষ্ট। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে  
পাকে। কাঁচা ফলের আঠায়  
খীবরেরা জাল রং করে। বৃক্ষ  
চিরশ্যামল। প্রকারভেদ—  
মাকড়কেন্দ্র, মাকড়া গাব [ সঁ  
কাকতিন্দ্রক ]।

কেন্দ্রক—১ গাব গাছ, ২ তাল-বিশেষ।  
কেবিকা, কেবী—পদ্মবিশেষ।  
পর্যায়—কবিকা, ভূজারী, নৃপ-  
বল্লভা, ভূজনারী, মহাগন্ধা,  
রাজকন্যা, অতিবাহিনী।

কেম্বুক—[ হি° কেম্বুয়া ] কেউ গাছ।  
॥ রাজব° ॥ পর্যায়—পেচুক, পেচু,  
পেচিকা, দলসারিণী, কেচুক  
॥ রত্নমা° ॥

কেয়া—কেতকী দ্র°। বিলাতী কেয়া;  
*agave americana*.

কেয়াকাটা—[ইং feated screwpine]  
ছোট শেওড়া গাছ, *pandanus*  
*faetidus*, পল্লীগামে বেড়ার জন্য  
ব্যবহৃত হয়। ফুল দুর্গন্ধযুক্ত।

কেরই—বড় কেরই, ছোট কেরই, শ্বেত  
কেরই *euphobia pilucifera*,  
*e. microphylla heyne*, *e.*  
*thymifoliaburm*.

কেলিক—অশোকবৃক্ষ।

কেলিকদম, কেলিকদম্ব—কদম্ব দ্র°।

কেশকার—[ হি° কুশিয়ারি ]  
ইক্ষুবিশেষ।

কেশগভক—শ্যোনাংক বৃক্ষ।

কেশধৃৎ—ভদ্রতকেশ নামক তৃণবিশেষ  
॥ শব্দচিন্তামণি ॥

কেশপণী—আপাঙ।

কেশমথনী—শমীবৃক্ষ ।

কেশমুষ্টি—১ বিষলুষ্টিবৃক্ষ, ক'চলে;

২ [ হি° বিষদোড়ি ] মহা-  
নিম্ববৃক্ষ ।

কেশর, কেসর—১ নাগকেশর, ২  
বকুলবৃক্ষ, ৩ পদ্মাগবৃক্ষ, ৪  
হিঙ্গুবৃক্ষ, ৫ নীপ, কেলিকদম্ব ।

কেশরজন—ভূমরাজ, ভীমরাজ,  
কেশরাজ ।

কেশরদাম—জলে ভাসা শাকবিশেষ,  
কাঁচড়াদাম, *jussiena repens*.  
শীতকালে ফুল ও ফল হয় ।

কেশরাজ—শাকবি°, ভীমরাজ ॥ রাজব°  
ভাবপ্র° ॥ *Verlesina calendu-*  
*lacea*. পর্যায়—ভূমরাজ, ভূম,  
পতঙ্গ, মাক'র, নাগমার, পবর,  
ভূমদোসর, কেশরজন, কেশ্য,  
কুম্বলবধ'ন, অঙ্গারক, একরজ,  
করঞ্জক, ভূমরজ, ভূমার, মকর ।

কেশরায়, কেসরায়—১ মা তুলুংগক-  
বৃক্ষ, ২ দাড়িম্ব, ৩ বীজপদ্র,  
টাবালেবু ।

কেশতিয়া, কেশরিয়া—[ স° কেশরাজ ;  
ও° কেশদুরা ] সোমরাজ্যাদি-  
বর্গের লতাবিশেষ, *eclipta*  
*alba*. সরু, ফুল শাদা ও ছোট-  
ছোট । বৎসরের অধিকাংশ

সময়েই ফল হয় । এই গাছের  
রস বাংলা কালিতে মেশায় ।

কেশরী, কেসরী—পদ্মাগবৃক্ষ, বীজ-  
পদ্রকবৃক্ষ, লাল সজিনা ।

কেশরী মলগো—*finebristylis*.  
*schoenoides*.

কেশরুহা—ভদ্রদাস্তিকাবৃক্ষ ।

কেশরায়ুধ—আয়ুবৃক্ষ ।

কেশরালয়—অম্বথবৃক্ষ ।

কেশহস্তফলা—শমীবৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

কেশাহা—নীলগাছ ।

কেশিকা—শতাবরীবৃক্ষ, শতমূল ।

কেশিনী—১ জটামাংসী, ২ চোরপদ্মপী ॥

কেশী—১ নীলীবৃক্ষ, ২ ভূমিকেশ-  
বৃক্ষ, ভূইকেশ । কেশীবৃক্ষের  
পাতা খেজুর গাছের মত ও শিখা-  
রক্তবর্ণ ।

কেশুর—[ স° কেশরু ] মৃচ্ছাদিবর্গের  
তৃণবি°, *scirpus grossus*.  
বড় ডাটার মত গাছ, কেবল গোড়ার  
কাছে পাতা হয়, নীচে কন্দ হয় ।

কেশুরিয়া—বর্ষজীবী শাখাপ্রশাখা-  
বিশিষ্ট গুল্ম, *eclipta alba*.  
এর সঙ্গে অনেকে ভূঙ্গরাজের  
গোল করে ফেলে । কেশুরিয়ার  
ফুল শাদা, ভূঙ্গরাজের ফুল

পীতবর্ণ, আগষ্ট থেকে ফেব্রুয়ারী  
পর্যন্ত ফুল ও ফল হয় ।

কৈটব—১ কট ফল, ২ করমচা, ৩  
পদিকরঞ্জ, নাটা গাছ, ৪ কটকী  
গাছ ।

কৈবর্তিকা—মালবদেশের প্রসিদ্ধ লতা ।  
পর্যায়—স্বরঙ্গা, লতা, বঙ্গী,  
দশারহা, রাঙ্গনী, বস্তুরঙ্গা,  
সুভগা ।

কৈবর্তী মদুস্তক—কেওট মদুথা, কেশদ্র  
মদুথা ॥ ভাবপ্র' রাজনি' ॥

কৈরব—১ কুমুদ, ২ শ্বেতবর্ণ উৎপল,  
ওঁদ ।

কৈরাত—১ ভূনিম্ব, চিরতা, ২ শম্বর  
চন্দন ।

কৌআমুড় ( দেশজ )—সুদৃশ্য  
লতানিয়া গাছ, *callicarpa*  
*lanceolaria* .

কৌক—লতাগাছ, *phoenix acoulis* .

কৌড়—বাঁশের নতুন চারা ।

কোক—খেজুর গাছ ।

কোকদন্তা—মেদীপাতা ।

কোকনদ—১ রক্তকুমুদ, ২ রক্তপদ্ম ॥  
কুতুম' ॥

কোকরন্দা—কুকুর-শোঁকা ।

কোক-বরাদি—*salvia parviflora* .

কোক-সিম—[ স' কুলাহল ] কোকসিমা,

*celsia coromandeliana* .

প্রকারভেদ—(১) বড় কোকসিম,  
*blumea lacera*, (২) ছোট  
কোকসিম, *vernonia cinerea* .

কোকাগ্র—সর্মাষ্টলবঙ্গ ।

কোকিলনয়ন—কোকিলাক্ষ, কুলেকাটা,  
তালমথনা ।

কোকিলাক্ষ—[ স' ইক্ষুরক ; হি'  
কৈলয়া, তালমাথানা ; ম' বিখরা ;  
গুজ' এথরো ; ক' কুলগোলিকে ;  
উ' কোইনিথিয়া, মাথুরেণ ; কো'  
খাড়াকুলে ] কুলেখাড়া, কুলেকাটা,  
কোলিকা, কুলিকা ॥ রাজনি'  
রাজব' ॥ বাসকাদিবর্গের ক্ষুদ্র  
ক্ষুদ্রপৰ্ব', *asteracantha longi-*  
*folia*, *barleria lon*, *ruellia*  
*lon*, *hygrophila spinosa* .

জলাভূমিতে জন্মে । মূল  
বহুশাখাবিত, কান্ড চতুষ্কোণ,  
শাখা গ্রন্থিযুক্ত । রোমান্বিত,  
চ্যপ্টা, পাতা সরু, লম্বা ও শাখার  
গ্রন্থি থেকে জোড়া-জোড়া বাহির  
হয় । ফুল মিলিত দল, নীলবর্ণ ।  
প্রকার ভেদ—(১) রাঙা  
কুলেখাড়া, (২) কাজলি আক ।  
পর্যায়—ইক্ষুগন্ধা, কাণ্ডেক্ষু,  
ইক্ষুর, ক্ষুর, শৃগালী, শৃংখলী,



শূরক; শূগলবটী, বজ্রাশ্বি,  
বজ্রকটক, পিকেক্ষণা, পিচ্ছলা।  
শ্বেত কোকিলাক্ষের পর্যায়—  
বীরতরু, ত্রিঙ্কর, ক্ষুরক,  
শূরপদ্প, কুলাহক।  
রক্তকোকিলাক্ষের পর্যায়—ছত্রক,  
অতিছত্র।

কোকিলাবাস—আম্রবৃক্ষ।

কোকিলেক্ষ—কাজলি আক।

কোকিলেণ্টা—মহাজম্বু, বড় জাম।

কোকিলোৎসব—আম্রবৃক্ষ।

কোকোয়া বাঁশ (দেশজ)—বাঁশবি°।

কোঞা (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

কোচাই (বেল°)—*acacia concinna*.

কোটপাহাড়িয়া (দেশজ)—ক্ষুদ্র  
গাছ-বি°।

কোঠর—অকোট-বৃক্ষ।

কোঠর পাম্পকা—কোঠরপদ্পী।

কোদালিয়া—শিম্বাদিবর্গের বন্য  
লতানিলা ক্ষুদ্র শাকবি°, *desmo-*  
*dium triflorum*. পাতার তিনটি  
পর্ণ, ফুল ছোট নীলবর্ণ।

কোদু; কোদো—[ স° কোদুব; হি°  
কোদফা; ও° কোদুঅ ]  
ধান্যাদিবর্গের বর্ষায়ু আরণ্য  
তৃণবি°। *paspalum scro-*  
*biculatum*. প্রায় ১-১½ হাত

উঁচু হয়, ধানক্ষেতে জন্মায়।  
পাতা মৎস্যাকার, বিষাক্ত। বিহারে  
নিকট জমিতে চাষ হয়।

কোদুর—কোদো ধান ॥ রাজব°  
ভাবপ্র° ॥

কোনা—*poa nucioides*.

কোপলতা—কর্ণফোটালতা।

কোবিদার—[ কো° কাণ্ডনগচ্ ; ম°  
কোরল ; গুজ° চম্পাকাটি ; ক°  
কোচালে কচনার ; তৈ° দেবকাণ্ডন ]  
কাণ্ডন ফুলের গাছ,  
॥ ভাবপ্র° রাজনি° ॥

*baubinia purpuracens*.

প্রকারভেদ—শ্বেত-কোবিদার—(স°  
শ্বেত কাণ্ডন) নিগন্ধ, কেশর  
১০টি, *b. acominata*. (২)

শ্বেত কোবিদার—সুৰভিকুসুম, *b.*  
*candide*, কেশর ৫টি। (৩)

তাম্রপদ্প কোবিদার—(ক°  
কাণ্ডনার, রক্তকাণ্ডনবৃক্ষ (হি°  
কাচনার) *b. veriegata*. ফুল  
বড়। পর্যায়—চমরিক, কুন্দাল,

যক্ষ্মপত্রক, যক্ষ্মপত্র, কাণ্ডনাল,  
তাম্রপদ্প, কুদার, রক্তকাণ্ডন, চম্প,  
বিদল, কাম্বপদ্প, করক, কাম্বার,  
যমনচ্ছদ। (খ) পারিজাত

॥ হরিবংশ ॥ (গ) পাতপদ্প

কোবিদার—দেবকাণ্ডন, b.  
 purpura. ফুল হেমন্তকালে  
 ফোটে। ফুলের জন্য শ্বেতকাণ্ডন  
 বাগানে রক্ষিত হয়। পীতকাণ্ডন  
 পর্বতে জন্মে। ফুলের রং  
 ঘোর গোলাপী।

কোমলপত্রক—সজনে।

কোমলবৃক্ষ—লবলীবৃক্ষ।

কোমলা—ক্ষীরকবৃক্ষ।

কোর—মৃগাল।

কোরকুশ ( দেশজ )—অগাধ ঘাসবি,  
 andropogon nardus.

কোরম্ধী—ছোট এলাচ, ২ পিপ্‌লু।

কোরদ্য, কোরদ্যক—কোদোধান।

কোদ্রব—কোদোধান।

কোর্ণেব—citrus limonum.

কোলক—১ অক্টোবৃক্ষ, ২ বহুবারবৃক্ষ,  
 ৩ মরিচ।

কোলকন্দ—[ স° মহাকন্দ ] কাস্মীরে  
 পুটালদ্র ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—  
 ক্রিমি, পঞ্জল, বস্ত্রপঞ্জল, সুপট,  
 পুটকন্দ।

কোলককটক—মধুখজর।

কোলঘোন্টা—বজরীবি°।

কোলবল্লী—গজাপ্পলী।

কোলশিম্বী—আলকুশী লতা দ্র°।

॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

কোলপ, কোলা—১ কুলগাছ; ২  
 পিপ্‌লী, ৩ চই।

কোলী—কুলগাছ।

কোশকার—আক।

কোশদেরী ( দেশজ )—momordica  
 umbellata.

কোশফল—কক্কোল ( ? )।

কোশফলা—১ মহাকোশাতকী, ২  
 এপুসী, শলা।

কোশবতী—কিঙে।

কোশাগ—ওকড়া ( ? )।

কোশাতকী—ঘোষালতা, ঘোষ, কিঙা  
 ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ luffa foetida.

কিঙা দ্র°। প্রকারভেদ—

(১) ক্ষুদ্রফলা কোশাতকী—[ স°  
 জ্যোৎস্নিকা ] l. bindal.

(২) বৃহৎফলা কোশাতকী—[ স°  
 হস্তীঘোষা ; হি° বড়ীতোরই ] l.

graveolens. (৩) রাজকোশাতকী  
 —[ স° রাজকোশতক ] তেতো

খন্ডুল, l. amara. (৪) ধারা-  
 কোশাতকী—কিঙে, ঘোষ, l.

acutangula. [ হি° বিমনী, ;  
 ও° জনী ]। (৫) শ্বেতপদ্মপা,

পীতপদ্মপা কোশাতকী—[ স°  
 কৃতবেধন, ক্ষেদ্র ] l. echinata.

পর্যায়—কৃতচিহ্না, জালিনী,

সুতিস্তা, বস্টালী, মৃদঙ্গফলিনী, কৰ্ণশৃঙ্গদা। ঘোষলতা আদ্র ভূমিতে জন্মে ও ভুল্লুঠিত থাকে। পাতা, ফুল ও ডাটা প্রায় বিগের মতো ও অতি তিক্ত। ভাদ্র-আশ্বিনে প্রথম পুষ্পিত, শীতকালে ফল পুষ্ট হয়। ফলের গায়ে ফাঁক-ফাঁক সরু নরম কাটা আছে।

কোশাগ্র—ফলবৃক্ষবিং, কোশাম, দেশ-বিশেষে কেওড়া বলে। পর্যায়—কৃমিবৃক্ষ, সুকোশক, ঘনবৃক্ষ, বনায়, জন্তুগাদপ, ক্ষুদ্রায়, রক্তায়, লাক্ষাবৃক্ষ, সুরক্তক ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥

কোশিলা—গ্রূষাপর্ণী।

কোশী—আমগাছ। পর্যায়—পল্লবধট্টী, পাদবিরজা, পাদরথী।

কোর্ব—জাতি, জায়ফল (?)।

কোষফল—ঘোষলতা।

কোষফলা—পীতঘোষা।

কোটা—[ নদীয়ায়, মৈয়মসিংহে প্রচলিত নাম ] পাট দ্রং।

কোষ্ঠেক্ষু—শাদা আক।

কোহিবাগ—সরল গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ, *ryoxyamus nigar*. পর্বতীয় শন, জুলাইমাসে ফুল হয়।

কোহী গাছ ( দেশজ )—*bridelia scandens*.

কোহেরা ( দেশজ )—কাঠাল।

কোঁবি ( দেশজ )—*sterculia urens*.

কোঁস্তের—অজরনবৃক্ষ।

কোঁবল—কুল।

কৌশিক—অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতাশাল।

কৌশিকফল—নারিকেলবৃক্ষ।

কৌশিকোজ—শেওড়া গাছ।

কৌসুম—১ বনকুমুম, ২ শাকবিং।

ক্কচ—গ্রন্থিল-বৃক্ষ।

ক্কচ্ছদ—কেতকী-বৃক্ষ।

ক্কচপট্ট—১ শাক-বৃক্ষ, ২ সেগুন, কেতকী-বৃক্ষ।

ক্কর—করীর-বৃক্ষ।

ক্কমপুরুক—বকফুলের গাছ।

ক্কমিকটক—১ বিড়ঙ্গ, ২ চিহ্নাজ, চিতা, ৩ যজ্ঞভূমদুর।

ক্কমিশগ্র—বিড়ঙ্গ।

ক্কম—সুপারী।

ক্কমুক—১ গুবাক-বৃক্ষ, ২ রক্তদারু-বৃক্ষ।

ক্কয়শীষ—কপিশীষ, হিংগল (?)।

ক্কাস্তা—বৃহতী।

ক্কমিকটক—১ বিড়ঙ্গ, ২ যজ্ঞভূমদুর।

ক্কমিগ্রী—সোমরাজী।

ক্রিমিশত্রু—রক্তপদ্পক, পালিতামাদার ।

ক্রিমিশাণ্ড—বিটুখদির, গুয়েবাবলা ।

ক্রব—১ রক্তকরবী, ২ ভুতাক্রুশ-বৃক্ষ,  
ভূতরাজ ।

ক্রুরকর্ম—১ কটু-তুন্দ্রিনী বৃক্ষ, ২  
অকপদ্পপী ।

ক্রুরগন্ধা—কম্বারীবৃক্ষ ।

ক্রুমুক—সুপারি ।

ক্রুরা—রক্তপদনব ।

ক্রোং—ক্ষুদ্র বৃক্ষ-বি° ।

ক্রোটন—[ ইং croton ] পুন্ডি-  
আদিবর্গের বৃক্ষ-বি° । মলক  
ঈপপদ্রু হতে আনীত । ইহার  
ডালে গাছ হয় ।

ক্রোড়কশেরুক—ভদ্রমুস্তা ।

ক্রোড়ুড়া—বড় থলকুড়ি ।

ক্রোড়পর্ণী—কণ্টকারিকা ।

ক্রোড়োট—১ মৃথা, ২ ভদ্রমুস্তা ।

ক্রোটফল—ইংগুদী ফল ( ? ) ।

ক্রোটুবিয়া—পৃথ্বীপর্ণী, চাকুলিয়া,  
স্থানবিশেষে বিরালছাই বলে ।  
পর্যায়—পৃথ্বী-পর্ণী, চিত্রপর্ণী,  
অহিপর্ণী, সিংহপৃচ্ছী ।

ক্রোটেক্স—শাদা আক ।

ক্রোট্রী—১ শূক্ৰ-ভূমিকুম্ভাণ্ড, ২  
লাংগলী ।

ক্রোড়াদন—১ পিপ্পলী, ২ মৃগাল, ৩  
ঘেঁচু ( ? ), ৪ চিণ্ডোটক তণ ।

ক্রীতক—১ করমচার বীজ, ২ বৃক্ষ-বি° ।

ক্রীতকা, ক্রীতকিকা, ক্রীতনী—  
নীল গাছ । ষষ্ঠিমধু দ্র° ।

ক্রুক্ষ—টীনে ধান ।

ক্রুগদা—হরিদ্রা ।

ক্রুতয়—কৃকর-শোকা ।

ক্রুতিবধ্বসী—বৃদ্ধদারক-বৃক্ষ ।

ক্রুতবৃক্ষ—মুচুকুন্দ ।

ক্রুপা—হরিদ্রা ।

ক্রুব—রাইসর্ষে° ।

ক্রুবক—১ আপাং গাছ, ২ রাইসর্ষে°,  
৩ রাজিকাবিশেষ, ৪ ভুতাক্রুশ ।

ক্রুবকৃৎ—ক্ষুপবিশেষ, ছিকনী ।

ক্রুবপত্রী—দ্রোণপদ্পদ্রী, ঘলঘসে ।

ক্রুবিকা—ওষধিবৃক্ষ, বৃহতিবিশেষ ।

পর্যায়—সপতন, পীততুলা,  
পুত্রপদা, বহুফলা, গোধিনী ।

ক্রুমাংশ—সজনে গছ ।

ক্রুয়তরু—স্থালীবৃক্ষ [ হি° বেনিয়া  
পিপার ] । পর্যায়—নন্দীবৃক্ষ,  
অশ্বখভেদ, প্ররোহ, গজপাদপ,  
ক্ষীরী ।

ক্রুয়নাগিনী—জীবন্তীবৃক্ষ ।

ক্রুয়পত্রা—দ্রোণপদ্পদ্রী ।

ক্রুয়দলা—চিল্লিশাক, ছোট বেতুরা ।

ক্রুয়দশক—১ সজনে, ২ মৃলা, ৩  
পলাশ, ৪ চুক্তিকা, ৫ চিতা, ৬ আদা,

৭ নিম, ৮ ইক্ষু, ৯ অপামার্গ, ১০ মোচা ।

ক্ষারদ্র—ঘণ্টাপারুল গাছ ।

ক্ষারপত্র—বেতো শাক ।

ক্ষারপত্রা—চিল্লিশাক ।

ক্ষারবৃক্ষ—মৃৎকবৃক্ষ । ঘণ্টাপারুল ।

ক্ষারমধ্য—আপাং ।

ক্ষারটক—১ ধব, ২ আপাং, ৩ কুণ্টক, ৪ দ্বিলাফলা, ৫ তিল, ৬ ঘণ্টাপারুল ।

ক্ষারটক—১ পলাশ, ২ হাড়ঘোড়া, ৩ আপাং, ৪ তেঁতুল, ৫ আকন্দ, ৬ তিল, ৭ নালজ (?) ।

ক্ষিতিক্ষম—খদিরবৃক্ষ ।

ক্ষিপ্ৰপাকী—১ গাণ্ধিভাট, ২ গন্ধভেদালিয়া ।

ক্ষীরক—ক্ষীরমোরটলতা (?) ।

ক্ষীরকণ্ঠকী—ক্ষীরীশবৃক্ষ ।

ক্ষীরকন্দা—কালো ভূইকুমড়া ।

ক্ষীরকাণ্ডক—১ মনসা, ২ আকন্দ ।

ক্ষীরকাণ্টা—বটীবৃক্ষ ।

ক্ষীরক্ষব—শিরগোলা গাছ ।

ক্ষীরদল—আকন্দ ।

ক্ষীরদ্রুম—অশ্বথবৃক্ষ ।

ক্ষীরনাশ—শাখোটবৃক্ষ, শেওড়া গাছ ।

ক্ষীরপণী—আকন্দ ।

ক্ষীরপলাশ—শাদা পেঁয়াজ ।

ক্ষীরবিষাণিকা—১ বিছটী, ২ ক্ষীরকাকলী ।

ক্ষীরবৃক্ষ—১ যজ্ঞভূমদ্র, ২ ক্ষীরকাবৃক্ষ, ৩ অশ্বথ, ৪ ক্ষীরিণী, ৫ ন্যাগোধ, ৬ মউয়া, ৭ পাকুড়, ৮ পারিশ ।

ক্ষীরমোচক—moringa hyperanthera.

ক্ষীরমোরট—লতাৰি, মোরটলতা ।  
পৰ্ণায়—সিতদ্র, স্তদল, ক্ষীরক ।

ক্ষীরলতা, ক্ষীরবিদারী—কালো ভূইকুমড়া ।  
পৰ্ণায়—মহাশ্বেতা, ঋক্ষগন্ধিকা, ইক্ষুবল্লরী, ইক্ষুবল্লী,

ক্ষীরকন্দা, পয়স্বিনী, ক্ষীরশক্তা, পয়ঃকন্দা, পয়োলতা, পয়োবিদারিকা ।

ক্ষীরশক্তা—ক্ষীরকাকোলী ।

ক্ষীরশূক্ল—পাণিফল ।

ক্ষীরশূক্লা—১ রাজাদনী, ২ শূক্লভূমিকুশ্মাণ্ড ।

ক্ষীরাত্মিকা—ক্ষীরই গাছ ।

ক্ষীরাবী—ক্ষীরই । পৰ্ণায়—গ্রাহিণী, কচ্ছরা, আগ্রমলো, মরুভবা ।

ক্ষীরাহব, ক্ষীরাহব—সরলদ্রুম ।

ক্ষীরিকা—ক্ষীরবিদারী, ক্ষীরবৃক্ষ, ক্ষীরখেজুর, পিণ্ডখেজুর ।  
খেজুর দ্র ।



ক্ষীরা—শসা দ্র° ।

ক্ষীরাই, ক্ষীরী—[স° ক্ষীরাবী] স্নদ্বি-  
আদিবগের বর্ষাষ্ম শাক্যব°, ক্ষীরুই  
গাছ, *euphorbia pilulifera*.  
ঘাসের মধ্যে জন্মে । গাছ ভাঙিলে  
দুধ বাহির হয় । প্রকারভেদ—  
(১) বড়ক্ষীরী—লতানিয়া গাছ ।  
পাতা খরলোমশা, পাতায় শিরা  
স্পষ্ট । (২) ছোটক্ষীরী—  
লতানিয়া গাছ, *e. microphylla*,  
পাতা ছোট, পাতায় শিরা দেখা যায়  
না, (৩) দ্বিধিকা, (৪) মনসা,  
(৫) আকন্দ, (৬) রাজাদনী,  
(৭) শিরোগোলা, (৮) বটবৃক্ষ,  
(৯) পাকুড়, (১০) সোমলতা,  
(১১) শ্যালীবৃক্ষ ।

ক্ষীরিণ—[ হি° ক্ষীরণী ; ও° ক্ষীরী ]  
বকুলাদিবগের তরুণবী,  
*mimusops hexandra*. পাতা  
চকচকে । ফুল ছোট আপাডুর ।  
ফল একবীজ ।

ক্ষীরিণী—১ বৃক্ষবী° । পর্যায়—  
কণ্ঠক্ষীরী, কণ্ঠগী, পটুর্কণিকা,  
ভিজদংশা, হৈমবতী, হিহদংশা,  
হৈমবতী, হিমাদিজা, পীতদংশা,  
যবচিণ্ট, হিমোভবা, হৈমী,

হিমজা । ২ গাণ্ডবা, ৩ ক্ষীর-  
কাঁসা, ৪ শ্বেতসারিবা ।

ক্ষুন্ন—রিঠেগাছ ।

ক্ষুণ্ণ—দেখান ।

ক্ষুতক—কালসরিষা ।

ক্ষুদ্রকণ্টকারী—অগ্নিদমনীবৃক্ষ ।

ক্ষুদ্রকণ্টকী—বৃহতী, গণিয়ারীবৃক্ষ ।

ক্ষুদ্রকণ্টকা—কণ্টকারিকা ।

ক্ষুদ্রকারিণিকা—ক্ষুদ্রকারবেল্লী, ছোট  
করেলা । পর্যায়—কুড়হণ্ডী,  
গ্রীকণিকা, প্রতিপত্রফলা, শুববী,  
কারবী, বহুফলা, ক্ষুদ্রকারিণিকা,  
কন্দফলা ।

ক্ষুদ্রক্ষুর—ক্ষুদ্রগোক্ষুর ।

ক্ষুদ্রধিদির—দধিদির ।

ক্ষুদ্রগোক্ষুরক—গোক্ষুরবৃক্ষবী° ।

পর্যায়—ত্রিকণ্টক, কণ্ট, বড়ক্ষ,  
বহুকণ্টক, ক্ষুর, গোকণ্টক,  
পলক্ষবা, ক্ষুদ্রক্ষুর, ভক্ষটক,  
শ্বলশৃঙ্গোটক, ইক্ষুগন্ধ, স্বাদকণ্ট ।

ক্ষুদ্রঘোলা—চিবিব্লিকা বৃক্ষ ।

ক্ষুদ্রচণ্ডু—কটুকা । পর্যায়—চণ্ডু ।

শূনকরচণ্ডুকা, স্বকসারভেদিনী, কটু-  
পত্রিকা ।

ক্ষুদ্রজাতিফল—আমলকী ।

ক্ষুদ্রজীর, ক্ষুদ্র জীরক—ক্ষুদিয়া  
জীরা ।

ক্ষুদ্রজীরা—জীবন্তী লতা  
 ক্ষুদ্রতুলসী—বাবুই তুলসীবি° ।  
 ক্ষুদ্রদূরালভা—দূরালভা দ্র° ।  
 ক্ষুদ্রদুঃস্পর্শা—অগ্নিদমনীবৃক্ষ ।  
 ক্ষুদ্রধাত্রী—ককটবৃক্ষ ।  
 ক্ষুদ্রপত্রা—চুকো পালং ।  
 ক্ষুদ্রপনস—১ লকুচ, মাদার, ২ ছোট  
 কাঁটাল ।  
 ক্ষুদ্রপাষাণভেদা—প্রস্তরভেদী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
 বৃক্ষ । পর্যায়—চতুঃপত্রী, পার্বতী,  
 নগভূ; অশ্বকেশু, গিরিভূ,  
 কন্দরোঃভবী, গিরিজা, নগজা ।  
 ক্ষুদ্রপোতিকা—মূলপোতী ।  
 ক্ষুদ্রবর্ষাভূ—রক্তপদ্রনবা ।  
 ক্ষুদ্রবল্লী—একরকম পাইশাক; মূল-  
 পোতিকা ।  
 ক্ষুদ্রবার্তাকিনী—শ্বেত কণ্টকারী ।  
 ক্ষুদ্রবার্তাকী—তিংবেগুন ।  
 ক্ষুদ্রবাস্তুকী—শ্বেতচিল্লীশাক ।  
 ক্ষুদ্রভণ্টাকী—তিংবেগুন ।  
 ক্ষুদ্রমস্তা—কেশদ্র ।  
 ক্ষুদ্ররসা—তিক্ত গুঞ্জলতা ।  
 ক্ষুদ্রশীষ—ময়ূরশিখাবৃক্ষ ।  
 ক্ষুদ্রশ্যামা—কটভীবৃক্ষ ।  
 ক্ষুদ্রশ্লেষ্মাত্মক—ভকবদ্রদারক ।  
 ক্ষুদ্রশ্বেতা—আল্বেস্ট্রপদ্মপী । অর্কাদি-  
 বর্গের ।

ক্ষুদ্রহিম্মদনিকা—কণ্টকারী ।  
 ক্ষুদ্রা—১ কণ্টকারী, ২ আমরুল, ৩  
 গড়েগড়ে খান ।  
 —ক্ষুদ্রাশ্বিনম্ভ—ছোট গণিয়ারী । পর্যায়  
 —তপন, বিজয়া, গণিকারিকা,  
 অরণি, লঘুম্ভ, তেজোবৃক্ষ,  
 তনুত্মা ।  
 ক্ষুদ্রাপামার্গ—রক্ত অপামার্গ ।  
 ক্ষুদ্রায়—কোষায়, কেওড়া গাছ ।  
 ক্ষুদ্রায়পনস—লাকুচ ।  
 ক্ষুদ্রায়া—আমরুল ।  
 ক্ষুদ্রায়িকা—[ হি° আবর্জিত, আবতা ]  
 পর্যায়—চাষেরী, চুক্রায়া, চট্টিকা;  
 লোগায়া, চতুঃপত্রী, লোগা, বোড়া,  
 অল্পপত্রিকা, অশ্বষ্ঠা, অম্বতী, অয়া;  
 দন্তশঠা, শাখায়া, অল্পপত্রী । oxalis  
 corniculata.  
 ক্ষুদ্রৈলা—ছোট এলাইচ ।  
 ক্ষুদ্রোদম্বরিকা—কাকোদম্বরিকা ।  
 ক্ষুদ্রোপদকনায়ী—মূলপোতী শাক ।  
 ক্ষুদ্রাকুশল—বিষ্বাস্তরবৃক্ষ ।  
 ক্ষুদ্রাভিজনন—রাইসর্বে ।  
 ক্ষুদ্রামার—অপামার্গ ।  
 ক্ষুদ্র—গোক্ষুর ।  
 ক্ষুদ্রক—১ তিলবৃক্ষ, ২ কোকিলাক্ষ, ৩  
 গোক্ষুর, ৪ ভুতাক্ষবৃক্ষ ।  
 ক্ষুদ্রপত্রিকা—পালং শাক ।

ক্ষুরাঙ্গ—গোক্ষুর।

ক্ষুরিকা—পালংশাক।

ক্ষেতপাপড়া—[ সঁ ক্ষেপপটক, ক্ষেত্রপাপড়া ; হিঁ দর্মপাপর ; তেঁ ভেরোনেলারেজ ; নেপাঁ পোরিত্রহো ; গোয়ানিজ—কাজুরি ; ইং two-flowered indian madder ] আচ্ছকাদিবর্গের বর্ষায় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, oldenlandia corymbosabiflora, o. herbacea, o. herbacea. এই চারা ভারতের সবটাই জন্মে; জলাভূমিতে; বর্ষার শেষে অক্ষুরিত, বসন্তকালে জন্মায়; গ্রীষ্মে শরিকিয়ে যায়। ফল ছোট, শাদা আষাঢ়-প্রাণে হয়। পাতা

ছোট ও সরু। ফুলের বোটা লম্বা সরু। পপট দ্র°।

ক্ষেত্রপপটি—বালকী, বাচ্চিকাকুড়; খেতপাপড়া। ক্ষেতপাপড়া, দ্র°।

ক্ষেত্রচিভিটা—কাকুড়।

ক্ষেত্রজা—১ শ্বেতকটকারী, ২ শশাঙ্গুলী, ৩ গো-মৃগিকা তৃণ, ৪ চণিকাতৃণ।

ক্ষেত্রদত্তী—শ্বেতকটকারী।

ক্ষেত্ররূহা—বাচ্চিকাকুড়।

ক্ষেত্রসম্ভব—চণ্ডশাক।

ক্ষেত্রসম্ভবা—শশাঙ্গুলী।

ক্ষেত্রসম্ভূত—কুন্দরাতৃণ।

ক্ষেত্রামলকী—ভুঁই আমলা।

ক্ষেত্রফলা—উদ্ভববৃক্ষ।

ক্ষৌদ্র—চম্পকবৃক্ষ।

[ ৮ ]

খগগড়—তৃণবি°। পর্ষায়—পোটগল; বৃহৎকাশ; কাকেক্ষুদ্র, baccharum spontaneum.

খগবক্ত—লক্কচবৃক্ষ।

খগশহু—পাশ্চিমগী, চাকুলে; hemionitis cordifolia, Rox.

খঞ্জকারি—সুস্না, খেসারী।

খটকা, খর—বেনা দ্র°। andropogon muricatus.

খট্টা—তৃণবি°, andropogon serratus.

খড়াকান ( দেশজ )—চর্ম ঘাস।

খড়ী—ধান্যাদিবর্গের তৃণবি°; saccharum fiescum. পূর্ববঙ্গে

জন্মে। আক গাছের ন্যায় ৪।৫  
হাত লম্বা হয়, কিন্তু ভিতর  
ফাঁপা।

খড়্গকোষ—লতানিলা গাছ, *scirpus*  
*maximus*.

খড়্গট—১ বৃহৎ কাশ, কাপড়, ২ খাগড়া,  
*saccharum spontaneum*.

খড়্গপত্র—খড়্গকোষ দ্র°।

খণ্ডকর্ণ—আলদুব°; শকরকন্দ  
॥ রাজব° ॥

খণ্ডশাখা—মহিবল্লী লতাবি°।

খণ্ডী—বনমদুগ°।

খণ্ডীর—পীতবর্ণ মদুগ°।

খণ্ডুল—*stercula urens*. সিংহল  
ও দাক্ষিণাত্যে জন্মে।

খদির—[ হি° খয়ের; তৈ° খদিরমু বা  
পোদলামানু; তা° বোদলয়;  
দক্ষিণে—কবাকিংকর, পঞ্জাব—  
খরেক ] খয়ের। ॥ ভাবপ্র° ॥ খদির  
শব্দে খয়ের, গছ, কাণ্ডত্বক ও  
কাণ্ডকে বুঝায়। খয়ের, শমী ও  
বাবলা গাছ একরূপ দোঁধিতে বলিয়া  
সধারণত লোকে সবগুলিকেই শমী  
ও বাবলা বলে। কোচবিহারে  
সর্বত্র প্রচুর পরিমাণে জন্মে।  
সেখানকার লোকে জ্বালানি কাষে  
ইহা ব্যবহার করে। (১) খদির,

গায়ত্রী—বাম্বুলাদিবর্গের বৃক্ষবি°,  
*acacia catechu*, *mimosa c.*

(২) সোমবল্ক—সাইকাটা a,  
*polycantha*; m. sama. (৩)

বিটখদির—গদুয়েবাবলা। দূর্গন্ধ-  
যুক্ত খয়ের, a. faruesiana. (৪)

বল্লীখদির—m. dumosa. (৫)  
তাম্রকণ্টক। (৬) অরি। (৭)

রক্তখদির—লাল খয়ের, *uncaria*  
*gambier*. আচ্ছুকাদিবর্গের

ক্ষুদ্রপাণ°। পাল্লা খয়ের। সিংহাপুর,  
মলাকা প্রভৃতি দেশে জন্মে।

(৮) শ্বেতখদির—সাদা খয়ের,  
পাপড়ি খয়ের। (৯) ক্ষুদ্র

খদির—দুর্খদির, সারখদির,  
মহাসার খয়ের গাছের নিৰ্বাসকে

খয়ের বলে। পানের সঙ্গে ব্যবহৃত  
হয়। বাজারে পাঁচ প্রকার খয়ের

দেখা যায়—১ পাপড়ি, ২  
জনকপুত্রী, ৩ পেস্তা, ৪ তিল, ৫

বেলগুটি। কৃত্রিম ও অকৃত্রিম  
ভেদে খয়ের দুই প্রকার। শাখা ও

পাতা সিঁধ করিয়া যে খয়ের পাওয়া  
যায় তাহা কৃত্রিম। আর কাঠের

ভিতর যে নিৰ্বাস সঞ্চিত হয়  
তাহা অকৃত্রিম। কৃত্রিম খয়ের দুই

রকম (১) সাদা ও (২) কালো।

সানা খয়ের ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।  
কালো খয়ের শিম্প ও রজনার্থে  
ব্যবহৃত হয় । প্রকৃতির প্রকারভেদে  
দুই রকম রং হয় । পর্যায়—  
বালতনয়, দন্তধারণ, তিক্তসার,  
কণ্টকীদ্রুম, বালপত্র, খদ্যপত্রী,  
ক্ষিতিক্ষম, সুশল্য, যন্ত্রাদ্র,  
জিহ্বাশল্য, কণ্ঠী, সারদ্রুম,  
কুষ্ঠারি, বহুসার, মেধ্য, বালপত্র,  
ককটী, কুষ্ঠহং, যদুপদ্রুম ॥  
রাজনি ভাবপ্র° ॥

খদিরকা—খয়ের ।

খদিরপত্রিকা—১ অরিমেদবৃক্ষ,  
গুমেবাবলা, ২ লজ্জালুলতা ।

খদিরপত্রী, খদিরা—লজ্জালুলতা ।

খদিরাষ্টক—১ খদির, ২-৪ ত্রিফলা,  
৫ নিম্ব, ৬ পলতা, ৭ গুলঞ্চ, ৮  
বাসক ।

খদিরিকা—লজ্জালুলতা, ২ লাক্ষা,  
গালা ।

খদিরী—১ লজ্জালুলতা, *mimosa*  
*pudica*. পর্যায়—নয়স্কারী,  
গণ্ডকালী, সভঙ্গ, গণ্ডকারী,  
শমীপত্রা, রক্তপত্রী, অজ্ঞানকারিকা,  
রাসনা । ২ হাড়গোড়া ।

খদিরোপম—কদর, কাঁটাবাবলা ।

খদ্যপত্রী—খদির ।

খদ্যোতম—একপ্রকার বিষাক্ত ফলযুক্ত  
বৃক্ষ ।

খপূর—১ সুপারি গাছ, *areca*  
*faufil* বা *catechu*. ২ সুগন্ধী  
তৃণবিঃ, *cyperus partenus*.

খমূলিকা, খম্বলী—কুন্তিকা, পানা ।

খয়ের—খদির গাছের নির্যাস ।  
খদির দ্র° ।

খয়েরমোরী ধান—ধান্যবি° ।

খয়েরশালি—ধান্যবি° ।

খরকাণ্টিকা—বলা, বেড়েলা গাছ ।

খরগন্ধনিভা—নাগবল, গোরখ-চাকুলে,  
*hedysarum lagopodioides*.

খরগন্ধা—নাগবলা ।

খরঘাতন—নাগকেশর, *mesua terrea*.

খরচ্ছদ—১ উলপত্ণ, উলখড়, ২  
ইংকট, ওকড়া, ৩ কুন্দরত্ণ, ৪  
শেওড়া ।

খরত্ব—অলম্বা, লজ্জালুবিশেষ ।

খরদ—পদ্ম ।

খরদলা—ডুমুর ।

খরদ্বষণ—ধূতরা ।

খরনাল—পদ্ম ।

খরপত্র—১ সেগুন, ২ ক্ষুদ্র তুলসী  
গাছ, ৩ যবনাল শর (?), ৪ মরুর  
বৃক্ষ, ৫ হরিদ্রগন্ধ কুশ ।

খরপত্রক—তিনকবৃক্ষ ।



খরপত্ৰী, খরপাণিনী—১ গোজিহ্বা  
বৃক্ষ, দারিয়া শাক ; ২ কাকডুম্বর ।

খরপাদাঢ়া—কপিথবৃক্ষ ।

খরপদুপ্প—নাগদানা ।

খরপদুপ্পা, খরপদুপ্পী—বাবুইতুলসী ।

খরপদুপ্পিকা—ববরাবৃক্ষ ।

খরমঞ্জরী—অপামার্গ ।

খরবটকা—তৃণ-বিশেষ ।

খরবল্লরী, খরবাল্লিকা, খরবল্লী—  
নাগবলা ।

খরমুজ, খরবুজ—[ স° ষড়্ভুজা ;  
খবুজ, নোমক ; হি° খরবুজা ;  
তে° মুলন-পাণ্ডু ; ম° খবুজ ; ও°  
তনিয়া শকরটেটী ; ক° ষড়্ভুজসোতে ;  
তৈ° খরবুজং ; ফা° খরপুজা, অ°  
বিস্তিথ ; ইং musk melon.]  
কুম্ভাডাদিবর্গের কাকুড় সদৃশ  
গাছ, cucumis melo. তরমুজ-  
জাতীয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ফল বি° ;  
কাবুল দেশে জন্মায় ।

খরশাক, খরশাকা—ভাগী, বামনহাটী ।

খরসোনি—লৌহিকালতা ।

খরস্কন্দ—পিয়াল গাছ ।

খরস্কন্দা—খেজুর গাছ ।

খরস্পর্শা—১ পীতপুষ্প, দেবদালী-  
লতা, ২ হলদে ফুল, ঘোষালতা ।

খরস্করা—১ কাঠমল্লিক, ২ ত্রিপদ-  
মল্লিক ।

খরা—দেবতাড়বৃক্ষ ।

খরাগরী—দেবতাড়বৃক্ষ ।

খরাহ্বা—বনজৈয়ান ।

খরী ( দেশজ )—ইক্ষুবিশেষ, sacc-  
harum semi-decembans.

খজু—খজুরবৃক্ষ ।

খজুয়—১ চক্রমদবৃক্ষ, চাকুন্দে ; ২  
ধূতুরা ; ৩ আকন্দ ।

খজুর, খজুরী—[ হি° খজুর ; ম°  
শিন্দী ; গুজ° খজুরী ; ক°  
ইণ্ডিল ; তৈ° ইণ্ডাচেট্ট, ফা°  
তমরুতর, খুর্মা ; আ খুর্মাতর ;  
ইং date palm, wild date  
tree ] খেজুর, খাজুর phoenix  
sylvestris. প্রকার ভেদ—  
(১) পিণ্ডখজুরী—[ স° মধু-  
খজুরিকা, রাজখজুরী, দ্বীপ্যা ;  
সুলেমানী, ছোহারা, হি° পিণ্ড-  
খজুর, ম° খজুরী ; গুজ°  
খজুর, খারক ; ক° সিংহ ইণ্ডিল ;  
তৈ° খজুরপ পণ্ডু, ফা° তমর  
রুতব, অ° খুদসমাতর, খুর্মাখস্ক ]  
পিণ্ডখেজুর, p. dactylifera.

আরব ও তুরস্ক জন্মে । খেজুর  
গাছের মত কেবল কাটা নাই ।

গোড়া থেকে কলাগাছের মত  
তেউড় জন্মায়। গাছ-পাকা খেজুর  
শুকাইলে খদ্দু, ও কাঁচা শুকাইলে  
ছোন্নারা বলে। (২) ভুখজুরী—

(ক) অতি ক্ষুদ্র গাছ, কাণ্ড নাই  
p. acculis, p. farinifera. ৮।১০

বৎসরের গাছ ৮।১০ আঙ্গুরের  
বড় হয় না। খেজুর গাছের মতো  
পাতা তবে ছোট, বিহারে জন্মে।  
বাঙলায় জংলী খেজুর। (খ)

অপর ভুখজুর—কাণ্ড ১ হাতের  
বড় হয় না। ইহা গোদাবরী  
সাগরসংগমের নিকট বালুকাময়  
ভূমিতে জন্মায়। ইহার ফল  
পাকিলে কালো রংয়ের হয় ও শাঁস  
খুব কম। (৩) বন্য খজুর—  
[ স° খজুরিকা; উ° খজির ]

বাঙলাদেশে জন্মায়।

খপঁরাল—বৃক্ষবিশেষ।

খবঁপটিকা, খবঁপটী—দ্রোণপদ্পী,  
ঘলঘসে।

খবঁরা—তরদীবৃক্ষ।

খবঁজ [ ফা° ]—খরমুজ দ°।

খল—তমালবৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

খলস্বী—আকাশবল্লী।

খলব—১ এক প্রকার ধান, ২ ছোলা;  
বুট।

খসরুদ—ক্ষীরীশবৃক্ষ।

খসখস—১ বেনা দ°। ২ গুজরাতে  
পোস্তর বীজকে খসখস বলে ॥  
রাজনি° ॥

খসতিল—খাখস, পোস্তদানা।

খসফেনক্ষীর—আফিঙ (?)।

খসম্বা—আকাশমাংসীবৃক্ষ।

খসবক্ত—লকুচ, ডেও।

খসকক্ষুদ্র (দেশজ)—একপ্রকার ডুমুর।

খাড়াবান (দেশজ)—চর্মঘাস।

খাগ, খাগড়, খাগড়া—[ ইং reed ]  
phragmites karka, sacc-

harum spontanum. স্থানবিশেষে

খাগ ও খাগড়া ভিন্নার্থে ব্যবহৃত

হয়। খাগড়া, যাহার মধ্যে শোষ

থাকে। খাগ যাহার মধ্যে শোষ

নাই।

খাজা কাঁঠাল (দেশজ)—যে কাঁঠালের

কোরা বেশি নরম হয় না।

খাজুর—খজুর দ°।

খাজুরচাড়ি—leonotis nepetioefolia.

খাড়া (দেশজ)—সজনের খাড়া বা  
ডাটা।

খানোদক—নারিকেল ফল ॥ ত্রিকান্ড° ॥

খামআলু (দেশজ)—আলুবি,

dioscorea alata. তালু দ°।

খামাচ (দেশজ)—লতাবিশেষ,

*mucunna nivea, corpopogon  
nivoves.*

খাজাল—খাম আল। আল দ্র°।  
খিন্নী, খিরণী—[ স° ক্ষীরী, রাজাদল,  
রাজাদনী, খীর্ণা; ম° খিরণী;  
গুজ° রামণ; তা° পন্ন; ক° খেশে  
মারিলে; ও° ক্ষীর°; হি° ক্ষীরণী]  
বকুলাদিবর্গের ছায়াতরুবি°;  
*mimusops indica, m.  
hexandra.* কাণ্ড সরল। পাতা  
লম্বা, চওড়ায় বড় ও মসৃণ,  
প্রত্যেক শাখায় একটি করিয়া ফুল  
হয়। ফুল ছোট এবং বসন্তকালে  
ফোটে। জলপাইয়ের ন্যায় ফল।  
ফলে দুধ আছে। পানফল ভক্ষ্য।  
পূর্ব-বাংলায় খিরণী জন্মান না,  
পশ্চিমবঙ্গে দেখা যায়।

খীর্ণা—খিন্নী দ্র°।

খুজলী ( দেশজ )—ছদ্মইলে চুলকানি  
ধরে। *hibiscus pistus.*

খুদিগুড়কা—*crozophora plicata.*

খুদিজাম—*antidesma panicu-  
latum.*

খুবানী—খোবানী দ্র°।

খুর—কুলের পাতা (?)।

খুচক—তিলবৃক্ষ।

খুদীজাম—*antidema paniculata.*

খুর্মা—খজুর দ্র°।

খেড়ী কলাই—শিম্বাদিবর্গের সরু

গাছবি°, *phaseolus*

*-aconitifolius,* বন্য মৃগকলাই-

এর মত। বিহার ও অসামে

আবাদ হয়। লোমশ গাছ, শূঁটি

লোমশ নহে।

খেওরা—একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°,

*sonnertia acida.*

খেজুর—খজুর দ্র°।

খেতপাপড়া—ক্ষেতপাপড়া দ্র°।

খেপূর ( দেশজ )—এক প্রকার ঘাস-

*scirpus hysoor.*

খেরমৃগ—ছোট মৃগ, খেরমূয়া;

*phaseolus mungo.*

খেসারী—[ স° সুস্না, খজকার,

খণ্ডিক; হি° খিসারী; ও° চণা ]

খেসারি, *lathyrus sativus.*

শিম্বাদিবর্গের কলাইবি°। কোথাও

কোথাও ইহাকে ‘খোড়িয়া,’

‘ছোট মটর’ বলে। উপপত্র বড়

পাতার মত। শূঁটি চ্যাণ্টা।

খোটি—পালং শাক ॥ শব্দচ° ॥

খোবান—[ ফা° খুবানী; ইং *apricot* ]

বাদামের মত গাছ, *prunus*

*armeniaca.* পশ্চিম হিমালয়ে

জন্মে, গাছের শুকনো ফল।

[ গ ]

গঙ্গাপালংগ—বনপালং ।

গজকটা ( দেশজ )—লতানিয়া গাছ,  
wibera scandeus.

গজকণা—গজপিপূল ।

গজকন্দ—হস্তিকন্দবৃক্ষ, হাতিকাদা ।

গজকুম্ভ—নাগকেশর ॥ চক্রদ° ॥

গজকৃষ্ণা—গজপিপূল ।

গজার্চিভিটা—গজপ্রিয়া চিঁভটা,  
ইন্দ্রবারুণী ॥ রত্নমালা° ॥ রাখাল-  
শশা ।

গজদণ্ডফলা—ডঙ্করীলতা ॥ রাজনি° ॥  
চিঁচিহ্নে ।

গজপাদপ—স্থালীবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র° ॥  
বেলিয়াপিপর ।

গজপিপূল, গজপিপুলী—[ স°  
ইভোষণা, বসার; ইং fruit of  
piper-chaba ] কচনাদিবর্গের  
অবরোহিণী, scindapous  
officinalis. প্রত্যেক গ্রন্থি  
হইতে শিকড় বাহির হইয়া অন্য  
গাছে চড়ে । পর্যায়—করিপিপুলী,  
ইভ-কণা, কপিবল্লী, কপিপল্লিকা,  
কপিপল্লিকা, শ্রেয়সী, গজাহবা,  
কোলবল্লী, চব্যফল, চব্যজা,

ছিদ্রবৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থি, তৈজসী,  
বতুল; স্থূলবৈদেহী শব্দ° অম° ॥

গজপদুপী—নাগপদুপালতা ॥ শব্দার্থ-  
চিস্তামণি ॥

গজপ্রিয়া—শলকীবৃক্ষ ।

গজবল্লভা—১ গিরিকদলী, পাহাড়ে  
কলা, দয়াকলা, ২ শলকীবৃক্ষ ॥  
রাজনি° ॥

গজবিভট্ট—শসাবি°, cucunis  
madraspatarnus.

গজভক্ষক—অশ্বথবৃক্ষ ।

গজভক্ষা, গজভক্ষ্যা—শলকীবৃক্ষ  
॥ শব্দরত্ন° অম° ॥

গজা-আলু—আলু দ্র° ।

গজাধা—চক্রমর্দবৃক্ষ, চাকুন্দে ॥  
রাজনি° ॥

গজাদন, গজাদনী—অশ্বথবৃক্ষ ।

গজাদিনামন্—গজপিপুলী ।

গজারি—বৃক্ষাব° । ঢাকা অঞ্চলে গরান  
বৃক্ষকে গজারি বা গজী এবং  
চোরাকে গোচি বলে । ইহার পাতা  
বড়, ড়ক স্থূল ।

গজাশন—অশ্বথবৃক্ষ ।

গজাশনা—শলকীবৃক্ষ ॥ রত্নমা° ॥

গজাসন—১ যজ্ঞভূমুর । ২ গাঁজা বা  
সিন্ধি, *canabis sativa*.

গজাহ্ব—গজপিপলী ।

গজী—বৃক্ষবি°, *hedyotis scandens*.

গজেষ্টা—ভুইকুমড়া ।

গজোপকুল্যা—গজপিপলী ॥ ভৈষজ্য-  
রত্ন ॥

গজোষণা—গজপিপলী ॥ রাজনি° ॥

গজা—[ স° গজ ; ইং hemp ] গজা,  
*canabis sativa*, সিন্ধি গাছের  
পাতার নাম সিন্ধি, মঞ্জরীর নাম  
গাঁজা, আর নিষারের নাম চরস ।  
[ সিন্ধিকে স° ভজ, বিজয়া ; বাং  
ভাঙ, সিন্ধি ; হি° ভাঙ, সবজি ;  
তা° গজাইলাই ; তে° গজা অকু ; ও°  
গজা ; ম° ভজ ]

গড়গড়, গড়গড়া । ( দেশজ )—[ স°  
গবেধুকা ; ও° গরগড় ; ইং Job's  
tears grass ] ধান্যাদিবর্গের  
ঘাসবি°, *coix barbata*, c.  
*lachryma-jobi*. দীর্ঘায়ু, প্রায়  
২৩ হাত লম্বা । ফল গোলাকার,  
ক্ষুদ্র ।

গড়গোয়ালিয়া—তৃণবি°, *vitis*  
*glancas*.

গড়মুন্দর—বৃক্ষবি°, *mimosa*  
*arabica*.

গণকর্ণিকা—ইন্দ্রবারুণী ॥ রাজনি° ॥

গণরূপ—আকন্দ ॥ রাজনি° ॥

গণরূপিন—শ্বেতাকবৃক্ষ ॥ রত্নমা° ॥

গণিকারিকা—[ স° অগ্নিমস্ত, তর্কারী,

বৈজয়ন্ত ; কো° গয়েন্দারী, গম্ভদারী ;

হি° অরণী, অলেখু ; ম° থোরএরণ ;

ও° অরণী, ক° নরুখল ; তৈ°

নেলিচেট্র ; উ° অলিবথ ; আসাম-

গণিয়ারী ] গণিয়ারী, অগ্লাম্ব,

॥ রাজনি° ॥ *premna spinosa*.

বহু শাখা-প্রশাখাযুক্ত চিরায়ামূল

বৃক্ষবি° । ১০।১২ হাত উচ্চ । নদীর

নিকটে হয় ক্ষুদ্রাগ্নিমস্ত—

ভাণ্ডারাদিবর্গের ছোট গাছ,

*premna serratifolia*, p.

*integrifolia*. সমুদ্রের কাঠ ও

পাতা সুগন্ধ । ফুল ছোট, হলদে

রঙের আমেজযুক্ত । পূর্বকালে

ইহার পাতা খসিয়া অগ্নি উৎপাদন

করিত । পাতা অভিন্নমুখী,

মৎস্যাকার । পর্যায় — শ্রীপর্ণ,

গণিকা, জয়া, তেজোমস্ত,

জ্যোতিষ, পাবক, অরণি, বহুমস্ত,

মণ্ডন, গিরিকর্ণিকা, অগ্নিমণ্ডন,

তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা, অরণীকেতু,

শ্রীপর্ণী, কণিকা, নাদেয়ী, বিজয়া,

অনন্তা, নদীজা ।



গণিকারী—পুষ্পবৃক্ষি° । বসন্তকালে  
ফুল ফোটে । পর্যায়—কাণ্ডনিকা,  
কাণ্ডনপুষ্পী, বসন্তদুতী, গন্ধকুসুম,  
অলিমোদা, বাসন্তী, মদন-মাদনী ।

গণিয়ারী—গণিকারিকা দ্র° ।

গণেশকুসুম—রক্তকরবী ॥ রাজনি° ॥

গণ্ডকারী—খদির-বৃক্ষ ॥ শব্দচ° ।

গণ্ডকালী—খদিরী-বৃক্ষ ।

গণ্ডগায়—ফলবি° ( ? ) ॥ শব্দ-চিন্তা° ॥

আতা [ হি° সারিকা ] ।

গণ্ডদুর্বা—[ হি° দুর্বিপাৎ ] গাটিয়া

বা গেটে দুর্বা ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

পর্যায়—গণ্ডালী, অতিতীয়া,

মৎস্যাক্ষী, বাহুগী, মীনপর্ণী,

সুচীনেত্রা, শ্যামগ্রন্থি, গ্রন্থিলা,

গ্রন্থিপর্ণী, সুচীপত্রা, শ্যামকান্তা,

জলস্থা, শঙ্কলাক্ষী, কলায়া,

ত্রিা ।

গণ্ডমালিকা—লজ্জালতা ॥ রত্নমা° ॥

গণ্ডারি—কোবিদার ॥ ভাবপ্র° ॥

গণ্ডালী—১ শ্বেতদুর্বা, ২ সর্পাক্ষী-

বৃক্ষ ।

গণ্ডীর—সমষ্টিলা° ( ? ), শসা

( ? ) ।

গণ্ডীরী—সেহু-ডবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥,

সিজ ।

গণ্ডগাছ—[ স° অগদ ; ও° বারবর্ষী ;

ইং american aloe ] বিদেশ  
হইতে আনীত ক্ষুপীবি°, agave  
americana. পাতা বড়, মোটা,  
শাসাল, ধারে ধারে কাঁটা আছে,  
প্রায় ১২ বৎসর পরে ফুল ধরে ।  
ফুল শাদা । পাতার আঁশ হইতে  
দাড়ি তৈয়ারি হয় । আনারস দ্র° ।

গন্ধকন্দ—কেশদুর ।

গন্ধকাষ্ঠ—বৃক্ষবি°, ligum aloes.

গন্ধকুসুম—গণিয়ারী ॥ রাজনি° ॥

গন্ধখেড় ( ? )—ভূতৃণ, গন্ধবেণ ।

গন্ধগুণা—[ ইং smoth grass ]

তৃণবি°, andropogon

glaber.

গন্ধজটিলা—বচ ( ? )

গন্ধজাত—তেজপাত ।

গন্ধতৃণ—শালিধান্যবি° ।

গন্ধতৃণ—বেণা । পর্যায়—সুগন্ধি,

ভূতৃণ, সুরম, সুরভি, মধুবাস,

অতিচ্ছত্রক ।

গন্ধতৃণ—এলবালুক ॥ রাজনি° ॥

গন্ধদলা—বনযমানী ।

গন্ধদারু—চন্দন ।

গন্ধদ্রব্য—নাগকেশর ॥ ত্রিকা° ॥

গন্ধন—গন্ধতৃণ । শব্দার্থচিন্তা° ॥

গন্ধনকুলী, গন্ধনাকুলী—[ স° সর্পাক্ষী ;

তা° কিরিপদুরন্দন ; তে° সর্প

শীতেট ] গম্ভাতীর গাছ ।  
 ॥ ভাবপ্র° রাজনি° ॥ রাস্নাবি°,  
*acamphe papillosa*, *ophior-*  
*rhiza mungos*, *opioxyton*  
*serpentina*. পর্যায়—মহাস্থগন্ধা,  
 সুবহা, সর্পাক্ষী, ফণিহস্ত্রী,  
 নকুল্যাঢ়া, অহিভুক, বিষমদানিকা,  
 অহিমদনী মহাহিগন্ধা, অহিলতা ।  
 ২ চই, ৩ কন্দবি° ।

গন্ধনামন—জালতুলসী ।

গন্ধানিলয়—নবমালিকা (?) ।

গন্ধনিগা—গন্ধপত্রা, শঠীবিশেষ ।

গন্ধপত্র—১ শ্বেত তুলসী ॥ রত্নমা° ॥ ২  
 মরুবকবৃক্ষ, ৩ বিবব ॥ রাজনি° ॥

গন্ধপত্রা—শঠীবিশেষ । মালবদেশে  
 চলিত কথায় পলাশ ।

গন্ধপত্রিকা—অঙ্গমোদা ॥ রাজনি° ॥

গন্ধপত্রী—১ অশ্বগন্ধা, ২ বনধোয়ান ।

গন্ধপলাশিকা—হরিদ্রা ।

গন্ধপলাশী—শঠী, ॥ ভাবপ্র° ॥  
*curcuma zerumbet* । ২

আমাদা ॥ সমথ° ॥

গন্ধপীতা—শঠী ।

গন্ধপুষ্প—১ বেতসবৃক্ষ ॥ শব্দরত্ন° ॥,  
 ২ অক্টোটবৃক্ষ, ধলা আঁকড়া  
 ॥ জুটা° ॥, ৩ চালতে গাছ, ৪  
 অশোকগাছ ॥ রাজনি° ॥

গন্ধপুষ্পা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ কেতকী  
 বৃক্ষ, ৩ গণিকারীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গন্ধকর্ণিজবৃক্ষ—রক্ততুলসীবৃক্ষ

॥ রাজনি° ॥

গন্ধফল—১ কপিথবৃক্ষ, ২ বিবববৃক্ষ,  
 ৩ তেজঃফলবৃক্ষ, তেজোবল

॥ রাজনি° ॥

গন্ধফলা—১ প্রিয়দ্ববৃক্ষ ॥ শব্দরত্ন° ॥

২ ভুইকুমড়া, ৩ শল্লকীবৃক্ষ

॥ রাজনি° ॥

গন্ধফলী—১ চম্পককণিকা, কাটালে  
 চাপা ॥ বিশ্বকো° ॥ ২ প্রিয়জ ।

গন্ধবধু—শঠী ।

গন্ধবন্ধু—আমবৃক্ষ ॥ শব্দর° ॥

গন্ধবল্লরী—লতাবি° ।

গন্ধবহল—১ সিতাজকবৃক্ষ, ২ শ্বেত  
 তুলসী ।

গন্ধবহুল—গন্ধগালি ।

গন্ধবহুলা—গোরক্ষীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥  
 মালবদেশে পাওয়া যায় ।

গন্ধবাকুচী—লতাকল্লুরী ।

গন্ধবিরজা—[ স° সরলদ্রু, শ্রীধাসসার,  
 গন্ধরস ; তা° সরল দেবাদ্রু ; তে°  
 দেবাদ্রুচেট্ট ; ইং long-lived  
 pine ] গন্ধবিরজা, *pinus*  
*longifolia*, *boswelhia*  
*thuifera* সচরাচর ধূপের জন্য ও

প্রলেপের জন্য ব্যবহৃত হয়।  
সরল বৃক্ষবি। হিমালয়প্রদেশে  
জন্মে।

গন্ধবৃক্ষ—শালগাছ; shorea  
robusta.

গন্ধবেনা—[ স° গন্ধতৃণ; ভুজুগ; ইং  
lemon grass ] ধান্যাদিবর্গের  
তৃণবিশেষ, andropogon shoe-  
nantus. বেনাগাছের মত। পাতা  
হইতে সুগন্ধী তৈল প্রস্তুত  
হয়।

গন্ধভদ্রা—গন্ধভাদালী।

গন্ধভাণ্ড—গাঁধিভাট। পর্যায়—  
নন্দিবৃক্ষ, তাম্রপাকী, ফলপাকী,  
গীতক, গন্ধমুন্ড, ক্ষিপ্ৰপাকী  
॥ বৈদ্যকরত্নমা ॥

গন্ধভাদালী, গন্ধভাদুলী—[ স°  
প্রসারিণী, গন্ধভদ্রা, গন্ধালি; ও°  
পসারুণি; ইং dog's bane ]  
গন্ধভাদালিয়া, গাঁদাল, গাঁধাল,  
hedystis villosas, poederia  
foetida, আচ্ছূদাদিবর্গের  
লতাবি। পাতায়, ডাঁটার, ফুলে  
দুর্গন্ধ। ফুল ভাদ্র-আশ্বিনে  
ফোটে।

গন্ধমাংসী—জটামাংসী (?)।

গন্ধমালতী—বৃহৎ লতানে গাছ—

aganosma caryophyllata.  
echites c. মালতী দ্র°।

গন্ধমুন্ড—লতাবি; hirciscus popu-  
leneoides. গন্ধভাদুলিয়া,  
গন্ধভাণ্ড দ্র°।

গন্ধমূল—কুলঙ্গন-বৃক্ষ।

গন্ধমূলক—শঠী ॥ গন্ধরস° ॥

গন্ধমূলা—১ শল্লকী, ২ শঠী ॥  
রাজনি° ॥

গন্ধমোদনী—১ চম্পককলিকা, কঠালে  
চাঁপা, ২ চম্পকপুষ্প কালকা।

গন্ধমোহিনী—চম্পক কলিকা ॥ রাজনি° ॥

গন্ধরস—[ স° শল্লকী ] শলাই, রসা,  
gendarussa vulgaris. শলাই  
গাছের রসকে গন্ধবিরজা বলে।

গন্ধরাজ—[ স° মৃদুগর, ইং  
cape jasmine ] আচ্ছূদাদিবর্গের  
ক্ষুদ্রপবি, gardenia florida.  
চীনদেশ থেকে আনীত। ফুল বড়,  
সাদা ও ভুগন্ধযুক্ত। গাছ প্রায়  
৪ হাত উঁচু হয়।

গন্ধরুহা—কাঠমল্লিকা। পর্যায়;  
মদয়ন্তী, মোদয়ন্তি, সরপ্রবা ॥  
রাজনি° ॥

গন্ধবৃদ্ধ—শঠী।

গন্ধবৃহন্ত, গন্ধবৃহন্তক—এরন্ড-বৃক্ষ,  
ricinus communis.

- গন্ধবন্ধু—শঠী ।  
 গন্ধবন্ধু—আম্রবৃক্ষ ।  
 গন্ধবল্লরী—লতা-বি° ।  
 গন্ধবহুল—১ সিতাজকবৃক্ষ, ২ শ্বেত  
 তুলসী ।  
 গন্ধবহুল—গন্ধশালি ।  
 গন্ধবহুলা—গোরক্ষী । মালবদেশে  
 পাওয়া যায় ।  
 গন্ধবাকুচী—লতা-কস্তুরী ।  
 গন্ধবীজা—মেথী° রাজনি° ॥  
 গন্ধবৃক্ষ—শালবৃক্ষ° রাজনি° ॥  
 shorea robusta.  
 গন্ধলতা—প্রিয়ঙ্গু° শব্দচ° ॥  
 গন্ধশঠী—শঠী ।  
 গন্ধশাক—গৌরস্বর্ণ শাকবি° ।  
 গন্ধশালী—ধান-বিশেষ । পর্যায়—  
 কল্মাষ, গন্ধাল, উত্তমোত্তম,  
 সুগন্ধি, গন্ধবহুল, সুরভি, গন্ধত-  
 ডুল, সুগন্ধশালী° রাজনি° ॥  
 গন্ধসার—১ চন্দনবৃক্ষ° অম° ॥ ২  
 মৃগরবৃক্ষ° রাজনি° ॥ ৩  
 আমআদা ।  
 গন্ধসারণ—মৃগরবৃক্ষ° রাজনি° ॥  
 বৃহন্নখী গাছ ।  
 গন্ধা—১ চম্পককলিকা° শব্দর° ॥ ২  
 শঠী° রাজনি° ॥ ৩ শালপর্ণী,  
 শালপাইন গাছ, gangetic  
 hedysarum.° অমরটীকা ॥  
 গন্ধাঢ্য—নারজকবৃক্ষ ।  
 গন্ধাঢ্য—১ স্বর্ণযদ্বী, হলদে বর্ডাইফুল,  
 ২ তরুণীপদ্মে, ৩ গন্ধভাদলী, ৪  
 শতপত্রী, গোলাপ ।  
 গন্ধালা—জীয়তী গাছ, celtis  
 orientalis.  
 গন্ধালিগর্ভ—ছোট এলাচ° রাজনি° ॥  
 গন্ধালী—গাখাল, গাখালী, paderia  
 foetida. পর্যায়—প্রসারণী,  
 ভদ্রপর্ণী, কটন্তরা, গন্ধাঢ্য, সরণা,  
 রাজবালা, ভদ্রবালা, সারণী ।  
 গন্ধাল—ধান্যবি° ।  
 গন্ধাহবা—রক্ততুলসী ।  
 গন্ধিপর্ণ—সপ্তছদবৃক্ষ, ছাতিম ।  
 গন্ধী—তৃণকুসুম° রাজনি° ॥  
 xanthophyllum virens.  
 গন্ধোৎকটা—দমনকবৃক্ষ ।  
 গন্ধোলি—১ সুগন্ধিতৃণবি°, cyprus  
 rotundus. ২ শস্যবি° ।  
 গবগ্র—খড় ।  
 গবাকী—১ রাখালশস্য । পর্যায়—  
 ত্রৈলী, ইন্দ্রবারুণী, চিত্রা,  
 গজার্চিভিটা, মৃগেবাব, পিটস্কোটি  
 বিশালা, মৃগাদশী° রত্নমা° ॥  
 ২ শেওড়া° রাজনি° ॥ ৩ অপচিতা ।  
 গবাদন—ঘাস ।  
 গবাদনী—অপরাজিতা ।

গবাদনী—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ নীল  
অপরাজিতা।

গবেশনা—গোরক্ষচাকুলে।

গভীকা—গাভার।

গম—[ স° গোধূম, মহাগোধূম ; হি°  
গেহু ; ম° গহু ; ও° ঘউ ; ক°  
গোদি ; তে° গেন্দুল্ল্য ; কা°  
গম্বম্ ; অ° হিস্তে ; প° খানকা ;  
ইং wheat ] গম, triticum  
vulgare, ভারতবর্ষের মধ্যে  
মূলতান, পঞ্জাব, সিন্ধু,  
রাজপুতানা, সম্বলপুর, জম্বল-  
পুর, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ,  
বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে  
সর্বপ্রকার গম জন্মে, ইংলণ্ড,  
রুশদেশ ও চীনদেশেও প্রচুর জন্মে।  
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশেও এক প্রকার  
সাদা গম জন্মে—নাম দাদবানি,  
পঞ্জাবে নানা জাতীয় গম জন্মে  
তাহার মধ্যে দুই প্রকার গমের  
শুধা আছে ; একের রঙটি  
কালো ও অন্যের হলুদ রংয়ের  
হয়। অসাধারণ চার প্রকার গম  
জন্মে—(১) সফেদ, (২) ঘেরিপবা  
(শুধা নাই), (৩) রমোদবা, (৪)  
লালিয়া। কাঠিয়ারাড়ে গমের  
ময়দা কিছ্র কালো হয়। বাংলা-

দেশে চার প্রকারের গম আছে—(১)  
দুধিয়া, (২) গামালী, (৩)  
গম্বাজলী, (৪) খেড়ী।

গভারিক—গাভারীওক্ষ ॥ রাজানি ॥

গভারী—[ স° গ্রীপণী, গাভারী ;  
হি° খভারি ; ম° শিবন গভারী ; আ°  
গমারি ; গুজ° শবন্য ; ক° সীবনী ;  
তে° সালান্ডব্দিটি বেটু ; কো°  
গামারী ] গামীর, গভার, যদপনি ; ক্র ;  
গামার, গামারী, gmellna arbo-  
rea, বহু শাখাবিশিষ্ট সুউচ্চ  
বিশাল ছায়াতরু। বাঙলাদেশে  
খুব কম দেখা যায়। কাণ্ড, দীর্ঘ  
কাণ্ডের ছাল মোটা ও শাদা। ফুল  
বড় ; আকৃতি লাউয়ের মত, স্বাদ  
অন্নমধুর। পাতা বড় পানের মত।  
পর্যায়—গ্রীপণী, সর্বতোভদ্র ;  
কাশ্মরী, মধুপর্ণিকা, কাশ্মর্য,  
কাশ্মরী, ভদ্রা, গোপভদ্রিকা,  
কুমুদা ; সদাভদ্রা, কটফলা,  
কৃষ্ণবস্তিকা, কৃষ্ণবস্তা, হীর্য,  
সর্বতোভদ্রিকা, সিন্ধপণী, সুভদ্রা,  
কভারী, বিদারিণী, ক্ষীরিণী,  
মহাভদ্রা ; মধুপণী, স্বরুভদ্রা, কৃষ্ণা,  
অপূর্ণতা, রোহিণী ; সৃষ্টি,  
হুলজ্জা, মধুমতী, সুফলা, মহা-  
তুমুদা, সুদৃঢ়তা, ॥শব্দক°, শব্দর° ;

গম্মা আলু—আলু দু°।



গয়াবথ—অবথ বৃক্ষবিশেষ, ficus  
rumphii blume.

গরম—কুম্ভার্জক, কুম্ভতুলসী ।

গরনাশিকী—পীতবর্ণ দেবদালী লতা ।

গরা—দেবদালী লতা ॥ রাজনি° ॥

গরাগরী—দেবতাড়বৃক্ষ ।

গরাণ, গরান—[ ইং mangrove ]

ছোট গাছবি°, ceriops condo-

lleana, c. roxburghiana,

সিন্ধুপ্রদেশে ও সুন্দরবনে জন্মে ।

প্রায়ই সমুদ্রের ধারে ও গজার

মোহনার কাছে জন্মে । ইহার ডাল

থেকে ঝুরি নামে । ইহার খঁটিতে

এদেশে খোলার ঘর ও অন্যান্য ঘর

তৈয়ারী হয় ।

গরাণ, গরাণীয়া আলু—আলু দ° ।

গরিকলাহ—[ হি° ভাটকলাই ; ইং

soy bean ] শিম্বাদিবগের কলাই-

বি°; glycine soja . জাপান ও

চীন দেশ হইতে আনীত হইয়া

পূর্ববাংলা ও উত্তরবঙ্গে ইহার

আবাদ হয় । জাপানীদের ইহা

প্রধান খাদ্য । পাতা ও রোয়াযুক্ত ;

প্রত্যেক খঁটিতে ৩-৪টি কলাই

থাকে ।

গরী—দেবতাড়বৃক্ষ ।

গরুড়—আরণ্যশাক, গুরুর, poly-

podium, ফুল হয় না, রাসনা-

জাতীয়, সুন্দরবনে ও বাংলাদেশে

দেখা যায় । অন্য বৃক্ষে জন্মে ।

পাতা শক্ত ও পাতার শিরার ওপর

রেণুখলী জন্মে ।

গরুড়বেগা—লতাবি° ॥ বৃহৎস° ॥

গরুড়চাঁপা—গড়রীয় চাঁপা [ স°

ক্ষুদ্রাদি চম্পক ] plumeria

acutifolia poir. পর্বস—স্তম্ভ,

নাগচম্পক, ফণিচম্পক ।

গর্জন—উচ্চতরুবি° । (খুলিয়া গর্জন )

dipterocarpus turbinatus

gaertn. ২ তেলিয়াগর্জন, d.

alatus Roxb. চট্টগ্রামে হয় ।

ইহা হইতে তেল হয় । বর্ষাকালে

ফুল ও ফল জন্মে ।

গর্জর—মূলবি° । গাজর, daneus

carota.

গর্জফল—বিকটকবৃক্ষ ॥ রাজনি° ।

গদভ—১ শ্বেতকুমুদ ॥ রত্নমা° ॥ ২

বিড়গ ॥ রত্নমা° ॥

গদভশাক—বামনহাটি ॥ জটধর ॥

গদভশাখী—ভাগী ॥ রাজনি° ॥

গদভা—শ্বেতকটকারী ॥ ভাবপ্র° ॥

গদভাড—গাম্ভিহাট বা পাকুর গাছ ।

ইহার পাতা, কাণ্ড ও ফল অবশেষ

ন্যায় । পর্বস—কন্দুরাল, কপা-

তন; সুপাশ্বক, প্রক্ষশদ্রী, প্রব,  
কমন্ডল, প্রাক্ষশ, কন্দরালক ।

গর্দভাডক—পাকড় গাছ ।

গর্দভাহর—কুমুদ বা শালুকবি ।

গর্দভী—১ অপরাধিতা, ২ শ্বেতকট-  
কারী, ৩ কটভী ॥ রাজনি ॥

গর্ধ—গর্দভাড-বৃক্ষ ॥ শব্দর ॥

গর্ভকর—পদ্রজীব বা জীয়াপদ্রতের  
গাছ ।

গর্ভঘাতিনী—মাতালিকাবৃক্ষ ॥ রত্নমা ॥

গর্ভদ—পদ্রজীব, জীয়াপদ্রতা ॥  
রাজনি ॥

গর্ভদা—শ্বেতকটকারী ।

গর্ভদাত্রী—ক্ষুপরি । পর্যায়—পদ্রদা,  
প্রজাদা, অপতাদা, সৃষ্টিপ্রদা,  
প্রাণমাতা, তাপসদ্রুমসমিভা ।

গর্ভনুদ—কলিকারী, ঈশলাক্ষুদে  
॥ ভাবপ্র ॥ বিষলাক্ষুলিয়া গাছ ।

গর্ভপাতন—রীঠাকরজ ।

গর্ভপাতিনী—কালিকারীবৃক্ষ, ঈশলা-  
ক্ষুদে ॥ রাজনি ॥

গর্ভপ্রাবিন—হেঁতাল গাছ ॥ রাজনি ॥

গর্ভগী—ক্ষীরাই গাছ ॥ শব্দচ ॥

গম্ভূদ, গম্ভূটিকা—মেড়ুরা ধান ।  
রত্নমা ॥

গম্ভূট—মেড়ুরা বা মাড়ু ধান ॥ চরক ॥

গম্ভূৎ—তৃণধান্যবি ॥ অম ॥

গম্ভেটিকা—জরডীতৃণ ॥ রাজনি ॥

গলা—মজ্জালুলতা ।

গাংবেগা—নদীতীরস্থ বেণাতৃণবি ।

গাঁজ—[ স° গঞ্জ, গঞ্জা ; ও° চুগ্ধরিয়া-  
দল ; হি° গাজ ; ইং chara ]  
জলজ শাকবি । ফুল হয় না ।  
পুষ্করিণী ও স্থির জলে জন্মায় ।  
ডাঁটা সরু-সরু, সবুজ রং-এর ।  
পাতা নাই ।

গাঁজা—[ স° গঞ্জে ; ও° গঞ্জা ; হি° গাজা,  
ভাং ; তা° গাঞ্জাইলাই ; তে° কলম—  
বেট ; ম° ভাঙ্গা, কাম্বীরবাছি ; ইং  
hemp ] ভাং । বর্ষজীবী

উদ্ভিদ, cannabis sativa.  
৪-৮ ফুট লম্বা । কাণ্ডের উভয়  
দিকে পশ্ট হয় । ফল ও বীজ ;  
চ্যাপ্টা, ফলের গায়ে কাঁটা থাকে ।  
ইহার আদি জন্মস্থান—সাই-  
বেরিয়া । ভারতে, উড়িষ্যা ও  
হিমালয়ের পাদদেশে অরণ্যে জন্মে ।

পর্যায়—গাঁজকা, বজ্রদারু, ভাঙ্গা,  
ভরিতা, গজাশন, গজাকিনী,  
কুণারি, মাতুলী, মাতুলানী,  
মাদিনী, শক্ৰাশন, ত্রৈলোক্যবিজয়া-  
ইন্দ্রাশন, জয়া, বীরপদ্রা, চপলা,  
অজয়া, আনন্দা, প্রকাশিনী,  
হর্ষিণী ।

গাঁদা—গোঁদা দ্র° ।

গাখাল—[ স° গাম্খালী; গাম্খভদ্রা, প্রসারণী; ও° পসারুণি ] আচ্ছদ-কাঁদিবর্গের দুর্গন্ধরোহিণী; *paederia foetida*. শরৎকালে ফোটে ।

গাফেরদুক—গোরক্ষতন্ডুলের বীজ ।

গাফেরদুকী—গোরক্ষতন্ডুলা ।

গাফেরদুহী—নাগবল ॥ রাজনি° ॥

গাজর—[ স° গর্জর, পি° ডমূল; হি° গাজর; তে° পিতাকন্দ; তা° গাজর; ম° ও কর্ণা° বাট্লামুলা; ই° carrot ] ধান্যকাঁদিবর্গের শাকবি°; *daucus carota*. পর্যায়—গুঞ্জন, পিচ্ছমূল, পীতক; সন্মূলক; স্বাদমূল, সুপীত, নারঙ্গ, পীতফলক। আদি জন্ম ইউরোপ ও এশিয়া। পশ্চিমভারতে ইহার বহুল আবাদ হয় ।

গাড়ীকলাই—[ হি° ভাটনান; ফা° ভুট ] *glycine soja* siel. কলায়, বতুল, সতীন; হরেকদুক ।

গাণ্ডীবিন—গান্ধীবিন অর্জুন গাছ ।

গাণ্ডেরী—আখের এক প্রকার জাত ।

ঢাকা বিভাগে ইহার আবাদ হয় ।

গাণ্ডভজা—শুকশিম্বী, আলকন্দী ।

গাণ্ডা—ভূম্যামলকী ।

গাম্খারী—দুরালভা ।

গাম্খালরজন—[ স° পি° ডিতক নেভালি; হি° কোটাগাম্খাল; তা° শুল্কন্দ ] কাঁটামূল ছোট গুল্মবি° । পাতা চামড়ার ন্যায় শক্ত ও চকচকে ।

গাব—[ স° তিস্তদুক, গালব; হি° গাব, তেস্তদ; ও° মাকড়কেস্তদ; ইং date plum ] বৃক্ষবি°, *diospyros embryopteris*. ঘনশ্যামল পত্রবিণ্ণ । ফল পীতবর্ণ, আঠাল, মিষ্ট । আধপাকা ফলের আঠা নৌকার তক্তা জুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয় । প্রকারভেদ—বনগার; —*d. cordifolia*. গাবভেরেন্ডা—রেড়ী গাছ ।

গাবভেরেন্ড—[ স° এরুড; হি° রুড; মালয়ম্—এরুডম; ও° গব; তে° এরুডম ] রেড়ি গাছ, *ricinus communis* L. পর্যায়—শ্বেত এরুড, সিতএরুড, চিত্র, গন্ধর্ব-হস্তক, আমড, তরুণ, শুল্ক; বাতারি, দীর্ঘদন্তক, পণ্ডামূল, বর্ধমান, রুরদুক । ছোট গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ।

গাবনল—[ ইং Bengal reed ] *amphidiox bengalensis*.

গামার ( দেশজ )—গাম্ভারী, গম্ভারী  
দ্র° ।

গায়ত্রিন্—খদিরবৃক্ষ ।

গায়ত্রী—খদির ।

গারকলাই—soja hispida.

গারুড়—polygala cilita, minor.

গারুড়াকাপত্রিকা—পাচীলতা ॥ রাজনি° ।

গালব—১ লোধবৃক্ষ ॥ মেদিনী ॥, ২  
কেন্দুকবৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

গালোভা—১ ধান্যবিশেষ, ২ পদ্মবীজ,  
কোঁপল ॥ রাজনি° ।

গিমা—[ স° গ্রীষ্মসুন্দরক, ৩  
পিতাশাক ; ইং lady bed straw ]  
গিমেশাক, erythroea centaur-  
oids, e. roxb. ছোট শাকবিশেষ ।  
পাতা সরু, ফুল সাদা, ছোট ।  
শীতকালে হয় । তিস্ত । ফল  
পাকিলে ফাটিয়া যায় ।

গিন্দুক—গেন্দুক-বৃক্ষ ॥ হেম° ॥

গিরিকদম্ব, গিরিকদম্বক—নীপ,  
ধারাবদম্বক ॥ রাজনি°, সুশ্রু° ॥

গিরিকদলী—দয়ে কলা, পাহাড়ে কলা, ॥  
রাজনি° ॥ ডমরে কলা ॥ অভিধা° ।  
কলা দ্র° ! পযায়—গিরিরম্ভা,  
পর্বতমোচা, অরণ্যকদলী, বহুবীজা,  
বনরম্ভা, গিরিজা, গজবল্লভা ।

গিরিকর্ণা—অপরাজিতা লতা ।

গিরিকর্ণিকা, গিরিকর্ণা—১  
অপরাজিতা । ২ শ্বেতকিনিহীবৃক্ষ ।

গিরিজা—[ স° গিরি ; ও° গিরিজা ; ইং  
bastard cedar ] নেপাল তরু ।  
বৃক্ষাদিবর্গের আরণ্যবৃক্ষ,  
guazuma tomentosa. পাতায়  
রোম্মা আছে । গুচ্ছাকারে ফুল  
হয় । ফল শুকনো লম্বা  
অবদময় । বাংলাদেশে প্রায়  
দেখা যায় ।

গিরিজা—১ মাতুলুঙ্গা, কমলা ॥  
হেম° ॥ ২ শ্বেতবৃহা, ৩ ক্ষুদ্র,  
পাষণভেদলতা, ৪ ক্রয়মানলতা,  
বলাড়মূর, ৫ কারীবৃক্ষ, ৬ মল্লিকা,  
৭ গিরিকদলী ।

গিরিনিস্ব—ঘোড়া নিমগাছ ॥ রাজনি° ॥

গিরিপীলু—পদুম-বৃক্ষ, ফলসা ॥  
রাজনি° ॥

গিরিপদ্পক—শৈলেন্দ্র ।

গিরিবাসিন্—হস্তীকন্দ-বৃক্ষ ।

গিরিভিদ—গিরিভেদ, পাষণভেদক-  
বৃক্ষ, হিমাসাগর, হাড়জুড়ি ।

গিরিমল্লিকা—কুটজ-বৃক্ষ, কুরচী ।

গিরিরম্ভা—পাহাড়ে কলা ।

গিরিশালিনী—অপরাজিতা ॥ বামন-  
পদ° ॥

গিরিহবা—অপরাজিতা ॥ সুশ্রু° ॥

গির্ষাহ্বা—অপরাজিতা ॥ স্মৃৎ ॥

গিলা গাছ—[ও° গিল] বকুলাদিবর্গের  
বৃহৎ লতাবি, eutada hurso-  
etha. ফুল ছোট হলুদ রংয়ের।  
ফল দীর্ঘ, বীজ গোল, চেঁটা।

গীলতা—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা;  
বড়গওয়া কটকী।

গীর্বাণকুসুম—দেবকুসুম, লবঙ্গ।

গদাগাদি—একজাতীয় বৃক্ষ, gumsea.

গদাগরী—[ হি° পোয়া ] anethum  
graveolens.

গদালা—দ্রাক্ষালতার ন্যায় এক প্রকার  
বুনো গাছ, vitis latifolia.

গর্দড়ি কচু—ক্ষুদ্র একজাতীয় কচু।

গদগ্গদল; গদগ্গদল—[স° গদগ্গদল;

পালঙ্কযা, পদরঃ; হি° গগল;

ভৈবাগগল; গদজ° গদগল; ম°

ক্ষাগাদগুঠঠ; ক° ইউবোল; তে°

গদগিগ° লমুচেট্ট; মহীসাহী;

কা° বোএজহুদানা; অ° মদিক-

লেজক; ও° শিলা; ইং ameris]

balsamodendron mukul, b.

agallocha, amyris commi-

phora, commifora africana.

ছোট তরু, কাটাষদ্রুত। ॥ রাজনি°

রাজব° ভাবপ্র° ॥ গদগ্গদল গাছ

আরব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকায়

জন্মে। গাছের আঠাই গদগ্গদল  
(সুগন্ধ)। ভারতের মধ্যে

রাজপুতানা, सिन्धु-প্রদেশ, আসাম  
ও পূর্ব বাঙলায় জন্মে।

ভাবমিশ্রের মতে গদগ্গদল পাঁচ

প্রকার—(১) মহিষাক্ষ (সকলবী),

(২) মহানীল (মুকুল-ই-আরব);

(৩) কুমুদ, (৪) পদ্ম (মুকুল-  
ই-আজরক), (৫) হিরণ্য

(মুকুল-ই-আহুদ)। ভূমিজ

গদগ্গদল—[স° দৈত্যামেদজ,  
দগাহব, মহিষাসুরসম্ভব] পূর্ব

বাঙলায় ও আসামে আর এক

গাছ ইহাতে গদগ্গদল নির্বাস

বাহির হয়। b. roxburghii.

গদুচ্ছকগিণিশ—ধানাবি°, রাগীধান

॥ রাজনি° ॥

গদুচ্ছকরজ—একপ্রকার করজ, পত্রসিন্ধ;  
পদ্মগদুচ্ছাকার। কামিনী

পদ্মপত্রকে কেহ-বেহ বৈদ্যশাস্ত্র-  
বর্ণিত গদুচ্ছকরজ বলে। আবার

কেহ আশশেওড়া বা জাহুটীকে  
বলে। পর্যায়—সিন্ধদল, গদুচ্ছ-  
পদ্মপত্র, নন্দী, গদুচ্ছী, সানন্দ,  
দন্তধাবন।

গদুচ্ছদন্তিকা—কদলী ॥ রাজনি° ॥

গদুচ্ছপত্র—তালবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥



গুচ্ছপুষ্প—১ ছাতিম, ২ অশোকবৃক্ষ  
 ॥ বৈদ্যকর ॥

গুচ্ছপুষ্পক—১ রীঠকরঞ্জ, ২  
 গুচ্ছকরঞ্জ ।

গুচ্ছপুষ্পকী—১ ধাতকীবৃক্ষ, ২  
 শিমুড়ীবৃক্ষ । ক্ষুদ্রপরি ॥

গুচ্ছফল—১ রীঠকরঞ্জ, ২ রাজাদনী,  
 ৩ নির্মালী ফল, ৪ গুচ্ছকরঞ্জবৃক্ষ ।

গুচ্ছফলা—১ অগ্নিদমনীবৃক্ষ, ২  
 কাকমাচী, ৩ দ্রাক্ষা, ৪ কদলী ।

গুচ্ছবধা, গুচ্ছহামলিকা—গুড়াসিনী  
 তৃণ, চিপিটা লতা ।

গুচ্ছহাল—গুচ্ছহমালতি, গন্ধখড় ।

গুচ্ছহাসকন্দ—গুচ্ছকন্দ, ফুলী ।

গুচ্ছী—গুচ্ছকরঞ্জ ॥ রাজনি ॥

গুজ, গুজা—দ্র । [ সঁ রক্তসুজ  
 , চুডামণি, শ্বেতগুজা, শ্বেত-  
 কাণ্ডোজী, সিতোচ্চটা ] । কুঁচ,  
 abrus precatorius. পর্যায়—  
 কাকচিণ্ড, কৃষ্ণা; সফুঠা, রক্তিকা,  
 কাকগম্ভীরা, কাকাদনী; কাকতিস্তা,  
 কাকজবা, শিখাভগী, সোম্যা,  
 শিখাভী, অরুণা, তাম্বিকা,  
 শীতপাকী, ভিল্লভবণা, বন্যা,  
 শ্যামলচুড়া ।

গুড়কামাই—[ সঁ কাকাদনী, কাকমাচী;  
 হিঁ কবেরা; গুজ পীলভী; তেঁ  
 কামাণ্ড ] solanum nigrum.

পর্যায়—কাকমাচী, ধ্বংসমাচী;  
 বায়সাস্ত্রা, বায়সী, সর্বভিত্তা,  
 কাকমাতা, চন্দ্রাবিনী; স্বাদুপাকা ॥  
 রাজনি রাজব ॥ বর্ষজীবী গুল্ম  
 জাতীয় উদ্ভিদ । অপর গাছে  
 জড়াইয়া উঠে । ফুল সাদা, লক্ষা  
 ফুলের মত, কখন বেগুনে হয় ।  
 ফল কালো, লাল বা হলুদে হয় ।  
 পতিত জমিতে, জঙ্গলের ধারে  
 ছায়াযুক্ত স্থানে জন্মায় ।

গুড়তৃণ, গুড়গ্রিণ—ইক্ষু ।

গুড়দার—ইক্ষু ।

গুড়দল-শিম ( দেশজ )—Labiab  
 purpurascens.

গুড়পুষ্প, গুড়পুষ্পক—মধুকপুষ্প,  
 মৌলগাছ ।

গুড়ফল—পীলবৃক্ষ ।

গুড়মূল—১ অস্পর্শারিষ শাক, চাঁপা-  
 নটে, ২ ইক্ষু ।

গুড়বীজ—মসুর ।

গুড়শিত্র—লাল সম্রনে ।

গুড়লা—গুড়াসিনীবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র ॥

গুড়শয়—আখরোট ॥ রাজনি ॥

গুড়ী—দেশজ বৃক্ষ ।

গুড়ুচী, গুড়ুচি—[ সঁ গুড়ুচী,  
 অমৃত; হিঁ গিলোর; মঁ ওঠবেল;  
 গুজ গলো; কঁ অমরদবল্লী, তেঁ  
 তিপ্তিগ; তিয়াতিজ, গোখুচি ;

তাং সিঙ্গি, লকোদি; কানাং, গুরুগুণী; কাং গিলাই; অং গিলোই, কোং গুলটাই, গুল্লাই ] গুলগুণী লতাৰিং; *cocculus cordifolius*; *tinospora cordifolia*.

॥ ভাবপ্র° রাজনি° রাজব° ॥ অনেক দিনের হলে মানুষের হাতের মত, মোটা হয়। ছাল পাতলা। পাতা প্রায় পানের মত। ফুল হরিদ্রাভ শাদা, ফল মটর কলায়ের মত, পার্কিলে লাল রং হয়। প্রকারভেদ—১ পদ্মগুড়ুচী, পদ্মগুলগুণী—[ স° সুদর্শনা ] *c. tomentosa*, পাতা অপেক্ষাকৃত গোলা, পদ্মপাতার মত, তাহাতে তিনটা আঙুল, পাতা লোমশ। ২ কন্দোভবা গুড়ুচী—সুপরিচিত ও সুলভ নহে। পর্যায়—বৎসাদিনী, ছিন্নরুহা, তিস্তিকা, অমৃত, জীবন্তিকা, সোমবল্লী, বিশল্যা, মধুপর্ণী, চক্লক্ষণা, অমৃতবল্লী, অমৃতসম্ভবা, জরুরি, শ্যামা, বরা, সুকৃতা, মধুপর্ণিকা, ছিন্নোভবা, অমৃতলতা, বসায়নী, সোমলতিকা, ভিষক্‌প্রিয়া, কুণ্ডলিনী, বয়স্কা, নাগকুমারিকা, ছিন্নিকা, চন্দ্রহাসা, সুখা, সোমা, মণ্ডলী, দেবনির্মিতা

॥ রাজনি° ॥ পাতা ও সমস্ত লতাটি ওষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

গুড়ুগুণী—বৈদ্যক শাস্ত্রোক্ত একটি গণ—গুড়ুচী, নিম, ধনে, পদ্মকাস্ত, চন্দন।

গুণ—*Aloe*, s. p. *zeylamica*.

গুণাত্মক—অক্টোটবক্ষ, ধলা-আঁকড়া।

গুণ্ডালা—ক্ষুদ্র ক্ষুপারি°। পর্যায়—জলোদ্ভূতা, গুচ্ছবধা, জলাশয়া।

গুণ্ডাসিনী—তৃণারি°। পর্যায়—গুণ্ডালা; গুণ্ডালা; গুচ্ছমূলিকা, চিপটা, তৃণপত্রী, যবাসা, পৃথুলা, বিটরা।

গুণ্ণ—দেধান।

গুণ্ণপদ্ম—ছাতিম গাছ।

গুণ্ণিশেওড়া (দেশজ)—[ স° নদ্য-ভূষুর ] ঘটিশেওড়া; *ficus heterophylla*.

গুণ্ণ—[ স° মৃজ; ইং a kind of pen-read grass ] শরপত্র দ্র°, *saccharum sara*. পর্যায়—পটরক, অচ্ছ, শৃঙ্গবেরাশ্বমূল।

গুণ্ণমূলা—হোগলা।

গুণ্ণা—১ হোগলা, ২ ভদ্রমুস্তক, ৩ প্রিয়ম্বক্ষ, ৪ গবেধকা।

গুণ্ণেনহ—ধলা আঁকড়া।

গুণ্ণা—আলকুশী।

গুবাক—গুয়া বা সুপারি গাছ ।

গুয়ে-গাজা—আমেরিকাদেশীয় গাছ ;  
lantana camara. ঘনঘন শক্ত  
ডাটাযুক্ত গুল্ম । শাখায় একদিকে  
বহু কাটা আছে ।

গুয়েগাদা—গুল্মবি° . lantana  
camara. ডাটা শক্ত, শাখায় কাটা  
আছে । আমেরিকা ইহাতে আসে ।

গুয়ে-বাবলা—[ স° বিটখদির, জাল-  
বধুরক ; হি° গণ্ডাবাবুল  
বিলাতীবাবুল ; ম° ক্ষুদ্রখদির ;  
গুজ° তালবাডল ; তা° ভেদাবানা ]  
উদ্ভিদবি°, acacia farnesiana.  
কাটিময় উদ্ভিদ ; ২০-২৫ ফুট  
উঁচু । পৰ্যায়—বিটখদির,  
কাণ্ডোজী, গোরট, মরুজ, পহতর,  
বহুসার, মহাসার ॥ রাজনি° ॥

গুরি—Quinquangular.

গুরুল্ল—শ্বেতসরিয়া ॥ রাজনি° ॥

গুরুপত্রা—তিস্তিডীবৃক্ষ ॥ শব্দর° ॥

গুরুবর্চোয়—পাতিলেবু ।

গুরুশিংগাপা—শিংগাপবি° ।

গুর্দলশিম ( দেশজ )—dolichus  
lablab.

গুল—euphorbia tirucalli,

গুলআনার—পারসাজাত এক প্রকার  
দাড়িমগাছ ।

গুলখীরা—( ইং holly-hock ), alt-  
hoea rosea.

গুলগা—nipa fruticans.

গুলচিনি—আকরকড়া দ্র° ।

গুলগু—১ [ স° নিঞ্জর, গুলগু ; হি°  
গুরুল্লি, গুলগু ; প° গিলো,  
গুলারিচ, বো° গুলওয়ালি,  
ঘরল ; ম° গুল-ভেলি ; তা° সিন্ধল,  
কোডি ; তে° তিপ-তিগে, গুলুচি ;  
ইং heart-leaved, moon-seed ]  
বৃক্ষবি°, tinospora cordi-  
folia. ডাটা ও শেকড় ঔষধে  
ব্যবহৃত হয় । ২ [ ফা° গুল-আ-  
চীন, ইং Spanish jassemine ]  
তগরাদিবর্গের পদুপতরবি°, ple-  
meria acuminata. গাছ  
আঁকা-বাঁকা । ফুল সাদা, ভিতর  
দিক হলদে রং, বাহিরে  
লাল, সুগন্ধি । প্রকারভেদ  
—( ১ ) সাদা গুলগু - ফুল  
সাদা, p. alba. ( ২ ) লাল  
গুলগু—ফুল লাল, p. rubra,  
coccular cordifolia. গড়চী  
দ্র° ।

গুবাক, গুয়া—পদ্ম দ্র° ।

গুহদাড়ী—আকরকড়া দ্র° ।

গুলদাউদি—পারসাজাত উদ্ভিদবি° ,

pyrethrum indicum; crysanthemum i.

গদুল্‌নিগম—পারস্যজাত উদ্ভিদবি°  
narcissus tazetta.

গদুল্‌ফিরিঙ্ক ( পারস্য ) — venca  
rosea.

গদুলবাঁশ—একপ্রকার বাঁশ ।

গদুলমখমল—gonephrena globosa.

গদুলমোন্দ—একপ্রকার ফুলগাছ, impatiens balsamina,

গদুল ( দেশজ )—একপ্রকার গাছ,  
figus gooloorea.

গদুল ( দেশজ )—বৃক্ষবি° ।

গদুলা—স্নহীবৃক্ষ, সিজ ।

গদুলাল-তুলসী—বাবুইতুলসী । তুলসী  
দ্র° ।

গদুলাশ্যামা ( দেশজ )—eranthemum  
pulchellum.

গদুলাসকর—(ইং three styled flax)  
একপ্রকার বাহারি লতা ; linum  
trigynum.

গদুলিবাগদন ( দেশজ )—একপ্রকার ক্ষুদ্র  
বেগুন, solanum longum.

গদুগা ( দেশজ )—একপ্রকার বৃক্ষ ।

গদুলকেতু—অন্নবেতস, খৈখড় ॥ রাজনি° ॥

গদুলমদল—আদা ।

গদুলমল্লী—সোমলতা ।

গদুল্মিনী—লম্বলতা (?) । পর্যায়—

বীরুং, উল্লপ, বিরুধা-  
অবরুং ।

গদুল্মী—১ আমলকী, ২ এলাচী, ৩  
গন্ধনধীবৃক্ষ, গদুকাওনী ॥ শব্দচ° ॥

গদুবাক—সুপারি, স্থানবিশেষে গুয়া,  
areca catechu. পর্যায়—ঘোঁটা  
পদুগ, ক্রমদুক, খপদুগ; গদুবাক, পদুগ-  
বৃক্ষ, দীর্ঘ পাদপ; বকতরু;  
দড়বক, চিকণ; পদুগী, সুরঞ্জন,  
গোপদল, রাজতাল, ছটাফল ।  
বাংলায় পাঁচ প্রকার সুপারি আছে  
—দেশাল, খড়ে, ২ ভেটেল, ৩  
চিকি, ৪ রামপুং, ৫ জাহাজে  
সুপারী । সুপারী দ্র° ।

গদুহা—১ সিংহপাচ্ছীলতা, ২ পুষ্টি-  
পণী লতা, চাকুলে ।

গদুহাপদুপ—অবথবৃক্ষ ।

গদুহাবীজ—ভূতৃণ, গম্বখড় ।

গদুপত্র—১ অকোট-বৃক্ষ, ২ করী?বৃক্ষ ।

গদুপদুপক—বকুলবৃক্ষ ।

গদুফল—বদরবৃক্ষ ।

গদু-বাল্লিক, ভূতৃবল্লী—অকোটবৃক্ষ ।

গদুমা—[ স° ফলেপদুপা ; ] ক্ষুদ্র বৃক্ষ-  
বি° ।

গদুগুন, গুঞ্জস—১ মূলবিশেষ, চলিত  
কথায় শালগম বা গাজর (?)

॥ ভাবপ্র° ॥ brassica rapa.

পর্যায়—শিথি-মূল, যবনশট,

বতুল, গ্রীষ্ম মূল, শিখাকন্দ,

কন্দ, ভিণ্ডীর-মোদক, ২ রসুন;  
৩ বাল রসুন।

গৃধনখী—১ কাকাদনী-বৃক্ষ, কালিয়া-  
কড়া, ২ কুল গাছ ॥ স্ত্রুণ্ড ॥

গৃধপত্রা—ধূমপত্রাবৃক্ষ।

গৃধাণ, গৃধাণী—ধূমপত্রাবৃক্ষ।

গৃটি—বদরবৃক্ষ।

গৃহকন্যা—ঘৃতকুমারী।

গৃহকুলক—চিচিঙে শাক।

গৃহদ্রুম—১ মেটগৃহ-বৃক্ষ, ২ শাক-  
বৃক্ষ, সেগুন গাছ।

গৃহাশয়া—পানের গাছ।

গেঁটিবন ( দেশজ )—বৃক্ষবিং।

গেঁদা; গাদা—[সং কন্দুক; হিঁ গেঁদা;

গেণ্ডক; ওঁ গেঁছু; পারসী—

গুলজফবি; ইং French mary-

gold; African mary-gold বা

calendula ] সোমরাজবগের

পুষ্পভর, tagetes patula;

t. erecta. প্রকারভেদ—(১) দেশী

গাদা—গাছ লম্বা, ফুল তামাটে

বগের, (২) চীনে গাদা—t.

patula. গাছ ছোট, ফুল হলদে

রংয়ের লাল আমেজ, (৩) বড়

গাদা—t. erecta, (৪) বিলাতী

গাদা—calendula; গাছ ছোট,

ফুল বড় বড় হলদে রংয়ের।

গেছি-শিম—এক-প্রকার শিম, lablab  
macrocarpum.

গেহু—excoecaria agallocha.

গৈর—লাফলীবৃক্ষ।

গৈরিকাক্ষ—জলমধুকবৃক্ষ।

গোআলিয়া—একপ্রকার ঘাস, andro-  
pogon punctatum.

গোআলিয়া লতা ( দেশজ )—একপ্রকার  
লতা, cissus vitiginea.

গোড়ালেবু—[ সং অগ্নিনিব্দক ] লেবু  
দ্রু।

গোকট, গোকটক—গোক্ষুরবৃক্ষ।  
গোক্ষুর দ্রু।

গোকর্ণা—মর্বারলতা।

গোক্ষুর—[সং গ্রিকটক; হিঁ গোথুরা;

ছোট গোথুর, গোরথুল; ওঁ

গোথুর; তেঁ পালের; ওঁ

গোথরা, ফাঁ তুরস্বেথার থক্ষ; আঁ

বজ্রুলথক্ষ, বকলতলথার থক্ষ

গোথুর, গোথুর, গোথুর,

গোথুর] tribulus terrestris, t.

launginosus. বর্ষায় শাকবিং;

ঘাসের মাঝে জন্মে। প্রকারভেদ—

(১) ক্ষুদ্র গোক্ষুর—পাতা ছোলা-

পাতার মত, ফুল পীতবর্ণ, ফলে

৬টি কাটা আছে, (২) বৃহৎ

গোক্ষুর—পাতা শ্বেতাভ, ফুল



সাদা ও পীত, ফল পাঁচকোণা,  
চার কোণে ৪টি কাঁটা। পৰ্যায়—  
শ্বদংষ্ট্রো; বনশৃঙ্গাট, কণ্টফল;  
ক্ষুদ্রক, চণকদ্রুম, ক্ষুদ্র; গোক্ষুদ্রক;  
ট্রিকণ্ট, স্বাদুকণ্ট; গোকণ্ট,  
ইক্ষুগণ্ডিকা।

গোখরি—গোক্ষুদ্র দ্র°।

গোচান্ডালী (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

গোচ্ছাল—ভূকদম্ব, চাকুলিয়া।

গোজা—গোলোমিকাবৃক্ষ।

গোজারিক—কণ্টকারবৃক্ষ।

গোজপণী—দক্ষফেনীবৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

গোজিয়া—সত্যবি°।

গোজিহ্বা—গোজিয়াসতা; দারিয়া শাক,  
premna esculenta. পৰ্যায়—  
বার্বিকা; দার্বিকা, দাবিপত্রিকা,  
খরপত্রী, বাতোলা, অধোমুখা,  
অনুজিহ্বা, দবী, অধঃপুষ্পী,  
গোজিহ্বিকা।

গোজী—গোজিহ্বালতা।

গোটা—সুপারি।

গোড়ম্ব—শীর্ণবৃক্ষ তরমুজ ॥ মে° ॥

গোত্রবৃক্ষ—ধন্বনবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র° ॥

গোথুবি (দেশজ)—[ ই° one headed  
cyper grass ] একপ্রকার ঘাস,  
anosperum monocephaluta.  
ছোট গোথুবি—cyperus dubis.

গোদুখদা, গোদুখা—চণিকা তৃণ  
॥ রাজনি° ॥

গোধাঘ্র—গোয়ালে লতা।

গোধাপদিকা—গোধাপদী লতা।

গোধাপদী—গোয়ালিয়া লতা; গোয়ালে  
লতা দ্র°।

গোধাবতী, গোধাবল্লী—গোধাপদী,  
গোয়ালে লতা দ্র°।

গোধীশ—দ্রোণপুষ্পী।

গোধূম—গম দ্র°। ১ প্রকারভেদে—মহা-  
গোধূম ( বড় গোধূমা ), পশ্চিম-  
দেশ হইতে আনীত; ২ মাধুলী  
গোধূম ( ছোট গোধূম ), মধ্যদেশ  
যথা দিল্লী, আগ্রা, লক্ষ্মী স্থানে  
জন্মে; ৩ দীর্ঘ গোধূম [ স°  
নান্দীমুখ ] শর্য়া নাই ॥ রাজনি° ॥

গোপকর্টিকা—রাখালশা।

গোপঘোণ্টা—১ শেরাকুল; ২ হস্তিকোলি,  
৩ বৈচ।

গোপদল—গুবাকবৃক্ষ।

গোপন—তেজপাতা।

গোপভদ্রা—কাম্বরীবৃক্ষ।

গোপভদ্রিকা—গম্বরীবৃক্ষ।

গোপবল্লী—১ মূৰ্বা, ২ শ্যামালতা,  
৩ অনন্তমূল।

গোপা, গোপিনী—শ্যামালতা।

গোপাকনা—অনন্তমূল।

উদ্ভিদ-অভিধান

গোপানককণ্ঠি রাখালশশা।

গোপালী—রাখালশশা।

গোপদা—বড় এলাচী।

গোপদরক—কুন্দরকবৃক্ষ।

গোবরা—*anesomeles ovata*।

গোবরা-নটি—*amaranthus lividus*।

গোবরা ফিঙ্গাটা ( দেশজ )—একজাতীয়  
বৃক্ষ, *elliacea*।

গোবরিয়া-চাঁপা—*plumiera acu-*  
*minata*।

গোমক—[ স° গোড়ুয়া, গবাক্ষী, চিত্রা ]

তরমুজের মত ফল-বৃক্ষ। খরমুজ  
দ্র°।

গোময়ছত্র, গোময়ছত্রিকা—কোড়ক-  
ছাতা। পর্ষায়—দিলীর, শিলীধক,  
উচ্ছলীধ।

গোময়প্রিয়—গন্ধধড়।

গোময়োলভব—আরবব; সোদালবৃক্ষ।

গোমরী—রামবেগুন।

গোমরী—*arenga s ccharifera*।

গোমরীকা—তৃণবিশেষ। পর্ষায়—  
রক্ততৃণ; ক্ষেত্রজা; কৃষ্ণ-ভূমিজা।

গোয়ালেলতা—[ স° গোধাপদী,

গোধাবতী, হংসপাদী, গুহালিক ;

ও° তিন-আংগুলিয়া ] লতাবি°,

*vitis pedata*; *cissus p*। এই

লতার মূল কিংবা পত্রের সাদৃশ্য

পক্ষে মতভেদ দেখা যায়। কেহ  
বলেন—পাতা—ত্রিদলবিশিষ্ট  
( হাঁসের মত )। কেহ বলেন

পাতার মূল হাঁসের পায়ের মত  
লাল। পাতা হিসাবে তিন

প্রকার—(১) বড় গোয়ালে। পাতা  
রোমশ ও পাতা ৭টি পর্ণ, (২)

ছোট গোয়ালে—এক বৃক্ষে ৩টি  
দল ও প্রত্যেক দলের পাশে ক্ষুদ্র

ছেদ দেখা যায় ইহাকে তিন পাতী  
বলে ও (৩) ছয় আংগুলে

গোয়ালে। বৃক্ষস্থিত ৩টি করিয়া  
পাতা থাকে। ইহাই প্রকৃত

গোধাপদী। পর্ষায়—সুবহা;  
গোধাবতী, ত্রিফলা, ত্রিপদী,

মধুসবা, হংসপাদিকা, হংসাবতী;  
রক্তপাদী, ত্রিপদা, ঘৃতমন্ডিকা,

বিশ্বগ্রাম্ভি; কীটমারী, কণাটী;  
তাম্রপাদী, বিক্রান্তা, ব্রহ্মাদনী,

পদাঙ্গী, সূতপাদিকা, সপ্তারিণী,  
পাদিকা, প্রহ্লাদী, কীটপাদিকা,

ধাতরাষ্ট্র-পদী, গোধাপাদিকা;  
বলীধদলা, হংসবতী।

গোরক্ষকণ্ঠী—চিতিটা।

গোরক্ষ-চাউলা—[ স° গোরক্ষ-তড়ুলা,  
নাগবলা ] জবা-বগের ক্ষুদ্রপর্ণ;  
*sida spinosa*। পাতায় ৩টি

শিরা। বোটার কাছে ৩টি আব থাকে। পাতার নীচের পিঠ পাশদুটে। ফুল ছোট শাদা। ফল পঞ্চকোষ। বেড়োলা গাছের মত কিন্তু তাহাতে ১০টি কোষ আছে।

গোরক্ষচাকুল্যা—*uraria lagopodioides*.

গোরক্ষজ্বন্দ—১ গোধম, ২ গোরক্ষচাকুলে; ৩ ঘোন্টাবৃক্ষ।

গোরক্ষতুলা—নাগবলা, পর্যায়—গাজেরদুকী; বাসা, হৃষ্য-গবেধকা খরবল্লিকা; বিশ্বদেবা।

গোরক্ষদুপা—অমৃতসঞ্জীবনীবৃক্ষ।

গোরক্ষী—[ স° সুদাণ্ডিকা, সর্পদন্তী ]  
মালবদেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রপর্ব,  
*solanum rubrum erythropyrenum*.

গোরখা—বৃক্ষবি°।

গোরমা ( দেশজ )—গন্ধখড়।

গেলকাকড়া—গোল কাকরোল,  
*momordica cochi-chinensis*.

গোলখয়রা—[ ইং holly hock ]  
গুলখীরা, *althoea rosea*.

গোলমলজা—*cyp. rus rox*.

গেলপাতা—ভালাদিবর্গের ক্ষুদ্রপর্ব,  
*nipa fruticans*. পাতায় সুন্দর

ছাতা হয় ও ছাউনি করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

গোলমরিচ—[ স° মরিচ, উষণ, ধর্মপত্তন; হি° কালীমরিচ; ম° চোকামরিচ; অ° জালদুক; ক° যেনসু; তে° মরিয়া; তা° মিল গুভলী; ফা° ফিল্‌ফিল-ই-সিয়া; অ° ফিল্‌ফিল অসুন্দ; ইং black pepper ] তাম্বুলাদিবর্গের ভুলদৃষ্টিত লতাবি, *piper nigrum*. আসাম ও কৌচবিহারে মরিচের লতা জন্মায় বটে, কিন্তু বাংলার মত ফলপ্রসূ নয়। ফলের নাম গোলমরিচ। চাষের জন্য ইহার লতার কলম করিয়া রোপণ করিতে হয়। ফাগুন মাসে জমি উত্তমরূপে চাষ করিয়া বর্ষাকালে জয়ন্তী বা অন্য কোন বড় গাছের মূলদেশে ইহার লতা বসাইতে হয়। শরৎকালে ফুল ফোটে। বসন্ত কালে ফল পাকে। পাকিলে লাল হয়, শুকালে কালো রং হয়। পর্যায়—বেল্লজ; কৃষ্ণ, উষ্ণ, ধর্মপত্তন।

গোলমোথি—*cyperus seminudas*.

গোলমোহিনী ( দেশজ )—একপ্রকার গাছ, *deringia celosoides*.

গোলশিঙ্গা ( দেশজ )—*quercus serrata*.

গোলাপ, গোলাব—[ ইং rose ] পূর্বে বাংলাদেশে ছিল না। আজকাল প্রায় শতাধিক গোলাপ দৃষ্ট হয়। গোলাপ অত্যন্ত সুখী পুষ্পবৃক্ষ। সমস্তে পালন করিতে হয়। (১) বসরাই গোলাপ [ ইং Bussorah rose ] *rosa centifolia. r. damascena*. বসোরা গোলাপফুল বৎসরে একবার বসন্তকালে ফোটে। গাছ কষ্টকপূর্ণ। শাদা ও লাল দুই রকমের ফুল হয়। (২) দেশী গোলাপ—সেঁয়তি, *rosa moschata*; ফুল শাদা রংয়ের—অল্প মৃগনাভির গন্ধ আছে।

গোলাব-জাম—[ ইং rose apple ] জাম দ্র°, *eugenia jambosa*,

গোলাস—শিলীশ্র ( ? )।

গোলীড়—ঘটাপারুলি।

গোলোমিকা—গোলোমী, শ্বেত দূর্বা।

পশ্চিমে গোধূমা। পর্যায়—

গোধূমী, গোজা, ক্রোটেকপুচ্ছিকা,

গোসম্বা, প্রস্তরগী।

গোশীর্ষক—দ্রোণপুষ্পী বৃক্ষ।

গোরজবিক—শাদা জিরে। জিরা

দ্র° ॥ রাজনি ॥

গৌর সর্বপ—শাদা সর্ষে।

গৌরিল—শ্বেতসর্বপ।

গৌরী—১ শ্বেতদূর্বা, ২ তুলসী, ৩ মল্লিকা, ৪ সুবর্ণ-কদলী, ৫ আকাল মাংসী।

গ্রন্থি দূর্বা—গাট দূর্বা।

গ্রন্থিপর্ণ—( হি° গঠিবন ) গাঠিয়াল।

কদুশিমা জাতীয়; নেপালে হয়।

পর্যায়—শুক, বহিপুষ্প, শ্চোনেয়,

কদুরবহী, বহ, শুকবহ,

কুশপুষ্প, গুল্মক, বিশীর্ণাথ্য,

গ্রন্থিক স্বারামগুচ্ছ, শুকপুচ্ছ,

শুকচ্ছদ, কাকপুষ্প।

গ্রন্থিপর্ণা—জতুকালতা।

গ্রন্থিফল—১ কপিথ, ২ মদনবৃক্ষ,

৩ শাকুরডবৃক্ষ।

গ্রন্থিমৎফল—লকুচবৃক্ষ, মান্দার।

গ্রন্থিমান—হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া

গাছ ॥ ভাবপ্র° ॥

গ্রন্থিমূলা—মালা দূর্বা।

গ্রন্থিল—১ পিচ্চনী মূল, ২ আদা, ৩

বঁইচ, ৪ করীরবৃক্ষ, ৫ তড়ুলীয়

শপক।

গ্রন্থিলা—১ ভদ্রমুস্তা, ২ মালা দূর্বা।

গ্রহনায়ক—অকবৃক্ষ।

গ্রহনাশ, নাশক—শাকবৃক্ষ।

গ্রহাপতি—অকবৃক্ষ।

গ্রহাক্ষয়—ভূতাক্ষবৃক্ষ।

গ্রামীণা—১ নীলীবৃক্ষ । পর্যায়—  
নীলী, নীলিনী, তুলী, কালদোলা,  
নীলিকা, রঞ্জনী, গ্রীফলী, তুচ্ছা,  
মধুপর্ণিকা, ক্রীতকা, কালকেশী,  
২ পালংক্য শাক ।

গ্রাম্যকন্দ—বন ওল ।

গ্রাম্যকর্কট—কুম্ভাস্ত ।

গ্রাম্যবল্লভা—পালংক্যশাক ।

গ্রাবরোহক—অশ্বগন্ধাবৃক্ষ ।

গ্রাহিনী—ক্ষুদ্র দুরালভা, ২ ক্ষীরই ।

গ্রাহিন—কপিথ ।

গ্রাহফল—কপিথবৃক্ষ ।

গ্রীষ্মজা—নবমল্লিকা ।

গ্রীষ্মধান্য—বোরোধান ।

গ্রীষ্মপুষ্পী—করণ পুষ্পবৃক্ষ ।

গ্রীষ্মসুন্দর—গিমেশাক ।

## [ ৬ ]

ঘটপত্রী বা কলসপত্রী—[ ইং pitcher  
plant ] ইহার পাতা অনেকটা  
কলসীর মত । কোন পাতা এক  
গজ লম্বা, কোনটা বা ৪-৫  
ইঞ্চি । রাজা নামে এক প্রকার  
ঘটপত্রীর পাতা ১১-১২ ইঞ্চি  
লম্বা ও ৫ ইঞ্চি চওড়া । ঘন  
সবুজবর্ণ বীরুজাতীয় উদ্ভিদ ।  
দীর্ঘ ফলকের ন্যায় পাতার দড়ির  
মত অগ্রভাগ থেকে ৪-৮ ইঞ্চি  
কলস বুলিতে থাকে । প্রতিটি  
কলসের মধ্যে একটি গোলাপী বা  
লাল আভাষুক্ত ঢাকনি । রংএর  
আকর্ষণে পতঙ্গেরা কলসের মধ্যে  
ঢুকিয়া পড়ে আর ঐসব কলসের  
মুখ পিচ্ছল—সেখানে থাকে

অসংখ্য সূক্ষ্ম নিয়মদ্বারা-রোম ।  
ভিতরে ঢুকিলে আর বাহির হইতে  
পারে না—মৃত্যুমুখে পড়িয়া যায় ।  
ছোট-ছোট পাখিও ইহাতে ধরা  
পড়ে । সেই হেতু ইহাকে পতঙ্গ-  
ভোজী বৃক্ষ বলে । আসামের  
জঙ্গলে, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো  
প্রভৃতি স্থানে প্রচুর দেখিতে পাওয়া  
যায় ।

ঘটলাবদ—গোলালাউ ॥ রাজনিং ॥

ঘটসেওড়া—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ ।

ঘণ্টক—ক্ষুপবিশেষ ।

ঘণ্টকর্ণ—ক্ষুপবিশেষ, ঘটকান ।

ঘণ্টা—বৃক্ষবিশেষ, *bignonia*  
*snaveoleus* .

ঘণ্টাপাটাল, ঘণ্টাপারুল—[ হিঁ মোটা ]



অরণ্যবৃক্ষ বিশেষ, *bignonia snaveoleus*, *schrebra swietc niodes*. ফুল হলদে রংয়ের, খয়ের রংয়ের আমেজ আছে। ফল প্রায় ২ ইঞ্চি লম্বা, ঘণ্টার মত। পর্যায়—গোমীট, ঝাটল, মোক্ষ, মদুক্ষক, গোলিহ, ক্ষারদ্রু, কালোমদুক্ষক, পাটলি, ঘণ্টাক, ঝটি, তীক্ষ্ম, কাষ্ঠপাটলি, কালাস্থলী; কাচস্থলী।

ঘণ্টাবীজ—জলপালবৃক্ষ।

ঘণ্টারবা, ঘণ্টারবী ঝনঝন, স্থান-বিশেষে ঝনঝনিয়া, শগপুস্পী।

ঘণ্টালিকা, ঘণ্টালী—কোষাতকী, ঝিঙা।

ঘণ্টিনীবীজ—জলপালবৃক্ষ।

ঘন—মদুক্ষ, *cyperus rotundus*.

ঘনচ্ছদ—শিগ্রু।

ঘনজ্বান—ঘনসেয়ালা ॥ ত্রিকাণ্ড ॥

ঘনত্বচ্—শিগ্রু।

ঘনদ্রুম—বিকটকবৃক্ষ।

ঘনপত্র—১ পদনবা, ২ শিগ্রু।

ঘনপল্লব—সজনে।

ঘনফল—বিকটকবৃক্ষ।

ঘনরস—মোরটবৃক্ষ।

ঘনবল্লিকা—অমৃতপ্রবা লতা।

ঘনবাস—কুম্ভাণ্ড।

ঘনসার—বৃক্ষবিশেষ।

ঘনশব্দ—কোশায়বৃক্ষ।

ঘনঘন—তড়ুলীয় শাক।

ঘনা—মাবপর্ণী। ঘনময়—খজুরবৃক্ষ।

ঘনামল—বাস্তুক শাক।

ঘষণী—হরিদ্রা ॥ ত্রিকাণ্ড ॥

ঘলঘসা—[ স° কলস দ্রোণপুস্পী; ও°

গাইত্র ] ঘলঘসিয়া, হলঘসা;

*leucus linifolia*. তুলস্যাদি-

বর্গের আরণ্য ক্ষুদ্রাবিশেষ।

ফুলের আকার ডোঙার মত,

রং শাদা। প্রকারভেদ—১ ছোট

ঘলঘসা—1. *aspera*. ফুলের

বহিরাবরণ মসৃণ। বৎসরে

দুইবার ফোটে। বর্ষাকালে ও

শীতকালে। ২ বড় ঘলঘসা—1.

*caphalopes*. ফুলের বহিরাবরণ

রৌণ্ড।

ঘণ্টক—ধুস্তর।

ঘাস [ ইং *grass* ]—[ স° যবস,

জবাস, যবাস ] দূর্বাদিতৃণ। চীনে

ঘাস—জাপান ও সিংহলের সমুদ্র-

জাত শৈবালবিশেষ, *gelidium*,

*gracilaria*.

ঘাসকচ—*typhonium flagellifrom*.

ঘিকুমারী—ঘতকুমারী দ্র°।

ঘিতরই—একরকম ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

বিনটিনাটি—*amorantus tenni-  
folius*.

ঘিণালিতা পাট (দেশজ)—*corchorus  
capentaris*

ঘিরপুণ্ডা (দেশজ)—একপ্রকার গাছ,  
*luffa pentanda*.

ঘৃণপ্রিয়া—উদ্ভববৃক্ষ।

ঘুলেণ—ধানবিশেষ, গড়গড়ে ধান।

ঘুকাবাস—শেওড়া গাছ।

ঘৃণবাস—কুমাণ্ড।

ঘৃতকরঞ্জ—ঘিলাকরমচা। পর্যায়—

প্রকাষ, ঘৃতপর্ণক, সিন্ধুপত্র,

তেজগী, বিষারি, সিন্ধুশাক,

বিরোচন।

ঘৃতকুমারিকা—ঘৃতকুমারী দ্র°।

ঘৃতকুমারী—[ অজরা, গৃহকন্যা,

কুমারী, স্কটকা ; হি° ঘিউকুমারী,

বনভস্ককী, কুঠবেপাট ; কো°

বিস্ককণ্ঠন ; ম° কোরকড, কোরফাটো ;

ক° লোয়িমর ; তে° পিন্নগোরিকটল-

বন্দ ; ফা° দরখতেসিন্ন ; অ° মদুসবর ;

ইং *Indian aloë* ] রজনী গন্ধাদি-

বর্ণের শাকবিশেষ, *aloe indica*,

*a. perfoliata*, *a. vern*, *a.*

*chineusis*, *agave p.*, পাতা

মোটা দুই পাশে কাঁটা আছে ও মধ্যে

পিচ্ছল রসযুক্ত। ঘৃতকুমারীর

রস হইতে ‘মদুসবর’ হয়। মদুসবর

চারি প্রকার—(১) সক্রোটাইন,

(২) আরবিক, (৩) জাফরাবাদ,

(৪) মহীশূরে।

ঘৃতকুমারীপর্ণক, ঘৃতকুমারীপর্ণক—

ঘৃতকরঞ্জ দ্র°।

ঘৃতকুমারীমণ্ডনিকা—হংসপদীবৃক্ষ।

ঘৃতকুমারীমণ্ডা—বারসোলা বৃক্ষ,

মাকড়া হাতা।

ঘৃতাচীগভসম্ভবা—বড় এলাচী।

ঘৃণ্টি—চামর আলু।

ঘৃণ্টিলা—চাকুনিয়া।

ঘেঁচু—[ স° ঘেণ্ডুলিকা ] কচাদিবর্ণের

শাকবিশেষ, *spathium chinense*,

*typhonium trilobatum*. বনে

ঝোপে ঘাসের মধ্যে জন্মায়।

ঘেঁটু—[ স° ঘণ্টাকর্ণ ] ভাট দ্র°।

ঘোটিকা—১ বৃক্ষবি°। পর্যায়—ককটি,

তুরঙ্গী, চতুরঙ্গ, ২ লোনী শাক।

ঘোড়াকরণ—বড় গাছ, *ailanthus*

*excelsa*.

ঘোড়াকাতরা—[ স° অশ্বকাতরা ; হি°

ঘোড়েকাথর ] গাছবি°।

ঘোড়ানিম—(দেশজ)—*melia azadi-*

*rachta*.

ঘোড়া মৃগ—*phaseolus sublo-*

*batus*.

ঘোন্টা—১ ঘোন্টাকুল। পর্যায়—  
বদর, গোপঘন্টা, শৃংগাল, কোলি,  
কপিকোলি, হস্তিকোলি, বদরীচ্ছদা,  
কক'ন্ধ, ২ পুংগবৃক্ষ।

ঘোরা—দেবতাড়ী লতা, ঘোষালতা।

ঘোলমন্থনী—ঘোলমোনী গাছ।

ঘোলমহনি—অপামার্গাদিবর্গের ক্ষুদ্র-  
বিশেষ। *deeringia indica*.  
*deeringia celosioides*. গাছে  
জড়ইয়া ওঠে। ফুল ছোট, ফলও  
ছোট, শীতকৃত্ত, গোলাকার।

ঘোলি, ঘোলিকা, ঘোলী—এক প্রকার

পত্র শাক।

ঘোষ—কোষাতকী দ্র°।

ঘোষক—ঘোষলতা।

ঘোষকাকৃতি—১ শ্বেত কোষাতকী  
লতা, ১ মাকাল।

ঘোষলতা—[ স° দেবদালি, কোষাতকী,  
ঘোষক ] একপ্রকার ঝিঙা গাছ,  
*luffa binda*। চারা গাছ। ইহার  
প্রত্যেক অংশ পাতা, ফল,  
ডাটা তিক্ত।

ঘোষা—১ মৌরী, ২ শতপুংপা, ৩  
কোষাতকী, ৪ কাকড়াশৃঙ্গী (?)।

## [ ৮ ]

চই, চাঁঞ, চবিকা—[ স° বল্লী,  
কুটলমস্তক, চবী; হি° চব্য; ম°  
মিরবেলীচে' মৃঠঠ, চবঠঠ; ও°  
চবক; ক° চব্য; তৈ° সেবাম,  
চৈকান; আ° জাতিচাঁঞ; বড়  
চাঁঞ ] চাঁঞ, *piper chabe*.  
তাম্বুলাদিবর্গের বৃক্ষাশ্রয়ী বল্লী,  
লতাবিশেষ। ফল পিপুলের মত।  
ফরিদপুর, খুলনা জেলায়, যশোহর  
ও কোচবিহারে প্রচুর জন্মে।  
চবিকার ফলের নাম গজপিপলী  
বা গজপিপুল, *sciudapsus*

*officinalis*. ইহা কচুআদিবর্গের।  
পর্যায়—চব্যফলা, চব্যজা, ছিদ্র-  
বৈদেহী, দীর্ঘগ্রন্থী, বতর্লী,  
স্থূলবৈদেহী। কোচবিহারে লোকে  
চঞের ডাটার রস ব্যঞ্জে  
ব্যবহার করে ও কন্দবৎ মোট  
চবিকামূল ভাতে দিয়া খায়।

চক্রকুল্যা—চিত্রপর্ণী, চাকুলে।

চক্রপরিব্যধ—আরবগধ, সোদাল।

চক্রপর্ণী—চাকুলে।

চক্রমর্দ—[ স° দদ্রয়; মেঘাঙ্ককুসুম,  
শকুনশন, দৃঢ়বীজ, খজর; ]

কোঁ বড় হেলৈফা ; আসা°  
মেদেলুয়া ; হি° চকবড় । পবাড়,  
পমাড় ; ম° টাংকাঠঠা, তরোটা ;  
ও° কুবাধিয়ো ; ক° চগবে ; তে°  
তাংটামু ; ফা° সংজীম্বোয়া ।

চাকুন্দে, চাকুন্দিয়া, *cassia*  
*alata*, *c. foetida*. অনেকে  
কাসমদ° ভ্রমে চক্রমদ° এবং চক্রমদ°  
ভ্রমে কামমদ° বর্ণনা করিয়াছেন ।  
কাসমদের কাণ্ড মানুষের বৃদ্ধাঙ্গু-  
ষ্ঠের চেয়ে মোটা হয় না, ফুল  
ছোট। শিশি ব ছোট, সরু ।  
অধিকন্তু চক্রমদের কাণ্ড মানুষের  
জগ্ধ্যাতুল্য মোটা হয় । ফুলও  
বড়, শিশি চ্যাটা । চক্রমদের ভাদ্র-  
আশ্বিনে ফুল হয় । ফুল পীত-  
বর্ণ । চাকুন্দে দ্র° ।

চক্রগুচ্ছ—অশোকবৃক্ষ ।

চক্রদন্তী—১ দন্তীবৃক্ষ, ২ জয়পালবৃক্ষ ।

চক্রলক্ষণা—গুলগুণ ।

চক্রশ্রেণী—অজশৃঙ্গীবৃক্ষ ।

চক্রা—১ নাগরমুস্তা, ২ ককটশৃঙ্গী ।

চক্রাঙ্কিতা—বৃক্ষবি° ।

চক্রজা—১ সুদর্শন লতা, ২ ককট-  
শৃঙ্গী ।

চক্রাঙ্গী—১ হিণ্ডা, ২ বৃষপণী, ও  
ককটশৃঙ্গী ।

চক্রাধিবাসিন—নারঙ্গা লেবু ।

চক্রাসী—*swietenia chikrassa*.

চক্রিণ—চক্রমদ° ।

চক্কি (দেশজ)—পানিফলাজাতীয় জলজ  
লতাবি° ।

চক্ষুয়া—১ কুলখ কলাই, ২ অজশৃঙ্গী,  
ও বনকুলখিকা

চক্ষুবর্হন—মেঘশৃঙ্গীবৃক্ষ ।

চক্ষুয়া—১ কেতকবৃক্ষ, ২ পদ্মডরীক  
বৃক্ষ, ও শোভাজনবৃক্ষ ।

চচে°ডলা, চচে°ডা—পটোল লতার  
মত লতা, চলিত কথায় চিচিড়া বা  
চিচিণ্ণে । পর্যায়—বেশমকুল,  
বেতরাজী, বৃহৎফল ।

চণ্ড—১ এর°ডবৃক্ষ, ২ রাঙা ভেরে°ডা,  
ও পত্রণাকবি° [ হি° চেবুলা ] ।  
পর্যায়—বিজলা, কলভী, চীর-  
পত্রিকা, চণ্ডুর, চণ্ডপত্র, স্মৃশাক,  
ক্ষেত্রসম্ভব ।

চণ্ডপত্র—চণ্ডশাক ।

চণ্ডুর—চণ্ডশাক ।

চটকা—*Bauhinia acuminata*.

চটফল—নারিকেল ।

চণ, চণক—ছোলা, *cicer arietinum*.

পর্যায়—হরিমন্থক, হরিমন্থজ, চণ,

হরিমন্থসুগন্ধ, কৃষ্ণচণ্ডক, বাল-  
ভোজা, রাজিভক্ষাকণ্ডুকী ।

চণকা—অতসী, *linum usitatissimum*.

চণদ্রুম—ক্ষুদ্রগোক্ষুর।

চণপত্রী—রদন্তবৃক্ষ।

চণিকা—তৃণ-বি°। পর্যায়—গোদুগ্ধা, সুনীলা, ক্ষেত্রজা, হিমা।

চণীদ্রুম—ক্ষুদ্রগোক্ষুর।

চণ্ড—তিস্ত্রীভৃক্ষ।

চণ্ডা—তৃণ-বি°। ১ শতপদ্যপী, ২ লিঙ্গনীলতা, ২ কপিকছুর ৪ শ্বেতদর্বা, ৫ ইন্দুরকানি।

চণ্ডালকন্দ—কন্দ-বি°।

চণ্ডীকুম্ম—রক্তকরবীভৃক্ষ।

চতুঃপর্ণী—আমরুল।

চতুঃপদ্ম—ভিন্ডীতকবৃক্ষ।

চতুঃফলা—নাগবলা।

চতুঃরঙ্গল—সোম্বাল।

চতুরঙ্গলা—শিউলী।

চতুরঙ্গ—১ অল্পবেতস, ২ বৃক্ষায়, ৩ বৃহৎজম্বীর, ৪ কাগিজলেবু।

চতুর্জাতক—১ দারচিনি, ২ এলাচি, ৩ তেজপাতা, ৪ নাগকেশর।

চতুর্ভূজ—১ মেথি, ২ চন্দ্রপদ (হালিম), ৩ কালোজিরে, ৪ যমানী।

চতুষ্পত্রী—১ সূর্যনিশাক, ২ ক্ষুদ্র পাষাণভেদী লতা।

চতুষ্পর্ণী—সূর্যনিশাক।

চত্বাল—কুশ (? )।

চনা—[ ই° chickpea ] বুট, চনক *cicer arietinum*

চনাশিম—সিঁম্বি°।

চন্দন—১ শ্বেতচন্দন। [ স° শ্রীখণ্ড, ভদ্রশ্রী, গন্ধরাজ, সর্পাবাসম্, গন্ধসারম্, মলয়জম্ ; হি° চন্দন ; ক° গন্ধ ; গুজ° সুখড় ; ফা° সন্দল্ সংফেদ্ ; অ° সন্দলে অবীয়দ্ ; দ্রবি° ম°, তে° চন্দন ; ইং sandel wood ] ছোট আরণ্য তরু-বি, *santalum album*. চন্দনবৃক্ষ নানাপ্রকার গাছের শিকড়ে প্রথম জন্মায়। ২ রক্তচন্দন [ স° তিল-তপণম্, প্রবালফলম্, রক্তসারম্, তাম্রসারম্, ক্ষুচন্দনম্, পতঙ্গ ; হি° লালচন্দন ; ম° রক্তচন্দন ; ও° রতাজলী ; ক° রক্তচন্দন ; তৈ° এরগন্ধপদ্যচেক ; তা° সেন্শাস্তনম্ ; ফা° সন্দলেসুখ° ; অ° সন্দলে অহমর ; ইং red sandel wood ] লালচন্দন, *pterocarpus santalinus*. শিম্বাদিবর্গের নাতদীর্ঘ তরু-বি°। দক্ষিণ ভারতে জন্মে। ৪ কালীয়ক—[ স° নারায়ণপ্রিয়, পীতকাশ্ঠ, ৫ বববিক [ স° শ্বেত,



নিগন্ধ ]। পৰ্যায়—গন্ধসার, মলয়জ, ভদ্রশ্রী, শ্রীখন্ড, মহাহ, গোশীৰ্ষ, তিলপৰ্ণ, মাঙ্গল্য, মলয়োন্মব, গন্ধরাজ, সুগন্ধ, সপৰ্য্যবাস, শীতল, গন্ধাঢ্য, ভোগি-বল্লভ, পাবন, শীতগন্ধ, তৈল-পৰ্ণিক, ইন্দ্রদ্রাতি, ভদ্রশ্রিয়, হিত; হিম, পটৌর, বৰ্ণক, ভদ্রাশ্রয়, সেব্য, রৌহিণ, যাম্য, পীতসার। চন্দন বহুশাখ বৃক্ষ। মহীশূর রাজ্যে প্রচুর জন্মে। গাছের ছালে লম্বা বিদারণ দৃষ্ট হয়। ফুল ছোট; বহুপরিমাণে হয়। প্রথমে ফিকে পীত, পরে ঘোর বেগুনে রং হয়। ফল গোলা মসৃণ, পাকিলে কালো রং। এক মন চন্দন কাঠ হইতে তিন ছটাক তৈল বাহির হয়। চন্দন তেল ও চুয়া একই জিনিস তবে প্রক্ৰিয়াভেদ। উড়িয়ায় চুয়া পানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

চন্দনপুষ্প—লবঙ্গ।

চন্দনমূলী—*urtica tuberosa*.

চন্দনবতুয়া ( দেশজ )—এক প্রকার শাক।

চন্দনবতু—*chenopodium album*.

চন্দনশারিৰা—শারিৰাৰি°।

চন্দনহিরান ( দেশজ )—লতাৰি°।

চন্দনা—শারিৰাৰি°।

চন্দরস—[ইং *sandarac*] শালা দ-বগের উচ্চ সরলবৃক্ষ বি°, *vateria indica*. দক্ষিণ ভারতে জন্মে।

চন্দক—শিগ্রবীজ।

চন্দ্রপণী—প্রসারণী, গন্ধভেদালী।

চন্দ্রপুষ্পা—১ [ হি° শ্বেতরেঙ্গনী ] শ্বেতকণ্টকারী, ২ শ্বেতপ্রভা, বাকুচী, সোমরাল।

চন্দ্রপ্রভা—বাকুচী।

চন্দ্রবল্লরী—১ সোমলতা, ২ কেহ কেহ সাক্ষীশাককে বলে।

চন্দ্রবল্লী—১ সোমলতা, ২ মাধবীলতা; ৩ প্রসারণী।

চন্দ্রবালা—বড় এলাচি।

চন্দ্রভা—শ্বেতকণ্টকারী।

চন্দ্রমল্লিকা—[ ফা° গুল দাউচী ] সোমরাজ্যাদিবগের পুষ্পবৃক্ষবি°, *pyrethum indicum*, *chrysanthemum indicum*. চীন ও জাপান হইতে আনীত। ফুলের রং হলদে।

চন্দ্রমল্লী—লতাৰি°। অষ্টাপদী (?)।

চন্দ্রমূল্য—*kaiupfera galanga*।

চন্দ্রলেখা—বাকুচীলতা, চলিত কথায় সোমরাল।

চন্দ্রলেখা—হাকুচী।

চন্দ্রশূর—হালিম ফল । চাঁদশূর গাছ ॥  
ভাবপ্র° ॥

চন্দ্রসম্ভবা—ছোট এলাচি ।

চন্দ্রসুরস—বৃক্ষবি° । vitex  
negundo.

চন্দ্রহাসা—গুড়ুচী ।

চন্দ্রা—[ স° চন্দ্রিকা, সপ'গন্ধা ; বেষ্বে  
—চন্দ্রা ; হি° ছোট চাঁদ ; বিহার-,  
ও° ধান-মবনা বা ধান-বরুয়া ; তা°  
কোডনমিলপারি ; তে° পটলগন্ধী ]  
তগরাদিবর্গের' ছোট বৃক্ষবি°,  
ophioxylon serpentinum,  
rauwolfia s. ১ এলাচি । ২  
গুড়ুচী । ফুল সাদা রংয়ের ।  
বাহির দিকে রং লাল । ফলের রং  
কালো । প্রতি গাঁইটে ৩৪ পাতা  
বলয়াকারে থাকে । রোমহীন ।  
হিমালয় ও ভারতে বহুস্থানে  
জন্মায় ।

চন্দ্রস্পদা—ককটগন্ধী ।

চন্দ্রিকাবৃজ—শ্বেত পদ্ম ।

চন্দ্রিল—বাস্তুকশাক ।

চন্দ্রেটা—উৎপালনী, নালের গাছ ।

চমরিকা—কৌবদারবৃক্ষ ।

চম্প—১ কৌবদারবৃক্ষ, ২ চাঁপা ফুল ।

চম্পক—[ স° হেমপদ্মপক, ] চাঁপা,  
michelia champaca. গাছ,

পাতা ও ফুল দেখিতে সুন্দর, কিন্তু  
গন্ধ উগ্র । এক ফুল থেকে  
অনেক ফুল হয় । চাঁপা গাছ বহু  
প্রকারের (১) বনচম্পক—অন্নগজাত  
বৃক্ষ । (২) কনকচাঁপা [ স°  
কর্ণিকার, দ্রুমোৎপল, পরিব্যাস ]  
গাছ খুব বড় হয়, pterospermum  
acerifolium. পাতা বড়, চওড়া  
ও গোলাকার । পাতার ডাটা  
পাতার মাঝে বিস্তৃত । ফুলও বড়  
উগ্রগন্ধযুক্ত । (৩) কাঠালী চাঁপা—  
আতাদিবর্গের লতানে ছোট গাছ,  
artabotrys odoratissimus.  
পাতা মনোহর । ফুলে কাঠালগন্ধ,  
হলদে রংয়ের ঈষৎ আমেজযুক্ত ।  
শ্রিতল । এক ফুল হইতে অনেক  
ফুল জন্মে । বোটার গোড়ায়  
অক্লুশ আছে । (৪) গোবরিয়া  
চাঁপা । (৫) জহরচাঁপা—ছোট  
বৃক্ষ, magnolia. সুমিষ্ট ফুলের  
গন্ধ বহুদূর বিস্তৃত । (৬)  
দলালচাঁপা—hedychium cor-  
onarium. ফুল সাদা ।  
শীতকালে পাতা ঝরিয়া যায় । (৭)  
দুর্গাচাঁপা—magnolia ptero-  
carpa. চট্টগ্রামে জন্মায় । ফুল  
বড় বড় ও সাদা রংয়ের । (৮)

ভুইচাঁপা—[ স° ভূমিচম্পক ; হি°  
মুখজালী ] কীটমার, *koempferia*  
*rotunda*. গ্রীষ্মকালে ও কোন  
কোন স্থানে শীতকালে ফুল  
ফোটে । জলাভূমিতে ঘাসের  
মাঝে জন্মায় । পাতা খয়রা বর্ণ,  
ক্ষুদ্র, ত হাতে আঠাল লোম  
আছে । পৰ্যায়—স্বর্ণপুষ্প,  
চাম্পের, শীতলচ্ছদ, সুভগ,  
ভূমহী, ভ্রমরাতিথি, সুরভি,  
দীপপুষ্প, হেমপুষ্প, পীতপুষ্প,  
হোমাহব, সুকুমার, বনদীপ,  
স্থিরগন্ধ ।

চম্পকরুভা—চাঁপাকলা ।

চম্পককালু—কাঁঠালি ।

চম্পককোষ—কাঁঠাল ।

চম্পালু—কাঁঠাল ।

চম্বেলি—চামেলী ।

চরঙ্গী—[ হি° ভরঙ্গী, তিথাই ] ছোট  
বৃক্ষ, *picrostima quassiodes*  
হিমালয় প্রদেশে জন্মায় । বিস্তৃত ।  
গাছের কাঠ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

চকিঁণ—চাকুশেদ গাছ ।

চচরীক—শাকবি° ।

চউট—কাঁকড় ।

চমকরি—মাংসরোহিণী লতা ।

চমকশা, চমকষা, চমকসা—১ সপ্তলা

লতা, ২ মাংসরোহিণী লতা ।

চমবৃক্ষ—চমতুল্য বৃক্ষল প্রধান বৃক্ষ,  
ভূজবৃক্ষ ॥ হরিব° ॥

চমক্সা—[ কোকনদেশে—ভগবতবল্লী ]  
আবর্তকী লতা ।

চমরী—এক প্রকার বিষলতা । ফলে  
বিষ আছে ।

চমসম্ভবা—এলাচি ।

চমিন—ভূজবৃক্ষ ।

চলদল—অশ্বথবৃক্ষ ।

চলপল্ল—অশ্বথবৃক্ষ ।

চলস্—[ ইং wood-sorrel ] বৃক্ষবি° ।

চবি, চবিক, চবিকা, চবী—চই, *piper*  
*longum*.

চব্য, চব্যক—চই ।

চব্যজা, চব্যকল—গর্জপপুল ।

চব্যা—চই ।

চাঁপা—[ স° চম্পক ] চম্পক দ্র° ।

চাঁপাকলা—কলা দ্র° ।

চাঁপানটি, চাঁপানটে—[ স° মেঘনাদ,  
তন্দুলীয়, তন্দুলীয়, অম্পহারীষ,  
বহুবীৰ্য ; হি° টোলাইকা শাক ;  
তে° মোলাকুরা ; ম° তান্দুলিজা ;  
কিরকুশালে ; তা° মুল্লুকিরই ;  
দ্রবি° কাভেয়াট ; ফা° সুপেজমজ ;  
অ° বৃকলেয়মানিয় ] চাঁপানটে,  
ক্ষুদ্রে - নটে, *amarantus*

polygamus. চাঁপানটের ক্ষুদ্র  
প্রায় গুল্মাঠিত থাকে। চাঁপানটে  
দুই প্রকার—(১) শ্বেতচাঁপানটে,  
(২) রক্তচাঁপানটে। নটিয়া দ্র°।

চাঁপা মৃচ্ছন্দ—চাঁপা দ্র°।

চা—[ ফা° চায় ; ইং tea plant ]  
ছোট গাছবি, *camellia*  
*theifera*. ভারতে আসাম প্রদেশে,  
চীন, জাপান, আমেরিকা ও  
হল্যান্ডে জন্মায়। ইহার পাতা  
গরম জলে ভাপাইয়া সেই জল খায়।  
সাধারণত দুই প্রকার—(১) কালো  
চা; (২) সবুজ চা। কালো  
চা—(ক) কনগা, (খ) স্ফুট, (গ)  
পিকো, (ঘ) কেপায়। সবুজ  
চা—(ক) হাইসন, (খ) স্কিন, (গ)  
ইয়ং হাইসন, (ঘ) টোয়ানকি, (ঙ)  
ইম্পিরিয়েল, (চ) গান পাউডার।

চাকদানা—এক প্রকার ঔষধের গাছ।

চাকন্দা—[ স° চক্রমদা, অক্ষুদ্র, দদ্রুয়,  
দাদমদন ; হি° চাকন্দা ; বড়  
হেলেণ্ডা ; ও° চাকন্দা ] দাদমারি,  
চাকন্দে, *cassia alata*, *c. tara*  
( *dittura* ); *c. foetida*  
কাণ্ডনাদিবর্গের ছোট অরণ্য গাছ।  
কাশন্দার মত গাছ, দুর্গন্ধ।

চাকন্দা—চাকন্দা দ্র°।

চাকন্দে, চাকুরিয়া—চক্রমদ°।

চাকুরিয়া গাছ—[ স° অণ্ড্রিয়-পর্ণিকা,  
চিত্রপর্ণী, *hedysarum lagopo-*  
*diodes*.

চাকুরিয়া—[ স° চক্রকুল্যা, চক্রপর্ণী,  
পুষ্টিপর্ণী ; হি° পেটবাষ ;  
*vraria logopoides*, *hemion-*  
*tes cordifolia*. শিম্বাদিবর্গের  
ছোট অরণ্য লতানে গাছ। পাতা  
রোম্যাপর্ণ। ফুল লাল, লতাইয়া  
ষাইবার সময় গাঠে শিকড় হয়।

চাকুরী—একপ্রকার পুষ্প।

চাকুরী ( দেশজ ) — স্থানবিশেষে  
কমলালেবুর নাম।

চাকুরী—[ স° অন্নবান্ধক ] আমরুল ॥  
ভাবপ্র° রাজব° ॥

চাকুর্যমূলক—চণকমূলী। নামান্তর  
বালেয়, বিষুগুপ্তক, স্থলমূল,  
মহাকন্দ, কোটিল্য, মরুসম্ভব,  
শালাক, কটুক, মিত্র ॥ রাজনি° ॥

চাকুর—একজাতীয় ক্ষুদ্র, *ophioxy-*  
*lon serpentenum* ॥ Rox ॥  
সচরাচর দুইটি গাছ এক স্থানে  
জন্মে। এই জন্য দুইটি মূল  
জড়ানো ভাবে থাকে। গাছ প্রায়  
এক হাতের বেশি উঁচু হয় না।  
রক্ষাশ্রিত পাতার মত পাতা, কিন্তু

আকারে ছোট। ফুল গুচ্ছাকারে  
হয়। ফুলের রঙ ঈষৎ বেগুনে।  
ফল ফলসার মত, পাকিলে কালো  
হয়। এই গাছের মূল উষ্মাদের  
ঔষধ-রূপে ব্যবহৃত হয় ॥ সা-প-প°  
১৫১০ ॥

চালতা—অন্নরসবিশিষ্ট ফলবি°।

চিচিড—চিচিঙ্গা।

চিতা—ওষধিবৃক্ষ।

চিত্রপণীবৃক্ষ—চাকুলিয়া গাছ।

চিত্রা—১ মূষিকপণী, *cucumio*  
*madraspstanus*. ২ দন্তীবৃক্ষ,  
৩ মৃগেৰ্বারদ, ৪ গম্ভদর্বা, ৫  
ইন্দুরকানি।

চিত্রাক্ষুপ—দ্রোণপুষ্পী।

চিত্রাঙ্গ—রাখিচতা, চিত্রক, চিতা।

চিত্রাবহর (দেশজ)—বৃক্ষবিশেষ।

চিত্রিকা—চিত্রা দ্র°।

চিত্রা—এক প্রকার অশ্বথের নাম বিশেষ।

চিনঘাস, চীন, চীনা—তৃণবিশেষ [ ইং  
millet ] পাতা চওড়া, লোমশ,  
শীষ বহু বিভক্ত, পাকিলে বাঁকিয়া  
পড়ে, *panicum maliacum*.  
চীনা দ্র°।

চিনি কামরাঙ্গা (দেশজ)—কামরাঙ্গা  
বিশেষ। ফল কামরাঙ্গার আকারের  
অর্ধেক, তত অন্ন নয়, পাকা

অবশ্যায়ও সবুজ থাকে।

চিডডী—তেঁতুল গাছ ॥

চিন্ন—চিনে ধান।

চিমি; চিমিক—পাটশাক।

চিরজীবক—জীবকবৃক্ষ।

চিরজীবিন্, চিরজীবিন্—১ জীবকবৃক্ষ  
২ শাল্মলিবৃক্ষ।

চিরঞ্জি ( হি° )—পিয়ালগাছের ফল,  
*buchania latifolia*.

চিরতা, চিরেতা—[ স° কিরাতক,  
কিরাতিত্ত, চিরতিত্ত ; ডে° নেলা-  
ভের্ম ; শাকবি°, *swertia chi-*  
*rata*, *agathotes cherayta*,  
অতি তিত্ত, হিমাচল প্রদেশে জন্মে।  
ভারতে ৩৭ প্রকার চিরতা দৃষ্ট  
হয় ; আছে ১৮০ প্রকার। কয়েকটি  
প্রকারভেদ—(১) ছোট চিরতা—  
*adenema hyssopifolia*.  
দাক্ষিণাত্যে পাওয়া যায়, (২)  
চিরতা—*gentian chirata*, (৩)  
বেগুনী চিরতা (কুবড়ী)—  
*exacum tetragona*, (৪)  
পাহাড়ী, চিরতা—*ophelia*  
*angustifolia*. পর্যায়—ভূনিয়,  
রামসেবক। এই গাছ তুটান ও  
খাসিয়া পাহাড়ে প্রচুর জন্মে।

চিরপত্রিকা—কপিষ্মপণী বৃক্ষ।

চিরপাকিন—কদ্বেল গাছ ।

চিরপুষ্প—বকুলগাছ ।

চিরবিষ্ব, চিরবিষ্বক, চিরবিষ্ব—  
করম্ভা, *dalbergia arborea*.

চিরবীৰ্ণ—লালভেরাণ্ডা ।

চিরাটিকা—১ শ্বেতপদ্মনর্বা, ২  
বটিকালতা পাতাড়ী, ৩ কিরাতক  
চিরতা ।

চিরমির—গাছড়াভেদ ।

চিকণী—সুপারী ।

চিভিটা—১ কাঁকড়, ২ গোমদক ফল ।  
পর্যায়—সুচিরা, চিগ্রফলা, ক্ষেত্র-  
চিভিটা, পাণ্ডুলফা, পথ্যা, রোচন-  
ফলা, চিভিটিকা, ককঁচিভিটা ।

চিলপদ্ম—বৃক্ষভেদ ।

চিলমুরি—বৃক্ষভেদ ।

চিনিয়াটন্দী (দেশজ)—বৃক্ষবিং ।

চিল্লী—১ লোধবৃক্ষ, ২ বাস্তুক শাক ।

চিবিল্লীকা—ক্ষুদ্র ক্ষুপবিং । পর্যায়—  
রক্তদলা, ক্ষুদ্রঘোলা, মধুমাল-  
পত্রিকা ।

চিবুক—মুচুকুন্দবৃক্ষ ।

চীচীরিয়া—গুল্মবিং ।

চীনক—ধান্যবিং । ॥ রাজবং ॥ পর্যায়-  
কাককঙ্ক ।

চীনরাজগুহ—ন্যাসপাতি গাছ ।

চীনা—ধান্যবিং । শ্যামাধানের মত

ক্ষুদ্র ধান । বিহার ও বোমাই  
প্রদেশে জন্মে । পাতা রোয়াযুক্ত  
বড় ।

চীনানারাগী—বৃক্ষবিং, *triphasla*  
*aurantiola*.

চীনাবাদাম—আটকে-কলাই দ্র° ।

চীনামলক—পানি-আমলা । আমলকী  
দ্র° ।

চীনী—কদলীবিং ।

চীরপত্রিকা—চণ্ডশাক ।

চীরপর্ণ—শালবৃক্ষ ।

চীরদক—চেউফল ॥ রাজবং ॥

চীর্ণপর্ণ—১ নিমগাছ, ২ খেজুর গাছ ।

চঁচমুড়মাড়ি—*Isolepis squarrosa*.

চঁচা—[ ইং country sorrel ]  
*cyperus compresas*.

চুআ (দেশজ)—১ ক্ষুদ্র গাছবিং, ২  
ঔষধিলতাবিং ।

চুকপালঙ্, চুকাপালঙ্গ, চুকপালং—  
চুক্র দ্র° ।

চুক্র—[ স° চুকপালঙ্গ, অম্রবেতস ; হি°  
চুকা, চুকাকা শাক ; ম° আশ্বটচুকা,  
লঘুবথোর ; ও° চুকাঘাটীভাজী ;  
ফা° তুশক ; ক° হুলিচকোত ; অ°  
হুমার চুক্লে হামেজা ; ইং  
sorrall ] শাকবিং, অম্রশাক বিং ॥  
রাজনিং, ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—



থৈকল, মেস্ত, আমরুল, শতবেধী, অম্রবেধী, রসায়, বেতসায়, বেধক, ভীম, ভেদন, রাজায়, অম্রভেদন, অম্রাকুশ, রক্তসার, ফলায়, অম্রনায়ক, সহস্রবেধী, বীরায়, গন্ধমকেতু, বরাভিষা, শম্ভদ্রাবী, মাংসদ্রাবী, বরাঙ্গী, দলায়, শুক্তা  
 ॥ প্রবোধ ॥ ওয়াট ॥ rumex  
 vesicarius.

চক্রক—চুকাপালং ।

চক্রফল—বক্ষায় ।

চক্রবাস্তক—চুকাপালং ।

চুক্রা—আমরুল; ২ তিস্তিড়ী ।

চুক্রাবাস্তকী—আমরুল ।

চুচ—স্বদনী-শাক ।

চুচ—শাকবিং, ঘাসবিং ।

চুনথড়কী ( দেশজ )—apluda  
 aristata.

চুপিড়ি-আল—আলবিং, dioscorea  
 globosa. আল দ্র° ।

চুড়াল—১ উচুটা তৃণ; নির্বিষী-ঘাস,  
 ২ শ্বেতগুঞ্জা, ৩ নাগরমুখা ।

চুত, চুতক—আম্রবক্ষ ।

চুয়া—বক্ষবিং । বাঙলায় ও উত্তর-  
 পাশ্চিম প্রদেশে পর্বতীয় স্থানে  
 জন্মে ।

চুর্ণক—যষ্টিংক, শালিধান্যবিং ।

চুর্ণশাকাক—চিগ্রকুট গিরি প্রসিদ্ধ  
 এক প্রকার শাক । ইহার অপর নাম  
 গৌরস্বর্ণ ॥ রাজনিং ॥

চেঁচকা—limnochloa plantagi-  
 nea.

চেঁচুয়া, চেঁচুক ( দেশজ )—ঘাসবিং ।

চেতনকী—হরিতকী ॥ রাজনিং ॥

চেলান লতাবিং । পর্যায়—অপ-  
 প্রমাণক, চিত্রফল, সন্ধাস, রাজ-  
 তিনিশ, লতাপনস, নাটায়, মেট ।

চেনাট পিপ্পল—stillingia sebifera.

চেলনটিয়া ( দেশজ )—ক্ষুদ্র বক্ষবিং ।

চৈত্য—১ উদ্দেশবক্ষ । পর্যায়—  
 দেবতরু, দেবাবাস, করিভ, কুঞ্জর ।

২ বিল্ববক্ষ ।

চৈত্যতরু, চৈত্যদ্রু, চৈত্যদ্রুম—  
 অশ্বথবক্ষ, অশোকবক্ষ ।

চৈই ( দেশজ )—চইগাছ ।

চৌচড়া ( দেশজ )—ঘাসবিং ।

চোচ—১ দারুচিনি, ২ তেজপাতা, ৩  
 তালফল, ৪ কদলীফল, ৫  
 নারিকেল ।

চোড়া—মহাপ্রাণিক, বড়ধূলকুড়ী ।

চোতক—দারুচিনি ।

চোপচিনি, চোপচীনী—চীনের ক্ষুদ্র-  
 বিং, smilax china.

চোরক—পুকা শাক, পিড়িক শাক ।

চোরকাটা—[সি গোরক, চোরপুস্পী]  
ধানাদিবর্গের তৃণবি, chryso-  
pogon acicularis, andropo-  
gon aciculatus. ভাটা সোজা  
তাতে ফুল হয়।

চোরপুস্পিকা—চোরপুস্পী।

চোরপুস্পী—[হি শংখহুলী বা বোলা]  
শাখিনী, চোরহুলী বা হোঠাহুলী।

ফুল শাখের মত। পর্যায়—  
শাখিনী, কেশিনী, চোরপুস্পিকা,  
অধঃপুস্পী, মঙ্গল্যা, অগরপুস্পী,  
রাবতী, হেটলী।

চোরা—চোরপুস্পী।

চোলন—নল, খাগড়া।

চোপক—মোঁদাগ।

চ্যাত—গ্রামবৃক্ষ, আম।

[ ছ ]

ছটাফল—সুপারি গাছ।

ছত্রক—বেঙের ছাতা দ্র°।

ছত্রপত্র—ছত্রাকার পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ,  
১ শ্মল-পত্র, ২ ভূজপত্র বৃক্ষ,  
৩ মানকচু, ৪ ছাতিম গাছ।

ছত্রপুস্প, ছত্রপুস্পক—তিলফুল গাছ।

ছত্রবৃক্ষ—মুচুকুন্দ ফুলের গাছ।

ছত্রা—১ মোরী, ২ শলফা, শলফা;  
৩ ধনে, ৪ মঞ্জিষ্ঠা, ৫ কোড়ক ছাতা;  
৬ কাম্বার দেশজাত ধনের ন্যায়  
গাছ।

ছত্রাক—জাল-বর্জরক-বৃক্ষ। বেঙের  
ছাতা দ্র°।

ছত্রাকী—রাসনা।

ছত্রাতিছত্র—ছত্রাকার জলজাত সুগন্ধি  
তৃণভেদ। পর্যায়—পালয়্য,

অতি-পদ্ম, স্নগন্ধা, ছত্রক, কটুক,  
কটু, চলতি কথায় ছাতু।  
ছত্রক দ্র°।

ছত্রাধান্য—ধন্যাক, ধনে।

ছত্রিকা—পাতাল-ফোড় শিলীশ্বদ্র।

পর্যায়—গোময়-ছত্রিকা, দিলীর,  
শিলীশ্বদ্রক, বসারোহ, গোলাস,  
উর্বঙ্গ, ছত্রাক, উচ্ছলীশ্বদ্র।

ছদ—১ গ্রন্থিপণী বৃক্ষ, গেঁঠেলা,  
২ তমাল-বৃক্ষ, ৩ তেজপত্র (শদ্বদ্র  
পাতা)।

ছদন—১ তমাল-পত্র, ২ তেজপাতা।

ছদপত্র—ভূজপত্র।

ছদ্মিকা—গুলগু।

ছদর্দন—১ তিতলাউ, ২ নিম্ববৃক্ষ, ৩  
মদন-বৃক্ষ।

হর্দিপাণিকা—কাঁকুড় ।

হর্দি'কা—বিষ্ণুক্রান্তা; একপ্রকার বৃক্ষ,  
অপরাজিতা গাছ ।

হর্দি'কারিপদ্—ক্ষুদ্রৈলা, গুজুরাতি  
এলাচ ।

হর্দি'ঘ্ন—নিম গাছ ।

হর্দ্যাপনক—কাঁকুড় ।

হাঁচি—হাঁচিকুমড়া—[ স° কুম্ভান্ড ]  
*benincasa cerifera* savi.  
পর্যায়—কর্কোটিকা, কুম্ভান্ডী,  
কুম্ভান্ডী, বৃহৎফলা, সুফলা,  
কুম্ভফলা, নাগপদ্মফলা, আদি  
জন্মস্থান জাপান ও যব্বীপ ।  
ভারতে সর্বত্র চাষ হয় । কুমড়া দ্র° ।

হাঁচি বেত—বেত দ্র° ।

হাঁচিপান—একপ্রকার সুগন্ধি পান ।  
পান দ্র° ।

হাইলা—এক প্রকার গাছ । সুন্দরবন  
ও ২৪-পরগনায় হয় ।

হাগলখুড়ি; হাগলখুড়ি—[ ও°  
কনসারি-নটা ; হি° দোপাটি লতা ;  
তে° চেচুলাপিম্বি তিগি ; তা°  
আদাপদুকদী । *ipomoea*  
*pescapra* কলম্বী-আদিবর্গের  
আরগলতা । সুন্দরবনে; উড়িষ্যা-  
প্রদেশে সমুদ্রতীরে জন্মে । ফুল  
রক্তবর্ণ । তাহাতে নীলের আমেজ

আছে । পাতা মধ্যে খণ্ডিত ।

হাগললাখু ( দেশজ )—বৃক্ষদারক-বৃক্ষ,  
বিতারিয়া গাছ ।

হাগল-নাদি ( দেশজ )—বৃক্ষ-বিশেষ ।

হাগল-পটপটি—*euphorbia dracun-*  
*culoides*.

হাগলপাটী ( দেশজ )—*cynanchum*  
*paniciflorum*.

হাগলশিত্রকা—বৃক্ষদারক-বৃক্ষ, বিতারক  
গাছ ।

হাগলবাটী—রোহিণী । অর্কাদিবর্গের  
আরগলতাবি°, *doemia extensa*.  
প্রকারভেদ—১ [ ও° উৎকলি ]  
একজাতীয় দৃগন্ধ ও রোয়াযুক্ত,  
ফুল হলদে, *doemia extensa*  
২ অন্যজাতি [ হি° কালিয়া লতা ]  
*cynanchum callialata*.

রোয়াশূন্য, ফুল বেগুনে রঙের ।

হাগলবাটী—লতানে উদ্ভিদবি°,  
*naravelia zeylanica*.

হাগলনাদী, হাগলনাদি—সোমরাজ্যা-  
দিবর্গের বন্য শাকবি° । ধান ক্ষেতে  
জন্মে । ডাটা শিরাল, ফুল ছোট-  
ছোট, গোলাকার, *sphaeranthus*  
*indicus*.

ছাতা, ছাতি, ছাতু—উদ্ভিদ । ছাতার  
মত দোঁখতে ফুল হয় না, *mush-*

room, toad's stool agaricus.

১ পলছাতু—পচাখড়ে যে ছাতা জন্মায়। এই ছাতা মানুষ খায়।

২ কাঠছাতু—পুরানো ভিজা কাঠে যে ছাতা জন্মায়, polyporus

ছাতিন, ছাতিম গাছ—[ সঁ সপ্তপর্ণ, ছত্রপর্ণ, বৃহৎত্বক, গুড়পুষ্প ; হিঁ ছতিবন্, ছাতিয়ান ; কোঁ ছাইতান ; মঁ সাশ্বিন ; কঁ এললেগ, এড়াকুল, এরিটাকু ] ছাতিম গাছ।

alstonia scholaris, a olean-drifolia, echites scholaris.

তগরাদিবর্গের বন্য গাছ।

পল্লীগ্রামে বনে জঙ্গলে এই গাছ জন্মিয়া থাকে। প্রায় ৪০ হাত উচ্চ হয়। গাছের ছাল মোটা, শাদা ও তিস্ত। কাটিলে সাদা আঠা নিগত হয়। শিমূল পাতার মত পাতা। পাতাগুলি শাখার চতুর্দিকে ছাতার ন্যায় বিন্যস্ত।

এইজন্য ইহাকে ছত্রপর্ণ বলে। ফুল হরিতাভ শাদা, ছোট।

ফুলের গন্ধ মদের মত (হাতির নাক-গেথ হইতে যে জল বাহির হয় তাহাকে 'মদ' বলে।)

ও শরৎকালে ফোটে। ফুল, ছাল ও আঠা ঔষধার্থে ব্যবহৃত

হয়। কান্ডের বাস্টে বিদ্যালয়ের বোর্ড তৈয়ারী হয়। গহিঠে-গহিঠে ৬-৯টা পাতা।

ছাদন—নীলাগ্নান-বৃক্ষ, কালাকোরঠা ফুল গাছ।

ছাবী—সুরপদ্মাগ-বৃক্ষ, ছবিয়ান ফুল।

ছায়া—aerua lanata.

ছায়াদ্রুম—১ ছায়াতরু, ২ নমেরু বৃক্ষ।

ছিকণী—[ সঁ ঘাগদুঃখদ ] বৃক্ষভেদ, হাচুটি, ছিক্‌নি, নাকছিকনি ॥

ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—ক্ষবকুৎ, তিস্তা, ছিক্‌কা, উগ্রা, উগ্রগন্ধা।

ছিক্‌কা—বৃক্ষবি°, হাচুটি।

ছিঁচনী—হাঁচোটি।

ছিছরা—ধান্যবি° ॥ শূন্যপদ্° ॥

ছিস্তি—ডহরকরমচা গাছ।

ছিদ্রবৈদেহী—[ সঁ গজপিপ্পলী ]

ছিদ্রপ্রধানা বৈদেহী শাক পার্থিববৎ।

ছিদ্রাস্তর—ছিদ্রমস্তমধ্যে নল খাগড়া।

ছিদ্রাফল—মাংসফল।

ছিমগ্রাশ্বিনিকা, ছিমগ্রাশ্বিনী—ত্রিপর্ণ-কালতা।

ছিম্পদ্রটী—অম্বাষ্ঠা (?)।

ছিম্পপুষ্প—তিস্কপুষ্পবৃক্ষ।

ছিম্পরুহা—১ গুলঞ্চ। পর্যায়—

বৎসাদনী, মধুপর্ণী, অমৃত,

অমরাকুন্ডলী, অমৃতবল্লী, গুড়ুচী,

চক্লক্ষণা । ২ স্বর্ণকৈতকী,  
৩ শাল্লকী ।

ছিন্না—গদুলগু, গদুচী ।

ছিন্নোভবা—গদুলগু ।

ছুরিচিয়া ( দেশজ )—তর্গবি° ।

ছুরিকাপত্ৰী—শ্বেতবৃক্ষ ।

ছুরিপত্রক, ছুরিপত্রিকা, ছুরিপত্ৰী—  
বৃশ্চিকালীলতা, বিছুটি ।

ছুরিকাপত্ৰী—বিছুটী ।

ছেলু—সোমরাজী গাছ ।

ছোট আকন্দ—আকন্দ দ্র° ।

ছোট উলুচা ( দেশজ )—ধাসবি° ।

ছোট ওকড়া—zapania nodiflora.

ছোট কট—sagittaria, sagittifolia.

ছোট কব্বা ( দেশজ )—লতানবৃক্ষবি°,  
carpopogon pruriens.

ছোট কল্প ( দেশজ )—borago  
indica.

ছোট কাণ্ডা ( দেশজ )—trades-  
cantia umbricata.

ছোট কিরাতা—slevogtia verti-  
cillata.

ছোট ক্ষীর্নই—euphorbia chama-  
esyce.

ছোট গোখরী—cyperus dubius.

ছোট চাঁদ—ophioxylon serpenti-  
num.

ছোট জাম—eugenia caryophyllata.

ছোট কঙ্কন—crotalaria prostrata.

ছোট কাঁজি—utricularia biflora.

ছোট দুধলতা—asclepias gemirata.

ছোট নৌকা—জলজ বৃক্ষ, pontidera  
hastata.

ছোট পানচুলি—villarsia cristat<sup>a</sup>  
v. indica ( বড় পানচুলি ) ।

ছোট পিনেনটি—aira filiformis.

ছোট ফুটিকা—osbeckia aspara.  
বড় ফুটিকা দ্র° ।

ছোট বন্দা—loranthus globosus.

ছোট বয়ব—zizyphus rotandifo-  
lius.

ছোট বিষতাড়ক—argyreia argen-  
tea.

ছোট ভুইকামাদী—columnnea to-  
mentosa.

ছোট মটর—[ ইং grey pea ] plsum  
sativum quadratum.

ছোট মন্দা—loranthus globosus.

ছোট মসুর—[ ইং hardy sare ]  
ervum hirsutum, বড় মসুর,  
e. leus.

ছোট মেছেতা—justicia poly-  
sperma.

ছোট মেথি—trifolium indicum.

ছোট রক্তকম্বল—*nymphaea rosea*.

বড় রক্তকম্বল, *n. rubra*.

ছোট রিঠা—[ স° ফেনিল অরিষ্ট ; হি°

দোদন, রিঠ ; ও° ইট ] বড় গাছ ।

*sapindus mukorossi gaertn.*

শাদা বা বেগুনে ফুল হয় ।

ছোট লুনিয়া—*portulaca meri-*

*diana*.

ছোট শালুক—*nymphaea stettata*.

ছোট শর্ষি—*nymphaea edulis*.

বড় শর্ষি, *n. versicolor*.

ছোট হলকষী—*leucus esculenta*.

ছোয়ারা—[ হি° ছুয়ারা ] বন্য খেজুর,

*phoenix dactylifera*. খুর্মা দ্র° ।

ছোলক—[ স°—মাতুলক ] বাতাবী

লেবু, বেগপুড়া, *citrus medica*.

লেবু দ্র° ।

ছোলা—[ স°—হরিমুখ, চণক ; হি°

চনা, বুটে ; ও° বুট, সোলা ; ম°

চনা ; তা° কাদালয়, কদনাই, তে°

সন্নগল ; ক° কডলে, ইং *gram*,

বা *chick pea*] *cicer ariet-*

*num*. ছোলা, ছলা । পর্যায়—

চণ. হরিমুখ, সুগন্ধি, কুঞ্চপুঙ্ক,

বালভোজ, কাঞ্জিভোজ, কণ্ডুক ।

শিখাদিবর্গের শাকবি° ।

ছোহারা—ছোয়ারা । খুর্মা দ্র° ।

## [ জ ]

জই—[ স° যব ; ইং *oats* ] যবাদি-

বর্গের শস্যবি°, *avena sativa* ।

ঘোড়ার খাদ্য । নীলনিগন্ধ ।

জকুট—বার্তাকুপুংপ ।

জগমদন—*gendaraussa vulgaris*

( *justicea gandarusa* ( ? ) )

জঘনেফলা—কাকোডুস্বরিকা ।

জঙ্কি (দগজ)—একজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষ ।

জঙ্কিজাম—*dalrympelia pomifera*.

জঙ্গলীনারাঙ্গ—নারাঙ্গাবৃক্ষবি° ।

জঙ্গলআদা—আদা দ্র° ।

জঙ্গলীকাপাস—*hibiscus iritfolius*,

জঙ্গলীখেজুর—এক প্রকার খেজুর ।

জঙ্গলীদাল—*potanochloa retxu*.

জটাকাণ্ডা—*commelana com-*

*nunis*.

জটামাংসী—[ ইং *spikenard* ]

শাকবি° *valeriana jatamansi*,

*nardostachys*. j. হিমালয়

প্রদেশে জন্মে । ইহার কন্দে জটর

মত শিকড় আছে । ইহা তেল সুগন্ধি

করিতে ব্যবহৃত হয় ॥ রাজনি° ॥



জটারদ্রা—রুদ্রজটা লতা ।

জটাল—বটবৃক্ষ, ২ আমহলদ্র ।

জটলা, জটাবতী—জটামাংসী ।

জটাবল্লী—রুদ্রজটা লতা ।

জটাসালপানী—*dicerna pulchellum* .

জটি—১ বটবৃক্ষ, ২ জটামাংসী ।

জটিন—পাকুড় ।

জটীলা—১ জটামাংসী, ২ পিপ্পলী,  
৩ দমনকবৃক্ষ ।

জটী—১ পকটীবৃক্ষ, ২ জটামাংসী ।

জঠরগুণ্ড—আরুণবধ, সৌদাল । ইহাতে  
উদরভঙ্গ হয় বলিয়া এই নাম ।

জড়া—১ শূক্‌শম্বী, আলকুশী, ২  
ভংই-আমলা ।

জড়ামাংসী—জটামাংসী ।

জতুকা—[ হি' পপু'রী ] পপটি লতা ।

পর্যায়—জতুকারী, জননী,

চক্রবর্তিনী, তিষকফলা, নিশাম্বা,

বহুপত্রী, সুপত্রিকা, রাজবৃক্ষা,

জনেটা, কপিপক্ছ, ফলোপমা,

রঞ্জনী, সূক্ষ্মবল্লী, লমরী,

কৃষ্ণবল্লিকা, বিজ্জলিকা, কৃষ্ণরুহা,

তরুবল্লী, দীর্ঘকলা । গুণ :

রুচিকারী; তিষক শীতল ও

অগ্নিকর ॥ রাজনি° ॥

জতুকারী—জতুকালতা ।

জতুপালফ ( দেশজ ), জদুপালফী—  
*salicornia indica* .

জননী—১ বংইফুল, ২ জটামাংসী ।

জনপ্রিয়—১ সজনে গাছ, ২ ধনে ।

জনপ্রিয়া—হেলাগা; হিগা ।

জনবল্লভ—শ্বেতরোহিত বৃক্ষ ।

জনার—[ স' যবনাল, যাবনাল ; হি'  
জুনেয়া ; উ' মকা, ইং *zea maze*,  
Indian corn ] মকা ; ভুট্টা, *zea*  
*maze*, *andropogon bicolor* .

ধানাদিবর্গের শস্যবি° । বিহার  
প্রদেশে বহু পরিমাণে ইহার আবাদ  
হয় । দক্ষিণ আমেরিকা ইহার আদি  
জন্মস্থান । পর্যায়—যবনাল,  
যোনালা, জুর্গায়স্ব, দেবধান্য,  
জোস্তালা, বীজ পদ্মিকা ।

জনি—জতুকা ।

জনিলাকা—মহানীলীবৃক্ষ ।

জনেট—মদুগর পদ্মবৃক্ষ ।

জনেটা—১ জতুকা, ২ হরিদ্রা, ৩  
জাতীপদ্ম ।

জন্তুর—বীজপদ্মবৃক্ষ, ট্যাবালেবু,  
বিড়ঙ্গ, ৩ হিঙ্গ ।

জন্তুনাশন—১ হিঙ্গ, ২ বিড়ঙ্গ ।

জন্তুপাদপ—কোষায়বৃক্ষ, কেওড়া ।

জন্তুফল—যজ্ঞভূমুর এ উদ্ভৃম্বর ।

জন্তুহৃদী—বিড়ঙ্গ ।

জপা—১ জবাপদ্মবৃক্ষ। ২ জবাপদ্ম।

জবনাল—জনাল, মক্কা।

জবিল—কোকড়বৃক্ষ।

জবসা—[ ইং hebrew manna  
peant ] alhagi maurorum.

জবা—[ সঁ ওড্রপদ্ম ( পিচ্ছিল পদ্ম )  
রক্তপদ্মপী, অর্কপ্রিয়া, হরিবল্লভা,  
সূর্য্যারামসাধননী ; হিঁ ওডহুল,  
ওচুল, জবা; ওডহর, মঁ জামবন্দ,  
গুজু জাম্বু ; কঁ দাসনল ; তেঁ  
মন্দরপদ ; উঁ মন্দার ; ইং  
shoe-flower ] জবা ফুলের গাছ  
॥ রাজবঁ ॥ hibiscus rosa sin.

ফুলের জন্য বাগানে রোপিত  
হয়। ফুল রক্তবর্ণ, প্রায় বার  
মাসই হয়। পর্যায়—ওড্রপদ্ম;  
জপা, ওড্রা, রক্তপদ্মপী, অতিরঙ্গ;  
অর্কপদ্মপী, অর্কপ্রিয়া, রাগপদ্মপী;  
প্রতিকা, হরিবল্লভা ॥ শব্দ ॥ প্রকার  
ভেদ : (১) শ্বেতজবা, hibiscus  
syriacus. ছোট গাছ; ফুল শাদা।

(২) রক্তজবা; (৩) পঞ্চমুখী জবা,  
বহুদল জবা।

জবানী—ঘাসবিঁ।

জমালাগোটা—বৃক্ষবিঁ। জয়পালে  
দ্রঁ।

জম্ব, জম্বু, জাম—[ ই° black-

berry, the rose-apple tree ]  
ফলতরুবিঁ। প্রকারভেদ—১

রাজজম্বু—[ সঁ সুরভিপ্রা,  
মহাকলা, মহাজম্বু, মহাশঙ্খা,  
নীলফলা, রাজাহাঁ, শর্কাপ্রিয়া,  
মেঘমেদিনী ; হিঁ জামদুন, বড়ি-  
জামদুন ; কঁ নিরল ; মঁ থোরা-  
জাম্ভুঠঠ ; গুজু রাজজাম্বু ; তেঁ  
পেশদানেরিড ; ও° জাম ] বড়

জাম, কালোজাম, eugenia jamb-  
olana. ২ কাকজম্বু—[ সঁ  
নাদেয়ী, ভুঁফেটা, কাকবল্লভা, e.  
caryophyllifolia. কাকজম্বুর  
ফল রাজজম্বুর ফলের চেয়ে ছোট।

৩ ভূমিজম্বু—[ সঁ ভূবল্লভা,  
পিকভক্ষা, কাষ্ঠজম্বু ; হিঁ ফরেন্দু,  
ছোটজামদুন ; মঁ নদীজাম্ভুঠঠ ;  
গুজু বেলরোপাজাম্বু, ডুঙ্গরিজাম্বু ;  
কঁ দোদান্নিরল ; তেঁ নীরনেঝিড ]  
ছোট জাম, ভূইজাম ; গুড়াজাম, e.  
fruticosa. ভূমিজম্বুর ফল কাক-  
জম্বুর চেয়ে ছোট, মটরকলাইয়ের  
চেয়ে বড় হয় না। ৪ গোলাপ  
জাম—[ ইং rose-apple ] e.  
jambo. ৫ বনবাদাম—ভূইজাম,  
কাকজম্বু, ardisia humilis.  
পাতা একোত্তর মসৃণ। ফুল আরক্ত,

পঞ্চদল। চটিগায়ে লম্বানলি জাম,  
বুটি জাম, ফুলজাম, লাল ফুলজাম  
নামে কতকগুলি জাম আছে।

জম্বাল—১ শৈবাল, ২ কেওয়াফুলের  
গাছ।

জম্বালনী—১ শৈবালিনী, ২ পম্বিনী।

জম্বীর, জামীর—লেবুগাছবিং *citrus*  
*acida*. প্রকারভেদ—১ জম্বীর—  
গোড়ালেবু, ২ মধুজম্বীর  
বা কমলালেবু, জামীরলেবু (শ্রীহট্ট  
দেশীয় বা গ্রাম্য), ৩ নারঙ্গ বা  
নারেঙ্গলেবু [সং নারঙ্গ]; ৪  
বীজপদর, মাতুলজ—ট্যাবালেবু,  
তাবালেবু, *c. medica*; ৫ মধু-  
কর্ণটি; মধুবীজপদরক—বাতাবী  
লেবু, ৬ নিম্বক—পাতিলেবু,  
*c. bergamia*, ৭ বনবীজপদরক—  
আরণ্যবাতাবীলেবু, ৮ স্বপজম্বীর  
—কাগজীলেবু। ইহা ছাড়া কোচ-  
বিহারে সস্তা ও জম্বুরা নামে দুই  
প্রকারের লেবু আছে। তত্তৎ  
শব্দ দুই। ৯ মরুবকবৃক্ষ, নাগদানা  
গাছ, ১০ অর্জকবৃক্ষ, ক্ষুদ্রতুলসী  
গাছ, ১১ সিতার্জকবৃক্ষ, শ্বেত-  
তুলসী গাছ, ১২ পুদিনা শাক।  
এই গাছের ফল ও পত্রাদি ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত হয় ॥ রাজনি ॥

জম্বু—জাম ॥ জম্ব দুই ॥

জম্বুক—১ গোলাপ জাম, ২ সোনাল  
গাছ; ৩ সুবর্ণ কেতকী, ৪ বরুণ-  
বৃক্ষ।

জম্বুকতৃণ—গম্বখড়।

জম্বুবনজ—শ্বেতজ্বাপদৃপ।

জম্বুল, জম্বল—১ জামগাছ, ২ কেয়া  
গাছ।

জম্বু—১ নাগদানা, ২ জামগাছ।

জম্বুকা—কাঙ্কলী দ্রাক্ষা।

জম্বুরাজ—জামরুল।

জম্বুক—জম্বীর।

জম্বুন—আকন্দ।

জম্বুর—গোড়ালেবু।

জম্বুর—জম্বীর।

জয়—অগ্নিমস্তকবৃক্ষ।

জয়ধান—*andropogon sacchara-*  
*tum*.

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা।

জয়পাল—[সং দন্তীবীজ; ইং  
*purging croton*] বৃক্ষবিং।  
সাধারণ কথায় জামালগোটা,  
*croton tiglium*. স্নেহাদিবর্গের  
ছোট-তরুণি। পাতা মসৃণ।  
তিনটা শিরা আছে। ফল দেখিতে  
কমলালেবুর মত, আকারে সুপারীর  
ন্যায়। ফল হইতে জোলাপের মত

কটু কষায় স্বাদযুক্ত এক প্রকার তৈল বাহির হয়। অতি বিরেচক। বাহ্যপ্রয়োগে রিস্টারের কাজ করে। জয়পাল অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয় ॥ রাজনি ॥  
পর্যায়—জৈপাল, সারক, রচক, তিস্তিড়ীফল, দস্তীবীজ, মলদ্রাবি, বীজরেচন, কুম্ভীবীজ, কুম্ভিনীবীজ; ঘন্টাবীজ, ঘন্টিনীবীজ, নিকুম্ভবীজ, শোধিনীবীজ, চক্র-দস্তীবীজ ॥ শব্দ ॥

জয়ন্তী, জয়া—(মং অপরাঞ্জিতা; হিং জিহী; মং শিভারী; তাং চম্পাই; তেং সোমাস্তি; অং হব্-এল-ফক্দ্; ফাং সিদিবন্) জৈন্তী গাছ, *aeschynomene sesban*, *sesbenia aegyptiaca*. শিম্বাদিবর্গের জৈন্তীগাছ; মধ্যমাকৃতি গোছের গাছ। তেঁতুল পাতার মত পাতা; ফুল ছোট পাতা, ফুল, মূল; বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

জয়া—১ জয়ন্তীবৃক্ষ, ২ হরিতকী, ৩ শান্তাবৃক্ষ, ৪ নীলদর্বা, ৫ অগ্নিমন্তুবৃক্ষ।

জয়াবহা—ভদ্রদন্তী-বৃক্ষ।

জয়াশ্রয়া—জড়রীতণ।

জয়াস্বা—ভদ্রদন্তী-বৃক্ষ।

জয়দ্রী, জয়দ্রী—জাতীফল বা জাতী-কোশ ফল, *mace*; জাতীফল দ্র°।

জরড়ী—[ হিং জরড় ] তণ্ডি°।  
পর্যায়—গার্মোটিকা, সুনাল, জয়াশ্রয়া। গরুকে খাওয়াইলে গরুর দুধ বাড়ে।

জরগ—১ শ্বেতজীরক, ২ হিংগ, ৩ জীরক, ৪ কৃষ্ণজীরক ৫ কাসমর্দ°।

জরগদ্রুম—অশ্বকর্ণ-বৃক্ষ।

জরগা—কৃষ্ণজীরক।

জরদকলমী—*hewitha bicolor*.

জলকটক—পানিফল।

জলকন্দ—কদলী।

জলকরণ—১ নারিকেল, ২ পদ্ম, ৩ জলতা।

জলকামরু—কুটুম্বনীবৃক্ষ।

জলকুম্ভল—শৈবাল।

জলকুম্ভক—জলজাত বৃক্ষভেদ।

জলকেশ—শৈবাল।

জলগড়গড়—*coix aquatica* ( ডাঙা-গড়গড়—*coix gigantea* )।

জলঙ্গ—মাকাল।

জলজা—১ পদ্ম, ২ হিজলবৃক্ষ, ৩ শৈবাল।

জলজন্মন—পদ্ম।

জলজবুকা—ক্ষুদ্র জাম, বনজাম।

জলতুলায়—[ স° কণ্ট; জলজ ;  
 হি° জলযোলাই ; ম° চবঠাই ;  
 তে° কুইকোরা ] কাঁচড়াদাম ।  
 পদ্মকরিণীতে ; জলাশয়ে ; জন্মে ।  
 বর্ষাকালে ফুল হয় ; ফুল শাদা  
 ঠিক মৃড়ির মত । গ্রন্থি থেকে  
 শিকড় বাহির হয় ।

জলতিস্তিকা—শল্লকীবৃক্ষ ।

জলদাশন—শালবৃক্ষ ( মেঘ বর্ষাকালে  
 শালপত্র ভক্ষণ করে এরূপ প্রসিদ্ধ  
 আছে ।

জলদ্রাক্ষ—শালিঞ্জী শাক ।

জলধর—তিনিশবৃক্ষ ।

জলনীলিকা, জলনীলী—শৈবাল ।

জলপাই—( ইং wild olive tree )

ক্ষুদ্র আমড়ার মত ফলবান  
 বৃক্ষবি° ; *eloecarpus serratus*,  
*e. prinoides*. রুদ্রাক্ষ গাছের  
 মত গাছ । হিমালয়ের প্রদেশে  
 ও ত্রিবাংকুরে জন্মে ।

জলপিপলী, অগ্নিজ্বালা, অগ্নিমালা,

জলপিপলী—[ স° জলপিপলী ]

জলপিপলী, পনিসগা,  
*cormicina* *salicifolia*.

আরণ্যলতাবি° । ॥ ভাবপ্র° ॥

জলভূমিতে জন্মায় । পাতা সরু,  
 রসাল, ফুল নীল রংয়ের । গাঁইট-

মধ্য ( internode ) দীর্ঘ ।

জলপিপলিকা—জলপিপলী ।

জলপৃষ্ঠজা—শৈবাল ।

জলফল—পানিফল ।

জলবৎকল—পানা ।

জলবল্লী—পানিফল ।

জলবানীর—জলবেতস ।

জলবেতস—বানীরবৃক্ষ । পর্যায়—

নিকুঞ্জবক, পরিব্যাধ, নাদেয়ী ।

জলব্রাক্ষী—হিলমোচী শাক, হেলাপা ।

জলভূ- কাঁচড়াদাম ।

জলমধুক—মধুকবৃক্ষ, জলমোয়া ।

পর্যায়—মণ্ডল্য, দীর্ঘপত্রক,

মধুপদুপ, ক্ষৌদ্রপ্রিয়, পতঙ্গ,

কীরেট, গৈরিকাস্থ্য ।

জলশুক—শৈবাল ।

জলসূচি—পানিফল ।

জলস্থা—গণ্ডদুর্বা ।

জলাক্ষী—জলপিপলী ।

জলাঞ্জন—শৈবাল ।

জলাল—পানীয়াল ।

জলাশয়—লামজ্জকতৃণ ।

জলাশয়া—গণ্ডালাবৃক্ষ ।

জলাশয়—বস্তুগণ্ডতৃণ ।

জলাহা—উৎপল ।

জলেচ্ছয়া—হাতিশাড় গাছ ।

জলেজ, জলেজাত—পদ্ম ।

জলোদ্ভবা—গুডলা ক্ষুদ্র, লম্বুরাক্ষী ।  
জরস—ঘাস ।

জাই—[ স° জাতি ; ইং jasmine ]  
চামেলী, jasminum  
grandiflorum. মল্লিকাদিবর্গের  
পুষ্পতরুবি° । অরণ্যে বহু  
পরিমাণে জন্ম । জাতি দ্র° ।

জাংগহরিতকি—( দেশজ ) । হরিতকী  
ভেদ ।

জাংঘক—শ্রীকারীবৃক্ষ ।

জাঝালি—বৃক্ষভেদ ।

জাটালি—কিংশুক সদৃশ বৃক্ষভেদ ।

জাভ্যারি—জামীর ।

জাতরূপ—ধূস্তরবৃক্ষ ।

জাতি—[ স° জাতি ; ও° জাই ; ইং  
chambeli, Spanish jasmine ]

১ চামেলি, জাই—jasmine  
মালতীজাতীয় পুষ্পবি° ।  
grandiflorum. গোলাব গাতার  
মত জোড়া—পজোড়া পাতায়ুক্ত  
প্রসিদ্ধ পুষ্প । ফুল শাদা  
ও পীতবর্ণ । বসন্তকালে ফুল  
ফোটে । পীতপুষ্পের নাম  
'স্বর্ণজ্যোতি' । ২ আমলকী,  
মালতী । পর্যায়—সুরভিগন্ধা,  
সুমনস, সুরাপ্রিয়া, চৈতকী,  
সুকুমারী, সন্ধ্যাপুষ্পী, মনোহরা,

রাজপুত্রী, মনোজ্ঞা, মালতী,  
তৈলভাবিনী, স্ন্যগন্ধা ।

জাতিকোশ—জয়িত্রী ।

জাতিপত্রী, জাতীপত্রী—জয়িত্রী,  
জাতিফলের ছাল ॥ রাজনি° রাজব°,  
ভাবপ্র° ॥

জাতিফল, জাতীফল—[ স° মদশোণ্ড  
( মদকারী ), জাতিফল ; তে°  
জাজিকায় ; তা° জোদিকরায় ;  
বর্মী—জাদিক্ষু ; ফা° জোমোবুবা ;  
অ° জোবুউৎলাবু ; ইং  
nutmeg ] জায়ফল ॥ রাজব°  
রাজনি° ভাবপ্র° ॥ myristica  
fragans, m. moschata. মালকা  
ঝীপপুঞ্জ জন্মে । মলয়, পিবাং  
ও জাঙ্গিয়ার ঝীপে ইহার আবাদ  
হয় । ফুল ছোট নিগন্ধ, পীতবর্ণ ।  
ফল গোলাকার কৃকট-ডিম্ববৎ ।  
ফল মসৃণ ও পীতবর্ণ । জায়ফলের  
তিনটি স্তর :—(১) ফলাবরণ  
(pericarp), (২) ফলকোষ,  
জয়িত্রী, mace [ স° জাতিকোষী,  
জাতীপত্রী ; হি° জাবিত্রী ; ম°  
জায়পত্রী ; উ° জাইত্রী ; ও° জাম্বিত্রী ;  
ক° জায়পত্রী ; তে° জাজিপত্রী ; ফা°  
জবিত্রী, বজবরে ; অ° বিসবাসা ]  
জৈত্রী । ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন



কাল হইতে জরিদ্বী ও জায়ফল  
পানের মনলারূপে ব্যবহৃত হইয়া  
আসিতেছে। জায়ফলের বীজের  
আবরণকে জরিদ্বী বলে।

জাতিশস্য—জায়ফল।

জাতুপর্ণিকা, জাতুপর্ণী—জাতু শাক-  
জাতীয় বৃক্ষভেদ ॥ স্ত্রুদ্র ॥

জানেকা (দেশজ)—একপ্রকার ক্ষুদ্র  
বৃক্ষ।

জাফরান—[ হি° জাফরান, কেশর;  
আ° জাফরান; ইং saffron ]  
একপ্রকার; শাক্যবিশেষ। *crocus*  
*sativus*. পারস্যদেশে ও কাস্মীরে  
জন্মে।

জাবাবিণ—(দেশজ) বাঁশবি°। মোটা  
ও লম্বা প্রায় ৩০ হাত।

জাম—জম্ব দ্র°।

জামরুল—(ইং jamolana) *eugenia*  
*alba*. জম্বুকাদিবর্গের ফলতরু-  
বি°। ফল শাদা বর্ষাকালে হয়।  
মালয়দ্বীপ ইহার আদি জন্মস্থান।  
জামাইপুলিশিম (দেশজ)—এক প্রকার  
শিম।

জামীর—লেবু দ্র°।

জাম্বব—জাম।

জাম্ববক—জাম।

জাম্ববী—নাগদমনীবৃক্ষ।

জাম্বীর—জাম।

জায়ফল—জাতীফল।

জারা—[ ইং jarrah ] *eucalyptus*  
*rostrata*. অস্ট্রেলিয়া দেশ জাত  
বৃক্ষবি°।

জারুল—যাতক্যাদিবর্গের পদুমবৃক্ষ-  
বি°, *lagerstroemia reginae*,  
1. *flosreginae*. ফুল বড়-বড়  
প্রায় তিন আঙ্গুল চওড়া।  
বঙ্গদেশ, আসাম প্রদেশ ও চট্টগ্রামে  
জন্মে।

জাল—কদম্ব-বৃক্ষ।

জালগাঠ, জালগাঠী—বর্ষায়দ তৃণবি°।  
*panicum helopos*, p.  
*javanicum*. শ্যামা ঘাসের মত  
দোঁখতে, কিন্তু প্রণত, প্রায় দুই  
হাত লম্বা হয়। বড় জালগাঠী—p.  
*setigerum*. লম্বা হইয়া শাইয়া  
পড়ে।

জালঘাটি—*cyperus pygmaeus*.  
জালিনী—১ ঝিঙে, ২ ঘোষাতকী, ৩  
পটোল লতা।

জালী—ঝিঙা, পটোল।

জিউলী—[ স° ইংল ] গুড়ি কাট;  
*odina wodier*.

জিএল—[ স° জিহিনী (জনিষাসা);  
জিয়ল; জিবন; হি° জিহিনী;

কাসমল্লা, তেঁ গম্পিলা ] জিওল, odina wodier. আম্রাদিবর্গের বৃক্ষবি°। গাছ অনেকটা আমড়া গাছের মত। শীতে সব পাতা ঝরিয়া যায় ও বসন্তে পদুপোৎপন্ন হয়। গাছ হইতে বহু পরিমাণে আঠা বাহির হয়। পাতা পক্ষাকার।

জিভিনী—শাল্মলীজাতীয় বৃক্ষভেদ। চলতি কথায় কার্কাশমূল। পর্ষায়—ঝিভিনী, ঝিগি, স্তনির্ঘাসা, প্রমোদিনী।

জিতী—বৃক্ষভেদ। asclepias tenacissima, ইহার ছালে ধনুকের ছিলা তৈরী হয়।

জিতেন্দ্রিয়, জিতেন্দ্রিয়াস্ব—কমবৃদ্ধ-বৃক্ষ ॥ হেমচ°, রাজনি°।

জিদুপালক ( দেশজ )—salicornia indica.

জিনিয়া—[ইং zinnia] বিদেশী বর্ষায়-পদুপ ক্ষুদ্রপবি°। zinnia elegans. ফুল প্রায় গাঁদা ফুলের মত।

জিবল, জীবল ( দেশজ )—বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিয়ল ( দেশজ )—বাহাদুরী কাঠের গাছ।

জিয়াপদুত, জিয়াপদুতা; জিয়াপোতা, জিয়াপদুত—পুরুজীব দ্র°।

জিঙ্ক—তগরপদুপ।

জীব—১ জীবন্তী-বৃক্ষ, ২ মহানিম্ব-বৃক্ষ।

জীবক—১ জীববৃক্ষ, ২ পীতসাগ-বৃক্ষ।

জীবক ঋষভক হইতে ক্ষুদ্র। ইহার মস্তক হইতে নারিকেল বৃক্ষের ন্যায় কুর্চাকার শীষ বাহির হয়। জীবক ও ঋষভক এক জাতীর। উভয়েরই কন্দ রসালবৎ, পত্র অতিসূক্ষ্ম।

জীবকের শীষ কুর্চাকার ও ঋষভের শীষ বৃষণগবৎ।

জীবজীব—বৃক্ষবি°।

জীবদ—জীবক-বৃক্ষ।

জীবদা, জীবদাত, জীবদাত্রী—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবদণ্টা—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবন—ক্ষুদ্রফল-বৃক্ষ।

জীবনক—হরিতকী ॥ রাজনি° ॥

জীবনা—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবনিকা—হরিতকী।

জীবন—sponia orientalis.

জীবনী—জীবন্তী-বৃক্ষ।

জীবনীয়া—জয়ন্তী-বৃক্ষ।

জীবনেত্রী—মৈংহলী-বৃক্ষ।

জীবন্ত—জীবনাশক (?)।

জীবন্তিকা—বন্দা, পরগাছা, জীবাখ্য  
শাক, জীবন্তীহরিতকী, শমী ।

জীবন্তী—[সং জীববর্ধক ; হিঁ জেডী ;  
ওঁ রাজমুড়ী, বাগুটী ; কং হিরিয়া-  
হলি ] ১ লতাবিঁ । চলিত কথায়  
জীবই, জীয়াতি । *dendrobium*  
*macraci*. অধুনা লুপ্তপ্রায় ।  
জীবন্তী সম্বন্ধে সকলের বিভিন্ন মত  
দৃষ্টে বোধ হয় কেহই ইহার স্বরূপ  
ঠিক করিতে পারেন নাই । পর্যায়—  
জীরনী, জীবনীয়া, জীরা, জীবনা,  
মধুস্রবা, প্রবা, পরিশ্বিনী, জীব্যা,  
জীবদা, জীবদাত্রী, শাকশ্রেষ্ঠা,  
জীবভদ্রা, ভদ্রা, মঙ্গল্যা, ক্ষুদ্রজীবা,  
যশস্যা, শৃঙ্গাটী, জীবদৃষ্টা,  
কাঞ্জিকা, শশিশিষ্বকা, সুপিঙ্গলা,  
মধুস্বাসা, জীববৃষা, স্তম্ভকরী,  
মৃগরাটিকা, জীবপত্রী, জীব-  
পুষ্পা ॥ শব্দ অমং ॥ ২ সুরাষ্ট্র  
দেশজ স্বর্ণবর্ণ হরিতকী, ৩ শমী,  
৪ গুড়ুচী, ৫ বন্দা, পরগাছা,  
৬ শাকবিঁ, ৭ শকরায়া ন্যায় মধুর  
পুষ্পলতা ।

জীবপত্র, জীবপত্রক—ইঙ্গদীবৃক্ষ ।

জীবপুষ্পা—বহুজীবন্তী ।

জীবাপ্রিয়—হরিতকী ।

জীববল্লী—ক্ষীরকাকোলী ।

জীবভদ্রা—জীবন্তীলতা ।

জীবশূক্লা—ক্ষীরকাকোলী ।

জীবসংস্কৃত—কামবৃদ্ধিবৃক্ষ (?) ।

জীবসাধন—ধান ।

জীব্যা—হরিতকী, জীবন্তী ।

জীবশাক—মালবদেশের শাকবিঁ

॥ রাজনিং ॥

জীমুতমূল—শঠী ।

জীয়াশিম—শিমবিঁ, *lablab rubri-*  
*florum*.

জীরক—জীরা, জীরে দ্র° । ॥ রাজবিঁ,  
রাজনিং, ভাবপ্র° ॥

জীরা, জীরে—[ সং জীরক, অজাজী ;

হিঁ জীরা ; মং জীরে ; ওঁ

শাকবৃজীরং ; কং জীরনে ; তেঁ

জিলকারা ; ফাঁ জীরভ ; অঁ

কমদন ; য়নানী° রবামন° । ইং

*cumin black, caraway* ]

*cuminum cyminum*.

ধানাদিবর্গের শাকবিঁ । (১)

কালোজীরে, কেলোজীরে—[ সং

কৃষ্ণাজাজী, কৃষ্ণজীরক, কারবী ;

হিঁ কালোজীরা ; গুজ° কলোজী-

জীর° ; মং কলোজীজীরে° ; কং

করীজীরকে ; তেঁ নল্লজীর ;

ফাঁ জীরেমাহ° ; অঁ কমদন-

কিরমানী° ] *nigella sativa*.

Ranunculaciae-বগের বর্ষায়  
শাকবিং । কৃষ্ণবর্ণ ত্রিকোণ বীজ ।

(২) শা-জীরা । শাদা জীরা—  
[সং উপকর্ষিকা, গোরজীরক ; হি°  
কলোজী, মগরেলা ; ম° শহাজীরে° ;  
ও° সাজীরু° ; ক° করিদোডজীরিলে  
তে° নলজীরাকার ; ফা° শোণিক,  
শাদানে ; অ° ইবহুস সোদা ;]  
কালোজীরে মিঠে জীরে ;  
carum carui, c. bulbocas-  
tanum. ধান্যাদিবগের শাক ;  
কালো মোরীর মত ফল ।  
আফগানিস্তান, কাশ্মীর প্রদেশে  
আদি জন্মস্থান । (৩) বনজীরে  
—[সং অরণ্যজীরক, বনজীর ;  
হি° কালাজীরি ; ম° কড়ুজীরে° ;  
ক° কাজীরলে ; গুজ° কালাজীরি ;  
কড়ুজীরি ; অ° কমুনবহরী,  
কমুনরুমী°] বাঙলাদেশে ব্যঞ্জন  
সঙ্গে ব্যবহৃত হয় । বাঙলায় ইহার  
আবাদ নাই ।

জীরক—জীরা দ্র° ।

জীরন—জীরা দ্র° ।

জীরিকা—বংশপত্রীতৃণ ॥ রাজনি° ॥

জীর্ণদারু—বৃক্ষদারক-বৃক্ষ, বিধারা ।  
পৰ্যায় : জীর্ণকঞ্জী, সুপদুপিকা,  
অজরা, সক্ষয়পর্ণা ।

জীর্ণপত্র—পট্টিকা লোধ, পাঠিলা লোধ ।

জীর্ণপত্রিকা—বংশপত্রী তৃণ ।

জীর্ণকঞ্জী—বৃক্ষদারক-বৃক্ষ ।

জীর্ণপর্ণ—কদম্ব ।

জীর্ণবৃক্ষ—পট্টিকা লোধ ।

জীর্ণা—স্থূলজীরা ।

জীলমরিচ ( দেশজ )—sphenoclea  
zeylanica.

জুই যুই—[সং যুথী, যুথিকা] jas-  
minum auriculatum. যুই ফুল  
শাদা রংয়ের । চৈত্র-বৈশাখে  
ফোটে । সুগন্ধী, মল্লিকাবগের ছোট  
গাছ । লতানিয়া । (১) বনযুই  
—clerodendron inarme.  
(২) স্বর্ণযুই—[সং সুবর্ণযুথী,  
হেমজুই] jasminum retero-  
phyllum. ফুলের রং হলদে  
ও নিগন্ধ ।

জুইপানা—[সং যুথিকাপণী° ; দক্ষিণ  
ভারত—নাগমল্লী] জুইপানা,  
justicia nasuta, rhinacan-  
thus communis. বাসকাদিবগের  
ছোট গাছ । ফুল শাদা, ওষ্ঠ-বৎ ।  
পুংকেশর দুইটি ।

জুই—pavetta tomentosa, iora  
tomentosa.

জুপিককা—paisicum roxburghii.

জুফা ( দেশজ )—এক প্রকার গাছ ।

জুম—*goruga pimata*.

জুয়ার—[ স° যাবনাল ; ইং *indian millet, great millet* ] দেধান

( দেবধান ), জোয়ার, *sorghum vulgare*. ধান্যাদিবর্গের শস্যবি° ।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে ইহার বহুল আবাদ হয় । বাংলাদেশে হয় না ।

প্রায় ৫৬ হাত উচ্চ হয় । শস্য গোলাকার । খড় শক্ত ।

জুবণ—ধাতুকীপুষ্প, চলিত কথায় ধাইফুল ।

জুক্ষ—বৃক্ষদারক গাছ ।

জুস্তিনী—এলাপণী-দ্র° ।

জেরস্বাদ—*zingiber zerumbet*.

জেলপাপড়া—*molugo triphylla*.

জৈত্রী—জয়ন্তীবৃক্ষ, ধনেচে ।

জৈপাল—জয়পালবৃক্ষ ।

জোংগক—অগুরু ।

জোমড়া—[ স° ক্ষুদ্র শাখ ] ।

জোয়ান—যোয়ান দ্র° ।

জোয়ার—[ স° যাবনাল ] জুয়ার দ্র° ।

জোলপালং ( দেশজ )—শাকবি°, *rums acutus* ।

জোলাপ—[ ইং *jalapa* ] *ipomoea purga*. কলম্বী আদিবর্গের

শাকবি° । মেক্সিকো দেশ ইহার জন্মস্থান । এদেশে নীলগিরি ও মুসৌরী পাহাড়ে ইহার চাষ হয় । দেশীয় জোলাপের গাছের নাম তিরডী ।

জ্যোত্বলা—সং দেবী লতা ॥ রাজনি° ॥

জ্যোতিষ্ক—চিত্রকবৃক্ষ, চিতে গাছ, গণিকারিকাবৃক্ষ ।

জ্যোতিষ্কা—জ্যোতিষ্মতী লতা ।

জ্যোতিষ্মতী—[ স° কটভী, অলবণা, রায়সাদনী, পীতভৈলা, অগ্নিফলা,

মেঘা, দর্জরা ; হি° মালকাঙলী,

মলটাঙুন ; ম° মালকাংগোনী ;

ক° কৌণ্ড-এরডু ; তে° বাবজী ;

ফা° কাল ; ইং *heart pea* ]

লতাবি° । লতাফটুকরী ॥ রাজনি° ॥

*celastrus paniculatus, c.*

*montan, c. rothiana, c.*

*senegalensis, c. nutan,*

*scutla paniculata,*

*cardispermum helicacabum.*

বাংলাদেশে জন্মে না, লতাফটুকী

জ্যোতিষ্মতী নহে । ঢাকায় বন-

উচ্ছে বনে । বৃক্ষারোহী

লতাবি° । পাকা ফল থেয়ে কাকে

বিস্তাভ্যাগ করলে তাহা হইতে প্রায়

দুই গাছ অঙ্কুরিত হয় । ফল

ছোট মটরের মত। ভ্যারেন্ডা ফলের মত গা। পাকা ফল পীতবর্ণ। বীজ হইতে তেল হয়, তেল গাঢ় পীতবর্ণ। মূল, পাতা ও তেল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।  
 পর্যায়ঃ পাবারতপদী, নগনা, ক্ষুটবন্ধনী, পুতিতৈলা, ইংগুদী, ইংলী, পারাবর্তাশ্র, কটভী, পিন্যা, স্বর্ণলতা, অনলপ্রভা, জ্যোতির্লতা, সুপিংগলা, দীপ্তা, মেধ্যা,

মতিদা, দুর্জরা, সরস্বতী, অমৃত।  
 জ্যোৎস্না;—[ স° অকল্কা ],  
 পটোলিকা, ঝিঙে।  
 জ্বরহ্ন—গুড়ুচী, বাস্তুক।  
 জ্বরাস্তক—নেপাল নিম্ব, আরবধ, সৌদাল।  
 জ্বরপাহা—বিস্বপত্রী, বেলগঠ।  
 জ্বলন—চিগ্রকবৃক্ষ।  
 জ্বলিনী—মুর্বালতা।  
 জ্বলাজিহ্ব—চিগ্রকবৃক্ষভেদ।

[ ৮ ]

ঝঞ্জন—( স° শলপুপিপকা, ঘন্টরবা )  
*crotolaria retusa, c. ciseri-*  
*cia.* ॥ কোরি ॥ শিশ্বাদেবগের  
 অরণ্যজাত বর্ষায়দ শাকবিঁ। শল-  
 বৃক্ষের মত দেখিতে। শব্দি  
 পাকিলে বাতাসে ঝন-ঝন শব্দ হয়  
 বলিয়া নাম।

ঝঞ্জসী আবরী—শাকবিঁ, *core-*  
*veon vetch, vicia sativa.*

ঝটি—ক্ষুদ্র বৃক্ষ।

ঝনুকমণি—বিলাতী স্ট্রবেরি জাতীয়  
 গুড়মবিঁ, *frageria indica*  
 ॥ কোরি ॥

ঝা—নাগবলা।

ঝাউ—( স° ঝাবুক, ঝাট ) *tama-*  
*rix indica.* ॥ বিশ্বকোঁ ॥ অরণ্য-  
 জাত ছোট গাছ। একত্রে অনেক  
 জন্মিয়া থাকে জংগলের মত করে।  
 পাতা খুব পাতলা। বাতাসে ঝা-  
 ঝা শব্দ করে বলে নাম। (১) লাল  
 ঝাউ—*tamarix dioica.* পাতায়  
 খোল আছে। পদং ও স্ত্রী পদঙ্গ  
 ভিন্ন গাছ হয়। (২) বনঝাউ—  
*t. gallica.* পাতায় খোল নাই।  
 ফল ছোট, অনেকটা মাজু ফলের  
 ন্যায়, তিনকোণা। একই গাছ পদং  
 ও স্ত্রী পদঙ্গ ফোটে। (৩) বিলাতি  
 ঝাউ—*casuarina equisetifo-*



lla. অস্ট্রেলিয়া দেশজাত। পাতা  
খুব পাতলা। ফল ছোট কাঁটাযুক্ত।  
সমুদ্রের ধারে অধিক পরিমাণে  
জন্মে। পাতা আইষের মত ছোট।  
ডাটা সরু, গোল।

ঝাউয়া কলা—এক প্রকার কলা গাছ।

ঝাউরা লেবু—এক প্রকার লেবু গাছ।

ঝাই মরিচ (দেশজ)—লাল মরিচ।

ঝাই-শর্ষা (দেশজ)—রাইসরিষা।

ঝাঁজ—[স° জর্জর; ইং chara]  
uticularia fasciculata. পচা  
পুকুরে এক রকম শাক জন্মে  
তাহার নাম ঝাঁজ বা ঝাঁজি। ফুল  
ছোট। হলদে রংয়ের। কলিকাতা  
অঞ্চলে একরকম গাছ (chara)  
হয় তাহাকেও ঝাঁজ বলে। তাহার  
ফুল হলুদ। পাতা বহু ছিন্ন।  
সরু চুলের মত। পুংকেশর  
দুইটি।

ঝাঁপ—ঝাঁপেটারিফুল, sida asia-  
tica.

ঝাট—ঝাউ দ্র°।

ঝাটল—ঘণ্টাপাটলবৃক্ষ, পশ্চিমে ঘণ্টা-  
পারুল বলে।

ঝাটা—ভূম্যামলকী। ২ বৃদ্ধিকা।

ঝাটামলা, ঝাটিকা—ভূম্যামলকী।

ঝাবুক (দেশজ)—এক প্রকারগাছ।

ঝার (দেশজ)—একপ্রকার কাপাস  
লতা।

ঝালমরিচ—একপ্রকার কটু মরিচ।

ঝাবু—চলিত কথায় ঝাউ। পর্যায়—  
ঝাবুক, ঝাবু, ঝাবু, পিচুল  
॥ শব্দরং ॥ অফল, বহুগ্রাণি  
॥ শব্দচ°।

ঝাঁকিরা (দেশজ)—[স° কোশাতকী  
(ধারা), ঝিন্দি, ঝিঙ্গাক,  
জ্যোৎস্না; হি° ঝাঙাতরুই, তরুই;  
ও° জ্বহনী) allargium  
hexapetalum. ঝিঙা, ঝিঙ্গা,  
ঝিঙ্গে luffa foetida, l.  
acutangula. কোশাতকী দ্র°  
॥ বেল° ॥ কুম্ভাডাদিবর্গের  
প্রতানীবি°। ফুল হলদে রংয়ের  
সম্মুখকালে প্রস্ফুটিত হয়।  
ফল লম্বা দশকোণা, বাজনার্থ  
ব্যবহৃত হয়। পুং পদ্যে তিনটি  
কেশর। পল্লীগ্ৰামে ঝিঙাফুল  
ফটলেই সম্মুখ্যর আগমন স্থির হয়।  
ধূন্দুল এই রকম বটে, কিন্তু  
প্রভেদ আছে। বৃহৎ প্রতানী,  
ফল বড়। পুংকেশর ৫টি।  
ধূন্দুল দ্র°।

ঝিঙ্গাক—ঝিঙ্গা।

ঝিঙ্গনী বৃক্ষ—শামলীজাতীয় গাছ।

ঝিঙী—ঝিঙীনী বৃক্ষ, চলিত কথায়-  
ঝিঙা গাছ ।

ঝিঞ্জিরা—ক্ষুপবি° ।

ঝিঞ্জিরিটা—ক্ষুপবি° । চলিত কথায়  
রীটা বা ঝিঞ্জিরীটা ! পর্যায়—  
ফলা, পীতপুষ্পা, ঝিঞ্জিরা,  
রোমাশ্রয় ফুলা, বৃন্তা ।

ঝিন্টি, ঝাটি—[ স° ঝিন্টি, ঝিন্টিকা ;  
হি° ফটসরৈয়া, পিন্নাবাসা ;  
ম° করোন্টা ; কো° পৈঝুটী  
( শীতপুষ্প ) ; ক° গোরটে ;  
ও° কাটা অসেলিয়ো ; তে°  
গোরেডু ] ঝাণ্টী ফুলের গাছ  
॥ রাজনি° ॥ বাসবাদিবর্গের ক্ষুদ্র  
বৃক্ষবি° । অরণ্যজাত । ফুলের  
রং ভেদে চারি প্রকার : (১) শ্বেত  
ঝিন্টি—[ স° সৈরেয়েক, সৌরেন ]  
সাদা ঝাটি, *barleria dicto-*  
*tomr*, ফল লম্বা গাছে কাটা  
নাই । ফুল সাদা । (২) নীলঝিন্টি  
—[ স° আত°গল, দাসী ] *b.*  
*coerulea*, *b. cristata* ( উজ্জ্বল  
নীল ) : পর্যায় : বানা, দাসী,  
আত°গল, বাণ ॥ অম° ॥ সহচর,  
নীলকুরন্টক । (৩) পীত  
ঝিন্টি—[ স° কুরন্টক, কিঙ্কিরাত ]  
কাটা ঝাটি, *b. prionites*.

কাটা গাছ । ফল, হলদে ।

পর্যায়—কুরন্টক, সহচরী,

সহচর, পীতপুষ্প, দাসী,

কুরন্টক । (৪) রক্তঝিন্টি—[ স°

কুরবক, অরুণ-ঝিন্টি ] লাল ঝাণ্টী,

*b. ciliata*, পীতঝিন্টির ক্ষুদ্র

যেখানে যেখানে দেখা যায় । এক

হাত উঁচু হয় । ফল ববের মত ।

ফুল প্রায় সব সময়েই হয় ।

পীত ঝিন্টি ও নীল ঝিন্টি স্নলভ

কিন্তু রক্ত ও শ্বেত ঝিন্টি সর্বত্র

স্নলভ নয় ।

ঝাণ্টিনটিয়া—শাকবি° । *amarantus*

*tennifolius* ॥ বেল° ॥

ঝুমকালতা—[ ইং *citron-leaved*

*passion flower* ] ঝুমকা,

*passiflora citrifolia*, প্রতানী

লতাবি° । আজকাল বাগানে ইহার

বহু প্রকার দেখা যায় । অধিকাংশ

আমেরিকা হইতে আনীত ।

ত্রিকোণবিশিষ্ট পাতা । ফুল,

নীল রঙের স্তম্ভাঙ্ঘ্রিযুক্ত, পঞ্চদল,

বর্ষায় ফোটে । শ্রীলোকের

কর্ণাভরণ ঝুমকোর মত দেখিতে

বালিয়া নাম ।

ঝংজি ( দেশজ )—থারাপ ধান্য ।

ঝুঁড়ি ঘাস (দেশজ)—একপ্রকার ঘাস;  
andropogon laxum.

ঝুঁট—কাঁড়হীনবৃক্ষ।

ঝুঁপি (দেশজ)—একপ্রকার লতা;  
impatiens thumpi.

ঝোড় (দেশজ)—সুপারি গাছ।

## [ ট ]

ট—করক, নারিকেলের মালা।

টগর—( স° তগর ; তগর ) কাঠটগর,  
tabernoemontana coro-

naria. তগরাদিবর্গের ছোট

ফুলগাছ। গাছ ক্ষীরী। তিন-

টার হাত উচ্চ হয়। ফুল শাদা ও

সুগন্ধী। (১) ফিরকিটগর—

ফিরগুণীটগর, periwinkle

vinca. গাছ প্রায় দুই হাত উচ্চ।

দুই রকমের গাছ, একের ফুল শাদা

( vinca alba ) ও অন্যের লাল

( vinca rosa )। প্রায় ১২

মাসেই ফুল হয়। (২) বড় টগর—

tabernoemontana plena.

টকানক—বৃক্ষদারবৃক্ষ, বামনগাছা।

টকারী—বৃক্ষভেদ। চলিত কথায়

টেকারী।

টগুনী—বৃক্ষবি°। আকনাদি।

টলুদা (দেশজ)—লতাবি°; babusa

talda.

টাকাপানা (দেশজ)—জলজ লতাবি°;  
plstia stratiotes.

টাকাহার (দেশজ)—একপ্রকার সুগন্ধী  
লতা।

টানার্জিনিয়া—poa punctata.

টাবানেবু—একপ্রকার লেবু; citus

acid. এই লেবুর অভ্যন্তস্থ শসি

বা 'সার' শিখকারী, অরুচিনাশক

॥ ভাবপ্র° ॥

টিকিওপড়া—locheunia corchori-  
folia.

টিকোর—হরিদ্রাবি°, curcuma  
angustifolia ॥ বেল° ॥

টিটিনিকা—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

টিণ্ডশ—ডেঁড়শী, ঢেঁড়স। বৃক্ষবি°

॥ ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—রোমশফল;

তিন্দিশ, মর্দিনির্মিততিন্দিশ।

টিলিয়া (দেশজ)—গুল্মবি°।

টিলকা—বৃক্ষবি°।

টিয়ারি—[ স° তুবরী ; ও° কটী ]

টৌর; *caesalpinia digyna*.

কৃষ্ণচুড়াদিবর্গের আরণ্যছোট বৃক্ষবি°। কাটাগাছ, নাটাগাছের মত। রাঢ়দেশে ইহাকে 'টাউর কাটা' বলে। আসাম, চট্টগ্রাম; ব্রহ্মদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে প্রচুর জন্মে।

টুটুক—১ শ্যোগাকবৃক্ষ; সোনাল। ২

কৃষ্ণখদিরবৃক্ষ। ৩ টকিনীবৃক্ষ।

টুনাকা—তালমূলীবৃক্ষ।

টুপাকুল (দেশজ)—কুলবি°।

টেপারি—[ই°] *cape gooseberry*,

*strawberry* ], *physalis peru-*

*viana*. বঙ্গনাতিবর্গের বর্ষায়, শাকবি°। ফল ছোট, ফলে অনেক বাঁচ থাকে। আমেরিকার পেরু-দেশে ইহার আদি জন্মস্থান। ফলের বহিচ্ছেদে ফল আবৃত থাকে।

টোকাপানা (দেশজ)—জলজ লতাভেদ, *pistia stratiodes*.

টৌধান আল (দেশজ)—একজাতীয় আল।

[ ৪ ]

ঠাকরিকলাই, ঠিকরাকলাই (দেশজ)

—*dolichos pilosus*. শিম্বাদি-

বর্গের বন্য কলাই শাকবি°। মাস-

কলাইএর মত কিন্তু ছোট,

কালো। ভাল মিষ্ট হয় না।

ঠিকিরী (দেশজ)—*phaseolus radiatus*.

[ ৬ ]

ডাগরাকলা (দেশজ)—ডোগরেকলা,

বৃহদাকার কদলী (অব্যবহার)।

কলা দ্র°।

ডঙ্কোনি (দেশজ)—ডানকোনিলাতা,

*pladera decussata*.

ডঙ্কর (দেশজ)—*figus hirsuta*.

ডংগরখীরেনিয়া (দেশজ)—বৃক্ষভেদ।

ডংগরী—ফলবি°। লতাফল। চলিত

কথায় ককিড়ী ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—

ডাংগরী, দীঘেবাঁর, দংগরী,

ডংগারী, নামশুঁড়ী; গজদন্তফলা

॥ শব্দচ° ॥

ডরকরণ; ডহরকরণা—*galedupa arborea*. করঞ্জ দ্র° ।

ডহু, ডহুয়া, ডেঁউয়া, ডেঁকল, ডেলুয়া  
—[ হি° ডইলার ] বৃক্ষবি°, ডেও;  
মাদার, *artocarpus locoscha*  
॥ রাজব° ॥ পর্যায় । লকুচ, লিকুচ ।

ডাকরী—কাঁকড়ী ।

ডাংগাগড়গড় ( দেশজ )—বৃক্ষভেদ ।

ডানকুনী—[ স° ডঙ্কানি; শংখপদুপী  
( শুল্ক ); শংখপদুপা; দন্তোৎপল;  
হি° শংখাহুলী, শংখাবষ্ঠী; ও°  
শংখাবলী; ক° শংখপদুপী ]  
ডানকুনি, *pladera decussata*;  
*causcora decussata*. বর্ষায়  
বন্য ছোট গাছ । এক হার্তের চেয়ে  
বড় হয় না । জলাভূমিতে জন্মে ।  
ফুল শাদা, যুক্ত চতুর্দল ।  
বর্ষাকালে ফোটে । ফল শীতকালে  
পাকে । সমস্ত গাছটিই ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত । পত্র অভিমুখী । কেশর  
৪টি; ফল ত্রিকোষ । বীজ ছোট  
বহুকোণ । শংখপদুপী দ্র° ।

ডাৰ—নারিকেল দ্র° । কাঁচ বা নেয়াপাতি  
নারিকেল ।

ডামর—[ স° ধনক ; হি° ডামর ]  
পর্বতীয় তরুবি°, *vateria indi-*  
*ca*. গাছের রস ( white damm-

*er, indian copal* ) বার্নিসের  
জন্য তার্পিন তেলের সঙ্গে ব্যবহৃত  
হয় । হিন্দি ডামর শব্দে গাঁদ,  
আঠা বোঝায় ।

ডালকচু ( দেশজ )—একজাতীয় বৃক্ষ;  
*sagtharla cordifolia*.

ডালচিনি—দারুচিনি দ্র° ।

ডালিম—[ স° দাড়িম, দালিম্ব, দাড়িম্ব;  
ও° ডালিম্ব; হি° ডারিম; ইং  
*pomegranate* ] *pulca*  
*granatum*. ভারতবর্ষের প্রায়  
সকল স্থানেই জন্মায় । বহুবীজ  
ফল । দাড়িম দ্র° ।

ডিঁড়িম—কৃষ্ণপাকফল, পানী আমলা ।

ডিঁড়র—চলিত কথায় ঢেঁড়শ ।

ডিম্বকা—শ্যোগকবৃক্ষ ।

ডুডু ( দেশজ )—বৃক্ষবি° ।

ডুমুর, ডুমুর—[ স° উডুম্বর, জ্বনে-  
ফলা, ফগদু, জন্তুফল; নাগোধ;  
ও° ডিম্বি; ইং *common*  
*cultivated fig tree* ] *figus*  
*indica*. (১) ডুমুর—*figus rox-*  
*burghii*. (২) যজ্ঞডুমুর—[স°  
উডুম্বর] *figus glomerata*. ইহার  
গাছ ডুমুর গাছ অপেক্ষা বড় হয় ।  
পাতা ডুমুরপাতার চেয়ে ছোট এবং  
কর্কশ নহে । ফলও ডুমুরের চেয়ে

বড়; পাকিলে লাল মধুর স্বাদ হয়  
ও ভিতরে পোকা জন্মায়। কাঁচা  
ফল কাটিলে আঠা বাহির হয়।  
পাকাফলের সরবৎ গ্রীষ্মকালে  
উপাদেয়। (৩) কাবুলীডুমুর—  
[ কাবুলী নাম—আঞ্জীর] ফল বড়-  
বড়; মিষ্ট ও ভক্ষ্য, (৪) কাকডুমুর—  
[ স° ফলগ; কাকোডুম্বরিকা ]  
ছোট ডুমুর; *ficus hispida*.  
ভারতে সর্বত্র হয়।  
ডুমুরপণী—দন্ডীবৃক্ষ।

ডুলী—বিপ্লীশাক।  
ডেউয়া—ডেও, মাদার। ডহু দ°।  
ডেংগুয়া—একপ্রকার গুল্ম।  
ডেংগুয়াখাড়া—ডেংগোথারা। লাল  
নটিয়া শাক, *amaratus lividus*,  
a. *gangiticus*.  
ডেহুয়া—ডেও, মাদার।  
ডোড়ী—ক্ষুপবি°। পর্যায়—জীবন্তী,  
শাকশ্রেষ্ঠা, সুখা-লুকা, বহুবল্লী,  
দীর্ঘপত্রা, স্কন্ধ-পত্রা, জীবনী।

## [ ত ]

তগর—মদনবৃক্ষ; ময়নাকাটা গাছ, টগর  
ফুলের গাছ, *tabernaemontana coronaria*. ককনদেশ-  
প্রসিদ্ধ একপ্রকার নদীজাত বৃক্ষকে  
তগর, মহোরগ ও তগরমূল বলে  
॥ সমর্থ° রাজনি° ॥ টগর দ°  
তগরপাদিক—জলজ গাধলতা, ক্ষুপবি°।  
তগরপাদী—তগরবৃক্ষ।  
তজবী—হিহুবৃক্ষ।  
তডুলা—১ বিড়ঙ্গ, ২ মহাসম্ভাবৃক্ষ  
[ হি° কগাহিয়া ]।  
তডুলী—১ যবতিস্তা লতা, ২ শশামূলী  
ককটী, ৩ তডুলীয় শাক।

তডুলীক—তডুলীয় শাক।  
তডুলীয়—[ হি° চবরাই, অল্পমরুয়া ]  
চাঁপানটে, গোয়ালনটে বা ক্ষুদে  
নটে। পর্যায়—অল্পমারিষ,  
তডুলভন্ডীয়, তডুলী, তডুলীয়ক,  
গ্রীষ্মল, বহুবীর্ষ, মেঘনাদ, ঘনস্বন,  
সুশাক, পথ্যশাক, ক্ষুদ্রখণ্ড, স্বনিতা-  
হ্বায়, বীর, তন্দুলনামা।  
তডুলীয়ক—১ তডুলীয় শাক, চাঁপানটে  
শাক, ২ বিড়ঙ্গ।  
তডুলীয়কা—বিড়ঙ্গ।  
তডুল—বিড়ঙ্গ।  
তডুলের—তডুলীয় শাক।



তন্ডুলেরক—তন্ডুলীয় শাক ।

তন্ডুলোষ—তন্ডুলরাশির ন্যায় দৃশ্যমান  
বলিয়া বেড় বাণ ।

তৎপত্রী—হিঙ্গুপত্রী, কলাগাছ ।

তনুভূত—ক্ষুদ্রান্নিমগ্নক; গগুরীগাছ ।

তনুপত্র—তাপসতরু, ইক্ষুদীবৃক্ষ ।

তনুবীজ—নারিকেল কুল ।

তন্তুনির্বাস—তালবৃক্ষ ।

তন্তুবিগ্রহা—কদলী ।

তন্তুভ—সর্বপ ।

তন্তুর—মৃগাল ।

তন্তুল—মৃগাল ।

তন্তুসার—সুপারী গাছ ।

তন্ত্রী—গড়ুচী ।

তন্দ্ৰিকা—গড়ুচী দ্রু ।

তন্দুরা—ত্রিবং, তেউড়ী দ্রু ।

তন্নি—চাকুলিয়া ।

তপন—১ আকন্দ, ২ ক্ষুদ্রান্নিমগ্ন-  
বৃক্ষ ।

তপনচ্ছদ—আদিত্যপত্র বা হুড়হুড়ে  
গাছ ।

তপনতনয়া—শাই গাছ; শমীবৃক্ষ ।

তপস্যা—কুন্দপদ্রুপ, কুন্দফুল ।

তপস্বিপত্র—দমনকবৃক্ষ ।

তপোধন—দমনকবৃক্ষ ।

তপোধনা—মন্ডুরী-বৃক্ষ ।

তবকুরী (দেগজ)—*unona dumosa*.

তমকা—তমাল-বৃক্ষ, *phyllanthus emblica*.

তমাক—তামাক দ্রু ।

তমাল—[ সঁ—কালক্ষুধ, তিস্তদ্রু, জীবকদ্রু, তাপিচ্ছ; হিঁ তেঁদ, তমালতেঁদ; উঁ কেঁদ ] তেঁদগাছ, তমাল, *diospyros tomentosa*, গাব গাছের মত গাছ । দীর্ঘকাল-স্থায়ী চিরশ্যামল । পাতার দুই পিঠই রোমশ । কাণ্ডের মধ্যের কৃষ্ণসারযুক্ত কাঠকে আবলুস বলে । ফল মানুষ্যে খায় । দাম্পল দ্রু । বহুকাল কৃষ্ণবর্ণ । দেখিতে সুন্দর । ২৭-২৮ ফিট উচ্চ হয় । ফুল বড় ও শাদা । বৈশাখ মাসে ফুল ফোটে । কমলা লেবুর মত ফল । পাতা তেজ-পাতার মত । ২ তিলক-বৃক্ষ, ৩ বরুণ-বৃক্ষ, ৪ কৃষ্ণখদির । কালিদাসের ‘তমাল কৃষ্ণবর্ণ’ বোধ হয় দক্ষিণ ভারতের গাব গাছ । পৰ্শায়—কালক্ষুধ, তাপিজ, নীলতাল, তমালক, নীলধ্বজ, কালতাল, মহাবলা । *xanthocymus pictorium*. এই তমাল গাছের ক্ষুধ কালো বলিয়া ইহার কালক্ষুধ নাম । তমাল অর্থে

যাহাকে দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করা যায় ।

তমালক—সুদর্শনশাক, ২ তেজপাতা ।

তমালেকা—ভুইআমলা ।

তরই—[ হি° ] এক প্রকার ঝিঝা ।

তরুণি, তরুণী—অর্কবৃক্ষ; ২ ঘৃত-কুমারী, aloe, ৩ পদমচারিণী লতা । ৪ শেউতী গোলাপ, rosa moschata.

তরদী—কটক-বৃক্ষ-বি° । পর্যায়—তারদী, তীরা, খবঁরা, রক্ত-বীজকা ।

তরবট—cassia auriculata.

তরবুজ, তরমুজ—[ স° কলিঙ্গ, শীর্ণবৃক্ষ, সুখবাস, মাংসলফল, তরমুজ; হি° তরবুজ; ম° কলিঙ্গউ; গুজ° তরপুজ; ক° কোস্তে; ফা° হিন্দুজনা; তরবুজ; অ° বস্তিথহিন্দী; পারস্য—দিল মপক্ষ ওকচরেইন; ইং water melon ] তরমুজ, citrullus cucurbita, c. vulgaris. কুম্ভাভাদিবর্গের প্রসিদ্ধ জলময় সুস্বাদু ফলের লতা-বি° । ফল প্রায় গোল, চিকণ, পাকিলেও হরিদবর্ণ থাকে । পর্যায়—কালিন্দক, কঙ্কবীজ; ফল বতুল ।

লিনিয়াসের মতে তরমুজ ইতালি-দেশের দক্ষিণাংশ হইতে পৃথিবীর অন্যত্র বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে । সৈবিঞ্জ বলেন—ভারতবর্ষ ও আফ্রিকাই প্রথম জন্মস্থান । ভারতীয় অনেক প্রাচীন গ্রন্থে তরমুজের উল্লেখ দৃষ্ট হয় । ১৬ শতাব্দীর পূর্বে গ্রেট ব্রিটেনে তরমুজ পাওয়া যাইত না । ইজিপ্টের প্রাচীন চিত্রে বৃক্ষা যায় যে তখন তরমুজের চাষ হইত । দশম শতাব্দীর পূর্বে চীন দেশে তরমুজ ছিল না । ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের তরমুজই সুস্বাদু ।

তিরিতা—গাজা ॥ কুলাণবতন্ত্র ॥

তরুই—এক প্রকার ঝিঝা, luffa acutangula. বনতরুই—clubbed luff, luffa elevata.

তরুণ—১ কুঞ্জপদ্ম, সৈ°ওতি ফুল, ২ শুল জীরক, ৩ এরুডবৃক্ষ ।

তরুজীবন—বৃক্ষমূল ।

তরুণী—[ স° সেবতী-পদ্ম; ইং° Indian white rose ] গোলাপ, ২ ঘৃত-কুমারী; ৩ দস্তী-বৃক্ষ । পর্যায়—সেবতী, সহা, কুমারী গম্ভাত্যা, চারুকেশরা, ভূক্ষেতা;

রাম-তরণী; সুন্দা, বহু-পত্রিকা;  
ভগবল্লভা ।

তরুণী-কটাক্ষমাল—তিলকপদ্ম-বৃক্ষ ।

তরুভূজ—বন্দাক, পরগাছা ।

তরুমালিনী—ভুই-আমলা ।

তরুরাজ—১ তালবৃক্ষ, ২ পারিজাত  
পদ্মবৃক্ষ ।

তরুরূহা—হরিদ্রাভ-লতা-বি°, পরগাছা ।

তরুরোহিণী—পরগাছা ।

তরুবল্লী—মালবদেশজাত জতুকালতা ।

তরুলতা—[ স° কামলতা, ও°  
কুঞ্জলতা ] বর্ষায়তুলতাবি° ।

iponesea quamoclit,

quamoclit pinnata, কলম্বী-

আদিবর্গের । ফুল ধোর লাল

রংএর । পাতা বিচ্ছিন্ন । বড়

তরুলতা—আরণ্য-লতাবি° । qua-

moclit phoenicea. পাতা

বড়-বড় প্রায় আধহাত । পানের

মত ফুল একই প্রকার ।

তরুস্থা—পরগাছা ।

তরুট—পশ্চিম মূল; গেঁড় ।

তরুরী—[ বিহা° সস্তরি, সেবরি;

ও° বর্জ-জন্তি ; বোম্বাই—জৈত বা

জন্-জন্ ; ম° সেবরি ; গুজ্জ°

বাগিসংগণি ; তে°—সইমিস্তা বা

সমিস্তা ] জয়ন্তীবৃক্ষ, ধনচেগাছ;

sesbania aegyptiaca,

aeschynomena sesbania.

পর্ষার—বৈজয়ন্তী; জয়ন্তী; বিজয়া,

জয়া ॥ শব্দ° ॥ ২ গণিকারিকা বা

গুণরী গাছ ।

তপণী—গরুদক্ষদ-বৃক্ষ; পশ্চিম-চারিণী  
লতা ।

তবট—চাকদ্বন্দে গাছ ।

তল—তাল-বৃক্ষ ।

তলদাশি (দেশজ)—ফাঁপা অশুচ  
সরু বাশ ।

তলাশ—বৃক্ষভেদ ।

তস্কর—১ পৃক শাক; পিরিঙ শাক,  
২ ময়না গাছ ।

তস্করশায়—কাকনাসা লতা ।

তাজম্বল—কোবিদারবৃক্ষ ।

তাড়—তাল, corypha taliera.

তাড়কাফল—বৃহদেলা; এলাচ ।

তাড়ি—প্রধানত তালের রস । ইক্ষু,

খজুর, নিম্ব, মৈরোয়, নারিকেল

প্রভৃতি বৃক্ষ হইতেই যে গেঁজাষুস্ত

রস পাওয়া যায়—যাহা পান

করিলে নেশা হয়, তাহাকেও

সচরাচর তাড়ি ধলা হয় ।

তাড়ী—প্রথম প্রধান বৃক্ষ ।

তান্ডব—তৃণবিশেষ ।

তাপন—অকবৃক্ষ ।

তাপস—১ দমনক, ২ ইক্ষুবিশেষ, ৩

তমালপত্র, তেজপাতা ।

তাপসজ—তেজপাতা ।

তাপসতরু—ইক্ষুদী-বৃক্ষ ।

তাপসদ্রুম—ইক্ষুদী-বৃক্ষ ।

তাপসদ্রুমসন্নিভা—গর্ভদাত্রীক্ষুপ,

গর্ভদা গাছ ।

তাপসপত্রী—দমনকবৃক্ষ ।

তাপস-প্রিয়—১ পিয়াল গাছ, ২

ইক্ষুদী-বৃক্ষ ।

তাপস-প্রিয়া—দ্রাক্ষা, কিসমিস ।

তাপস-বৃক্ষ—ইক্ষুদী-বৃক্ষ ।

তাপিণ্ড—তাপিজ দ্রু ।

তাপিচ্ছ—তমাল-বৃক্ষ ।

তাপিজ—১ তমালবৃক্ষ, ২ নিসিন্দে

গাছ ।

তামরস—১ পম্প ২ ধন্তুর ।

তামলকী—[ স° তামলকী, ভূধাত্রী,

তামলকী, রহুফলা, বৃষা, বিষল্লী ;

হি° ভদ্রআবলা, ভংইআমলা,

পতালআবরা ; ম° ভংই

অম্বঠঠী ; ও° ভোঁআম্বলা ; ক°

আরু'নেল্লি, তে° নেলাউসীরীকে ] ।

ভংই আমলা, *phyllanthus*

*niruri*, *p. urinaria*. সমগ্রক্ষুপ,

মূল ও বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । আমলকী দ্রু ।

তামাক, তমাক; তামাকু—[ স°

তাম্বকট, ধূমবর্তিকা, ধূমপত্র ;

কলঞ্জ ; হি° তম্বাখ ; ম° তম্বাখ ;

ও° তমাকু ; অ° তম্বাক, ও°

ধূমপত্র ; পিকা ; ইং tobacco]

তামাক, তামাকু, *nicotiana taba-*

*cum*, তামাকের ( দোস্তা ) পাতায়

চুরুট, দোস্তা, নস্য তৈয়ারী হয় ।

বঙ্গনাতিবর্গের বর্ষায়ুশাক ।

পাঁচশত বর্ষপূর্বে ইহা আমেরিকা

হইতে ইউরোপে আনীত হয় ।

তাহার এক শতাব্দী পরে আমাদের

দেশে পতু'গীজেরা আনয়ন করে ।

পূর্বে এ দেশে অরণ্যজাত বৃক্ষ

ছিল, ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল । ইহার

কয়েকটি জাতি আছে । ১ ভরসুট

—হুগলী জেলায় ভরসুট পরগনায়

জন্মে । ২ ভেলসা—নরম তাম্বক ।

৩ মতিহারী বা বিষপাত—উগ্র-

তামাক । ৪ 'হিচ্চলী—উৎকৃষ্ট

তামাক । পদা তামাক, ভগী

—তামাক গাছের ডগার পাতা—

মিঠেকড়া । গুড়ুকতামাক—পচা

গুড় মাখাইয়া তৈয়ার হয় । অম্বরা

তামাক—তামাকুর গাছ সোজা হয় ।

পাতা কান্ডাগ্রেষী বৃক্ষহীন, কোণাকার। মধ্য বা দক্ষিণ-আমেরিকার কোন স্থান হইতে ইহা পৃথিবী ব্যাপ্ত হয়।

তাম্বুলবল্লী—[ সঁ মৃৎখরগকরী, কাম-জননী, আমোদজননী, শ্রমভিজনী, তীক্ষ্ণমঞ্জরী, সন্তগিরা, ভক্ষ্যপত্রী; মঁ নাগবেল; হঁ নাগরবেল, পান; কঁ—পানবেল; গুজঁ নাগরবেল, পান; কঁ নাগরবল্লী, পর্ণ ] তেঁ—তামলপাকু; তাঁ বেটিলী; অঁ—পান; ফঁ বগঁভোল; ইং betel tree, betel nut. ] পান, piper betel. নানাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণে তাম্বুল (betel leaf) গুণ, আকার ও বর্ণের বিশিষ্ট লাভ করে। নরহরি মতে তাম্বুল সাত প্রকার—১ শ্রীবাটী, ২ অন্নবাটী, ৩ সতসা, ৪ গহাগরে স্নগম্বি, ৫ অন্নসরা—স্নগম্বি। মালবদেশে জন্মে, ৬ পটুলিকা। অশ্বদেশে জন্মে। ৭ রেহসনিয়া। সমুদ্রতীরবর্তী দেশে জন্মে। যবদ্বীপ পানের আদিবাস। বাংলায় তিন প্রকার পান সাধারণত হয়। ১ দেশী বা বাজালা, ২ সার্চি বা খাসা, ৩ কপূর কাঠি।

তাম্বুলপত্র—১ চুবড়ী আল, ২ পান।

তাম্বুলবল্লিকা—পান, তাম্বুলবল্লী।

পর্ষায়—তাম্বুলি, নাগবল্লিকা, বর্ণলতা, সন্তগিরা, সন্তলতা, ফণিবল্লী, ভুজগতা, তক্ষপত্রা, তাম্বুলিক; পর্ণবলী, দিবাভীষ্টা নাগিনী, নাগবল্লরী।

তাম্বুলী—পান গাছ, betel plant.

পান টঁ।

তাম্বুলকণ্টক—নির্বাসপ্রধান কণ্টক বৃক্ষবিঁ।

তাম্বুলকট—তামাক।

তাম্বুলপল্লব—অশোকবৃক্ষ। পর্ষায়—হেমপদ্ম, বজ্রুল, কঙ্কলি, পিউপদ্ম, গম্ধপদ্ম, নট।

তাম্বুলপাকিন—গর্দভাভবৃক্ষ; গাঁধ-ভাট গাছ।

তাম্বুলদী—গোয়ালে লতা।

তাম্বুলপদ্ম—রক্তকান্ধন পদ্মবৃক্ষ।

পর্ষায়—কৌবিদার, চর্মরিক, কুন্দাল, যদুগপত্রক, কুন্ডলী, স্মন্তক, স্বপ্নকেশরী। ২ ভংইচাঁপা, ভামিচপক। ৩ অশোকবৃক্ষ।

তাম্বুলপদ্মিকা—রক্তগ্রিবৃৎ, লাল তেউড়ী।

তাম্বুলপদ্মী—ধাতকীপদ্ম, ধাইফুল।

পর্ষায়—ধাতুপদ্মী, কুঞ্জরা,

সুভিক্ষা, বহুপদ্যপী, বহিজ্জালা।

২ পাটলাবৃক্ষ, পারুল গাছ।

তাম্রফল—অকোটবৃক্ষ; আকোড় গাছ।

তাম্রবর্ণা—জবাফুল।

তাম্রবল্লী—চিরকুটদেশীয় লতা। লতা

পৰ্শ্বায়—তাম্রা, তালী, তমালী,

তমালিকা, স্কন্ধবল্লী, স্নোমো,

শোখনী, তালিকা।

তাম্রবীজ—কলায়।

তাম্রবৃক্ষ—১ রক্তচন্দনবৃক্ষ, ২ কুলথ।

তাম্রমূলা—১ দুরালভা, ২ লজ্জাল,

৩ কচ্ছুরাবৃক্ষ।

তাম্রসার—রক্তচন্দন।

তাম্রসারক—১ রক্তচন্দন, ২ রক্তখদির।

তাম্রসারিক—রক্তখদির।

তাম্রা—১ তাম্রবল্লী লতা। ২ কুচগুঞ্জা।

তাম্রাভ—রক্তচন্দন।

তাম্রিকা—গুঞ্জা।

তার, তারক—কদম্ববীজ, বৃক্ষবিং,  
alpinia allughas.

তার তড়ুল—শাদা দেখান।

তারদী—তরদীবৃক্ষ।

তারপদ্যপ—কদম্ববৃক্ষ।

তারামণি—serissa foetida.

তার্কী—পাতালগড়ুর লতা, বনলতা  
বিং।

তার্কী—১ শালবৃক্ষ, ২ অশ্বকর্ণবৃক্ষ।

তার্কীপ্রসব—অশ্বকর্ণ-বৃক্ষ।

তার্কীধ—বৃক্ষভেদ।

তাল—[ সঁ—তাল; তুণরাজ, দীর্ঘ-

শ্ৰুত; চিরায়, দীর্ঘপত্র, দৃঢ়চ্ছদ;

হিঁ তাড়; মঁ তাড়; ওঁ তাড়;

তাঁ পনম; ফাঁ তাল; অঁ তার;

ইং palmyra palm ] তালগাছ,

তালাদিবর্গের দীর্ঘ ঋজু বৃক্ষবিং।

প্রায় ৬০৭০ হাত উচ্চ হয়।

বসন্তকালে ফুল হয়। মৌতি, মোচ,

ফল, মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

তাল ও তালী প্রায় একার্থবোধক।

তালরস—তাড়ি। তালগাছের জটা

[ সঁ। তালপ্রলম্ব ]। তালগাছের

গুড়ীর সারকে 'তালকাড়ি', গাছের

মধ্যস্থ অসার ভাগকে আঁতি বলে।

পৰ্শ্বায়—তালদ্রুম, পত্রী; দীর্ঘশ্ৰুত,

ধনুজদ্রুম; মঁ তুণরাজ, মধুরস, মদাঢা,

দীর্ঘপাদপ, চিরায়, তরুরাজ

দীর্ঘপত্র, গুচ্ছপত্র, আসবদ্রুম,

লেখাপত্র, মহোমত।

তালক—হরিতাল।

তালকোশা ( দেশজ )—বৃক্ষভেদ।

তালনর—fimbristylis soylenia.

তালপণী—মৌরী দ্রুং।

তালপত্রী—মৃষিকপণী।

তালপদ্যপ—তালের জটা।



তালপ্রলম্ব—তালবৃক্ষের জটা ।

ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । রাজব° ॥

তালমাথনা—[ স° অতিচ্ছত্রা ; হি°  
তালিমাথানা ; তা° নিম্নলি ]  
কুলিয়াখাড়া, কটকলিকা । ঔষধ-  
বৃক্ষবি° ; *menisca dulsis* (?)

তালমুট—বৃক্ষভেদ ।

তালমূলী—[ স° তালমূলী, ভূ-তালী,  
তালপত্রিকা ; ক° কালমূলী  
( মূলের নাম ) ] *curculigo*  
*orchiodes*. শাকবিশেষ । আলু  
থেকে জন্মায় । পাতা লম্বা ও  
সরু, তালপাতার মত । ফুল  
হলদে রংয়ের, নিগন্ধ । পৰ্যায়—  
তালিকা, তালমূলিকা, অশৌয়ী,  
মূলী, তাল, থলিনী, সুবহা,  
তালপত্রিকা, গোধাপদী, হেমপদ্যপী,  
ভূতালি, দীর্ঘ কলিকা ।

তালমুড়া—*curculigo orchiodes*.

তালিকা—তালবৃক্ষ ।

তালিপাত—দাক্ষিণাত্যের তালপত্র ।

তালিফুলিয়া ( দেশজ )—বড়-  
লতানিয়া গাছ ।

তালী [ স° তালীতৃণরাজ ; ইং  
*tallpot palm* ] তাল গাছের  
ন্যায় আকৃতি দীর্ঘবৃক্ষ ।  
*corypha umbraeifera*.

অরণ্য-জাত বৃক্ষ । দাক্ষিণ ভারতে  
জন্মায় । তাল-গাছের মত কিন্তু  
তাহার চেয়ে মোটা, পাতা বড় ।  
প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে একবার  
ফুল দেয় । ফল পাকিলে গাছ  
মরিয়া যায় ।

তালিশপত্র—ভূম্যালকী [ ইং *silver*  
*fir* ] *abies webbiana*.

দেবদারু-আদিবর্গের তরুবিশেষ ।  
হিমালয়ে জন্মে । পৰ্যায়—শুকোদর,  
ধাত্রীপত্র, অকবেধ, করিপত্র,  
করিচ্ছেদ, নীল, নীলাম্বর, তাল,  
তালীপত্র, তমাহ্বর, তালীশপত্র ।

তিউড়ী—[ স° ত্রিপুটী, ত্রিবৃত্তা, ত্রিবৎ ]  
কলম্বী-আদিবর্গের সুবৃহৎ লতা-  
বি°, *operculina turpethum*,  
পাতা বড়-বড়, ফুল পঞ্চল ও বড়,  
শাদা রংয়ের, চারকোণা ফল ।

তিক্তামা—*microrrhynchus aspe-*  
*nifolius*.

তিক্তবৃমা—*aplotaxis circisides*.

তিক্ত—১ কুটজবৃক্ষ, ২ বরুণবৃক্ষ ।

তিক্তক—১ পটোল, ২ চিরতা, ৩  
কৃষ্ণখদির, ৪ ইজ্জদিবৃক্ষ, ৫ নিম্ব,  
৬ কুটজ ।

তিক্তকশিন্দকা—গম্বপত্রা ।

তিক্তকা—তিতলাউ ।

তিক্তকান্ড—চিরতা ।

তিক্তগুঞ্জা—করঞ্জা । পর্যায়—ক্ষুদ্ররসা,  
রসঘা; বিম্বপকটী ।

তিক্ততুণ্ডা—পিপ্পল । পর্যায়—  
চপলা; শোভা, বিদেহী, মাগধী  
কণা, কৃষ্ণপোকুল্যা; মগধী,  
কোলা ।

তিক্ততুণ্ডী—কটুতুণ্ডীলতা ।

তিক্ততুণ্ডী—তিত লাউ ।

তিক্তদুগ্ধা—ক্ষীরণীবৃক্ষ, ২ মেড়াশিঞ্জে  
গাছ ।

তিক্তপত্র—কাকরোল ।

তিক্তপর্ণিকা—গোরক্ষককটী ।

তিক্তপর্ণী—গোরক্ষককটী ।

তিক্তপৰ্বা—১ দুৰ্বা, ২ গুরুচী ।  
৩ যষ্টিমধু লতা ।

তিক্তফল—নির্মল ফল ।

তিক্তফলা—১ যবতিক্তা লতা, ২,  
যাবতীকা, ৩ ধরমুজ ।

তিক্তবল্লী—মুর্খালতা ।

তিক্তবীজা—তিতলাউ ।

তিক্তভদ্রক—পটোল ।

তিক্তমরিচ—কতকবৃক্ষ; নির্মল ফল ।

তিক্তরসা—ব্রাক্ষীশাক ।

তিক্তরাজ ( দেশজ )—andersonia  
rohitaka.

তিক্তরাজ—[ স° তরক্ষীর, পীতরাজ;

রোহিতক, রোড়া, রোহাণ; হি°  
হরিণ, হর ] নিম্বাদিবর্গের  
তরুবি° । amoor polystachia.

পাতা কোমল ও রোয়া যুক্ত,  
ধার কাটা নহে, পর্ণ ৫-৭  
জোড়া হ্রদল । ফুল ছোট ও  
শাদা । ফলের বীজ হইতে  
একপ্রকার তেল হয় । পর্যায়—  
রোহিতক, কদুশালমলি, দাড়িমপুপ-  
সংজ্ঞক, সদাপ্রসূন ॥ রাজনি° ॥

তিক্তশাক—১ খাদির-বৃক্ষ, ২ বরুণদ্রুম,  
বর্ণে গাছ, ৩ গিমে শাক, cra-  
toeva Roxburghii.

তিক্তশাক তরু—শ্বেতপ্রসূনক-বৃক্ষ ।

তিক্তশাকদ্রু—বরুণ-বৃক্ষ, বর্ণে গাছ ।

তিক্তসার—বিটখাদির, গুল্মে-বাবলা ।

তিক্তা—১ যবতিক্তা লতা, ২ ধরমুজ,  
৩ ছিকনী, হাঁচুটীর গাছ ।

তিক্তাখ্যা—তিতলাউ ।

তিক্তাঙ্গা—[ হি° ছেউড়ী ] পাতাল  
গরুড়ীলতা ।

তিক্তামৃতা—mensspermum.  
glabrum.

তিক্তাহবয়া—তিতলাউ ।

তিক্তিকা—১ তিতলাউ, ২ গড়-  
কামাই ।

তিক্তডী—১ বৃক্ষভেদ, scytalia

rimosa, ২ গন্ধবিশেষ,  
stilago tomentosa.

তিক্ষুদ—তিক্ষুড়ী দ্র°।

তিষ্ঠী—দ্রিৎ, তেউড়ী।

তিতকড়া—poya viridiflora.

তিতদুন্দুল—luffa amara.

তিতপাট—তিতকোষ্টা শাক, corc-  
horus acutangulus.

তিতলাউ—lagenaria vulgaris.

তিস্তরী (দেশজ)—লতাবি°;  
casearia varaea.

তিনাশ—তিনিশবৃক্ষ।

তিনাশক—তিনিশবৃক্ষ।

তিনিশ—[সং অক্ষক; হি° সন্দন;

ও° বন্ধন] শিষ্টাদিবর্গের আরণ্য

বৃক্ষবি°, dalbergia ougei-

nsis. কাঠ ভয়ানক শক্ত। এই

কাঠে রথের ঢাকা তৈয়ারী হয়।

মধ্যভারত, বিহার, ওড়িশাতে

জন্মে। একস্থানে প্রচুর জন্মায়।

বসন্তকালে পাতা ঝরিয়া যায়।

পর্যায়—সান্দন, নেমী;

অতিমৃদুক, বঞ্জুল, চিত্রকুৎ, চক্রী;

শতাদ; শকট, রথ, রথিক, ভস্মগর্ভ,

মেঘী, জলধর, সান্দনি, অক্ষক,

তিনাশক ॥ শব্দ° রাজনি° ॥

তিস্তরী, তিতুড়ী—[সং তিতুড়ী,

অগ্নিকা; চিণ্ডা; হি° ইমুলী; ম°

চিণ্ড; গুজ° অম্বালী; ক°

হুনিমে, হুনিগসেহেন্দ, হুনি

সিজয়লে, তে° চিন্তাচেট্র চিট;

ও° কংআং; তা° পঠঠি।

বো°—টিন্টজ; অ° তমবাহি; ইং

tamarind] তে°তুলগাছ,

tamarindus indicus.

কৃষ্ণচূড়াদিবর্গের তে°তুলগাছ

সর্বজন পরিচিত। কাঠ খুব

শক্ত, বসন্তকালে নতুন পাতা

গজায়, কিন্তু পুরাতন পাতা

একেবারে ঝরিয়া যায় না।

পুষ্পদল তিনটি। পুষ্প-কেশর

তিনটি। পর্যায়—চিণ্ডা, অগ্নিকা;

তিস্তিড়ক, তিতুড়ীকা, অগ্নিকা;

অগ্নিকা, চূক্র, চূক্রা, চূক্রিকা, অগ্না,

অতগ্না, ভুজা, ভুক্তিকা, চরিয়া,

গুরুপত্রা; পিচ্ছলা, ষমদুতিকা,

শাকচূক্রিকা, সূচূক্রিকা, স্ত্রীতিস্তিড়

॥ রাজনি° ॥

তিস্তিড়ীক—তে°তুল।

তিস্তিলাকা—তে°তুলগাছ।

তিস্তিলী—তে°তুলগাছ।

তিস্তিশ—টিণ্ডিশবৃক্ষ।

তিন্দ, তিস্তক—[সং নীলসার,

কালম্বক, কাকেন্দ; কো° গেদা;

হি° তেঁদু, কেন্দু ; ক° কব্দু ;  
 ম° ; টেঁদুর্গ আপন ; গুজু°  
 টিঁবরবো ; তে° তমিক ; তা°  
 তাম্বক ; ফা° অবন্দুসুঝাডু ; ও°  
 কেন্দু ; ইং ; ebony ] গাব গাছ,  
 কেন্দু, *diospyros glutinosa*,  
*diospyros embryopteris*.

তমলাদিবর্গের ছোট গাছ। পাতা  
 শক্ত, লাল। পাকা ফল পীতবর্ণ ও  
 মধুর। কাঁচা ফল অত্যন্ত কষায় ও  
 ইহার আঠাল রসে মাছধরা জাল রং  
 করে। ফুল, ফল ও ছাল  
 ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কোথাও  
 কোথাও ইহাকে মাকড়কেন্দু বলে।  
 দক্ষিণ ভারতের গাব গাছ। গাছের  
 কাঠ সাদা। আবলুসের কাঠ  
 কালো। তমাল দ্র°। বনগাব—  
 [ হি° বিষতেন্দু, *diospyros*  
*montana*, d. *cordifolia*  
 ॥ বেল ॥ গাছ কৃচিৎ দৃষ্ট হয়।

ইহার এক জাতের কাঁটা আছে।  
 পর্যায়—ফুজুক, কালকুন্ধ,  
 শিতি-শারক, কেন্দু, তিন্দু,  
 তিন্দুল, তিন্দুক, নীলার,  
 অতিমদুক, স্বর্ষক, রামণ, ফুজুন,  
 কালসার, সন্দনাহর।

তিমির—জলজু চারাবি°।

তিমিষ—১ কাকুড় ; ২ কুন্মাড, ও  
 তরমুজ।

তিমীর—বৃক্ষভেদ।

তিয়া—বৃক্ষভেদ।

তিরিজিহ্বক—বৃক্ষভেদ।

তিরিম, তিরিণ—একপ্রকার ধান।

তিরীট—লোধবৃক্ষ।

তিরীটক—লোধবৃক্ষ।

তিল—[স° হোমধান্য; বনোভব ; হি°

তিলী ; ম° তিঠু ; গুজু° তল ; ক°

এলু ; তে° তোবলু ; তা° বালেনেয় ;

দ্রবি° বারিক তিল ; ফ° কুজন্দ ;

অ° সিমসিম ] তিল, *sesamum*

*indicum*, s. *orientale*, s. *tri-*

*foliatum*, s. *luteum*. বর্ষায়

শার্বিণ্যে। বৎসরে দুইবার হয়।

মাঘ মাসে ও ভাদ্রমাসে হয়। প্রকার

ভেদ—১ শ্বেত তিল, ২ কৃষ্ণ

তিল, ৩ রক্ত তিল, ৪ বন্য তিল—

কাট-তিল (কটা রংয়ের)। পর্যায়—

হোমধান্য, পবিহ, পিত্তপর্ণ,

পাপয়, পুতধান্য, শেনহফল,

ফলপুর্। পাশ্চাত্যমতে তিলের

আদি জন্মস্থান আফ্রিকা ও পূর্ব

ঈশপদুজে। তিল ভারতে বহুদিন

হইতে প্রচলিত। বেদে ইহার উল্লেখ

পাওয়া যায়।—অথর্ববেদ ২।৮।৩,

৬।১৪০।১, শূক্ল-যজ্ঞবল্লভ—১৮।১২

ও শতপথ-ব্রাহ্মণে ৯।১।১।৩।

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষায় এই শস্যের যতগুলি নাম আছে তাহার সকলগুলিতে তিল এই নাম একপ্রকার অবিকৃত ভাবে গৃহীত হইয়াছে। অপর কোন শস্যের নামের এইরূপ সমতা ভারতবর্ষে নাই ॥ বিশ্বকো ॥ প্রকারভেদ— ১ কৃষ্ণতিল, ২ শাকী (শম্ভের ন্যায় শ্বেত) তিল, ৩ ভাদ্র (ভাদ্রায়) তিল, ৪ কাঠ তিল।

তিলক—[স° বাসন্তসুন্দর, তিলক ; তা° মন্জাড়ি ; ইং red wood tree] *adenanthera pavonina*. ফুলের গাছ। ইহা আমাদের প্রসিদ্ধ তিল গাছ।

তিলপর্ণ—১ সরল গাছের আঠা ; ২ চন্দন ; রক্তচন্দন।

তিলপর্ণী—রক্তচন্দন।

তিলপিঞ্জ—নিষ্ফল তিলবৃক্ষ।

তিলপুষ্প—১ তিলের ফুল, ২ বাঘনখী।

তিলপুষ্পক—১ বিভীতকবৃক্ষ, ২ তিলের ফুল।

তিলপেজ—নিষ্ফল তিলবৃক্ষ।

তিলভাবিনী—জাতিফুলের গাছ।

তিলাপত্যা—কেলেজীরা।

তিলিয়া—একপ্রকার গাছ।

তিলিয়াকরা—[ হি° নাগমশদী ; তে° টিগেমুশিদি ] ভাগ লতা, কেলো লতা, *coculus acuminatus*. জন্ম পঃ বহু, ওড়িশা, সিঙ্গাপুর। তিলিয়াল্লাউ (দেশজ)—একপ্রকার লাউ, *cucurbita punctata*. লাউয়ের গায়ে তিলের মত চিহ্ন থাকে।

তিব্ব—লোম্ববৃক্ষ।

তিব্বক—১ লোম্ব; ২ তিনিশ।

তিষ্যপুষ্পা—আমলকী।

তিষ্যফলা—আমলকী।

তিষ্যা—আমলকী।

তিসি, তিসী—[ স° অতসী, মসৃণা ; হি° তীসী, অলসী ; তা° অনুসী-ডিরাই ; ও° ফেসী ; ইং linseed ] তিসি, মসিনা, *linum usitatissimum*. ফুল পুষ্পদল, আকাশ নীল রং। শীতকালের ফসল। পৰ্যায়—অতসী, পিছলা, দেবী, মদগম্বা, মদোৎকর্ষা, নীল-পদুপিকা।

তিস্তা—শম্ভপুষ্পী।

তীক্ষ্ণ—১ চই গাছ ২ শ্বেতকদুশ।

তীক্ষ্ণক—শ্বেতসর্বপ।

তীক্ষ্ণকটক—১ ধুস্তর, ২ ইক্ষুদী-বৃক্ষ, ৩ বাবলা গাছ, ৪ বংশ।



তীক্ষ্ণকণ্টকা—কম্‌থারীবৃক্ষ ।

তীক্ষ্ণকবক—তুস্করবৃক্ষ ।

তীক্ষ্ণগন্ধ—১ সজিনা গাছ, ২ রক্ত-  
তুলসী, ৩ শ্বেততুলসী ।

তীক্ষ্ণগন্ধা—১ শাদা বচ, ২  
কম্‌থারী; ৩ রাইসরিষা, ৪ ছোট  
এলাচ ।

তীক্ষ্ণতত্বলা—পিপ্বলা ।

তীক্ষ্ণপত্র—ধনিয়ার গাছ ।

তীক্ষ্ণপদ্প—লবঙ্গ ।

তীক্ষ্ণপদ্পা—কেতকী ।

তীক্ষ্ণপ্রিয়—যব ।

তীক্ষ্ণফল—ধনিয়া গাছ ।

তীক্ষ্ণফলা—রাইসরিষা ।

তীক্ষ্ণমঞ্জরী—পানের গাছ ।

তীক্ষ্ণমূল—সজিনা গাছ ।

তীক্ষ্ণশুক—যব ।

তীক্ষ্ণসারা—শিশু গাছ ।

তীক্ষ্ণ—১, বচা, ২ সপকঙ্কালিকা  
বৃক্ষ, ৩ আলকুশী লতা, ৪  
মহাজ্যোতিষ্মতী লতা, ৫ অত্যম্ন-  
পর্ণী লতা, ৬ লঙ্কা মরিচ ।

তীরণ—লতাভেদ ।

তীররূহ—বৃক্ষ ।

তীরাট—লোধ ।

তীরকন্দ—১ পেঁয়াজ, ২ ওল ।

তীরগন্ধা—জোয়ান ।

তীরগন্ধিকা—জোয়ান ।

তীরজ্বলা—খাইফুল । এই ফুল  
স্পর্শ করিলে রণ হয় বলিয়া ঐ  
নাম ।

তীরা—১ গেঁটে দর্বা, ২ রাইসর্বে,  
৩ মহাজ্যোতিষ্মতী, ৪ তরদীবৃক্ষ,  
৫ তুলসী ।

তরুত, তরুতক—[ স° তরুত, তরুত;  
গুজ° ও ম° তরুত; তে°—কম্বলি;  
আসাম—নর্দান বা বোলি;  
নেপাল—কিম্বু তরুরি;  
বোম্বাই—তরুত, তরুরি, আম্বর,  
সেতর বা তরুলা আম্বর; ইং  
mulberry ] তরুতিয়া, তরুত,  
morus indica. ক্ষীরী ছোট  
গাছ । পাতা পোকার খায় ।  
শীতকালে ফল পাকে । অশ্বথ  
পাতার মত । আদি জন্মস্থান  
হিমালয় । ভারতে রেশম পোকার  
জন্ম চাষ হয় । প্রকারভেদ—  
১ শ্বেততরুত, morus alba,  
২ চীনে তরুত, morus atro-  
purpuria, ৩ দেশী তরুত  
morus indica.

তরুদ, তরুন—[ স° তরুন, নন্দিবৃক্ষ,  
কুবেরক; হি° তরুন; ও°  
মহানন্দ, মহালিম্বু ] cedrela



toona, নিম্বাদিবর্গের উচ্চবৃক্ষ  
বিশেষ। ফুল ছোট ও শাদা।  
বীজ চেপ্টা, দুইদিকে ডানা  
আছে। কাঠ (Indian  
mahogany) হালকা, ঈষৎ  
লাল। মেহগনি কাঠের মত  
কিন্তু অশি মোটা।

তুকাক্ষীরী, তুগাক্ষীরী—বংশলোচনা।  
বাঁশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত পদার্থ-  
বিশেষ।

তুঙ্গ—১ পদ্মগবৃক্ষ, ২ নারিকেল।

তুঙ্গক—পদ্মগবৃক্ষ।

তুঙ্গা—১ বংশলোচনা, ২ শমীবৃক্ষ।

তুঙ্গারি—শ্বেত করবার বৃক্ষ।

তুঙ্গিনী—বড় শতমূল।

তুঙ্গী—১ বাবুই গাছ, ২ হরিদ্রা।

তুঙ্গদ্রু—নীলীগাছ।

তুঙ্গদ্রু—ভেরাডা গাছ।

তুঙ্গা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ গজরাত  
দেশীয় এলাচি—সুদৈশ্মলা।

তুগ—[ স° নিম্ববৃক্ষ, তুনকুবেরক ;  
হি° ও মহানিম্ব ; তে° নিম্বরেট ;  
তা° তুনদ্র ময়ম ] তুনগাছ, তুনি,  
toon ciliata. হিমালয় প্রদেশের  
অরণ্যে, দক্ষিণ ভারতে, সিকিম,  
এবং বঙ্গদেশের কয়েক জায়গায়  
জন্মে।

তুগি—তুঁদ গাছ। পর্যায়—তুগি, তুনক,  
আপীন, তুগিক, কচ্ছক, কুঠেরক,  
কান্তলক, নিম্ববৃক্ষ, নন্দক।

তুগিক—নিম্ববৃক্ষ।

তুঙকেরিকা—কাপাস গাছ।

তুঙকেরী—১ কাপাস গাছ, ২  
তেলাকুচা।

তুঙিকা—তেলাকুচা।

তুঙকেরী—১ কাপাস, ২ তেলাকুচা।  
পর্যায়—তুঙি, রক্তফলা, বিশ্বী,  
বিশ্বিকা।

তুঙিকেশী—তেলাকুচা।

তুং ( দেশজ )—তুঁত গাছ।

তুতবলাঙ্গা—বৃক্ষবিশেষের বীজবি°।  
তোকমারির মত। তলে ফেলিলে  
ফুলিয়া উঠে।

তুখা—১ নীলীবৃক্ষ, ২ ক্ষুদ্রৈলা,  
৩ মহানীলী।

তুনতুনীনটী—amarantus fascia-  
tus.

তুন্দলফলা—শশা।

তুন—তুঁত গাছ।

তুবর—ধান্যবিশেষ।

তুবরষাণাল—এক জাতীয় লোহিতবর্ণ  
ধান ॥ সমথ° ॥, ২ লাল জনার।

তুবরী—১ অড়হর, ২ ধান্যভেদ।

তুবরিকা—অড়হর।

তুবরীশম্ব—চাকুন্দে গাছ ।

তুবি—অলাব্দ ।

তুবরক—চালমুগ্‌রা দ্র° ।

তুম—garuga pinnata.

তুম্ব—[ হি° bottle gourd ] লাউ,  
cucurbita lagenaria. লাউ  
দ্র° ।

তুম্বা—অলাব্দ, লাউ দ্র° ।

তুম্বিকা—১ অলাব্দ, ২ তিতলাউ ।

তুম্বী—১ অলাব্দ, ২ কুলিক-বৃক্ষ ।

তুম্বীপদ্প—অলাব্দ-পদ্প ।

তুম্বক—অলাব্দ ফল ।

তুম্বরক—ধনে দ্র° ।

তুম্বরী—ধনে ।

তুম্বরু—[ স° তুম্বর, শুলেয় ; হি°  
তেজবল ] zanthoxylum

alatum. মরীচ সদৃশ একজাতি

তীক্ষ্ণ ফল । নারঙ্গাদিবর্গের

ছোট গাছবি° । কটকপূর্ণ ।

কাঠ শাদা । ফুল ছোট হলদে

রংয়ের । বীজ ঘোর কালো রংয়ের ।

অনেকে ইহাকে নেপালী ধনিয়া

বলে । দার্জিলিং, হিমালয় ও

খাসিয়া পাহাড়ে জন্মায় । পাতার

বোটার পাতা আছে । পদ ও

শ্রীপদ্প ভিন্ন গাছে হয় ।

তুরগগন্ধা—অশ্বগন্ধা ।

তুরগাপ্রিয়—যব ।

তুরঙ্গক—[ হি° বড়ীতোরই ] হি-স্ত  
ঘোষাবৃক্ষ ।

তুরঙ্গগন্ধা—অশ্বগন্ধা ।

তুরঙ্গপ্রিয়—যব ।

তুরঙ্গিকা—দেবদালী লতা, ঘোষা ।

তুরঙ্গী—অশ্বগন্ধা ।

তুরঙ্গক—গ্রীবাসবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল ।

তুর্গা—অশ্বগন্ধা ।

তুলসারিণী—তুর্গাবি° ।

তুলসী—[স° বিষ্ণুবল্লভা; শ্রীদশমজরী,

হরিপ্রিয়া, গোবরী, সুরস, সুরসা ;

ও° লংডাবহুলি; হি° কালিতুলসী;

তে° গগ্নেগরচেট্র ; ইং holy

basil ] কৃষ্ণতুলসী,

স্বনমপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবি° । বিভিন্ন

প্রকারেভদ—কালোতুলসী, oci-

mum sanctum. ফুল রক্তবর্ণ,

পাতা সুগন্ধী । ডাটা কৃষ্ণরক্ত ।

তুলসী গাছ সাধারণত ১-৩

ফুট লম্বা হয় । পর্যায়—

কৃষ্ণার্জক, কৃষ্ণবর্ণী, কালমান,

করালক, কালপর্ণী, সুরভি, মানকা,

কালমানক । ২ বাবাইতুলসী

[স° অজগন্ধিকা, ববরী ; ও°

দলভা ; হি° সরজা ; আ° রেইহান,

তে° রুদ্র-জেড়া ] কোথাও কোথাও

গুলালতুলসী, *o. basilinum*,  
*o. pilosum*. ফুল সাদা, ডাটা  
 সবুজ, গাছ সুগন্ধী। পর্যায়—  
 সুরাভি, সুরাভিষেবা, সুরসা, আপেত-  
 রাক্ষসী, কবরী, তুঙ্গী, খরপদুপা,  
 অজগন্ধিকা; ৩. রামতুলসী—[স°  
 ফণিস্কক, মরুবক] *o. gratis-  
 simum*. সকল তুলসী গাছের  
 চেয়ে পাতা বড়। ফুল শাদার সঙ্গে  
 হলদে রংয়ের আমেজ আছে। ৪  
 দুলাল-তুলসী—[স° সুমুখ,  
 বনবর্বারিক] *o. caryophylla-  
 tum*. রাঢ়দেশ জন্মায়। ৫ শ্বেত-  
 তুলসী—[স° সিতাজক,  
 সুমুখ; হি° সফেদতুলসী;  
 তে° কুঙ্কতুলসী] শাদা তুলসী।  
*o. villosum*, *o. carum*. ইহাকে  
 বিশ্বতুলসীও বলে। পর্যায়—  
 অর্জক, শ্বেতপর্ণাসা, গন্ধপত্র,  
 কুঠেরক, অস্রাজক, তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ-  
 গন্ধ। ৬ বনতুলসী—*o. adsce-  
 ndens*. ৭ কুঠেরক, অর্জক—*o.*  
*tuberosum*. তুলসী হিন্দুদের  
 একটি ধর্মীয় গাছ। সাধারণত  
 গ্রামে গৃহস্থের প্রাঙ্গণে, মন্দির  
 পার্শ্বে রোপিত হয় ও দেবীরূপে  
 পূজিত হয়। এই গাছের

ডাটা ও পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত  
 হয়। পর্যায়—সুভগা, তাঁরা,  
 পার্বনি, সুরেজ্যো, কারুহা, সুর-  
 দন্দুভি, সুরাভি, বহুপত্রী, মঞ্জুরী  
 অপেতারক্ষসী, শ্যামা, গোরী,  
 ত্রিদশমঞ্জুরী, ভূতলী, ভূতপত্রী,  
 পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক,  
 বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিগ্রা, মাধবী,  
 অমৃত্য, পত্রপদুপা, সুগন্ধা,  
 গন্ধহারিণী, সুরবল্লী, প্রেতারক্ষসী,  
 সুবহা, গ্রাম্যা, সুলতা, বহুমঞ্জুরী,  
 দেবদন্দুভি, বিষ্ণুবল্লভা, হরিপ্রিয়া  
 ই° শব্দ অম° বিশ্ব° রাজনি°  
 ভাবপ্র°

তুলসীষেবা—বাবুইতুলসী।

তুলা—১ শিমূল তুলা, ২ কাপাস তুলা,  
 [হি° রুই, কপাস; তে° প্রান্তি, ম°  
 কপাস] *gossypium herbea-  
 ceum*, ৩ আকন্দ তুলা।

তুলাবীজ—কুঁচ।

তুলিনী—শিমূল গাছ।

তুলিফলা—শিমূল গাছ।

তুষ—১ ধানের খোঁষা, ২ বহেড়া গাছ।

তুষখান্য—সতুষ খান্য।

তুর্গিন—নন্দি-বৃক্ষ। পর্যায়—তুর্গী,  
 তুন্মক, আপান, তুর্গিক, কচ্ছক,  
 কুঠেরক, কান্তলক, নন্দিবৃক্ষ, নন্দক।

তুজ—১ তুঁত গাছ, ২ পার্শ্ব পিপ্পল ।

তুণী—নীলগাছ ।

তুণীক—নন্দিবৃক্ষ ।

তুরী—ধূতুরা গাছ ।

তুল—তুঁত-বৃক্ষ । তুঁত দ্রু ।

পৰ্যায়—তুদ, ব্রহ্মকাষ্ঠ, ব্রহ্মনেষ্ট,

পুষক, ব্রহ্মদারু, সুপদুপ, সুরুপ,

নীলবৃন্তক, ক্রমুক, বিপ্রকাষ্ঠ,

মদসার ।

তুলপিচু—তুলার গাছ ।

তুলফল—আকন্দ গাছ ।

তুলবতী—[ হি° তুলী ] বৃক্ষবি° ।

তুলবৃক্ষ—তুলার গাছ, শাল্মলীবৃক্ষ ।

তুলশকরা—কাপাস বীজ ।

তুলা—কাপাস গাছ ।

তুলিনী—শাল্মলীবৃক্ষ ।

তুলিফলা—শাল্মলীবৃক্ষ ।

তুখ—জায়ফল ।

তুণ—চীনা খড় । পৰ্যায়—অজুর্ন;

প্রিণ, থট, থেট, হরিত,

তাণ্ডব ।

তুণক—চীনে ধান ।

তুণকুসুম—গন্ধাধিক নামক একজাতি  
বৃক্ষবি° ।

তুণকেতু—১ বাঁশ গাছ, ২ তালবৃক্ষ ।

তুণকেতুক—বাঁশ ।

তুণগন্ধা—বিদারী, শালগণী ।

তুণগ্রাণ্ড—স্বর্ণজীবন্তীবৃক্ষ ।

তুণজাতি—উপলাদি খড় ।

তুণদ্রুম—তালগুবাক, খজুরাদি

বৃক্ষকে তুণদ্রুম বলে । ১ নারিকেল;

২ তাল ৩ সুপারী; ৪ তাড়িয়াং

গাছ । ৫ কেয়া, ৬ খেজুর, ৭

হেঁতাল গাছ ।

তুণধান্য—নীবার ।

তুণধ্বজ—১ তালবৃক্ষ, ২ বাঁশ গাছ ।

তুণধান্যক—কঙ্কাদান্যাদি ।

তুণানিব—চিরেতা ।

তুণপণ্ড—১ কুশ; ২ কাশ, ৩ শর, ৪

দভ, শালি, ৫ ইক্ষুদ ।

তুণপতি—রাজ ঘাস; কালা খাস ।

তুণপটিকা—ইক্ষুদভ তুণ ।

তুণপটী—ইক্ষুদভ তুণ ।

তুণপদ—তুণতুল্য মূলযুক্ত লতা ।

তুণপদ্পিকা—[ হি° সিন্দুরিয়া ]

সিন্দুরপদ্পীবৃক্ষ, ফুল গাছ ।

তুণবল্বজা—[ হি° সাবে বাগে ]

বল্বজাতুণ ।

তুণবীজ—নীবার ।

তুণবীজোত্তম—তুণধান্য ।

তুণবৃক্ষ—১ নারিকেল, ২ তাল,

৩ সুপারী, ৪ তালী, ৫ কেতকী,

৬ খেজুর, ৭ হিষ্টাল ।

তৃণমল্লিকা—কাঠমল্লিকা ফুল গাছ ।  
 তৃণমেরু—রুদ্রাক্ষবৃক্ষ ।  
 তৃণরাজ—তালবৃক্ষ ।  
 তৃণরাজবর্গ—১ সুগারী, ২ তাল;  
 ৩ হিস্তাল, ৪ তাড়ি, ৫ কেতকী,  
 ৬ খেজুর, ৭ নারিকেল ।  
 তৃণশীত—গন্ধখড় ।  
 তৃণশীতা—জলপিপলী ।  
 তৃণশূন্য—১ কেতকী পুষ্প, ২ মল্লিকা,  
 ৩ নারাক্ষ নেবু ।  
 তৃণশূলী—লতাভেদ ।  
 তৃণশোণিত—কুসুম ঘাস ।  
 তৃণশোণিকা—লঘুকেতকীবৃক্ষ ।  
 তৃণসংজ্ঞক—১ কুশ, ২ কাশ, ৩ নল;  
 ৪ দর্ভ, ৫ কান্ড, ৬ ইক্ষু ।  
 তৃণসারা—কদলী গাছ ।  
 তৃণাংস্থিপ—মস্থানক তৃণ ।  
 তৃণাঢ্য—পর্বতজাত তৃণ ।  
 তৃণায়—লবণ তৃণ ।  
 তৃণাশ্বা—চীনে ঘাস ।  
 তৃণেক্ষু—[ হি° সাবে বাগে ] বহুবজা ।  
 তৃণেশ্বর—তালবৃক্ষ ।  
 তৃণোন্তম—উৎকল তৃণ ।  
 তৃণোথ—কুসুম খাস ।  
 তৃণোন্মব—নীবার ।  
 তৃপলা—১ লতা, ২ ত্রিফলা ( হরিতকী;  
 আমলা, বয়ড়া ) ।

তৃপানা—লতা ।  
 তৃষাহ—মোরী ।  
 তৃষিতোত্তরা—অশনপর্ণীবৃক্ষ, আরাটী  
 গাছ ।  
 তৃষ্কারি—ক্ষেতপাণড়া ।  
 তেঁতুল—তিস্তিরী দ্র° ।  
 তেউড়ী—[ স° তহরী; হি° তব্দ ।  
 পাণিলর; ম° তেগু; তা°  
 সিবদই ], *ipomea turpethum*.  
 তেওড়া—নীলফুলযুক্ত ক্ষুপাবি° ।  
*lathyrus sativas*.  
 তেকাটামনসা—[ স° ত্রিকট, রজ্জী,  
 বজ্রদ্রুম ] তেগরামনসা, বাজ-  
 বারণ, *euphorbia antiquo-*  
*rum* শনুহিআদিবর্গের ক্ষীরী  
 বৃক্ষবি° । পাতা ছোট-ছোট  
 ধুব কম, তাহাও শীঘ্র খসিয়া  
 যায়—এজন্য পাতা শূন্য ।  
 তেকাটাসীজ—[ স°—ত্রিকট ] নাড়া-  
 শীজ, *euphorbia antiquo-*  
*rum*. তেকাটামনসা দ্র° ।  
 তেজ—*saccharum proceum*.  
 তেজফল—বৃক্ষভেদ । পর্যায়—বহুফল,  
 শামলীফল, স্তবকফল, স্তেনফল,  
 গন্ধফল, কণ্টবৃক্ষ ।  
 তেজনী—১ মর্বা, ২ চই, ৩  
 জ্যোতিষ্মতী ।

তেজপত্র—[ স° পত্রক; তেজপত্র; অক্-  
পত্র, ইং *cassia cinnamon* ]  
তেজপাতা; *cinnamomum*  
*tamala*, *laurus cassia*.  
মধ্যমাকৃতি চিরশ্যামল বৃক্ষবি°।  
পাতা সুগন্ধী। দুই প্রকার—  
১ তেজপাতা—*cinnamomum*  
*tamala* ২ রামতেজপাতা বা  
পাতিবেঁদা; *c. obtusifolium*.

ফুল ও ফল লবঙ্গের মত।

তেজফল—বৃক্ষ ও ফল বি°।

তেজস্বিনী—১ জ্যোতিষ্মতী লতা,  
লওয়াফটকী। ২ মহাজ্যোতিষ্মতী,  
বড় মালকঙ্গুনী।

তেজিনী—তেজোবল লতা, *sansevie-  
ra zeylanica*.

তেজোবতী—১ গজপিপালী, ২  
চবিকা, ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী।

তেজোবৃক্ষ—ক্ষুদ্রাগ্নিমন্তবৃক্ষ।

তেজোমন্ত—গণিকারিকা বৃক্ষ।

তেজোহুয়া—১ তেজোবতী, ২ চবিকা।

তেড়িয়া (দেশজ)—*corypha taliera*.

তেপারিয়া, তেপড়িয়া—*physalis per-  
uviana*. বনতেপারিয়া—*p-  
minima*.

তেপালিতা—বৃক্ষবি°, *eryth-  
rine indica*.

তেমা (দেশজ)—বৃক্ষভেদ।

তেরিজ—তালবৃক্ষ। তরুরাজ; তংরাজ  
৥ রাজনি° ॥

তেলুৱা (দেশজ)—বৃক্ষ, a species  
of *gelonium*.

তেলসার (দেশজ)—[ ইং *ebony* ]  
কেন্দ গাছ।

তেলহাই (দেশজ)—বৃক্ষবি°, *stercu-  
lia urens*.

তেলকুচা—[স°—বিস্বী, তুঁড়িকা,  
কটুতুঁড়ী, বিম্ব, তুঁড়ীকেরী; হি°  
কন্দুরিক-বিল, কড়বীকন্দুরী;  
ম° কড়তুঁড়নী; গুজ° কড়বী-  
ধোলা; স্ত° তীতকুম্বক; তা°  
কোরাই; প° কন্দুরি; ফা°  
কাবারে-হিঁড়; ও° গোখুরিয়া,  
কাইঞ্চিকীকুড়ি ] তেলাকুচা

[ স° তিস্তবিস্বী ]; ২ কন্দুরিক  
[ স° মধুরবিস্বী ] *coccinea*  
*grandis*, *cephalandra*

*indica*. কুম্ভাদিবিগের আরণ্য  
লতাবি°। বড় বড় শিকড়; ঘন  
সবুজ পাতা; ফুল শাদা। ফল  
পটলের মত তিস্ত। পাকিলে কঁচের  
মত রং হয়। তখন মিষ্ট হয়।  
পুং ও স্ত্রী পুংপ ভিন্ন গাছে হয়।  
ভারত ও বঙ্গ দেশের সর্বত্র জন্মে।



জঙ্গলের কিনারা ও বাগানের বেড়ায়  
দেখা যায় । ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

তেলাঙ্গশূরা (দেশজ)—বৃক্ষবি° ।

*limodorum longifolium*.

তেলাঙ্গাচীনা—*lagerstræmia in-*  
*dica*.

তেলিয়াগজর্ন (দেশজ)—ধূসর ছাল-  
বিশিষ্ট বৃক্ষবি° । *diptero-*  
*carpus alatus* Roxb. চটগ্রাম,  
আন্দামান, স্বীপপুঞ্জ, মালয়  
প্রভৃতি স্থানে জন্মায় ।

তেশিরাপাতি (দেশজ)—তিশিরাষুস্ত  
পাতঘাস, a species of *cyperus*.

তেশিরামনসা—তেকাটামনসা দ্র° ।

তেজসী—গজপিপূল ।

তৈরণী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ।

তৈলধান্য—১ তিল, ২ অতসী, ৩  
তোরী, এই তিনপ্রকার সর্বপ ।  
দুই প্রকার রাজী—খস ও কৌসুম  
বীজ । ইহাদের নাম তৈলধান্য ।

তৈলপর্ণক—গ্রন্থিপর্ণবৃক্ষ, গেঁড়োলা  
গাছ ।

তৈলপর্ণিক—বৃক্ষবি° ।

তৈলপিঞ্জ—নিষ্ফল তিল ।

তৈলফল—১ ইংগুদী, ২ বিভীতক ।

তৈলবল্লী—শতমূলী ।

তৈলভাবিনী—জ্বাতিফুল গাছ,

চামেলী গাছ ।

তৈলসান্দা—শ্বেতগোকর্ণী ।

তোক্স—পল্লবাদির অঙ্গুর ।

তোকমারি—[ হি° তোকমারি ] তোক-  
মারি, *lallemantia roybana*;  
তুলস্যাদিবর্গের ছোট গাছবি° ।

তোদন—ফলবৃক্ষবি° ।

তোদপত্রী—কুখান্যভেদ ।

তোপাচিনি—[স°—চোবাচিনি, দীপান্তর-  
বচা ; হি° চোবাচিনি ; তা°  
কোরিঙ্গে ; তে° পিরান্দিচকা ; অ°  
কুস্ব-এস-শিনি ] তোপাচিনি ।

*smilax glabra*, s. *china*.

চীনদেশীয় কাষ্ঠবি° । উদ্ভিদের

মূলকে তোপাচিনি বলে ।

ভারতবর্ষের শ্রীহট্ট জেলায় ও  
গারোপর্বতেও জন্মায়—নাম  
হরিণস্কচীনা । তোপাচিনি খুব  
ভারী ও গোলাপী রংয়ের হয় ।

তোয়কাম—জলবেতস গাছ ।

তোয়কুম্ভ—শৈবাল । পারশ্বকর্নি ॥

তোয়ধর—সুঘৃণি শাক ।

তোয়ধিপ্রয়—লবঙ্গ ।

তোয়পর্ণী—১ ধান্যবিশেষ, ২ উচ্ছে ।

তোয়পিপলী—কাঁচড়াদাম শাক ।

তোয়পদুপী—পাটলাবৃক্ষ ।

তোয়প্রণা—তোয়পদুপী ।

তোয়প্রসাদন—কতকফল, নির্মল ফল ।

এই ফল ঘসিয়া জলে দিলে পরিষ্কার হয় ।

তোয়ফলা—১ তরমুজ, ২ কাঁকড়া ।

তোয়বালিকা—কারবেলক ।

তোয়বল্লী—উচ্ছে ।

তোয়বৃক্ষ—শৈবাল ।

তোয়বৃক্ষ—শৈবাল ॥ পারস্করনিং ॥

তোয়্যাবাসিনী—পাটলাবৃক্ষ ।

তোদ—ঘতকুমারী ।

তপদককটী—১ কাঁকড়া, ২ শশা ।

তপদটী—ছোট এলাচি ।

তপদ্ব—শশা । পর্যায়—কটকফল, সুধাবাস, স্মৃশীতল ।

তপদ্বা—শশা, কাঁকড়া ।

তপদ্বস—কাঁকড়া ।

তপদ্বাস, তপদ্বাসী—১ মহেশ্বরবারুণী, ২ শশা ।

তরী—সোমরাজীবৃক্ষ ।

ত্রাণ—ত্রায়মাণ লতা ।

ত্রায়স্তিকা, ত্রায়স্তী—[ হি° অস্ত্রক, ত্রায়মান ; অ° জিরির ; গুজ° ত্রায়মাণ ; মহা° ত্রায়মাণ ; বোম্ব° ত্রায়মাণ্ গুলজলীল ; ফা° জলীল, অমরক । প° অসবর্গাফিজ গাফিজ ] । ত্রায়মানালতা, ক্ষুপবি° —delphinium zalll.

ক্ষুদ্র ডুমুরাকৃতি ফললতাবি° ।

ডুমুর, ficus heterophylla.

পর্যায়—বার্ষিক, ত্রায়স্তী, বল-ভাদ্রিকা, বলদেবা, স্তম্ভদ্রাণী, ভদ্রনামিকা, কৃত্তা, ত্রায়মাণিকা, বলভদ্রা, স্কামা, বার্ষিকা, গিরিজা, অনুরা, মাজল্যাহা, ভয়গাশিনী, অবনী, রক্ষণ, ত্রাণা । সমগ্র ক্ষুদ্রপ ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয় ।

ত্রায়বৃন্ত—অনুপদেশজাত গস্তীর নামক শাকবি°, শৃষ্ঠিয়া ।

ত্রায়মাণিকা—ত্রায়মাণ লতা ।

ত্রিশৎপত্র—কুমুদ, নালফুল ।

ত্রিক—১ ত্রিফলা, ২ ত্রিকটু, ৩ গোক্ষুর ।

ত্রিকট—গোক্ষুরবৃক্ষ ।

ত্রিকটু—১ শৃষ্ঠি, ২ মরীচ, ৩ পিপ্পল ।

ত্রিকটুক—ত্রিকটু ।

ত্রিকট—১ গোক্ষুর, ২ স্নহীবৃক্ষ ।

ত্রিকটক—গোক্ষুরবৃক্ষ ।

ত্রিকোণফল—পানিফল ।

ত্রিক্ষুর—কোকিলাক্ষবৃক্ষ, কুলেখাড়া ।

ত্রিগুণী—বিল্ববৃক্ষ ।

ত্রিজটা—বিল্ববৃক্ষ ।

ত্রিদবোভবা—বড় এলাচ ।

ত্রিদল—বিল্ববৃক্ষ ।

ত্রিদলা—গোয়ালে লতা ।

ত্রিদেশমঞ্জরী—তুলসী।

ত্রিদেশসর্বপ—দেবসর্বপ।

ত্রিধরাক—গুণ্ডতৃণ।

ত্রিপত্র—বিষবৃক্ষ।

ত্রিপত্রক—১ পলাশবৃক্ষ, ২ তুলসী,  
কুন্দ, বিষপত্রগ্রয়।

ত্রিপদা—গোয়ালে লতা।

ত্রিপর্ণ—পলাশ।

ত্রিপর্ণিকা—কন্দবি°। পৰ্ণায়—বৃহৎ-  
পত্রা, ছিন্নগ্রন্থিনিকা, কন্দালু,  
কন্দবহুলা; আয়ুবল্লী, বিনারুহা,  
ত্রিপর্ণী।

ত্রিপণী—১ শালপণী, ২ বনকাপাস,  
৩ চাকুলে গাছ।

ত্রিপান্দিকা—হংসপাদী লতা।

ত্রিপটু—১ মটর ডাইল, ২ গোক্ষুর-  
বৃক্ষ, ৩ খেসারী।

ত্রিপটুক—খেসারী।

ত্রিপটুা—১ মল্লিকা, ২ বেলফুল, ৩  
ছোট এলাচ, ৪ কর্ণক্ষেফট লতা, ৫  
বড় এলাচ, ৬ ত্রিবৃং, ৭ শাদা  
তেউড়ি, ৮ রক্ত তেউড়ি।

ত্রিপটুটন—১ ভেরাডা গাছ, ২  
খেসারী।

ত্রিপটুটী—১ তেউড়ী, ২ ছোট এলাচ।

ত্রিপটুটীফল—ভেরাডা গাছ।

ত্রিপদ্রমল্লিকা—ত্রিপদ্রমালিকা।

ত্রিপদ্রবা—কাসোতেউড়ী।

ত্রিফলা—১ হরীতকী, ২ বিভীতক, ৩  
আমলকী।

ত্রিবর্ণক—১ গোক্ষুর (ফুলে তিনটি  
রং আছে বলিয়া), ২ ত্রিফলা, ৩  
ত্রিকটু।

ত্রিবর্ণা—বনকাপাস। ত্রিবিং, ত্রিবৃত্ত—  
[সং ত্রিপটুা; হি° নিসোত;  
গুজ° নিসোত; ক° তিগড়ে। তে°  
আলতে; তা° শিবদই; ফা°  
নিসোথ; অং—তুরবৃন্দ; সাওতাল  
পরগনা—বন-এতকা; পং  
চিতাবিণ্য; হি° নিসোথ, নকাপতর;  
বো° নিশোতর, ফটুকারী;  
দক্ষিণে—তিকুর] তেগড়া,

তেউড়ী, *ipomoea turpethum*,  
*convulculus turpenthum*.

প্রকারভেদ—১ কৃষ্ণত্রিবিং—  
কালোমেবী, সুর্যেণী, শ্যামা,  
কালিন্দী, সুর্যেণিকা; কালামসুর-  
বিদলা, অর্ধচন্দ্রা, কালমেবিকা,  
কালমেসিকা, পালিন্দী। ২

রক্তত্রিবিং—কালিন্দী, ত্রিপটুা;  
লাল তেউড়ী। পৰ্ণায়—

ব্যাঘ্রাদনী, কটুরুণা, নিঃসৃত্তা,  
ত্রিবৃত্তা, অরুণা। ৩ শ্বেত

ত্রিবিং—হ্রিভাডী, ত্রিপটুা, সরলা,

শাদা তেউড়ী। গ্রিবিভের সুদীর্ঘ  
লতা আদ্রভূমিতে উষ্ণমরুপে  
বর্ধিত হয়। তেউড়ীর ডাটা গ্রিশির।  
বর্ষাকালে ইহার বহু শুল্কবর্ণ  
পুষ্প হয়। ফুলের আকৃতি  
কাণ্ডের মত। পর্যায়—সর্বান-  
ভূতি, সুবহা, গ্রিপুটা, গ্রিপুটী,  
রোচনী, মালবিকা, অর্চন্দ্রা,  
বিদলা, সুবেণী, গ্রিবৎ, বৃক্ষাক্ষী,  
গ্রিভুড়ী, গ্রিপুটা।

গ্রিবৎপর্ণা—হেলগা।

গ্রিবীজ—শামা ঘাস।

গ্রিবেলা—তেউড়ী।

গ্রিভুড়ী—গ্রিবৎ।

গ্রিষ্মি—ক্ষেতপাপড়া।

গ্রিশাখপত্র—বিষবৃক্ষ।

গ্রিশিখিপলা—মালাকন্দ নামক মূল।

গ্রিসন্ধি—পুষ্পভেদ। পর্যায়—

সাম্যকুসুম, সন্ধিবল্লী, সদাফলা;

ত্রিসন্ধ্যকুসুম, কাণ্ডা, সুকুমারা,

সন্ধিজা।

ত্রিসন্ধ্যকুসুম—ফাগুনিয়া ফুল।

ত্রিসন্ধ্যগন্ধি—এলাচ, দারুচিনি, তেজ-  
পাতা।

ত্রুটি—ছোট এলাচ।

ত্রুটিবীজ—কটু।

ত্রুটি—কটুফল।

অক্ছেদ—ক্ষীরীশ বৃক্ষ।

অক্পত্র—১ দারুচিনি, ২ তেজপত্র।  
পর্যায়—সুংকট, ভৃক্ষ, অচ, চোচ,  
বরাহক।

অক্পত্রী—১ হিংগুপত্রী, বাধুনী।  
পর্যায়—কারবী, পৃথবী, বাপীকা,  
করবী, পৃথু, ২ কলা গাছ, ৩  
বাটিরাপাতা (তেজপাতার মত  
পাতা)।

অক্সার—১ বাঁশ, ২ দারুচিনি, ৩ শোণ,  
৪ রন্ধ্র প্রধান বংশ, তলতা বাঁশ।

অক্সারভেদিনী—ক্ষুদ্রচন্দ্র-বৃক্ষ।

অক্সগন্ধ—১ নারাজানেবু। ২ লবঙ্গ।

অক্সগন্ধা—ছোট এলাচ।

অক্সাধি—দারুচিনি।

অক্সগন্ধ—নারাজানেবু।

অক্সদোষাপহা—বাকুচী।

অক্সদোষারি—হাস্তিকন্দ।

অক্স—দারুচিনি। পর্যায়—অক্স, বরকল;

ভৃক্ষ, বরাহক; মৃথশোধন, শকল;

সিংহল, বনা, সুরস, কামবল্লভ,

উৎকট, বহুগন্ধ, বিজ্জল, বনপ্রিয়;

নটপর্ণ, গন্ধবরক, বর, শীত।

অক্স—দারুচিনি।

অক্সপত্র—দারুচিনি।

অক্সিসার—বাঁশ।

অক্সিগন্ধা—ছোট এলাচ।

অক্সিপতি—অক্স-বৃক্ষ।

অক্সমীশ—অক্স-বৃক্ষ।

## [ থ ]

থাইকল, থৈবল (দেশজ)—[ হি°  
আমলতাস; ইং country  
sorrel ] স্নানামধন্য ক্ষুদ্রপৰ্ব।  
অম্লবেতস-বৃক্ষ, চুকপালং, rumex  
vesicarius.

থলকুড়ি; থলকুড়ি—থান কুনি  
গাছ।

থলপদ্ম—[ স° স্থলপদ্ম ] ১ ভূমিজাত  
পদ্ম। hisbiscus mu'abalis.  
২ ছত্রপত্র, তমালক ॥ মনি° ॥

থানকুনি (দেশজ)—[ স° ম'ডুকপর্ণী ;  
হি° ব্রহ্মম'ডুকী; তা° বল্লরাই,  
বালারাই; তে° ম'ডুক-ব্রহ্মকরুক,

ম'ডুকব্রহ্মী; বো° কুরিরণ,  
ইং indian pennywort ] থল-  
কুড়ি; hydrocotyle asiatica.  
ভলদাঁঠত লতা, বর্ষজীবী, পাতা  
কাণ্ডের দুই দিক দিয়া বাহির হয়।  
পাতা অনেকটা পটলের পাতার  
মত। ফল বসন্তকালে, ফল  
শীতকালে হয়। ঔষধিবি°।  
পর্যায়—মা'ডুকী, আট্টী, দিব্যা,  
মহোষধী। বঙ্গদেশে ও দক্ষিণ  
ভারতে পদকুরের ধারে ও আদ্রস্থানে  
জন্মায়।

থলকুড়ি—থানকুনি দ্র°।

## [ দ ]

দইয়াখইরা—লতা-ভেদ, achyranthes  
lanata.

দংশমূল—সজিনা গাছ, hyperan-  
thera morunga.

দক্ষিণাবত'বতী—বিচুটী।

দংশরূহ—তিলকৃষ্ণ।

দংশরূহা—কুরূহ গাছ।

দংশা—কুরূহ নামক বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

পর্যায়—কুরূহ, দংশরূহা, দাঁধকা,

স্থলেরূহা, রোমশা, কটশদলা,

ভস্মরোহা, সূদাঁধকা।

দংশাস্ব—ক্ষারপ্রধান বৃক্ষবি°। ভূষোড়া

॥ দ্রব্যার্ভি° ॥

দ'ডকন্দক—ধরণীবৃক্ষ, ভূমিকন্দ।

দ'ড-মাতৃক্ষ—পিণ্ডতগর।

দ'ডরী—ডঙ্করীবৃক্ষ। এক প্রকার  
কাঁকুড়।

দ'ডবৃক্ষ—মনসা গাছ, সিজ গাছ,  
euphorbia.

দাঁডন—১ মঞ্জু ঘাস, ২ দমনকবৃক্ষ।

দেউড়পল—শাকজাতীয় একপ্রকার ক্ষুপ, *canscorda decussata*.  
ডানকুনি নামে একপ্রকার পশু।  
এই নাম সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে  
॥ বিশ্বকো ॥ দীর্ঘবৃন্তযুক্ত  
উৎপল সদৃশ পুষ্পকে দেউড়পল  
বলা যায়। প্রাচীরের গায়ে গাঁদা  
জাতীয়—দীর্ঘবৃন্তযুক্ত উৎপলবৎ  
পুষ্পযুক্ত—এক প্রকার ক্ষুদ্র বৃক্ষ  
দেখা যায়। উহাও দেউড়পল—  
অপভ্রংশ ডালিপোলা।

দাঁদমা—দাড়িম দ্র°। [ ইং pomeg-  
ranate. ]

দ্রুয়—চক্রমর্দক, দাদমর্দন; *cassia*  
*tora*.

দীর্ঘ—কতবেল।

দীর্ঘপুষ্পিকা—শ্বেতাপরাজিতা (দীর্ঘ  
মত সাদা বলিয়া), *clitorea*  
*ternata*.

দীর্ঘপুষ্পী—১ কোলিশির্ষী, ২ শ্বেত  
অপরাজিতা।

দীর্ঘফল—কতবেল। কতবেলের রস  
দীর্ঘ ন্যায় অম্ল বলিয়া।

দখ্যানী—[ হি° মদন-মস্ত ] সুদর্শন  
গুলুগ।

দনা—[ স° দমনক; তে° দোনা;  
ও° দহনা ] সোমরাজ্যাদিবর্গের

শাক-বি°। *artemisia indica*.  
পাতার নিম্নাদিক রৌমাষক, পক্ষ  
কিছন্ন ও ঈষৎ সুগন্ধী। নাগদনা  
—[ স° নাগদমনক; ইং worm  
wood ] ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°। *arte-*  
*misia vulgaris*. পাতা চেষ্টা  
বেশী কাটা, নীচে দীর্ঘ শ্লোমশ।

দন্তকর্ণ—জম্বীর।

দন্তকাষ্ঠক—আহুলা-বৃক্ষ।

দন্তোচ্ছদোপমা—তেলাকুচা। তেলাকুচার  
সহিত ওষ্ঠের উপমা দেওয়া হয়  
বলিয়া।

দন্তধাবন—১ খদিরবৃক্ষ, *mimosa*  
*catechu*, ২ গুচ্ছকরঞ্জ  
*mimusops elengi*. ৩ বকুল।

দন্তপত্রক—কুন্দপুষ্প। *jasmine*  
*pubescens*. এই ফুলের পাপড়ী  
দন্তের ন্যায় বলিয়া।

দন্তপুষ্প—১ কতকফল, ২ কুন্দ,  
*strychnos potatorum*.

দন্তফল—১ কতকফল, ২ কর্পিথ।

দন্তকলা—পিপ্পলী।

দন্তমূলকা—দন্তী-বৃক্ষ (দাঁতের মত  
শাদা ফুল)।

দন্তগঠ—১ জম্বীর, ২ কর্পিথ, ৩ কর্ম  
রক্ষক, ৪ নাগ-রক্ষক। খাইলে দাঁত  
টকিয়া যায় বলিয়া।



দন্তশঠা—১ চাকেরী, ২ ক্ষুদ্রাশ্রিকা ।

দন্তহর্ষক, দন্তহর্ষণ—জম্বীর ।

দন্তিকা—দন্তীবৃক্ষ ।

দন্তিনী—দন্তীবৃক্ষ ।

দন্তিমূলিকা—দন্তীবৃক্ষ ।

দন্তী—[ সঁ নিকুন্ডা, মকুলক,

উপচিহ্না, লঘুদন্তী, ক্ষুদ্রদন্তী ;

হিঁ দন্ডী ; তিরিফল ; কোঁ

দন্ডী ; কঁ দন্ডী ; মঁ লঘুদন্ডী ;

গুজ্জঁ নেপালনাং মূল, দান্ত

এটলে ; তেঁ দন্ডীচেটে ; কোন্ড-

অম্দ্দম ; ফাঁ দন্দ ; অঁ হব্দলং

মূলক্ ] দন্তী, croton polyan-

drum. স্নর্গিহি-আদিবর্গের ক্ষুদ্র

ক্ষুপবিঁ । ফুল অত্যন্ত ছোট

পীতভ । ফল তিন আঠিয়া

সুক্ষ্ম রোমাবৃত । বসন্তকালে

ফুল ফোটে । উত্তর বাঙলায় ও

পূর্ব বাঙলায় জন্মে । পাতা

অন্ডাকার, দন্তদ্র, ঈষৎ লোমশ,

ত্রিশির । পাতার গোড়ায় দুটি

অব্দ আছে । ২ দ্রবন্তী—

[ সঁ আখুপর্ণিকা, শতমূলিকা,

সহস্রমূলী, দন্তী চিত্রা ; হিঁ

মুগলাই অন্ড ; মঁ খোরদন্ডী ;

গুজ্জঁ রতনজ্যোৎ ; কঁ এরন্ড

নেদন্ডী ; কাঁ শফারহুজ্জবা ; অঁ

অবুখলসা ] baliospermum

montanum. উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে

জন্মে । বঙ্গদেশে কদাচিৎ দৃষ্ট

হয় । ৩ রেচক—[ সঁ—দন্ডীবীজ ;

জয়পাল ; তাঁ জয়পাল । হিঁ জমাল-

গোটা ; মঁ জেপাঠা ; গুজ্জঁ

নেপালো ; কঁ জেপাল ; অঁ হব্দস্-

বলাতান্ ; ফাঁ তুখমেশ্বেদং

জীরঘতাই ] দন্ডীর বীজকে

রেচক বলে । — দন্ডীবৃক্ষ

বিবিধ—১ লঘুদন্ডী—উদ্ভবর-

সদৃশ পত্র । ২ বৃহৎদন্ডী—এরন্ড-

সদৃশ পত্র । পর্যায়—শীঘ্রা

গ্যেনঘটা, নিকুন্ডী, নাগক্ষেফতা ;

দন্তিনী, উপচিহ্না ; ভদ্রা ; রুক্ষা ;

রেচনী, অনুকুলা, নিঃশল্যা ;

চক্রদন্ডী, বিশল্যা ; মধুপদুপা ;

এরন্ডফলা, তরণী, এরন্ডপত্রিকা,

অনুরেবতী, বিশোধনী, কুন্তী,

উদ্ভবরদলা ; নিকুন্ডালিকা, প্রত্যক-

পর্ণী, উদ্ভবপর্ণী ।

দন্ডীবীজ—জয়পাল প্র' ।

দন্তুরচ্ছদ—টাবানব্দ ।

দবেদধক—রোহিষ তণ ।

দমন—১ দমনকবৃক্ষ, artemisia, ২

কঁদফুলের গাছ ।

দমনক—দোনাগাছ । পর্যায়—দমন,

দন্ত; গম্ভাৎকটা, মূনি, জটীলা,  
দন্তী, পাণ্ডুরাগ, ব্রহ্মজটী;  
পাণ্ডুরীক, তাপসপত্রী, পাবিত্রক,  
দেবশেখর, কুলপত্র, বিনীত,  
তপস্বিপত্র; মূনিপত্র; তপোধন,  
গম্ভাৎকট, ব্রহ্মজটী; কুলপত্রকা।  
পুষ্প জটাকৃতি।

দমনী—গ্রীষ্মদমনীবৃক্ষ।

দরকাণ্টকা—শতমূলী।

দরমা—*amphidanox karka*.

দরাথং—( পারসী ) বৃক্ষবি°।

দরালতা—( বৃক্ষভেদ )। *hedys-*  
*arum alhagi*.

দদ্রুহদা—ব্রাক্ষী ॥ পারাস্করানি° ॥

দদ্রুপগী—বৃক্ষভেদ।

দদ্রুয়—তক্রমদক।

দদ্রুনাশিনী—ইতালিনীবৃক্ষ।

দভ—[ সংভবদভ, দীর্ঘপত্র, পুখুল ]

কুশ, *poa cynosuroides*,

পর্যায়—কুশ, দভ, বহিস্রুচগ্র ও

যজ্ঞভূষণ। ২ শর; থাগড়া, *sac-*

*charum spontaneum*. পর্যায়—

দীর্ঘপত্র ও ক্ষুদ্রপত্র। ৩ উল্ল,

*imperata* ৪ *arundinacea*

*cyrill*.

দভপত্র—কাণ।

দভাহর—মুগ্ধতৃণভেদ।

দীর্ঘকা—[ হি° গোজিহ্বা লতা ]  
গোজিয়ালতা।

দল—ধানাদিবর্গের জলজ ঘাসবি°,  
*panicum stagninum*. থামা  
ঘাসের মত। প্রায় দুই হাত উঁচু  
হয়। ২ তমালপত্র; *p. crus-*  
*galli*.

দলকোষ—কন্দফুলের গাছ।

দলনির্মোক—ভূর্জপত্রবৃক্ষ।

দলপুষ্পা—কেল্লাফুল গাছ।

দলগম্বী—সৌগন্ধিক চারা, *pandanus*  
*odoratissimus*.

দলসারিণী—লেম্বুক, লেউ গাছ।

দলঢ়ক—১ স্বয়ংজাত তিলবৃক্ষ, ২  
নাগকেশর পুষ্পবৃক্ষ, *mesua*  
*ferrea*, ৩ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ, ৪  
করিকণবৃক্ষ, হস্তিকর্ণ পলাশ, ৫  
শিরীষবৃক্ষ; ৬ জলের পান্য,  
*pistia stratiotes*.

দলামল—১ মরুবকবৃক্ষ, *vangueria*  
*spinosa*, ২ দমনকবৃক্ষ, ৩ ময়না  
গাছ।

দলাম্র—চুকপালং।

দলাহর—তেজপাতা।

দলেগাম্বি—ছাতিম গাছ। *echites*  
*scholaris*.

দশকুলবৃক্ষ—১ শ্লেষ্মাতক, ২ করঞ্জ

৩ বিব, ৪ অশ্বখ, ৫ কদম্ব, ৬  
নিম্ব, ৭ বট, ৮ উদম্বর, ৯ ধাত্রী,  
১০ চিণ্টা ।

দশনবীজ—দাড়িম্ববৃক্ষ ।

দশনাঢ্য—চুক পালং ।

দশচুর—সৌগন্ধি তৃণবি, cyperus  
rotundus.

দশবাহুচণ্ডী—[ ই° leopard  
flower ] দশবাহুচণ্ডী, par-  
danthus chinensis, bela-  
mcanda chinensis. পুষ্প-  
শাক বি° । বাগানে রোপিত হয় ।  
ফলের উপর ফুল হয় । নিগন্ধ,  
পুষ্পে বর্ষাকালে ফোটে । পাতা  
তরবারির ন্যায়; দুই সারি । আদি  
জন্মস্থান চীনদেশে ।

দশমূল—নিম্ন লিখিত দশটি গাছের  
মূল পাচনে ব্যবহৃত হয় । ১ বেল,  
২ শোণা, ৩ গামার, ৪ পারুল, ৫  
গণিয়ারী, ৬ শাল, ৭ পানিচাকুলা,  
৮ বৃহতী, ৯ কন্টকারী, ১০  
গোক্ষরে ।

দশশতাপ্র—২ শতমূলী, ২ শতাবরী ।

দশানিক—দন্তী-বৃক্ষ, croton  
polyandrum.

দহন—১ চিরক-বৃক্ষ, plumbago  
zeylonica. ২ ভল্লাতক ।

দহন-বিটপী—ইষ-লাজলা গাছ ।

দাউদ মর্দন—দ্রুদমর্দন গাছ, cassia  
alata.

দাক্ষায়ণী—দন্তী-বৃক্ষ, croton  
polyandrum.

দাড়িম; দাড়িম্ব—[ স° নীলপত্র,  
লোহিত-পুষ্প, রক্তবীজ, দস্তবীজ,  
মধুবীজ, মণিবীজ, স্নফল, কুচফল,  
বৃন্তফল, বক্ষফল, শুকবল্লভ ; হি°  
অনা ; ম° ডাঠিম্ব ; গুজ°  
দাড়িম্ব ; ব° দালিম্ব ; তে° ডালিম্ব  
টেট্র, দালিম্বকায় ; তা° মাদলই  
চেহেজি ; ও° দালিম্ব ; ফা°  
অনারতুলস্ ; অনারসারী ; অ°  
রুহানহামীজ ; রুমালহলুদ ; ইং  
pomegranate tree ] ডালিম,  
দদিমা ; pumica granatum.  
দাড়িম্ব তিন প্রকার—১ কেবলমধুর,  
২ অম্লমধুর ( পাটনাই দাড়িম্ব ), ৩  
অম্ল ( বাংলাদেশে জন্মে ) ।  
অরণ্যজাত দাড়িম্বকে বনবীজ-  
পুরুক বলে । পষা'ন—করক,  
পিউপুষ্প, দাড়িম্ব, পব'রুহ,  
স্বাঙ্গ, পিউর, ফলশাড়ব,  
শুকবল্লভ, রক্তপুষ্প, দাড়িম্বার,  
কুট্রিম, রক্তবীজ, স্নফল, দস্তবীজ,  
বক্ষফল, বৃন্তফল, সুনীল,

নীলপত্র, দর্শনবীজ, বল্লভ  
শুকাদন, সৎফল ( বৃক্ষ ও ফল ),  
নীরস ।

দাড়িমপত্রক—রোহিতকবৃক্ষ ।

দাড়িম-পুষ্প—রোহিতকবৃক্ষ, রোহিড়া  
গাছ, *andersonia rohitaka*.

দাড়িমীমার, দাড়িম্ব, দাড়ী—দাড়িম ।

দাদমর্দন, দাদমারি—[ স° দদ্রুমর্দন ;  
ও° জাদুঘাই ] চাকন্দা দ্র°, *cassia*

*alata*. ২ কাণ্ডনাদিবর্গের বন্য  
ক্ষুপবি°, পাতা বড়, পর্ণও বড়  
১০।১২ জোড়া । ফুল বড় ।

শরৎকালে ফোটে । গুঁটি

দুইপাশে পাখনা থাকে । ১

বর্ষায় শাকবি°—*ammania*  
*baceifera*, a. *visicatoria*.

বর্ষাকালে প্রায় ক্ষেতের পার্শ্বে  
জন্মায় । ফুলে দল নাই । ফল

প্রায় গোল ও এক কোষ । কাঁচা  
পাতার রস গায়ে মাখাইলে ফোসকা

হইয়া যায় ।

দাদমারী—দাদমর্দন দ্র° ।

দানকোনী—[ স° দণ্ডোৎপল,

শলপুষ্প ] বর্ষায় শাকবি° ।

*canscora decussata*. জলের

থারে ও ভিজা ক্ষেত্রে জন্মে ।

ভাটা চারি কোণা । পাতা

অভিমুখী, ত্রিশিরা ফুল, শাদা,

চতুর্দল । বর্ষাকালে ফোটে ।

দানা—দনা দ্র° । *artemisia indica*.

দানুра *sepindus danura*.

দাপু ( দেশজ )—লতাভেদ ।

*polypodium proliferum*.

দাম ( দেশজ )—জলজ তৃণবি° ।

দাবীদুবী—*kyris indica*.

দামড়াশ্যামা—*oplimenus fruneyta*  
*cens*.

দাম্পল—[ স° তমাল ; হি° দম্পল ; ও°

সত্যাম্ব ] নাগকেশরাদিবর্গের

শ্যামল বৃক্ষবি° । *garcinia*

*xanthochymus*, শ্যামল ।

ফুল শাদা (?) ও সুগন্ধী,

ফাগুন-ঠেঁরে ফোটে । ফল বড়

প্রায় নেবুর মত, অম্ল । খাসিয়া

পর্বতে, ব্রহ্মদেশে চটিগায়ে ও

দাক্ষিণাত্যে জন্মে । উড়িষ্যাতেও

কিচৎ দেখা যায় । কেহ কেহ

ইহাকে তমাল বলিয়া ভুল করে ।

দারু—দেবদারু, *pinus devadaru*.

দারুক—দেবদারু ।

দারুকদলী—১ বনকদলী, ২ কাণ্ড-

কদলী ।

দারুচিনী—[ স° শুচ্ ; প° কিরকা,

দাবাচিনি ; বো° তাজ, দলচীনি ;

তিথি ; তেঁ দার লিগ্‌দ, লবঙ্গ  
যাশ্ভা, লাভান্দু গাম্‌ ; হ° einna  
man] ভাল ত° কারুয়া, ইলায়ান-  
গাম চিন, দারুচিনি, cinna-  
mun iners; e. natidum, c.  
zeylanicillus. দারুচিনির প্রকার  
ভেদ—১ সিংহল দারুচিনি—[স°-  
বরাণ্ণ, গুড়ত্বক] আদি জন্মস্থান-  
সিংহল—উত্তম। সিংহলের বলে  
বহু পরিমাণে জন্মে। ২ ভারতীয়  
দারুচিনি—[স° লাটপর্ণ, ত্বক্]।  
হিমালয় প্রদেশ দাক্ষিণাত্য জাত—  
অধম। কৃষ্ণবর্ণ, পাতা পুরু,  
উপর পিঠ চিকন, হ্রিতরা। দারু-  
চিনি—গাছের ছাল। ছাল ধূসর-  
বর্ণ, খসখসে, কাঠ ফিকে  
লালবর্ণ। বসন্তকালে ফুল ও ফল  
হয়। সুগন্ধ বৃক্ষবি°। পাতা  
মোটা, ত্রিশির। পৰ্যায়—ঔষধকল,  
অক্সাদ, দারুসিতা, স্ততকট, ভৃগু,  
ত্বকপত্র, বরাণ্ণক, ত্বক, চোলপত্র,  
ফল্য, স্দুরভিবকল, উৎকট চোচ,  
গুড়ত্বক, মধুশোধন, শকল, রাম-  
বল্লভ, লাটপর্ণ, বিজ্জল।

দারুনিশা—দারুহরিদ্রা; curcum  
zanthorrhizon.

দারুপত্র—হিংগপত্রী!

দারুপীতা—দারুহরিদ্র।

দারুযল—ফল ও বৃক্ষ ভেদ, pistac-  
hio.

দারু মেদ—বৃক্ষবি°, tomex sebi-  
fera.

দারুহরিদ্রা—[স° দারুহরিদ্রা, দাবী,  
অটকটেরী; হি° দারুহলদি; ম°  
দারু হঠ' ঠদ; গুজ° দারুহলদর;  
ক° মরদর্শিনা; তে° মণিবাঙ্গুপদ;  
তা° মরমঞ্জিল; ফ° দার চোব; তা°  
—দারহলদ] গুল্মবি°। cur-  
cuma zanthorrhizon, bar-  
baris asiatica, b. aristata,  
পাহাড়ে জন্মায়। ৪-৫ হাত বৈশী  
বড় হয় না। ফুল বড় ও পীত-  
বর্ণ। ফল ঘোর পাটকিলা রং।  
কষ্টকী ক্ষুপবি°। পর্যায়—পীতদ্রু,  
কালেক, হরিদ্রা, দাবী, পচ-  
ম্পচা, পর্জনী, পীতিকা, পীতদার;  
শ্খিররাগা, কামিনী, কষ্টকটেরী  
পর্জনা, পীতা দারনিশা,  
কালীয়ক, কামবতী, দারুপীতা,  
কর্কটিনী, দারু, নিশাহরিদ্রা।

দাবিকা—গোজিহ্মাবৃক্ষ, prena  
esculata.

দাবিপত্রিকা—গোজিহ্মা গাছ।

দাবী—১ দারুহরিদ্রা। berberis

aristata । ২ গোজিহ্বা ।  
prema esculata । ৩ দেবদারু ।  
৪ হরিদ্রা ।

দাল—শস্যবিং, *paspalum frumen-*  
*faceum* .

দালচিনি ( দেশজ )—দারুচিনি দ্র° ।

দালা—মহাকাল লতা ॥ ভাবপ্র° ॥

দালিকা—মহাকাল লতা ।

দালিম—দাড়িম দ্র° ।

দাবীদুরী—বৃক্ষবিং, *kyris indica* .

দাশপদুর, দাসপদুর—একপ্রকার মৃত্তা

বাস, *cyperus rotundus* .

দাসী—১ নীলঝিটী ২ পীতঝিটী ।

দাহক—চিরকবৃক্ষ, রাঙাচিতা গাছ,  
*plumbago zeylanica* .

দাহকাষ্ঠ—অগুরু চন্দন ।

দাহাগুরু—( স° বনবল্লভ ) অরণ্যজাত

সৌগন্ধ বিস্তারক বৃক্ষবিং ॥

রাজনি° ॥ অগুরু দ্র° ।

দিনকর—অক'বৃক্ষ ।

দিনকুং—অক'বৃক্ষ ।

দিনপ—অক'বৃক্ষ ।

দিনপ্রণী—অক'বৃক্ষ ।

দিনবন্ধু—অক'বৃক্ষ ।

দিনাধীণ—অক'বৃক্ষ ।

দিনেশ—অক'বৃক্ষ ।

দিনেশ্বর—অক'বৃক্ষ ।

দিলীর—শিলীশ্লক, ব্যাঙের ছাতা ।

দিবসকং, দিবসকং—অক'বৃক্ষ ।

দিবাকর—অক'বৃক্ষ, পদ্মপবি° ।

দিবামণি—অক'বৃক্ষ ।

দিবি দিবি—[ *divi divi* ; *ameri-*  
*can stomach* ] *caesalpinia*  
*coriara* . কৃষ্ণচূড়াদিবর্গের

ছোট গাছবি° । আমেরিকা হইতে

এদেশে আনীত হইয়াছে । ফুল

ছোট-ছোট পীতবর্ণ° । ভাদ্র-

আশ্বিন মাসে ফোটে । আজকাল

বোম্বাই প্রদেশে জন্মায় ।

দিব্যগন্ধ—লবঙ্গ ।

দিব্যগন্ধা—১ বড় এলাচ, ২ মহা-  
পঞ্চশাক ।

দিব্যতেজস্—ব্রাহ্মীশাক, ইহা খাইলে  
স্বর্গীয় লোকের ন্যায় তেজ হয় ।

দিব্যপদ্ম—করবীর ।

দিব্যপদ্ম—মহাদ্রোণা ।

দিব্যপদ্মিকা—লাল বর্ণের অক'বৃক্ষ ।

দিব্যলতা—মর্বালাতা ।

দিব্যসার—শালবৃক্ষ ।

দিব্যা—১ বন্ধ্যাককোটকী, ২ শতাবরী,

৩ ব্রাহ্মী, ৪ শুলজীরক, ৫

শ্বেতদুর্বা, ৬ হরীতকী, ৭

মহামেদা ।

দীন—তগর পদ্ম ।



দীপন—১ তগরমূল, ২ শালিগ শাক;  
 achyranthes triandra, ৩  
 কাসমদ, cassia tora. ৪  
 পলাশড্রু।

দীপনী—মেথি।

দীপপুষ্প—চম্পক-বৃক্ষ, michelia  
 champaca.

দীপ্ত—নেবু।

দীপ্তাকরণ—অর্ক-বৃক্ষ।

দীপ্তা—১ লাক্ষলিকা-বৃক্ষ। ২  
 জ্যোতিষ্মতীলতা, লগুয়া-ফটকী,  
 ৩ সাতলা।

দীপ্যক—১ বনজোয়ান, ২ জোয়ান,  
 ৩ ময়ূর-শিখা, ৪ রত্নজটা।

দীপ্যা—পিণ্ডি-খেজুর।

দীর্ঘকর্ণা—গোর-জীরক, সাজিরে।

দীর্ঘকন্টক—বাবলা গাছ।

দীর্ঘকন্দিকা—তালমূলী।

দীর্ঘকান্ড—গন্ধতণ।

দীর্ঘকান্ডা—পাতালগরুড়ী লতা।

দীর্ঘকীল—অক্কেঠ-বৃক্ষ, ধলা-আকড়া;  
 alangium hexapetalum.

দীর্ঘকীলক—অক্কেঠ-বৃক্ষ।

দীর্ঘকল্যা—গজপিপলী।

দীর্ঘকরক—অশ্বদেশোভব শালিভেদ।

দীর্ঘগ্রাণ্থ—গজপিপল।

দীর্ঘচ্ছদ—ইক্ষু।

দীর্ঘতনু—তালগাছ।

দীর্ঘতরু—তালবৃক্ষ।

দীর্ঘতমিষা—কাঁকড়।

দীর্ঘতণ—পল্লিবাহ তণ।

দীর্ঘদন্ড—এরুড-বৃক্ষ।

দীর্ঘদন্ডী—গোরক্ষী।

দীর্ঘদ্রু—তালবৃক্ষ।

দীর্ঘদ্রুক—শিমূল।

দীর্ঘনাল—১ যাবনাল, ২ গন্ধতণ।

দীর্ঘপটোলিকা—ধূম্রদল ॥ রাজব ॥

দীর্ঘপত্র—১ রাজপলাশড্রু, ২ বিষ্ণু-  
 কন্দ, ৩ হরিদভ, ৪ কঁচলে গাছ,  
 ৫ ইক্ষুভেদ।

দীর্ঘপত্রক—১ রত্ন-লগুন, ২ এরুড,  
 ৩ হিজল-বৃক্ষ, ৪ বেতস-বৃক্ষ,  
 ৫ করীর-বৃক্ষ, ৬ জলমৌল গাছ,  
 ৭ লগুন।

দীর্ঘপত্রা—১ চিত্রপর্ণিক, ক্ষুদ্রে  
 চাকুলিয়া, ২ ছোট জাম, ৩  
 পল্লিপর্ণী লতা, ৪ গন্ধপত্রা, ৫  
 কেতকী, ৬ ডোরী ক্ষুদ্রপ, ৭ শাল-  
 পর্ণী। ৮ পলাশী লতা ৯ মহা-  
 চণ্ডশাক।

দীর্ঘপত্রিকা—১ শাদা বচ, ২ ঘটকুমারী,  
 ৩ শালপর্ণী, ৪ শ্বেতপদনবা।

দীর্ঘপর্ণী—চাকুলে।

দীর্ঘপল্লব—শণবৃক্ষ, crotolaria

juneca.

দীর্ঘপাদক—১ তালবৃক্ষ; ২ পুং;  
৩ সুপারিগাছ, ৪ নারিকেলবৃক্ষ।

দীর্ঘফল—সোন্দাল, *cassia fistula*.

দীর্ঘফলক—অগস্ত্যবৃক্ষ; বকফল গাছ।

দীর্ঘফলা—১ মালবদেশের জতুকা  
লতা; ২ আগুরু।

দীর্ঘফলিকা—১ কর্ণপলদ্রাক্ষা; ২ জতুকা।

দীর্ঘমূল—১ মোরট লতা, ক্ষীর  
মোরটা, ২ বিব্বাস্তর বৃক্ষ, ৩ লাম-  
জকতৃণ ( কণাগাছের মত পীতাম্ব  
তৃণ )।

দীর্ঘমূলা—১ শ্যামালতা, *echites*  
*frutescens*. ২ শালপর্ণী,  
*hedysarum gangeticum*.

দীর্ঘমূলিকা—দুরালভা।

দীর্ঘমূলী—দুরালভা, *hedysarum*  
*alhagi*.

দীর্ঘরঙ্গা—হরিদ্রা।

দীর্ঘরাগ—হরিদ্রা।

দীর্ঘরোহিষফ—সুগন্ধি তৃণবি, বড়-  
রোহিষ। পর্যায়—দৃঢ়কাস্ত, দৃঢ়চ্ছদ,  
যজ্ঞেষ্ঠ, দীর্ঘনাল, তিত্তসার।

দীর্ঘলভাদ্রুম—অশ্বকর্ণবৃক্ষ, লতা-  
শাল।

দীর্ঘলোহিতযাণ্টিকা—লাস আক।

দীর্ঘবংশ—নলতৃণ।

দীর্ঘবল্লী—১ মহেশ্বরবারুণী, ২  
পাতালগরুড়ীলতা, ছেউড়ী, ৩  
পলাশীলতা, ৪ আয়তা এইরূপ  
লতা।

দীর্ঘবর্ষাভূ—শ্বেতপদুনর্বা।

দীর্ঘবৃক্ষ—১ শালবৃক্ষ, ২ তালবৃক্ষ।

দীর্ঘবৃন্ত; দীর্ঘবৃন্তক—১ সোনা-  
গাছ; ২ লম্বা সোনা, ৩ লতাশাল।

দীর্ঘবৃন্তা—ইন্দ্রচিভিটী লতা।

দীর্ঘবৃন্তিকা—এলাপর্ণী গাছ, কাট  
আমরুলী গাছ।

দীর্ঘশর—যাবনাল ধান্য।

দীর্ঘশস্য—গাব ফল।

দীর্ঘশাখ—১ শগবৃক্ষ, ২ শালবৃক্ষ,  
*shorea robusta*.

দীর্ঘশাখিকা—[ হি° নল্লবনগুড় ],  
নীলায়ী ক্ষুদ্রপ।

দীর্ঘশিখিক—রাজিকাভেদ।

দীর্ঘশুক—শালিধান্য। ধান্য দ্র°।

দীর্ঘশুকক—রাজ্যাস, অশ্বপ্রদেশে আমন-  
ধানকে রাজ্যাস বলে।

দীর্ঘশুকশ—তালবৃক্ষ।

দীর্ঘা—পুষ্ণিপর্ণী। পর্যায়—পৃথক-  
পর্ণী, লাগুদলী, ক্রোশুপুষ্ণিকা,  
ধামনি, কলসী, তন্বী, গহ্বা,  
ক্রোশুকমেথলা; শৃগালবিম্বা,  
শ্রীপর্ণী, সিংহপুষ্ণিকা, দীর্ঘপত্রা,

অতিলতা, ঘূতলা, চিত্রপাণিকা ।  
 দীর্ঘায়ু—শ্বেতমন্দারক ।  
 দীর্ঘালক—শ্বেতমন্দারক বৃক্ষ ।  
 দীর্ঘেবর—ভগ্নরীতি ।  
 দ্ব্যংগ—১ লতাকরঞ্জ, ২ কপিকছুর,  
 ৩ আকাশগঙ্গা, ৪ কণ্টকারী ।  
 দ্ব্যংগ—শিরগোলা নামক বৃক্ষ ।  
 পর্যায়—দ্ব্যংগপাষণক, দ্ব্যংগম্নন,  
 ক্ষীরীগোমেদসমিভ, বজ্রভ, দীপ্তক,  
 দ্ব্যংগপাষণ—দ্ব্যংগপোয়া । পর্যায়—  
 সেবকাল, নিশাভঙ্গা, নস্করী ।  
 দ্ব্যংগফণী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট  
 বৃক্ষবি° । পর্যায়—পন্নঃফণী,  
 ফেনদ্ব্যংগ, পন্নঃফণী, লতাবি,  
 রণকেতুগ্নী, গোজাপণী° ।  
 দ্ব্যংগবীজ—যবনালাদ্যতুল, চিপিট  
 (?) ।  
 দ্ব্যংগম্নন—দ্ব্যংগপাষণ ।  
 দ্ব্যংগকা—দ্ব্যংগ নামক বৃক্ষবি° ।  
 পর্যায়—স্বাদুপণী, ক্ষীরাবী,  
 ক্ষীরগণী, ক্ষীরাক্ষিকা । ২ গন্ধিকা-  
 বৃক্ষ । পর্যায়—উত্তমা, যক্ষফলা,  
 উত্তমফলগণী° ।  
 দ্ব্যংগ—ক্ষীরবৃক্ষ ।  
 দ্ব্যংগনিকা—লাল আপাংগ ।  
 দ্ব্যংগী—ক্ষীরাবী । পর্যায়—উত্তমা,

দ্ব্যংগকা, দ্ব্যংগী, ফলোত্তমা,  
 ফলিনী, দ্ব্যংগপাষণ ।  
 দ্ব্যংগ—সবজবর্ণ পেঁরাজ ।  
 দ্ব্যংগলতা (দেশজ)—[ স° চন্দ্রকাঞ্চি ;  
 হি° দ্ব্যংগলতা ; তে° নাগর-  
 মদুর্ভুকাই, তা° নাগনামুকাই ;  
 বো° গুলচাঁদনি ] হৈমন্তিক  
 ধান্যবি° । লতাবি°, colony-  
 tion bouanox boj, C.  
 aculeatum house. জল-  
 কলমী । পাতা কলমী শাকের  
 মত, ফুল শাদা । ফুল রাঙে  
 ফোটে; আর সর্ষ ওঠার একঘণ্টা  
 পরেই শুকাইয়া যায় । এই জন্য ।  
 ইহাকে moonflower বলে ।  
 বর্ষাকাল হইতে শীতকাল পর্যন্ত  
 ফুল ও ফলের সময় ।  
 দ্ব্যংগকৌরেয়া (দেশজ)—বৃক্ষবি° ।  
 trichosanthes anguina.  
 দ্ব্যংগচাঁপা (দেশজ)—চম্পকভেদ ।  
 দ্ব্যংগপটলী (দেশজ)—dolichos  
 ligonosus.  
 দ্ব্যংগলতা—[ স° দ্ব্যংগকা, তিত্তদ্ব্যংগ ;  
 হি° দ্ব্যংগলতা ; দ্ব্যংগলতা,  
 কিরণী, বো° দ্ব্যংগকা ; প°  
 ঘারোটক ; তে° দ্ব্যংগপালা ] ক্ষীরী-  
 বৃক্ষ, oxytelma esculentum.

অর্কাদিবর্গের দীর্ঘায়ু লতাবি° ।  
গাছের বর্ণ দূধের মত শাদা ।  
পাতা সরু সরু । ফুল ছোট ছোট  
শাদা রংয়ের, ফুলের ভিতর দিক্‌টা  
গোলাপী আভাযুক্ত । ফলের  
বীজের মধ্যে তুলা থাকে ।

দুঃখিয়াকরুই—*wrightia toman-  
tosa*. দেখিতে অনেকটা কুড়চির  
মত । পাতা সোজা, ফুল দৃগন্ধ,  
আপীত ।

দুঃপাটি ( দেশজ )—*পুষ্পবৃক্ষবি°*,  
*impatiens balsamina*.  
দোপাটী দ° ।

দুঃপাটীলতা—*ipomoea pescapore*.

দুঃপদরেমণি (দেশজ)—[ স° বৃক্ষজীব,  
বৃক্ষক ; হি° দোপরিয়া ; ম°  
বৃক্ষজা, গোড়—বাধুনিফুল ]  
ছোট উদ্ভিদ, পুষ্পবৃক্ষ, মধ্যাহ্নে  
প্রফুল্লিত হয় । ফুলের রং লাল ।

দুঃপদরিয়া—*পুষ্পশাকবি°*, *pen-  
tapetes phoenicea*. দোপাটি,  
কাঠলতা, রান্ধুনী । ১/১ই হাত  
উঁচু হয় । ফুল ঘোর লাল ।  
বাধুলি দ° ।

দুরন্ত—আমেরিকান কটকপূর্ণ ক্ষুদ্র  
বৃক্ষবি° । *duranta plumieri*.  
আজকাল বাগানে বেড়া দিবার জন্য

রোপিত হইয়া থাকে । প্রায় চারি  
হাত উচ্চ হয় । ফুল নীল রংয়ের ।  
ফল ছোট-ছোট মটরের ন্যায় ।

দুরাধৰ্ব—বেতসর্ষপ ।

দুরাধৰ্বা—কুটুম্বনীবৃক্ষ ।

দুরারহ—১ বিষবৃক্ষ, ২ নারিকেল-  
বৃক্ষ ।

দুরারহা—খজুরবৃক্ষ ।

দুরারোহ—১ শ্রীবল্লী, ২ শালালীবৃক্ষ ।

দুরালভা—[ স° দুরালভা, দুরালভা,  
গিরিকর্ণিকা, ধন্যবাস,

যবাস ; বো° ধমাসা ; ম°  
বোনকামুলী ; ক° বল্লিদুরবে ;  
তো° গিলাংগতি ; তা° তুলংগরি ;  
হি° হিগুয়া, যবসা, দুরালা ]  
কাটিযুক্ত গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ ।

*alhagi camelorum*, a.  
*mourorum*. গ্রীষ্মকালে

যখন অপরাপর গাছ মরিয়া  
যায় তখন ইহার পাতা ও  
ফুল হয় । গ্রীষ্মকালে ফুল ও  
শীতকালে ফল হয় । ঔষধে ব্যবহৃত  
হয় । ১ দুরালভা বা ধন্যবাস  
(মরুদেশজাত) পারস্য, সিরিয়া,  
মিশরদেশে জন্মে, [ হি° ধমাসা ] ।  
আফগানিস্তানে জন্মে [ হি°  
জবাসা, ২ ক্ষুদ্রদুরালভা, ও

যবাস, যাস, *alhagi mouroorum*.

গান্ধারদেশে জন্মে। গান্ধারী  
পদ্প। পর্যায়—দৃশপর্শ।

বসন্তের বারিপাতের পর যবাসক্ষুপ  
হইতে যে নিষাস ক্ষরিত হইয়া  
সঞ্চিত হয় তাহার নাম ম্যানা।

বোম্বাই প্রদেশে ইহাকে  
ওরঙ্গাবান্ বলে। পর্যায়—

দুরালভা, ধম্বরাস, তাল্লমুলী,  
কচ্ছুরা, দৃশপর্শা, ধম্বী, ধম্বর-  
বাসক, প্রবোধনী, সুক্ষাদলা,

ধিরুপা, দুরভিগ্রহা; দুলভা;  
দৃশপর্শা, যাস; যবাস, দৃশপর্শ,

কুনাশক, রোদনী, অনন্তা; সমুদ্রান্তা,  
গান্ধারী; কাষায়া; ধনুর্ধাস; যবস,

কচ্ছুরা; বিকষ্ট, পশ্মমুখী।

দুরালভা—দুরালভা দ্র°।

দুরিতদমনী—শমীবৃক্ষ।

দৃগ্পদপী—বৃক্ষবি°। পর্যায়—

কেশপদুটা, মানসী, বালাক্ষী,

কেশধারিণী। ইহা কেশপদ্প  
নামে খ্যাত।

দুগ্রহ—অগামার্গ (?)।

দুর্জরা—জ্যোতিষ্মতী লতা।

দুর্দ্রিতা—লতানে গাছ।

দুর্দ্রম—দুর্দ্রোদ্রম, পেঁয়াজ।

দুর্ধর্ষা—১ নাগদমনী, ২ কণ্ঠারীবৃক্ষ।

দুর্মরা—দুর্মর টাপ, দুর্বা।

দুলভ—১ দুরালভা, ২ শ্বেত  
কষ্টকারী।

দুলালচাঁপা—চম্পকভেদ, *hedychium coronarium*.

দুলালতগর—তগরপদ্পবি°। শূন্যপদ°।

দুলীচাঁপা—*sphenocarpus grandiflorus*.

দৃশপর্শ—দুরালভা।

দুতল্লী—কদম্বপদ্পী।

দুর্দ্রম—মুগ্ধতৃণ।

দুর্বা—[ সং গ্রাম্ভী ; হি° দুর্বা ; তে°  
গরিকে ; তা° অন্নগৃহ ; প° তল্লা ;

ইং grass, huriale grass,  
bent grass, panic grass ]

ধান্যাদিবর্গের তৃণবি°। দীর্ঘাঙ্গ  
লতা ঘাস। *cynodon dactylon*,

*panicum d.* ইহা পাপ বিনষ্ট  
করে বলিয়া এই নাম। পর্যায়—

শতপর্বিকা, সহস্রবাঁটা, ভাগবী,  
রুহা; অনন্তা, তিস্তপর্বা, দুর্মরা,

বহুবীর্ষা, হরিতা, হরিতালী,  
কচ্ছুরুহা। প্রকারভেদ—১ নীল

দুর্বা—[ হি° সফেদদুর্বা; হারিয়ারি ;  
দুর্বা ; ম° হরষ্ঠী ; গুজ° ধো,

ঘোলিধো ; ক° হস্তগরুকে ; তে°

দূর্বাদ্ ; দূর্বস্ত্ ; — তাং  
অরুগম্ পল্লভ্, দোষঘাস ]  
সচরাচরেষু হরিষর্ণ-  
দূর্বাদ্ দেখা যায় তাহাই নীলদূর্বাদ্ ।  
২ শ্বেতদূর্বাদ্—[ হি° সফেদ-  
দূর্বাদ্ ; গুজ° ধোলীধো ; তে°  
গড়িকগাভি ; ম° গোলেমি ]  
শাদাদূর্বাদ্ । নীলদূর্বাদ্ মত  
কেবল রংয়ের তফাৎ । পর্যায়—  
সহস্রবীর্ষা, গাডালী, শকুন্তলাক্ষক,  
গোলোমী, সিতদূর্বাদ্, সিতা,  
সিতাখ্য, চণ্ডা, ভদ্রা, নন্দা, মহাবরা,  
সুরবল্লভা, শূভা, সুপঠা । ৩  
গাণ্ডদূর্বাদ্—[ হি° গাণ্ডবদূর্বাদ্ ;  
ম° গাণ্ডুরদূর্বাদ্ ; ও° গাণ্ডুরধো ;  
ক° হোমকুণ্ডে : তে° পোম গাণ্ডী ]  
গেটে দূর্বাদ্ । গেটে দূর্বাদ্ ক্ষুদ্র  
হয়, ইহা কাশ ঘাসের মত । ইহার  
দ্বারা ঘর ছাওয়া হয় । পর্যায়—  
গাডালী, গাণ্ডদূর্বাদ্, অতিতীরা,  
মংস্যাক্ষী, বারুণী, মীনেন্দ্রা,  
শ্যামগ্রান্থি, চিত্রা, কলায়া, শকু-  
লাক্ষী । ৪ মালাদূর্বাদ্—নীলদূর্বাদ্  
মত । কেবল ইহা ব্রতীমালার  
মত । পর্যায়—বল্লিদূর্বাদ্, অলি-  
দূর্বাদ্, মালাগ্রান্থি, গ্রান্থিদূর্বাদ্,  
মূলগ্রান্থি, বল্লবী । সমগ্রভারতে

জন্মে, রাস্তার ধারে, মাঠে বাড়ির  
কিনারায় হয় । পানীদূর্বাদ্—  
sporbalus tenacissimus.

দূঢ়কণ্টক—খলা-আঁকড়া ।

দূঢ়কাণ্ড—১ বংশবৃক্ষ, ২ দীর্ঘ  
রোহিষক, ৩ পাতালগরুড়ী  
লতা ।

দূঢ়তরু—ধববৃক্ষ ।

দূঢ়তৃণ—মৃগতৃণ ।

দূঢ়তৃণা—বল্লভা তৃণ ।

দূঢ়তৃচ্—ধাবনাল তৃণ ।

দূঢ়পত্র—বংশ ।

দূঢ়পত্রী—বল্লভা তৃণ ।

দূঢ়পাদা—যব তিল্লা ।

দূঢ়পাদী—ভূম্যামলকী ।

দূঢ়প্ররোহ—বটবৃক্ষ ।

দূঢ়ফল—নারিকেল ।

দূঢ়বান্ধনী—শ্যামালতা ।

দূঢ়বল্লকল—পুগবৃক্ষ, ২ লকুট ।

দূঢ়বল্লকা—অশ্বষ্ঠা (?) ।

দূঢ়বীজ—১ চক্রমর্দ, ২ বদর, ৩ ববর ।

দূঢ়মূল—তৃণবি । প্রকারভেদ—১

১ মৃগতৃণ, ২ মস্থানক তৃণ,

৩ নারিকেল ।

দূঢ়লতা—পাতালগরুড়ী লতা ।

দূঢ়সদ্রিকা—মুখসতা ।

দূঢ়ক্ষ—ক্ষীরিকাবৃক্ষ ।



দুচাঙ্গ—জীরক ।

দুতা—জীরক ।

দুতিধাবক—আকনপাতা ।

দুশাকাংখা—পদ্ম ।

দুশোপদ্ম—শ্বেত পদ্ম, *nelumbium speciosum*.

দৃষ্টিকৃত, দৃষ্টিকৃৎ,—স্থলপদ্ম,  
*hibiscus mutabilis*.

দেতাড়া, দেতারী—[ স° দেবতাড়;  
দেবদালী, ] দেতারী, দেওচাড়া ।  
ধান্যাদিবর্গের প্রায় সোজা ঘাস  
বিশেষ ।

দেধান, নেবধান—[ স° দেবধান্য ; ইং  
*broomcorn* ] দেধান, দেবধান;  
*andropogon saccharatus*,  
*sorghum*. s. ধান্যাদিবর্গের  
শস্য । সরু আখ গাছের বা মক্কা-  
গাছের মত । উত্তর ভারতে আবাদ  
হয় । বাংলার কচিং দৃষ্ট হয় ।  
গোরুর খাদ্য ।

দেফল ( দেশজ )—বৃক্ষবি° ।

দেব—১ দেবদারু, ২ স্থলপদ্ম ।

দেবকাণ্ডন—*baubinia purpurea*  
॥ বেল° ॥

দেবকাষ্ঠ—দেবদারু প্রভেদ (?) ।

পর্যায়—পুতিকাষ্ঠ, ভদ্রকাষ্ঠ,  
সুকাষ্ঠক, শিন্ধদারু, কাষ্ঠদারু ।

দেবকুরুবা—মহাদ্রোণী ।

দেবকুম্ব—লবঙ্গ ।

দেবতরু—মন্দারাদি বৃক্ষ । ১ মন্দার,  
২ পারিজাত, ৩ সন্তান, ৪ কম্পবৃক্ষ,  
৫ হরিচন্দন ।

দেবতাড়, দেবতাড়ক—দেতাড়া গাছ ।  
পর্যায়—বেণী, ঘরা, গর, জীমূত,  
অগরী, ঘরাগরী, তাড়ী, আখদারিষহা,  
আখ, বিষজিহব, মহাচ্ছদ, কদম্ব,  
খুজ্জাক, দেবতাড়ক ।

দেবদারু—[ স° দেবদারু, দেবকাষ্ঠ,  
দেবদ্রুম, সরলবৃক্ষ, সরল । হি°  
দেবদারী, দেওদার ; ম° তেল্যা  
দেবদারু ; গুজ° দেবদার ; ক°  
চোপড়া দেবদার ; তে° দেবদারু  
চেঁকা ; ফা° দেবদার ; অ° শজর  
কুলজীন ; ইং *pine*, *Himalayan*  
*cedar* ] আতপ্যাদিবর্গের  
পর্বতীয় দীর্ঘ তরুবি° । *cedrus*  
*deodara*, *pinus d.*, *abies d.*,  
*polyalthia longifolia*.  
*guatheria l.* প্রায় ১৭০১৮৩  
হাত উচ্চ হয় । দেবদারু দুই প্রকার ।  
পাতা মৎসাকার, ধার তরঙ্গি । ফুল  
গ্রিন্দল । এক ফুল হতে অনেক  
ফল হয় । গুড়ির পরিধি প্রায়  
৩৬ ফুট । পাতা সবুজবর্ণ, পত্র

ও কিনারা ঢেউ খেলান । শ্মিৎখ-  
 দেবদারু—পর্বতপ্রদেশে জন্মে ।  
 সুগন্ধী, তৈলাক্ত; ভারী । কাণ্ড  
 প্রায় ১২।১৪ হাত উচ্চ ও ব্যাস  
 প্রায় ৩ হাত । কাষ্ঠদারু বা  
 কাষ্ঠদেবদারু—নিগন্ধ; হালকা,  
 রুদ্ধ । যেখানে সেখানে জন্মায় ।  
 ইহার কাষ্ঠ ও তেল ঔষধের  
 জন্য ব্যবহৃত হয় । গাছের  
 নিৰ্ঘাসকে শ্রীবেষ্ঠ সরল দ্রব বলে ।  
 পর্যায়—শত্রুপাদপ, পারিভদ্রক,  
 ভদ্রদারু, দ্রুতকিলিম, পীড়দারু,  
 দারু, পদতিকাষ্ঠ, সুরগারু, দারুক;  
 শ্মিৎখদারু, অমরদারু, শাম্বব;  
 ভূতহারি, ভবদারু, ভদ্রবৎ,  
 ইন্দ্রদারু, মস্তদারু, সুরভূরুহ;  
 সুরাশ্ব, দেবকাষ্ঠ ।  
 দেবদালিকা—মহাকালবৃক্ষ ।  
 দেবদালী—[ হিঁ ঘঘরবেল, সোনেয়া ]  
 লতাবি । পর্যায়—জীমূতক,  
 কষ্টফলা, গরা, গরী, বেণী, মহা-  
 কোষফলা, কটফলা, ঘোরা,  
 কদম্বী, বিষহরা, ককটী,  
 সারমুখিকা, বৃষকোবা, দালী,  
 আখুবিষহা, স্নেহশপটিকা,  
 কুরঞ্জিকা, মৃতকারী, দেবতাড় ।  
 দেবদাতী—বনবীজপুরু বৃক্ষ ।

দেবধান্য—দেধান । পর্যায়—যবনাল,  
 যোনল, জুগাহবয়, পোডালা,  
 বীজপুংগিকা ।  
 দেবনল—মধুর রসবিশিষ্ট তৃণ ।  
 arundo bengalensis. পর্যায়—  
 দেবনাল, মহানল, বন্য, নলোত্তম,  
 স্থলনাল, স্থলদণ্ড, সুরনাল,  
 সুরদ্রুম ।  
 দেবপর্ণ—সুরপর্ণ ( ? ) ।  
 দেবাপ্রিয়—বকবৃক্ষ ।  
 দেববলা—১ সহদেবীলতা, বলাভেদ,  
 ২ গ্রামমাণা লতা, বলাভূমুর ।  
 দেববৃক্ষ—১ মন্দারবৃক্ষ, ২ সপ্তপর্ণ  
 বৃক্ষ ।  
 দেবভবন—অশ্বথবৃক্ষ ।  
 দেবলতা—নবমল্লিকা ।  
 দেবসৰ্বপ—রক্তমূলক নামক বৃক্ষ ।  
 পর্যায়—অশ্বাশ্ব, বদর, রক্তমূলক,  
 সুরসৰ্বপাক, সূক্ষ্মদল, নিজর-  
 সৰ্বপ, কুরবার্ণাশ্ব ।  
 দেবা—১ পদ্মচারিণী লতা, ২ অশন-  
 পর্ণী, ৩ মূৰ্বা ।  
 দেবাগ্ন—অশ্বথবৃক্ষ ।  
 দেবাভিষ্ট—তাম্বুলী ।  
 দেবার্হা—সুরপর্ণ ॥ রাজনি ॥  
 দেবার্হা—সহদেবী লতা ।  
 দেবাবাস—অশ্বথবৃক্ষ ।

দেবী—১ বন্ধ্যাককোটকী, ২ শালপর্ণী,  
৩ মহাদ্রোণী, ৪ নাগরমুস্তা, ৫  
৬ হরীতকী, ৭ অতসী, ৮ মূর্বা,  
৯ সূক্কা, ১০ আদিত্যভক্তা, ১১  
লিঙ্গিনী।

দেবদারব—দেবদারুবৃক্ষ।

দোড়ী—ফলপ্রধান বৃক্ষ; দোলী।

দোনা—এক প্রকার লতাৰি, ২ দমন-  
কবৃক্ষ; দনাগাছ; *artemisia*  
*Indica*.

দোপাটী—[ স° দ্বিপট; হি°  
গুলমোন্দী; ও° হরগোরা ]  
দোপটী, দোমটী, দোপাটী,  
দপাটী। বর্ষায়—দুই রঙা  
পুষ্পবি°, *impatiens balsamina*  
ছোটগাছ। ফুলদল অসমান  
বিচিত্রবর্ণ। ছদ দলের মত রঙিন  
বলিয়া দ্বিপট। বর্ষাজীবী উদ্ভিদ  
১—৩ ফুট উঁচু হয়। কাণ্ড  
কোমল লোমযুক্ত, শাখা-প্রশাখা  
অস্প। ফুল ও ফল বর্ষাকালে  
হয়।

দোপাটী লতা (দেশজ)—দোমাটি,  
দুমটী, দুইবটি, দোবটি।  
লতাৰি°।

দোমটী—*hydrocera* *triflora*.  
দোপাটী দেখ দ্র°।

দোমাক্ষণী—বনবর্ষারিকা।

দোসরা শাক—*glinus* *littam-*  
*noides*.

দোহলী—অশোকবৃক্ষ।

দ্রবস্তী—[ স° মূর্ষিকপর্ণী, সহস্রমূলী;  
হি° মূষাকানী, ছোটা, ডোয়নী ]  
বৃক্ষবি°। পুষ্প—শম্বরী,  
চিত্রা, পত্রশ্রেণী, আঘুকর্ণিকা,  
মূর্ষিকপর্ণী, প্রতিপর্ণশিকা,  
সহস্রমূলী, বিক্রান্তা।

দ্রাক্ষা—[ স° দ্রাক্ষা, গুচুফলা;  
তাপসাপ্রিয়া, রসলা, কাম্মীরিকা,  
চারুফলা, পলাসী; হি° আঙ্গুর;  
ম° কাঠেদ্রাক্ষ; গুজ° ধরাধ;  
ক° বেডগগদ্রাক্ষ; ও° দ্রাক্ষা;  
তা° কোড়িমণ্ডি; কা° আঙ্গুর;  
অ° কাম্ম; ইং *vine, grapes* ]  
আঙ্গুর, *vitis* *vinifera*. ১

দ্রাক্ষা—( আঙ্গুর ), ২ কপিলদ্রাক্ষা  
( হি° লালীদাথ ) ৩ ক্ষুদ্রদ্রাক্ষা—  
( কীস্মীস, অ° কীস্মীস )।

৪ গোষ্ঠনীদ্রাক্ষা—[ ফা° মনুকা ],  
মনেকা; মনকা। কাম্মীরে বহুল  
পরিমাণে জন্মায়। কাবুল হইতে  
এদেশে বহু পরিমাণ আনীত হয়।  
আম ও শুষ্ক ফল ঔষধার্থে

ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—সুধীকা,  
গোস্তনী, স্বাধী, মধুরসা, চারুফলা,  
কষতা, প্রিয়লা, তাপসপ্রিয়া,  
গুচ্ছফলা, রসলা, অমৃতফলা।  
দ্রাবিড়ী—এলা, ওজরাতী এলাচী।  
পর্যায়—সুক্ষ্মা, উপকুণ্ডিকা, তুচ্ছা,  
কোরঙ্গী, দ্রাবিড়ী, গুটী।  
দ্রাবিণনাগক—গোভাজন। ইহা  
ভক্ষণ করিলে ধন নাশ হয়।  
দ্রাকিলিম—দেবদারু-বৃক্ষ। পর্যায়—  
দেবদারু, সুরাহ, ভদ্রদারু, দেবকাষ্ঠ,  
পীতদারু, দারু।  
দ্রুঘল—ভূমিচক্ষপক।  
দ্রুগ—পিপুল।  
দ্রুম—পারিজাত।  
দ্রুমশ্রেষ্ঠ—তালবৃক্ষ।  
দ্রুমেশ্বর—১ তালবৃক্ষ, ২ পারিজাত।  
দ্রুমোৎপল—কর্ণিকার।  
দ্রুমল্লক—পিয়াল-বৃক্ষ। *chironjia*  
*sapida*.  
দ্রোণ—[ স° দ্রোণপদুপী ] অরণীকাষ্ঠ।  
দ্রোণ-গান্ধিকা—রাশ্না।  
দ্রোণপর্ণী—ভূমিকদলী।  
দ্রোণপদুপী—[ স°-কদম্বা, কদম্ব-  
যোনি, দ্রোণ ; প°-গুলডেরা ;  
গুজ° কদলিমূল ; তে° কদম্বিক ;  
কো° কানশিশা ; - হি° গম্বা,

হলকুসা ; ম° কদম্বা ;  
ক° তুষ্ণ। তে°-লতুগ তুষ্ণ ; পদুয়া  
পাতোসী ; সিংভুম—গেটতুষ্ণ ;  
ঘলঘসি, দণ্ডকলস, ঘলঘসা,  
হলকসা, *leucas linifolia*  
*spreng, l. aspera*. শাদাফুল।  
বর্ষজীবী ঘন পত্রবিশিষ্ট ছোট  
ক্ষুদ্রপত্র। পাতা স্তরে স্তরে  
বিন্যস্ত থাকে—সরু, লম্বা,  
ছোট। ফুল শাদা চোঙের  
মত শীতকালে ফোটে; বড় বৃক্ষ।  
মহাদ্রোণী—*leucas caphalotes*-  
দেবদ্রোণী [ হি° বড়ী দ্রোণপদুপী ]  
পাতা ও ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত  
হয়। ঘলঘসা দ্র°। পর্যায়—  
খর্বপত্র, কদম্বফেণি, কদম্বিলা,  
চিহ্নাক্ষপ, কদম্বা, সুপদুপা,  
চিত্রপত্রিকা, দ্রোণা, ফলেপদুপ।

দ্রোণিকা—নীলগাছ।

দ্রোণী—১ নীলীবৃক্ষ ২  
ইন্দ্রচিভিটী।

দ্রোণীদল—কেয়াফুল।

দ্রুগাণি—রাংচিতা। পর্যায়—পাঠী,  
হুস্বাণি।

দ্বিকোণপদুপ—*bignonia radicans*  
॥ বেল ॥

দ্বিজকরুণসিত—শ্বেতাস্তকবৃক্ষ ॥ রাজনি ॥

বিজা—পালম শাক । একবার কাটিয়া

লইলে আর একবার হয় বলিয়া ।

দ্বিতীয়ত্রিফলা—গাম্ভারী ।

দ্বিতীয়ভা—দারুহরিদ্রা ।

দ্বিধালেখ্য—হিস্তালবৃক্ষ ।

দ্বিপত্রক—১ চণ্ডালকন্দ, ২ দ্বিদলকমল ।

দ্বিপর্ণ—বনকোলী ।

দ্বিপটু—সুগন্ধি শ্বেতপুষ্পক বৃক্ষভেদ

॥ পারস্করনিং ॥

দ্বিশৃঙ্খকা—মেট্রবল্লী ॥ পারস্করনিং ॥

দ্বীপখজুর্দর—মহাপারেবত ॥ রাজনিং ॥

দ্বীপশত্রু—শতমূলী ।

## [ ৭ ]

ধ—[ সঁ ধব । ওঁ ধ ] হরীতক্যাদি-

বর্ণের অরণ্যজাত বৃক্ষবিং,

*anogeissus latifolia*. কাঠ

শাদা, শক্ত । গাছ হইতে ধ আঠা

বাঁহর হয় ।

ধটক—নন্দিবৃক্ষ । পর্ষায়—ধব, ধট,

নন্দিতর, স্থির, গোর, ধরম্বর ।

ধতু—*emblica officinates*.

ধস্তুর—ধুস্তুর ।

ধনঞ্জয়—১ চিত্রকবৃক্ষ, ২ অজুর্নবৃক্ষ ।

ধনদ—১ হিজলবৃক্ষ, ২ চিত্রকবৃক্ষ ।

ধনদাক্ষী—কুবেরাক্ষী লতা, লতাকরঞ্জ ।

ধনপ্রিয়া—কাকজম্বুবৃক্ষ, একপ্রকার  
জাম ।

ধনিকা—প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ ।

ধানচা—[ সঁ জয়ন্তী ; ইং *indian  
flax* ] শিম্বাদিবর্ণের বর্ষায়,

ছোট গাছবিং, *sesbania  
aculeata*, s. *cannabina*.

ধনীয়ক—ধন্যাক, ধনে ।

ধনুঃপটু—পিয়ালবৃক্ষ ॥ ভাবপ্রং ॥

ধনুঃশাখা—মর্বা, ২ পিয়ালবৃক্ষ ।

ধনুঃশ্রেণী—১ মর্বা, ২ মহেন্দ্রবারুণী

॥ বৈদ্যকরং ॥

ধনুকেতকী—পুষ্পবিং ।

ধনুগুপ্ত—পুষ্পবিং ।

ধনুগুণা—মর্বা ।

ধনুমালা—মর্বালতা ।

ধনুর্দাস—১ দুরালভা ॥ বৈদ্যকরং ॥

২ সোমবল্লী ॥ রাজনিং ॥

ধনুবৃক্ষ—১ ধন্বনবৃক্ষ, ২ বংশ; ৩

ভল্লাতক, ৪ অশ্বথ । পর্ষায়—

পিচ্ছিলত্বক, ধর্মণ ॥ বৈদ্যকরং ॥

ধনুসং—পিয়ালবৃক্ষ ।

ধনে, ধনিয়া, ধন্যা—ধন্যাক দ্র° ।

ধনেয়ক—ধনিয়া ।

ধন্য—অশ্বকর্ণবৃক্ষ ।

ধন্যা—১ আমলকী, ২ ধন্যাক ।

ধন্যাক—ধনিয়া গাছ, *coriandrum sativum*. পর্যায়—ছত্রা, বিতুন্নক, কুস্ত্বব্দরু, ধান্যক, ধনা, ধনিক, ধানক, ধান্য, ধানেয়, ধনিকা, ছত্রা-ধান্য স্তর্গাশ্ব, শাকযোগ্য, সঙ্কল্পপত্র, জনপ্রিয়, ধান্যবীজ, বীজধান্য, বৈধক ।

ধন্বজ, ধন্বাধ, ধন্যাগ—[ হি° ধাম্‌নি ]

ধন্বনবৃক্ষ, *grewia asiatica*.

পিচ্ছিল-রসাত্মক রক্তপুষ্প, তেজো-

বান ফলবৃক্ষ । পর্যায়—রক্তকুসুম,

ধনুর্বৃক্ষ, মহাবল, রুজাসহ,

পিচ্ছিলক, রুক্ষ, স্বাদুকল ।

ধন্বন—গোত্রবৃক্ষ ॥ ভাবপ্র° ॥

ধন্ববাস—দুরালভা ।

ধন্বন—১ দুরালভা, ২ অজর্দনবৃক্ষ, ৩ বকুল ।

ধব—[ হি° ধড়িয়া ধাড় ], পশ্চিম দেশীয় বৃক্ষবি° । কেহ কেহ ধলা-আঁকড়া বলিয়া থাকেন । পর্যায়—শাকটোধ্য, দড়তরু, ধরুধর গোর, কষায়, মধুরত্বক, শুকবৃক্ষ, পাণ্ডুরু, ধবল, পাশুরে ।

ধবল—১ যববৃক্ষ, ২ শ্বেতমরিচ, ৩ অজর্দন গাছ ।

ধবলপাটিনী—[ হি° শ্বেতপাপড়ি ]

শ্বেতপাটিনিকা, শাদা পারুল ।

ধবলযাবনাল—[ স° মৌক্তিকতড়ুল ]

মুক্তা সদৃশ সূচিকণ ধান্য ।

পর্যায়—পাণ্ডুর, তারতড়ুল,

নক্ষত্রাকৃতিবস্তুর, বৃত্ত, মৌক্তিক-

তড়ুল ।

ধবলা—অনন্তমূল ।

ধবলোৎপল—কুমুদ, শদিয়া ।

ধন্তুর, ধন্তুর—ধূতরা দ্র° ।

ধমন—নল নামক তৃণ ।

ধমনি, ধমিনী—[ স° ধন্বজ, ধন্বন ]

ধামন দ্র° ।

ধমনী—১ হরিদ্রা, ২ পৃথিবীপর্ণা, ৩

নলিক । ?

ধর—কার্পাস তুলা ।

ধরণ—১ ধান্য, ২ অর্কবৃক্ষ ।

ধরণী—১ শাল্মলীবৃক্ষ, ২ কন্দভেদ ।

ধরণী—১ শাল্মলীবৃক্ষ, ২ কন্দবিশেষ ।

পর্যায়—ধরণীয়া, ধীরপত্রী,

সুকন্দক, কন্দাল, বনকন্দ, কন্দাঢা,

দণ্ডকন্দক ।

ধরণীকন্দ—ধরণী নামক মূলবিশেষ ।

ধরাকদম্ব—ধরাকদম্ববৃক্ষ ।

ধতুর—ধূস্তুর ।



ধর্ম্মন—বৃক্ষভেদ, ধামিনিয়া ।

ধর্ম্মপত্ন—গোলমরিচ ।

ধর্ম্মপত্র—যজ্ঞভূমির গাছ ।

ধর্ম্মমতি—বোধিবৃক্ষভেদ ।

ধলআঁকড়া—ধলড্র ।

ধলড্র—দৃঢ়কণ্টকবৃক্ষ, চলিত—ধল-  
আঁকড়া; allangium hexape-  
tatum.

ধলিবাঁশ—এক প্রকার বাঁশ ।

ধাইফুল—ধাতকী দ্র° ।

ধাতকী—[ স° পার্বতী, তাম্রপদুপী,

বহুপদুপিকা, ধব ; হি° ধায়কে

ফুল, ধবইকে ফুল ; ম° ধায়টী ;

গুজ° ধাবনী, ক° ধায়কে ফুল,

ধায়ফুল, তে° ধাতকীফুল,

—জাতিকো ; সাঁওতাল—

ইচাক ; ও° ধাতিকো, হারয়ারী ;

নে° দাহিরী ; ধাগেরাকা ]

ধাই, ধাই, ধাওয়াই, ধাত, ধাদকী,

ধাইতি, ধাউরা, ধাইফুল,

ধাইফুলের গাছ ছোট ।

পর্বতে জন্মায় । পাতার বৃন্ত

নাই । শাখায় লাগিয়া থাকে ।

ফুল তামাটে রং ; মাঘ-ফাগুনে

হয় । ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত

হয় । ষটদল, কেশর ১২টি.

পাশ্চাত্য ও ধবল । জন্ম—

বিহার, ছোটনাগপুর, উত্তরবঙ্গ,  
হুগলি । পর্বায়—বহুপদুপী,

তাম্রপদুপী, ধানী, অশ্বিনজালা,

অভিষ্কা, পার্বতী, বহুপদুপিকা,

কুমুদা, সীধুপদুপী, কুঞ্জরা,

মদ্যবাসিনী, গুচ্ছপদুপী, সংধ-

পদুপী, লোমপদুপিনী, তীর

জালা, বহিষ্কা, মদ্যপদুপা,

ধাতুপদুপী, ধাতুপদুপী, ধাতু-

পদুপিকা, ধাত্রী, ধাতুপদুপিকা ।

৥ রাজনি° ৥

ধাতুপদুপিকা, ধাতুপদুপী—ধাতকীদ্র° ।

ধাতুপদুপিকা—ধাতকী দ্র° ।

ধাত্রীপত্র—১ তালীপত্র, ২ আমলকী  
পত্র ।

ধান—ধান্য দ্র° ।

ধানক—ধানিয়া ।

ধানিকা, ধানী—পীলুবৃক্ষ ।

ধানিলস্কা—[ হি° গাছমরিচ ; তে°

মীরাপাকাই, তা° মুল্লাখাই ]

লস্কাবি°, capsicum fruit-

escens, lin. বহুবর্ষজীবী

উদ্ভিদ । কাঁচা অবস্থায় সবুজ,

পাকিলে লাল, কিংবা নেবুর

রঙের মত । ফলে অনেক বাঁজ

থাকে, বেগুন বাঁজের মত চেষ্টা

ও ছোট-ছোট । লস্কা দ্র° ।

ধানদুস্কা—অপামার্গবৃক্ষ ।

ধানদুস্কারি—লতাভেদ ।

ধানদ্য—বাণ ।

ধানের, ধানেরক—ধন্যাক ।

ধান্য, ধান—[ স° রোপ্যাতিরোপ্য, ব্রীহি, ইং paddy, rice ] শস্যবিং, সতুষত-ডুল, ধান, oryza sativa. ধানের প্রকারভেদ—১ শমীধান্য; ২ তৃণধান্য—[স° রাগী], ৩ শবক-ধান্য [শিশ্বীধান]—শয়্যাবৃত্ত ধান ও যবাদি, ৪ দেধান—[স° পবনাল], ৫ আশুধান—[স° পটিল] আউস, বর্ষাকালীন ধান, ব্রীহি ধান, ৬ শালিধান্য—আমনধান, হেমন্তকালে হয় । ৭ কঙ্কধান্য—কাছনীধান—চার প্রকার—শ্যামা; চীনা, কট, কোদো । চীনাধান শ্যামাধানের মত ক্ষুদ্র । চীনা দ্র°, ৮ কেলেশধান; ৯ লঘুধান; ১০ হৈমন্তিকধান [স° রক্তশালি] ১১ উড়ীধাম [সি° নীবার] ২ বর্ষিকধান্য—গ্রীষ্মকালে জন্মে যে ধান, ষেষ্টে ধান । বোরোধান [স° বোরব], বাঙলাদেশ ধান ও চাউলের জন্য প্রসিদ্ধ । প্রাচীন কালের বাংলা গ্রন্থে বহুপ্রকার ধানের নাম উল্লেখ আছে ।—

আজান, আশ্বারকুলি, আমপাবন, আমসলো, আলাচিত, আসতির, আসতজ, উড়াশালী, ককটি, কনকচুর, কাঁওদ, কামদ, কালা-কাস্তিক কালাঘুগর, কুসুমমালী, কোটা, খিরকবা, খেজুর ছাড়ি, খেমরাজ, গআবলী, গন্ধতুলসী, গন্ধমালতী, গুজুরা, গোতমপলাল, গোপালভোগ, চন্দনসাল, ছিছরা, জলারাজ, জেধ, জোলি, ঝিঙাসাল, টাঙ্গন, তসরা, তিলসাগরি, তুলানধান, তুলসালি, ভোজনা, দলাগাড়ি, দাড়ি, দধরাজ, নাগরজুগান, পলাল, পর্বতজিরা, পাখুদিয়া, পাতল, পাথর, ভেফেরি, বককড়ি, বিন্ধ, বানি, বিন্ধসালী, বদ্বি, বড়ামাতা, ভজনা, ভাদোলী, ভান্দমুখি, মইপাল (মহীপাল), মাধবলতা, মস্তাহার, মলামস্তাহার, মোকলস, রক্তসাল, রাসগড়, রাজদল, লতামো, লাউসলী, লালকাজিনী, বাঁকই, বাঁকচুর, বাঁকসাল, বাগনিবাঁচ, বাঁসকটা, বাঁজগটা, বাঁসমতী, বোআলি, সনাখড়িক, সালছটী, সীতাসালী, সোলপনা, হরি, হরিকালি, হাতিপাঞ্জার, হরকুলি

॥ নামগুণি বৌদ্ধবৃক্ষের—শূন্য-  
 পুরাণ ॥ পরবর্তী কালের বাংলা  
 কাব্যে ধানের উল্লেখ—হরিশঙ্কর,  
 হাতিপঞ্জর; হুড়া; হরকুলি;  
 হাতিপাদ, হিণ্ডি, হলুদগুড়ো,  
 কেলেকান্দু; কেলোজিরা, কানিয়া,  
 কার্তিক, কয়াকচা, কাশীফুল,  
 কপোতকণ্ঠিকা, কালিন্দী, কুম্ভম-  
 শালী; কনকচূর, দধিরাজ,  
 দুর্গাভোগ, পদ্দেশী, ধুস্তুর,  
 কুম্ভশালী, কোঙরভোগ, কোঙর-  
 পুর্ণিমা, কমলতা; কনকলতা,  
 কামোদ, খেজুরখুপী, খয়েরশালী,  
 ক্ষেম; গম্বাজল, গম্বাবলি, গোপাল-  
 ভোগ, গৌরীকাজল, গন্ধমালতী,  
 গম্বাখুপী; গুণাকর, চামরতালি,  
 হরিশঙ্কর, বন্দনশালি, ছত্রশালী,  
 জটাশালি, জগন্নাথভোগ, জমাই-  
 লাড়ু, জলারাজী; বিজ্ঞাশালী,  
 বলাহভোগ, ধূল্যা, নিমুই, নন্দন-  
 শালী, রূপনারায়ণ, পাতসাভোগ,  
 পায়রারস, পিপীড়াবাকি, তিল-  
 সাগরী, বাকশালি, বাকোই,  
 বুরানি; দাড়বন্দী, বাকচূর, বড়া-  
 মাটা, রামশালি, রাম্দী, রাজ্যমেটা,  
 রামগড়, রত্নকর, পুণ্যবতী,  
 নহীপ্রিয়; কাউশালি, লক্ষ্মীকাজল,

ভোজনা, ভবানীভোগ; হরকুলি,  
 সীতাশালি, শঙ্করশালি, শঙ্করজটা  
 ॥ শিবাণ ॥ মৃৎল আমলে তৎকালে  
 প্রচলিত চাল—সুখদোষ চাউল,  
 দেওয়ানপ্রসাদ চাউল, সংজেরা  
 চাউল, মিছরি চাউল, দস্তজেরা  
 চাউল, খঞ্জন চাউল, দেকের চাউল;  
 ষাঠীচাউল ॥ অইন-ই-অকবরী ॥  
 সরকারী সমীক্ষায় বিংশ শতাব্দীর  
 প্রথমার্ধে এই নামগুণি পাওয়া  
 যায়—অচিন, অচমিতা, অচমিতা;  
 অশিনসাইল, অমৃতসাল, অমৃত-  
 মণ্ডি, অমৃতভোগ, অমৃতসাগর,  
 আবরসাইল, আবিলকলমা; আব-  
 ছাইয়া, আচারভোগ; আচর, আদা-  
 শালি; আগুনবাগ, আগুনিয়া,  
 আকাশমণি, আলমভোগ, আলাপশি,  
 আল্লাদকুড়ি, আমনধাসা; আমন-  
 লতা, আমিরপসন্দ, আমবাকি,  
 আনারকলি, আমদারকুলী, আউশ-  
 বাশী, আবরাজ, আশার গাজিয়া,  
 আশিনা, আশিনবারা; আসামাগাহি,  
 আশকারাম, আশমিটা, আউশ-  
 গুড়গুড়ি; আউশকাজল; ইন্দ্র-  
 সাইল, ঈশ্বরভোগ, উখনীভোগ,  
 উখনীমধু, উকাইবা রাবণ, উরিধান,  
 কবিরমালিক; কাচারিসালি,

কদালিয়া চম্পা, কালাচিনি, কালা-  
ডোম, কালাকচু, কালামাণিক,  
কালিবাজাল, কালিগোরী, কালি-  
জিরা, কমলভোগ, কামরাং,  
কামিনীসর, কানাইবাঁশী, কানাই-  
লাল, কনকচূর, কাচননী, কাশী-  
ফুল, কাশ্মিরী বাঁশমতি, কস্তুরী,  
কাটালভোগ, কাটারীভোগ, কায়-  
বাদলী, কাজলমেথি, কেশমন্তী,  
কেশরী, কাবুলীভোগ, কোচমঙ্গল,  
কাচিকুমারী, কৈসেড়, কলাথোড়,  
কলা আমন, কলাসাগর, কলুভোগ,  
কমাল, কমলভোগ, কুমড়া;  
কুমারী। কুমড়ীভাজা, কুসুমফুল,  
কৈমাশূর, কৃষ্ণচুড়া, কৃষ্ণজিরা,  
কৃষ্ণালা, কৃষ্ণমণি, কৃষ্ণপ্রসাদ,  
কুমারভোগ, কুমরীবাজাল, কুসুম-  
শালী, খাচামহি, খয়েরগর্দড়ি, খেচুড়,  
খৈরাজ, খৈরামুড়কী, খেজুরহাঁড়ি,  
খালিশোওয়ার, খলসীপঁটি.  
খামনিবোকা, খরাইঁপিপড়া,  
খড়্গনাক, খড়্গাজবা, খাসা,  
খাসাগন্ধি, খাসাদুধসাইল, খাসিয়া-  
পরাণ, খাটখেমিয়া, খেজুরছাঁড়ি,  
খেজুরকানী, খেসারী, খিরসা,  
খোরকামাটি, খোস্কাইনোনা, খুদী-  
বান, খুদীঘাস, খৈয়ামুরগী;

খুদমা, গোবরাশনি; গজমুস্তা,  
গজপতি, গন্ধমালতী, গন্ধকস্তুরী,  
গঙ্গাবালি, গঙ্গাজল, গঙ্গাজলঘাসা,  
গঙ্গাসাগর, গাজীভোগ ( ফরিদ-  
পুরের আমন চাল ), গোবিন্দ-  
ভোগ, গোকুলসর, গোপালভোগ,  
গৌরাঙ্গসাল, গৃহস্থপাগল, গর্দ-  
গর্দড়ি, ঘাড়ভাগা, ঘিকৈ, ঘৃতকাণ্ডন,  
চামারমণি, চম্পা, চম্পাকুলী,  
চন্দনচূর, চন্দ্রভোগ, চেতীকৈক;  
চন্দ্রহার, চন্দ্রমণি, চাঁপাকলি, চপলা,  
চাপলাস, চৌন্দখোপা, চিকনদাইল,  
চিনিসাগর, চিনিসরকার, চিনশঙ্কর,  
চিন্তামণি; ছাগলবকরী, ছাইতন  
ডোমরা, ছোট চম্পা; জগন্নাথভোগ,  
জামাইভোগ; জিরা, টিয়াকাটী,  
ঠাকুরভোগ, ঠাকুরপ্রসাদ, ঢাকি,  
ঢাকেশ্বরী, ঢালামানিক; ঢোলী,  
দুববাজ, তাকুরভাগা, তালমুশুর,  
তাংগাই, তারাবালি, তারামশুল,  
তারাক, তিলাই, তিলবাদল;  
তিলবাজালি, তিলকাঁকড়, তিল-  
কাকুর, তিলকস্তুরী, তিলকাণ্ডন,  
তিপুদামসাল, তুলাসাল, তুলসী-  
মুকুল, তুলসীভোগ, তোতারাম,  
তুলপঞ্জী, তুলসীজবা, থামেট-মি  
( বর্মী ), খুবড়ী, দাদখান;

দেওয়ানভোগ, দোদানা; দধ-  
বিলাস, দধরাজ, দধসর, দধ  
সাইল, দর্গাপ্রসাদ, দধকলমা,  
দধকুমার; দধলুচি, দধমণি,  
দধের সর, দধিসর; নয় নাকাজল;  
নাকা, ননীভোগ, নারান্ধী, নারি-  
পারিজাত, নারিকেল ঝুঁকি;  
নারিকেলঝোঁপা, নারিকেলজিরা,  
নারিকেলফুল, নীলকানাই, নীল-  
কুমার, নৃপতিভোগ, পদ্মদাম;  
পদ্মলাল, পাদশাভোগ, পাখিরাজ  
( মৈমনসিংহ, পাবনা, ঢাকা, বাথর,  
গঞ্জে প্রসিদ্ধ ); পলাসফুল, পানি  
পাট, পংখীরাজ, পানমৌরি,  
পরমানসাইল; পব'তজিরা, পারি-  
জাত, পরমানভোগ, পরমানমুস্তা,  
পাটেশ্বরী, পতিরাজ, পিয়ারমণি,  
পেশওয়ারী ( ২৪-পরগনায় উচ্চ-  
মানের বলে বিবেচিত ), পেট-  
পাকা, পিলরাজ, পিপড়াবালাম,  
পিত্তরাজ, পিপড়ালেজ, পদ্ম-  
ঘোসা, পলাশ, প্রসাদভোগ,  
পুরবীখাসা, পুরবী, ফুলঝরি,  
ফুলকুমারী, বাবুরাম, বাচ্চা,  
বদরগাঁড়ি, বাদশাভোগ, বাদসাপসন্দ,  
বাগাফুল ( কোচবিহারের আমন  
চাল ), বাঘরাজা, বাঘা ( ফরিদপুর ),

বাঘনখী, বহুরানী, বাকতুলসী  
( সুগন্ধী চাল ), বয়রাচাপরাস,  
বলরামভোগ, বল্লম, বালুপ্রমাণ,  
বামনভোগ, বাস্দেরপাত, বহুলবকরী,  
বনগাউজল, বানিয়াভাতার, বাশি-  
গোপাল, বাশফুল, বংশীকলস,  
বংশীরাজ, বাংশমতি, বাশপাতা,  
বরসোহাগমণি, বাশীরাজ, বাসু-  
দেবভোগ, বাতাসা; বাতাসফেনী,  
বাতাসাভোগ, বেনাফুল, বেঙ্গী-  
লালপাটনি, বেগীভোগ, বেতাক;  
বিভীষণ-শাল, বীরমালি, বোয়াল-  
ঝুঁপ, বহুমালী, বোকা ( গোয়াল-  
পাড়া ); বোরবালাম; বোরো;  
বউপাগলা, বসন্তমালতী, বড়ারিমি,  
ভোগলক্ষর, ভুতশালি, মতিচূর,  
মতিহারি, মধুসাইল, মধুভোগ,  
মোহনভোগ, মোহনমালা, মহিষ-  
বাহন, মুরগীভোমরা, রাখাক্ষ-  
ভোগ, রাখারানীভোগ, রাখাতিলক;  
রাধুনীপাগল, রাখাবেষ্ণব ( নদীয়া;  
বর্ধমান, মৃদিশির্দাবাদ ); রঘুনাত-  
ভোগ, রাইভোগ, রাইমণি,  
রাইমানিক, রাইমুখি, রাজভোগ,  
রাজমোহন, রামচন্দ্রভোগ, রামফুল,  
রামপ্রসাদ, রানীকাজল, রানীপাগল,  
রসকদম্ব, রসালভোগ, রসুলভোগ,

রাতাংলী, রতনচুরী, রতনগোপ,  
 রুদ্ধাঙ্গীভোগ, রূপনারায়ণ, রুদ্ধাঙ্গী-  
 কান্ত, রংমোহন, রূপরাজ, রূপেসা-  
 পৈয়ী, রূপেশ্বর, লক্ষ্মী বিলাস,  
 লক্ষ্মীনারায়ণপ্রয়া ( বালাশোর ),  
 লক্ষ্মীপারিজাত, লালবাতি, লাল-  
 মতি, লাউবৃদ্ধ, লাউদ্রুম, লেমা  
 (ফরিদপুর, বাথরগঞ্জ, মর্দাশদাবাদ),  
 লেপাধোলা, লছমিদাঘা, লছমন-  
 বোস, শ্যামসুন্দর, শ্রীকান্ত,  
 শঙ্করভোগ, শঙ্করচিনি, শঙ্কর-  
 বিলাস, শঙ্খবড়, শঙ্খরেখা,  
 শীতলচিনি, শাকজিরা, শালগোজা,  
 শালাকাঁটি, শালিকুটি, শালেভাদ'হ,  
 শ্যামসর, শামালতি, শানমুস্তা,  
 শ্যামচুর, শীলকুমার, শসাকুল,  
 শসারধান, শ্রীহট্টী, শম্ভুশালী,  
 শ্যামরাজ, সফেদবাঁশমতি, সফেদা,  
 সাগরচিনি, সাইলখাজুরী, সাজান-  
 খালি, সাকরখোয়া, সাকরচিনি,  
 সালভোটকা, সালকুমার, সালি-  
 বরণআমল, সমুদ্রফেনা, সমুদ্রবালি,  
 সম্ভ্যামণি, সান্তনিভোগ, সাউরাজ;  
 সফরি, সরিষাবাটী আউস, সাইল-  
 চিকণ, সাইলচিকলাল, সাকোর-  
 খারো, সরবাতি, সরকলা, স্বর্ণলতা,  
 সিগুরকটুয়া, সীতাভোগ, সীতা

পাটনাই, সোনামুখী, সোনামুস্তা,  
 সোনারগাহ, সুবর্ণজিরা, সুবর্ণমণি,  
 সুবটী, সুজনী, সুজিআউস,  
 সুকুমার, সুলতানভোগ, সরদুকন-  
 বালি, সীমাঘট, সিঁদুরকান্ত, সিঁদা,  
 সিঁদাঙা, সীতলক্ষ্মীয়া, সীতানবমী,  
 সীতামালতী, সীতাচিনি, সোহাগ-  
 মতি, সোনখরিকা, সোনাখিল,  
 সোনামুদ্র, সোনারগাই, সোনা  
 চম্পা, সোহাগমণিশালী, সুন্দর  
 মাইল, সৌদামিনী, সৌলকুমার,  
 সুয়াপংখী, সুবর্ণ খজা, সুখদর্শন,  
 সুখমায়া, সুখবিলাস, সুখদাস,  
 সুলতানবাস, সুলতানভোগ;  
 হলদীগুড়ি, হংসরাজ, হাসখাল,  
 হলুমানবাতা, হরিদাসী, হরিমুদী,  
 হরিনাবয়ণ, হরিশঙ্কর, হরিদ্রাং,  
 হরিণকাজানয়া, হরমুস্তা, হাতি-  
 কানি, হীরাকমলা, হলদিকোটো,  
 হরিণকাজলা, হুগলী, পুরাপাটনি,  
 ক্ষীরচাঁচি, ক্ষেপাখিজা, ক্ষিরাই-  
 জালী, ক্ষিরসাভোগ, ক্ষিরসাপাট;  
 কুকুমাকুতি ॥ Galon's Sansk.  
 Dict. ॥ মহাশালী ॥ সুশ্রুত ॥  
 ভেড়াপাওয়া, সাহেবসাইল (শিলার)  
 ॥ Agricultural Ledger,  
 1910, no. 1 and 2, সরকার



কতর্ক প্রকাশিত *Oryza Sativa*  
গ্রন্থে হইতে) ॥ জ্ঞা° চারু° বিশ্ব° ॥

ধান্যক—[ স° তুস্বদ্রুক ; সুক্ষ্মপত্র ;  
শাৰ্বষোগ্য, ধন্যা ; হি° ধনিয়া ;  
ম° ধনে ; কোথিম্বীর ; গুজ°-  
ধান্য, কোথম্বীর ; তে° কোথ-  
সিলন ; তা° কোতমল্লি ; ফা°  
তুস্বমে কসবীর ; অ° কজবুরা ]  
ধনে; *coriamdram sativam*.  
বর্ষজীবী বহু শাখাবিশিষ্ট  
শাকবি° । ভারতের প্রায় সকল  
প্রদেশে জন্মে ।

ধান্য-পঞ্চক—১ শালিধান্য, ২ ব্রীহি,  
ধান্য, ৩ শুকধান্য, ৪ শিম্বীধান্য,  
৫ ক্ষুদ্র ধান্য ।

ধান্যপাতি—১ বীহি, ২ যব ।

ধান্যসার—তদ্ভুল ।

ধান্য্য, ধান্য্যক—ধনিয়া ।

ধান্যোত্তম—শালিধান্য ।

ধাম্বন—ধম্বন-বৃক্ষফল ।

ধাবনি, ধাবনী—১ পৃশ্নিপর্ণী, ২  
কটকারী, ধাবণী, ধাতকী ।

ধাবনিকা—কটকারিকা ।

ধামন, ধামনা—[ স° ধম্বন ; হি°-  
ডেনগান ; ও° ঢামন ] ধামা,  
ধামনি, *cordia macleodii*.  
বহুবারসদৃশ বৃক্ষবি° । ছোট-

নাগপদ্র, মধ্যভারত ও  
উড়িষ্যায় জঙ্গলে জন্মান্ন । কাঠে  
আঁশ লম্বা লম্বা । এজন্য ইহাতে  
ধনুক তৈয়ারি হয় । বাংলা দেশে  
দেখা যায় না ।

ধামাগর্ষ—[ হি° লেথুরা ] ১ রক্ত  
অপামার্গ ; ২ ঘোষলতা, ৩ গীত-  
ঘোষা, ৪ রাজকোষাতকী, ধর্দুল,  
৫ মহাকোষাতকী ।

ধারণী—ধরণীকন্দ ।

ধারাকন্দ—কদম্ব দ্র° ।

ধারান্দ্রহী—তেকাটাসিজ ।

ধারিণী—শাল্মনি-বৃক্ষ ।

ধারিন্—পাল্ল-বৃক্ষ ।

ধার্তরাষ্ট্রপদী—হংসপদী লতা ।

ধীর—কৃষ্ণকুম্ভ ।

ধীরপত্রী—ধরণী-কন্দ ।

ধীরাবী—শিশুপা-বৃক্ষ ।

ধীহরা—এক জাতীয় মিষ্ট কাঠাল ।

ধর্দুল—[ স° রাজকোষাতকী, হস্তি-  
কোষাতকী, দীর্ঘ পটোলিকা ;  
হি° ঘি-আতরুই ; পদ্রুনা ; তে°  
লুল্লীবার্ড ; আ° ভীতকাকরেল,  
ভাটকেরেলা ; ম° পারিসদোড়কা ;  
নে° পলো ; পা° ঘীগন্দ্রোলী ;  
বো°-ঘোষনা ; গুজ°—তুরিয়া ।  
হি° করবিতরুই ] এক প্রকার লতা

ও ফল, *luffa aegyptiaca*.

ভারতের সব জায়গায় চাষ হয়।

ইহা হইতে একপ্রকার তেল হয়।

ধতুরা—[ স° ধতুর, কটফল ; হি°  
ধতুবা ; ও° ধন্তুরী ; ম° ধোত্রা,  
ধোতরা ; কদুকনিকে ; তে°  
নাল্লাউস্মীতে, উস্মেস্তচেট্র ; তা°  
ওমত তাই, কারু উমতে ; অ°  
জোজধন্তুরীস ; ইং *thorn  
apple* ] ধতুরো। বগ্ননাতিবর্গের  
বন্য শাকবি°। বর্ষজীবী উদ্ভিদ।

২—৬ ফুট উঁচু হয়। বীজ  
লম্বাবীজের মত ; কিছু বড়।

প্রকারভেদ—শ্বেতধতুরা, [ হি°

সফেদ ধতুরা ] শাদা ধতুরা,

*datura alba*. ফুলের উপরি

ভাগে ও ভিতরে বেগুনে রঙের

দাগ, শাদা ধতুরার ফুল খুব

শাদা হয় না। একটু ঘোলাটে

হয়। ফুলের ভেতরের দিকে

কাঁচা সোনার মত রেখা ও বাহিরের

দিকে বেগুনে রঙের চিহ্ন থাকে।

২ কৃষ্ণধতুরা, কনক-ধতুরা।

*datura fastuosa*. কালো

ধতুরার ফুলের গায়ে বেগুনে রঙ

ও পাতা। ডাল, ফল সব বেগুনে।

ফুটন্ত ফুল দেখলে মনে হয় ঘেন

একটা ফুলের মধ্যে আর একটা

ফুল বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

ফল গোল ও কাঁটিযুক্ত। বিহার

অঞ্চলে ধতুরার পাতা বাসক

ফুলের পাতার মত। বাঙলা ও

বাঙলার বাহিরে এই গাছ প্রচুর

পরিমাণে জন্মে। পর্যায়—ধতুর,

ধত°, ধতুরা, কিতব, কনকাহর,

উস্মন্ত, শঠ, মাতুলক, শিবাপ্রিয়, শিব-

শেখর, দেবিকা, তুর, মহামোহী,

শ্যাম, মদন, খজুয়, কটফল,

কাহলাপুপ, রাজধত°, রাজধন্ত-

রক, মহামাঠ, ভাস্ক, রাজস্বর্ণ ॥

রাজনি° শব্দ° সুশ্র° ॥ আরও তিন

প্রকারের ধতুরা আছে—নীলপুপ,

পীতপুপ ও লোহিত পুপ

ধতুরা।

ধূনা—[ স° রাল, শালনির্বাস

মজ°বস ; হি° রাল ; ম° রাষ্ট ;

ও° রাল, সজ°রস ; তে° সজ°র-

নম° ; ফা° রালগ্বেবরী ; অ°

কিক্হর ; ইং *yellow ristaa* ]

শালবৃক্ষের নির্বাস, *shorea*

*robusta*. শাল দ্র°।

ধূন্দুল—[ স° দীঘ° পটোলিকা ]

ধূধূল, *luffa pentandra*.

ধূলিয়াগর্জন—[ গুজ° গর্জন।

ব্রহ্ম—পাকানাইন ] গর্জন,

dipterocarpus gaertn. উচ্চ  
চিরশ্যামল পত্রবৃক্ষ বৃক্ষ। কাঠ  
নরম, গাছের আঠা শাদা, ভেতরের  
কাঠ লাল ও ধূসরবর্ণ।

ধূস্র—ধূতুরা দ্র°। কেহ কেহ তরই  
বলে।

ধূপবৃক্ষ—সরল গাছ।

বেচিয়া কোরী, শলা সুরেশ্বল।

ধূমগন্ধি, ধূমগন্ধিকা—রোহিষ-তৃণ,  
গন্ধযুক্ত।

ধূমপত্রা—ক্ষুদ্রবি°। পর্যায়—  
ধূম্রাঙ্গা, সুলভা, স্বয়ম্ভুবা,  
গুধ্রপত্রা, গুধ্রাণী, কুমিষী, শ্রীমনা-  
পহা।

ধূম্রমূলিকা—শুলীতৃণ।

ধূম্রহা—ধূম্রপত্রা, স্বয়ম্ভুবা।

ধূরকি—নেপালজাত বৃক্ষবি°। শাখায়  
মশাল জ্বালান হয়। পুজায় ও  
ঔষধে ইহার নিষাঁস ব্যবহৃত হয়।  
কাঠে বরগা হয়।

ধূত—ধূতুরা গাছ।

ধূতমানুষা—রাশনা।

ধূলসমুদ্র (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

ধূলিকদম্ব—১ নীপকদম্ব-বৃক্ষ, ২  
বরুণ-বৃক্ষ, ৩ তিনিস-বৃক্ষ।

ধূলিকদম্বক—নীপকদম্ব-বৃক্ষ।

ধূলিপদ্রিপকা—কেতকীপদ্রপ। অনেক

পরাগ আছে বলিয়া।

ধূলিবাণ—dendracalamus bal-  
cosa.

ধূসরছদা—শ্বেতবৃক্ষ।

ধূসরপত্রিকা—হাতিশুঁড়া গাছ।

ধূসরা—পাণ্ডুরফলা ক্ষুদ্রপ।

ধেনুদুগ্ধ—চিতিট ( দুধের মত শাদা  
ফল )।

ধেনুদুগ্ধকর—গাজর ( গরুকে  
খাওয়াইলে দুধ বাড়ে )।

ধোর—ধববৃক্ষ।

ধ্যাক্ষজম্বু—কাকজম্বু।

ধ্যাক্ষতুণ্ডী, ধ্যাক্ষদণ্ডী, ধ্যাক্ষনখী—  
কাকনাসালতা।

ধ্যাম—১ দমনকবৃক্ষ, ২ গন্ধতৃণ।

ধ্যামক—রোহিষতৃণ।

ধ্যা—১ মর্বা, ২ আঢ়ী, ৩ শালপর্ণী।

ধ্যংসিন—পর্বতসমুদ্র পীলুবৃক্ষ।

ধ্যজদ্রুম—১ তালবৃক্ষ, ২ মাড়বৃক্ষ।

ধ্যনিবোধক—রোহিষতৃণ।

ধ্যাক্ষজম্বু—কাকজম্বু।

ধ্যাক্ষতুণ্ডী, —দণ্ডী, —নখী—  
কাকনাসা লতা

ধ্যাক্ষনায়ী—কাকোদ্রুমবরিকা।

ধ্যাক্ষবল্লী—কাকনাসালতা।

ধ্যাক্ষমাচী—কাকমাচী।

[ ন ]

নকল্-উস্-শয়তান—[ আব্বী ] জাঞ্জি-  
বার দেশজাত খর্বাকার খজুর  
বৃক্ষ ।

নকাট—এক প্রকার অগ্রমধুর ফল ।

নকুচ—১ মান্দার, ২ ডহুবৃক্ষ ।

নকুলাচা—গন্ধনাকুলি নামক  
কন্দারি ।

নকুলেটা—রাসনা ।

নক্জাত—ওষধিভেদ ( অধর্ববে° ২.  
২৩. ৪১ ) ।

নক্জাল—করমচা, ( রায়ে মৃদুদ্রুত  
হয় বলিয়া ), ডহরকরঞ্জা, *ponga-*  
*mia glabra vent.* করঞ্জ দ্র° ।

নস্তা—১ ঈশনাফালা, ২ হরিদ্রা ।

নস্তামল—*pongania globra,*  
*dalbergia arborea.*

নক্ষত্রকান্তিবিজ্ঞার—খবল যাবনাল ।

নখগৃচ্ছফলা—নিপাবীভেদ ।

নখনিপাব—নিপাবীভেদ, চলিত  
কথায় বামনখী শিম । পর্ষায়—  
অঞ্জলিফলা, বৃন্তনিপাবিকা, গ্রাম্যা,  
নখগৃচ্ছফলা, গ্রামজনিপাবী,  
নথফলিনী ।

নখপণী—বৃন্তিকা ক্ষুদ্রপ ।

নখপৃক্ষী—পৃক্ষা, পিড়িংশাক ।

নখপৃঞ্জফলা—সাদা শিম ।

নখপৃপী—পৃক্ষা ।

নখপৃর্বিকা—সবুজ শিম ।

নথফলিনী—নখনিপাব ।

নথরজনী—দ্বিবৃন্তবৃক্ষ, মেদিপাতা ।

নথরাহ—করবী-বৃক্ষ ।

নথবৃক্ষ—নীলগাছ ।

নথাল—নীলবৃক্ষ ।

নগ—*rottilera tinctoria.*

নগজা—ক্ষুদ্র পাষাণভেদা লতা ।

নগণা—ঈতাৰি° । লওয়াকটকী ।

পর্ষায়—পারাবতপদী, পিণ্যা,  
ক্ষুটবৃন্দনী, জ্যোতিষ্মতী, পুতি-  
তেলা, ইগুদী ।

নগভ—ক্ষুদ্রপাষাণভেদা লতা ।

নগরোথ—নাগরমুখা ।

নগরৌষধি—কদলী ।

নগাশয়—হস্তকন্দ ।

নট—১ শ্যোণাকবৃক্ষ, ২ অশোকবৃক্ষ ।

নটপণ—গুড়ত্বক ।

নটেশাক—[ স° তড়লীয়, তড়লীয়,  
লটক ; ও° নেউটিয়া ; হি°  
চোলাই ] নটিয়া, নটো, *amara-*  
*ntus tistris.* মারিষাদিবর্গের  
বর্ষায় শাকারি° ॥ মাটিতে গড়াইয়া

বা খাড়া হইয়া জন্মে । পাতা ছোট,  
লম্বাকৃতি, গুচ্ছবদ্ধ ফুল হয় ।  
প্রকারভেদ :—(১) চাঁপানটে—  
[ স° চণ্ডালক ] *amarantus*  
*polygamus* ॥ বেল° ॥ পুং-  
কেশর ৩টি । (২) বননটে—*a.*  
*fasciatus*, *a.* *viridis*.  
(৩) কাঁটানটে—[ স° তড়ুলীয়,  
মারিষ ] *a.* *spinous* ॥ খোরি° ॥  
আরণ্যকাটা শাক । পুংকেশর ৩ টি  
(৪) লালনটে—ডেঙ্গোশাক, *a.*  
*gangeticus*. ডাঙ্গা জমিতে  
আবাদ হয় । পুংকেশর ৩টি ।  
(৫) গোবরনটে—*a.* *lividus*.  
(৬) শাদানটে—*a.* *oleraceus*  
॥ বেল° ॥ বিস্বাদ । (৭) বাঁশনটে  
—*a.* *lanceolatus* ॥ বেল° ॥  
(৮) লালবাঁশ নটে—*a.* *atropur-*  
*puscus*. (৯) গুড়নটে । (১০)  
কনকানটে । (১১) টুনটুনি নটে—*a.*  
*fasciatus* ॥ roxb ॥ (১২) চিরদ-  
নটে—*a.* *polygamus* lin.  
(১৩) ঘোঁটনটে, ঝিষ্টনটে—*a.*  
*tenuifolius* willd. (১৪) মেঘনাদ  
নটে—*a.* *campestris* ॥ বেল° ॥

নড়—নলতৃণ ।

নড়দল—নলতৃণ, *panicum inter-*

*ruptum*.

নড়ী—*clcea disticha*.

নতদ্রুম—লতাশাল ।

নতীশাক (দেশজ)—পলতা, *tricho-*  
*santus dioeca*.

নদীকদম্ব—মহাপ্রাণিকা, থলকুড়ী ।

নদীকান্ত—১ হিজলগাছ, ২ সিংধাবারক  
বৃক্ষ, নিশিন্দে, ৩ জম্বকবৃক্ষ, ৪  
কাকজংঘালতা, ৫ লতাবি° ।

নদীকুলপ্রিয়—জলবেতস ।

নদীজ—১ অজর্দনবৃক্ষ, ২ যাবনালশর  
[ হি° জহরুলাশর ], ৩ হিজলবৃক্ষ,  
৪ নদীনিপাব, ৫ বিটমাক্ষিক ।

নদীজধানা—[ স° নদীনিপাব ] ধান্য-  
ভেদ ।

নদীজা—অগ্নিমস্ত্য । বড়গুড়রী গাছ ।

নদীন—বরুণবৃক্ষ ।

নদীনিপাব—ধান্যভেদ । পর্যায়—  
কটুনিপাব, কবর, নদীজ  
॥ রাজনি° ॥

নদীমাক্ষ—মানকহু ।

নদীবট—বটবৃক্ষ ।

নদীসর্জ—অজর্দনবৃক্ষ ।

নদেয়া—ভূমিজম্বু ।

নদ্যায়—[ হি° কোকুয়া ] সমাণ্টলাবৃক্ষ ।

নন্দকি—পিপলী ।

নন্দগোপিত—রাশ্না ।

নন্দিক—নন্দিবৃক্ষ।

নন্দিকাবর্ত—ক্ষুপবি°। nerium coronasium.

নন্দিতরু—ধববৃক্ষ।

নন্দিন—১ গর্দভা° বৃক্ষ; ২ ধববৃক্ষ।

নন্দীবৃক্ষ, নন্দীবৃক্ষ—কক্কণ দেশজাত সুগন্ধি প্রসিদ্ধ বৃক্ষবি°, cedrela toona. কাহারও মতে ক্ষীরমুক্ত অম্বথতুল্য বৃক্ষ, তুঁদবৃক্ষ। পর্যায়—তুনীক, তুনী, পীতক, কচ্ছপ; নন্দী, কুঠেরক, কাস্ত, তুঙ্গ, কুবেরক, কুনি, কচ্ছ, কাণ্ডলক, তুন্দ, নন্দিক। কেহ কেহ বলেন তুঁদ ও তুঙ্গ নামে দুই জাতি বৃক্ষ আছে ॥ বিবৃকো° ॥

নন্দ্যাবর্ত—তগরবৃক্ষ।

নফটকী—[ইং heart pea] ইংগুদী বৃক্ষ।

নব—রক্তপদুনর্বা।

নবপত্রিকা—১ কদলী, ২ দাড়িম, ৩ ধান্য, ৪ হরিদ্রা, ৫ মানকচন্দ্র, ৬ ৭ বিল্ব, ৮ অশোক, ৯ জয়ন্তী।

নবমল্লিকা, নবমালিকা—[স° নবমল্লিকা, সপুলা] নেমালীফুল, সাত পাপড়িযুক্ত মালতী ফুল, কেহ কেহ বাসন্তীফুল বলেন, jasminum arborescens. মল্লিকাদিবর্গের

ছোট পদুপতরুবি°। পাতা গোলাকার, চক্চকে, ৪-৫ আঙ্গুল লম্বা ও ৩-৪ আঙ্গুল চওড়া। ফুল বড় বড় শাদা ও সুগন্ধী। ছোটনাগপুর, বিহার অঞ্চল ও বোম্বাই প্রদেশে জন্মায়। বাঙলায় কচিং দেখা যায়। ফাল্গুন-চৈত্রে ফুল ফোটে। ফুলে ৭টি পাপড়ী। পর্যায়—অতিমোদা, গ্রেমী, গ্রীম্মোভবা, সপুলা স্কুমারী, সুরভি; শ্ৰীচিমল্লিকা, সুগন্ধা, নবালী, শিখরিণী, ভদ্রবর্মী, দেবলতা, গম্বনিলয়া, মালিকা, নবমল্লিকা।

নবরস—অ্যালোনিকাদিবর্গের বর্ষায়ু শাকবি°। biophytum sensitivum. পাতা গুচ্ছাকার। প্রায় দল জোড়া, হাত দিলেই সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। ফুল হলদে রঙের ভাদ্র মাসে ফোটে। ফল পঞ্চকোষ, বহু বীজ পৃথিপাশ্বে° প্রায় জন্মিয়া থাকে। কেশর ১০টি। ৫টি ছোট ও ৫টি বড়।

নবাত্ত—১ শঠ, ২ পিপুল, ৩ মরিচ, ৪ হরিতকী, ৫ বয়ড়া, ৬ আমলা, ৭ চিতেমূল, ৮ বিড়ঙ্গ, ৯ (?)। নবাড়ী—নড়ী, cicea disticha.



নমি—বড় গোল আলু মত এক  
প্রকার মূল।

নমেরু—সুরপুনাগ, ছবিয়ানা ফুল,  
কেউ কেউ রুদ্রাক্ষবৃক্ষ বলে।

হিমালয় প্রদেশের গাছ।

নর—ধানাকপূর তৃণ।

নরঙ্গ—নারাঙ্গা নেবু।

নরাচী—ফণীমনসা ॥ অথবা ৩ ও ৩১.৪ ॥

নরাধিপ—শ্যোগাকবৃক্ষ।

নরেশ্বর—শ্যোগাকবৃক্ষ, সোনালু গাছ।

নতক—গোটগল, নলতৃণ।

নল, নলখাগড়া—[ স° নল, নল ;

হি° নরমল ; ম° নঠঠ ; গুজ°

নালী ; ক° দেবনাল ; তে°

ভুজুগুরু ] নল, *amphidonax*

*karka*, *arundo karka*

॥ বেলা ॥ *phragmites karka*.

ধান্যাদিবর্গের দীর্ঘায়ু তৃণবি°।

দীর্ঘ হয়। ইহা ছেঁচে, পিটে

বুনে দরমা তৈরি হয়। মোটা

নলকে দেবনাল বলে। নল

খাগড়া ( দেশজ ) সরের কলমী।

ইহাতে কলম তৈরি হয়। ২ পদ্ম,

০ তৃণবি°। পর্ষায়—ধমন,

পোটগল, নাল, নড়, কুক্ষিরন্ধ,

কীচক, দীর্ঘবংশ, শূন্যমধ্য,

বিভীষণ, ছিদ্রাস্ত, মৃদুপত্র, বংশপত্র,

মৃদুচ্ছদ, লালবংশ। ঔষধার্থে°

ব্যবহৃত হয় ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

নলদ—১ জটামাংসী, ২ লামজ্জক

তৃণ।

নলদবু—নিম্ববৃক্ষ।

নলিকা—পটারী। পটারী দ°।

নলিত—নালতে শাক, তিস্তশাক।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্গনাদিতে ব্যবহৃত

হয়।

নলিন—পদ্ম।

নলিনী—পদ্মলতা।

নলফটকী—লতাফটকী দ°।

নাউ ( দেশজ )—লাউ দ°।

নার্কাছকনী—[ স° ছিকনী ; হি° নক

নিহনী, মেচোরা-ছেঁচেতা।

নোমরাজ্যাদিবর্গের বর্ষায়ু

আরণ্যশাকবি°, *centipeda orbi-*

*cularis*, ক্ষুদ্র ও রোমায়ুত।

শীতকালে জন্মে। পাতার ধারে

ধারে দাঁত আছে। ফুল হলদে

হয়।

নাকুলী—[ স° কুকুটীকন্দ, রাশনা, রক্ত

পত্রিকা, অহিভুক ] রাশনা দ°।

বৃক্ষের পাতার বর্ণ লাল, আর

বহুবীধ বিষদোষ নাশ করে বলিয়া

অহিভুক ॥ রাজনি° ॥ প্রকার

ভেদ—১ কুকুটীকন্দ, ২ রাশনা, ৩

চই, ৪ ষবতিস্তলতা, ৫  
বেতকাটিকারী, ৬ কন্দবিশেষ  
চলিত কথায়—নাই। পর্যায়—  
সপগন্ধা, স্রুগন্ধা, রক্তপত্রিকা,  
ঈশ্বরী, নাগগন্ধা, অহিভুক, সরমা  
সপাদনী, ব্যালগন্ধা ॥ শব্দ ॥

নাগ—১ নাগকেশ; ২ পদ্মনাগ।

নাগকন্দ—হস্তিকন্দ।

নাগকর্ণ—১ লাল ভেরাণ্ডা। ২ হস্তি-  
কর্ণ পলাশবৃক্ষ।

নাগকিঞ্জক—নাগকেশর পদ্প।

নাগকুমারিকা—১ গুলুণ্ড, ২ মঞ্জিষ্ঠা।

নাগকেশর—[ স° ইভাখ্য, নাগেশ্বর ;  
হি° নাগকেশর, না-ঘাস ; তে° নাগ-  
কেশরাল ; বো° নাগচপ, মোরলা-  
চপা ; অ° নারমৎক ; ও° নাগচাপা ;  
নাগেশ্বর, নাগকেশর ; প° না-ঘাস,  
আসাম-নাহোর ; তে° গজপদ্পম্ ;  
ব্রহ্মকেশর ; সিংহল—না-দেয়নো ;  
না-গাহা ; তা° নাংগাল, নাঙ্গাল-  
মালা ; শিরনাগপদ, নাগশাপদ ]  
নাগেশ্বর ফুলের গাছ,  
mesua ferrea, m. Roxb.,  
m. coromandalina. চির-  
হরিৎবৃক্ষ। গাছ বৃহৎ হয়।  
রাঢ় দেশে ও কোচবিহারে প্রচুর  
জন্মে। ফাল্গুন-চৈত্র পদ্পত

হয়। ফুলের কেশর অনেক ও  
সুন্দরভাবে বিন্যস্ত। ফুলের দল  
শাদা, দেখিতে অনেকটা বড় টগর  
ফুলের মত। ফল বড় হয়। ফল  
থেকে একরকম নির্ঘাস বাহির হয়।  
ফুল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কাঠ  
অতি কঠিন ও রক্তাভ। ভারতে  
ইহাই 'লোহাকাঠ' বলে বর্ণিত।

( iron wood )। প্রকারভেদ—  
১ সাধারণ নাগকেশর—নাক্সী  
গাছ; mesua ferrea. ২ নেপালী  
ও সিংহলী—m. spiciosa.  
৩ পাতা ও ফুল ছোট, দাক্ষিণাত্যে  
হয়; m. coromondellana.  
৪ প্রকৃত লোহাকাঠ—m. Roxbu,  
rghii, m. salicina, m. wal-  
keriana, m. pulchella,  
m. sclerophylla, m. nagana.

নাগগন্ধা—নাকুলীকন্দ।

নাগচহ্না—নাগদন্তী।

নাগজম্বু—ভৃংগীজাম।

নাগদন্তিকা—বিহুটি, tragla invol-  
ucrata.

নাগদন্তী—গ্রীহস্তিনী; হাতিশৃঙ্গ।  
পর্যায়—বিশল্যা; পঠপদ্পী,  
বিষোধাধি, শরুপদ্পা, ইভদস্তাহা,  
কাডেরী, কামদাতিকা, বেতপদ্পা,

মধুপদুপা, বিশোধনী, নাগক্ষেতা,  
বিশালক্ষী, নাগচত্ৰা, বিচক্ষণা,  
সর্গপদুপী, শূক্ৰপদুপী, স্বাদুকা,  
শতদন্তিকা, সিতপদুপী, সর্পদন্তী,  
নাগিনী ।

নাগদমনী—[ পশ্চিমে—নাগদোনী;  
ইং worm wood ] বলা, নাগদনা,  
ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং । দনা দ্র° । *arte-*  
*mesia vulgaris*. পর্যায়—জম্বু,  
জাম্ববতী, বলা, নাগাহবা, দমনী,  
নাগগন্ধা, বৃন্দা, রক্তপদুপা,  
জাম্ববী, মোটা, বিষপহা, নাগ-  
পদুপী, নাগপত্রা, মহাষোগেশ্বরী,  
মলয়ী, দঃসহা, দুর্ধর্ষা ॥ শব্দ° ॥

নাগদলা—পোশুর, পদুর । বাঙলায়,  
সিংহলে ও মালাবারে দেশীয় গাছ ।  
সুন্দরবনে বিস্তর জন্মান ।

নাগদলোপম—পরুষফল, ফলসা ।  
পর্যায়—অপাশ্বি, পরুষক, মৃদু-  
ফল, পরাপর, পরুষ, নীলচর্ম,  
পারাবত, নীলমণ্ডল ।

নাগদনা—[ স° মরুৎ ] সাধারণ ক্ষুদ্র  
ক্ষুপবিং, রক্তপদুপা, *artemesia*  
*vulgaris*, *centipedo orbicu-*  
*laris*. দনা দ্র° ।

নাগদোনা—এক প্রকার কাটাযুক্ত গাছ ।  
*artemesia vulgaris*, *crinum*

*artaticum* ॥ বেল° ॥ বাইবেলে  
নাগদোনা দুর্দশার চিহ্ন বলিয়া  
উল্লিখিত আছে ।

নাগদ্রুম—সিজগাছ ।

নাগপত্রা—নাগদমনী ।

নাগপত্রী—লক্ষণাকন্দ ।

নাগপত্ৰ—নাগবেল, *bauhinia ang-*  
*uina*.

নাগপদুপ—১ পদ্মাগবৃক্ষ, ২ নাগকেশর,  
৩ চম্পক । ॥ ভারত° ১২০৮ ৪০ ॥

নাগপদুপফলা—কুম্ভাডী ।

নাগপদুপিকা—১ স্বর্ণফুলী, হলদে  
ধই; ২ নাগদান ।

নাগপদুপী—নাগদমনী ।

নাগফণা—[ ও° নাগফণা, ইং hedge  
prickly pear ] ফণীমনসা, ফণা-  
মনসা, নাগফেনা, *opuntia*  
*dillenii*, *cactus indicus*  
॥ বেল° ॥ ক্ষুদ্র কণ্টকী বৃক্ষবিং ।  
পাতা নাই । ডাটা সবুজ রঙের  
গ্রন্থযুক্ত । ফুল বড় বড় হলদে  
রঙের । শুকনা ডাঙ্গায় বেড়ায়  
জন্মান । নাগফণাদিবর্গের সমস্ত  
বৃক্ষ নিম্পত্র ও কণ্টকবহুল হইয়া  
থাকে ।

নাগফল—১ পটোল, ২ ধুঁধুল ।

নাগফুলী—*heliotropium coro-*

mandelianum.

নাগফেণা—নাগফণা দ্র° ।

নাগবন্ধ—অশ্বথবৃক্ষ ।

নাগবলা—বলা, sida alba. পর্যায়—  
অতিবলা, মহাবলা, গাঞ্জেবুলী,  
ঝসা, হুম্বগবেধকা, গোরক্ষত-ডুলা,  
ভদ্রোদনী, খরগন্ধা, চতুঃপলা,  
মহোদয়া, মহাপদ্মা, মহাশাখা,  
মহাফলা, বিশ্বদেবা, অরিস্টা,  
দেবদণ্ডা, মহাদণ্ডা, ঘণ্টা, গবেধকা,  
॥ রাজনি° অম° ॥

নাগবল্লরী, নাগবল্লিকা, নাগবল্লী—  
তাম্বুল ।

নাগবল্লী—তাম্বুলী বা প্রীবাচী নামে  
এক জাতি বৃক্ষ ।

নাগবৃক্ষ—নাগকেশরবৃক্ষ ।

নাগবেল—নাগপত, baubinia  
anguina.

নাগমতী—কালোতুলসী, ocimum  
sanctum.

নাগর—১ নারাক্ষনেব্দ ২ শর্দিষ্ঠ, ৩  
নাগরমুখা, ৪ নাগকেশর ।

নাগরজ—কমলালেব্দ, নারাক্ষলেব্দ,  
citrus aurantium. কমলা  
লেব্দ দ্র° ।

নাগরমুতা, নাগরমুখা, নাগরমুখী—  
[স° নাগরমুস্তা, ভদ্রমুস্তা]

cyperus pertenuis. মূতা দ্র° ।

নাগরমুস্তা—নাগরমুখা, cyperus  
pertenuis. পর্যায়—নাগরোখা,  
নাগরাদিঘনসংজ্ঞকা, চক্ৰাংকা,  
নাদেশী, চুড়াল, পিণ্ডমুস্তা,  
শিশিরা, বৃক্ষধাংকী, কচ্ছরুহা,  
চারুকেশরা, উপটা, কপালিনী,  
পূর্ণকোষ্ঠসংজ্ঞা ।

নাগরাহব—শর্দিষ্ঠী ।

নাগরী—শুদ্রীবৃক্ষ ।

নাগরোখা—নাগরমুখা ।

নাগলতা—তাম্বুলী ।

নাগলডী—১ উগরী ফল, ২ হাতি-  
শর্দিষ্ঠা ।

নাগলুগন্ধা—রাসনাভেদ ।

নাগলফোতা—১ হাতিশর্দিষ্ঠা, ২ দণ্ডী  
বৃক্ষ ।

নাগাখা—নাগকেশর ।

নাগাঙলা; নাগাঞ্জনা—নাগবাণ্ঠি,  
রইকাঠ ।

নাগালাব্দ—গোল লাউ ।

নাগাহব—নাগকেশর ।

নাগাহবা—লক্ষণাকন্দ ।

নাগেশ্বর—নাগকেশর, mesua ferrea.

নাগকেশর দ্র° । পর্যায়—কিঞ্জলক,  
চাম্পয়, নাগকিঞ্জক, নাগীর, হেম-  
কিঞ্জক ॥ রাজনি° ॥

নাচনি—মরুয়া, *eleiuse coracana*  
 নাজক, নাজক—[ প° নাজক ; ইং  
*sensitive plant* ] লতাবি°,  
*mimosa pudica*. পানী  
 নাজক—*desmanthees natans*.  
 নাজনা—[ স° শোভাজন ] বারমেসে  
 সজিনা গাছ । সজিনা দ্র° ।  
 নাটাকরঞ্জ—নাট গাছ ; কাঁটাবহুল  
 বড় লতাবি° । পর্যায়—  
 ক্ষতপর্ণ, প্রকৃষ, পাতিকরঞ্জ,  
 পাতিকা, পাতিক, সকাটক, ককুভ,  
 অগ্নিশিখ, শরঠ, কালিকাল,  
 সোমবৎক । করঞ্জ দ্র° ।  
 নাটায়—তরমুজ । পর্যায়—চেনাল,  
 চিত্রফল, সুখাশা, রাজভেমিষ,  
 লতাপনস, সেদু ।  
 নাটম ( দেশজ )—বৃক্ষবি° ।  
 নাড়াশিজ ( দেশজ )—*euphorbia*  
*antiquorum*.  
 নাড়িপত্র—নাড়ীচ শাকভেদ ।  
 নাড়ী—গণ্ডদূৰ্বা ।  
 নাড়ীক—নালতে শাক । পর্যায়—  
 পটুগাক, নাড়ীশাক ।  
 নাড়ীকলাপক—[ হি° গণ্ডিনী গাছ ]  
 সপাংক্ষী লতা ।  
 নাড়ীচ—নালতে শাক । পর্যায়—  
 কেচুক, পেচুলী, পেচু, বিশ্বরোচন ।

নাড়ীতিক্ত—নেপাল নিম্ব ( নেপাল  
 দেশীয় নিমগাছ ) ।  
 নাড়ীশাক—পাটশাক ।  
 নাদেয়—১ কাশতণ, ২ বাণীরবৃক্ষ ।  
 নাদেয়ী—১ অম্ববেতস, ২ ভূমিজশাদক,  
 ৩ নাগরঙ্গ, ৪ জবা, ৫ অগ্নিমন্ত্ৰ,  
 ৬ বিজয়ন্তিকা । পর্যায়—জয়,  
 শ্রীপদগী, গণিকারিকা, জয়া, জয়ন্তী,  
 তর্কারী, বৈজয়ন্তিকা ।  
 নানা—বৃক্ষবি° । সোজা ও লম্বা  
 হয় । দামী তক্তা হয় ।  
 নানাকন্দ—চুবড়ী আলু ।  
 নান্দীমুখী—কুধান্যবি° ।  
 নাভক—বনতিক্ত বৃক্ষ ।  
 নাভিকা—কটভীবৃক্ষ ।  
 নার্মতি—*grangea maderspatana*.  
 নারঙ্গ, নারঙ্গা, নারঙ্গী—[ স°  
 নাগরঙ্গ, নারঙ্গ ; ইং *sweet*  
*orange* ] নারঙ্গী লেবু,  
 কমলালেবু, *citrus aurantium*.  
 নারঙ্গ—১ গাজর, ২ বিট ৩  
 ফলবৃক্ষবি° । বননারঙ্গা—  
 [ স° ঝিল্লিছেপ ; হি° লজ্জালু,  
 লক্সনা ; ম° এবং গুজু বরেন্না ]  
*gelonium multiflorum*,  
*g. fasciculatum*, *biophyium*  
*sensitivum*. এরুডাদিবগের

চিরশ্যামল বৃক্ষবিং । ফুল  
ছোট ছোট । হলদে রংয়ের ।  
বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে ফোটে ।  
ফল অনেকটা নারায়ণা লেবুর মত ।  
পুং ও স্ত্রী পুষ্প ভিন্ন গাছে হয় ।

নারায়ণপ্রিয়—পীতচন্দন ।

নারায়ণী—শতাবরী ।

নারিকের—নারিকেল ।

নারিকেল—[ স° নারিকেল, রসফল ;

হি° নারিকেল, থোপরা ; ম° শ্রীফল,

নাবষ্ঠ ; গুজ° নালীয়েস ; ক°

তোণনকায়ী ; ও° নাড়িয়া,

তে° টেকায়া ; নারিকদম ; তা°

টেমা ; তেংগায়ি ; ফা° জোজ হিন্দী

নারীগল্ ; অ° নারিজল ;

পশ্চিম—নারেল, নারিয়েল ;

ইং coconut tree ] নারিকেল,

cocos nucifera, palma

indica, major. সমুদ্রতীরবর্তী

প্রদেশে নারিকেলবৃক্ষ যথেষ্ট

পরিমাণে জন্মে । রাড়ের কোন

কোনও স্থানে একেবারে জন্মায়

না । ৭৮ বছর পরে ফল হয় । ভাদ্র

মাসের বৃষ্টির জল পাইলে ঝুন্ডনো

হয় । নারিকেল খোলে 'হুকা' ;

ছোবড়ায় 'দাড়ি' এবং কাটিতে

'কাটা' তৈরী হয় । ফল, ফুল

ও তৈল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

ঝুন্ডনো হইবার পূর্বাবস্থাকে 'ডাব'

বলে । - - - - - পৰ্বার—লাংগলী ;

নারিকের, নাড়িকেল, নারীকেল ;

নারীকেলী ; নারীকেরী, নারিকেল ;

সদাপুষ্প, শিরঃফল, নারিকেল,

রসফল, স্তূতুগ, কুচশেখর ; দৃঢ়নীল,

নীলতরু, মংগল্য ; উচ্চতরু,

তুংগরাজ, শকদতরু, দাক্ষিণাত্য-

দুরারহ, শ্যামকফল, দৃঢ়ফল ;

কুচশীর্ষক, তুংগ, শস্যফল,

সদাফল, করকান্ডস, পয়োধন,

মৎকুণ, কৌশিকফল, ফলমুণ্ড,

চটাফল, মৃণ্ডফল, বৈষ্ণামিষপ্রিয়,

নারিকেল, স্তূতুগ, ফলকেপর ।

প্রকারভেদ—মৃদুধানালিকেরক—[স°

মাক্ষিকফল, মধুফল, মাধ্বীকফল ]

কোকণদেশে জন্মে ।

নারীচ—নালিতা শাক ॥ রাজব° ॥

নারীষ্ট—মল্লিকা ।

নার্ঘ—নারদ ।

নাল—শালুক দ্র° ।

নালকাষিণা ( দেশজ )—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং,

smithia senisitiva.

নালকী ( দেশজ )—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং,

hibiscus cannabinun.

নালবংশ—তুংগভেদ ।



নালিক—১ পশ্ম, ২ নালিতা শাক।

নালিকা—পাটশাক।

নালিতা—[ স° নলিত, নারীচ, শঙ্ক-  
পত্র ] নলিতা শাক, *corchorus*  
*capsularis*. আতপাদিশোধিত  
পট্টশাক। পাট দ্র°।

নালী—পশ্ম।

নালীকিনী—পশ্মসমূহ।

নালীপ—কদম্বক।

নাসপাতি—[ স° অমৃতফল; ফা°  
নাষপাতী; ইং pear ] *pyrus*  
*communis*. হিমালয় ও নীল-  
গিরিতে জন্মে। কাবুল দেশীয়  
ফল, শরৎকালে পাকে।

নাসাল—কটফল বৃক্ষ।

নাসাভগা—*peristrophe* *bicaly-*  
*cula*.

নাসাসংবেদন—করলা।

নাস্তিতদ—আম্রবৃক্ষ।

নাস্তিদ—আম্রবৃক্ষ।

নাহাসত (দেশজ)—বৃক্ষবি°, *erithy-*  
*rina alba*.

নিঃশল্যা—দণ্ডীবৃক্ষ। ইহা সেবন  
করিলে শীঘ্র শল্যা নিগত হয়।

নিঃশ্রেণি—খজুরীবৃক্ষ।

নিঃশ্রেণিকা—তৃণবি°। পর্যায়—  
শ্রেণীবলা, নিরসা, বনবল্লরী।

নিঃসার—শেওড়া।

নিঃসারা—কদলীবৃক্ষ।

নিঃস্নেহফলা—শ্বেতকটকারী।

নিঃস্নেহা—অতসী।

নিকুঞ্জকায়—কণ্টকাবৃক্ষ। পর্যায়—  
কুঞ্জিকা, কুণ্ডবল্লরী।

নিকুণ্ড—দণ্ডীবৃক্ষ।

নিকুণ্ডাখ্যবীজ—জয়পাল।

নিকুণ্ডী—দণ্ডীবৃক্ষ, *croton po-*  
*lyandrum*.

নিকেতন—পলাণ্ডু।

নিকোচক—অক্টোটবৃক্ষ, *alangium*  
*hexapetalum*.

নির্ঘণ্টিকা—গুলঞ্চকন্দ।

নিচু—[ চীনা নাম—টনলি, লিচি ]  
*nephelium litchi*. আদি জন্ম-  
স্থান চীন। ১৮শ শতাব্দীর শেষ  
ভাগে ভারতবর্ষে আনীত হয়।  
প্রথমে কলকাতার আসে। গাছ  
৫৬ হাত হয়ে ১৫১৬ হাত লম্বা,  
ফল গোল। কাঁটালের মত কাঁটা  
গায়ে আছে। লিচু দ্র°।

নিচুল, নিচুলা—১ [ইং *hljal*], হিজল।  
*barringtonia acutangula*.

২ বেতসবৃক্ষ।

নিদাঘকর—অকবৃক্ষ।

নিদিগ্ধা—এলাচী।

নির্দিষ্টকা—১ এলা; ২ কণ্টকারিকা,  
solanum jacquini. পর্ষায়—  
অনাক্রান্তা; পৃথ্বী, ব্যাগ্রী, সিংহী,  
ধামনিকা, ক্ষুদ্রা; বৃহতী, কণ্ট-  
কারিকা ॥ বৈদ্যকা° ।

নিদ্রালু—১ বার্তাকী; ২ বনবর্ষিক।

নিপ—কদম্ববৃক্ষ। নীপ দ্র° ।

নিফলা—জ্যোতিষ্মতী লতা ।

নিবন্ধ—নিষ্ববৃক্ষ ।

নিম—[ স° নিষ্ব, অরিষ্ট ; হি° নীম ;  
ম° কড়নিষ্ব ; গুজ° নিষ্বডো ;  
ক° বেডবেব্দ ; তে° বেব্দমমরম ;  
তা° বেষ্ট ; ফা° নেনব্‌নীম দরখত  
হক ; ও° নিষ্ব, লিষ্ব ; ইং nim  
or mangosa tree ] azadira-  
chta indica, melia a. প্রসিদ্ধ  
বৃহৎ গ্রাম্যতরুবি° । চিরশ্যামল  
বৃক্ষ । ৪০।৫০ ফুট উঁচু । পাতা  
ও ছাল তিস্ত । ফুল শাদা । প্রকার-  
ভেদ—মহানিষ্ব—[ স° মহারিষ্ট ;  
হি° বকায়ন ; ম° বকানিনিষ্ব ;  
কড়নিষ্ব ; গুজ° বকান্য ; ক°  
মহাবেড ; তে° পেদবেয়া ; তা°  
মালাইবেতু বাবেপ্যাম ; ফা° আসাদ  
দরখত ; অ° বান ; বীজকে হব্দল ;  
আসাম—ঘোড়ানিম্ ] ঘোড়ানিম,  
melia a., m. bukayun, m.

sempervires. পাতা বিধা, ত্রিধা  
পক্ষাকার, বর্ষমধ্যে একবার করিয়া  
পড়ে । ২ কৈডর্ষ—[ হি° মিঠানিম,  
কৃষ্ণনিষ্ব, বরসজ ] একে ঘোড়া-  
নিমও বলা হয় । ছাল, পাতা,  
বীজ, ফুল ও তেল ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত হয় । নেপালজাত নিমকে  
'নেপালনিষ্ব' বলে । পর্ষায়—  
অরিষ্ট, সর্বতোভদ্র, হিঙ্গুনিষ্যাস,  
মালক, পিচুন্দ, পঙ্ককুৎ, পুঁয়ানি,  
ছদর্ন, অকপাদ, শুকমালক, কীটক,  
বিবন্ধ, নিষ্বক, কৈটর্ষ, বরজুচ,  
ছদি'ল্ল, প্রভদ্র, পারিভদ্রক, কাকফল,  
কীরেট ; নেতা, স্তম্ভনা, বিশীর্ণপর্ণ,  
যবনেট, পীতসারক ; শীত,  
রাজভদ্রক, কীকট, তিস্তক, প্রিয়শাল,  
পার্বত । ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

নিষ্বতরু—মন্দারবৃক্ষ ॥ অম° ॥

নিষ্বরজস—মহানিষ্ব ।

নিষ্ববীজ—রাজাদীবৃক্ষ, ক্ষীরিণী ।

নিষ্বাক—কোষফলা, কাগজীনেব্দ ।

নিম্বকা—আকনাদি দ্র° । clypea  
heruandifolia.

নিব্দ—১ জম্বীর, কাগজীনেব্দ ।

পর্ষায়—নিষ্বক, অল্পজম্বীর,  
দস্তাঘাতশোধন, অল্পসার, বহুবীজ,  
দীপ্ত, বহি, দন্তগঠ, জম্বীরজ,

অম্ব, রোচন, জম্বীর, শোধন, দীপ্তক । ২ ট্যাবানেব্দ । পর্যায়—বীজপদর, ফলপদরক, রুচক, লঙ্গ, শম্বরক, মাতুলঙ্গক, পদর, শ্বকল, মাতুলঙ্গ, স্নগম্ভ্যাঢ়া, গিরিজা, পদ্মিতপদ্মপিকা, বীজপর্ণ, অম্ব-কেশর, ছোলঙ্গ, দেবদত্ত, অত্যয়, মধুককটী । ৩ পাতিনেব্দ । পর্যায়—কোষফলা, নিম্বপাক, নিম্বা ।

নিম্বক—[ সৎ স্বপ্পজম্বীর, ] কাগজী নেব্দ, পাতিনেব্দ, জম্বীর দ্র° ।

নিগম্বীপদ্মপী—শাল্মলিবৃক্ষ ।

নিগদুঠী—নিসিন্দা গাছ ।

নিগদুডী; নিগদুদী—নিসিন্দা দ্র° ।

১ নীলশেফালিকা । পর্যায়—শেফালী, নীলিকা, কলিকা; সুবহা, রজনীহাসা; নিশিপদ্মপিকা । ২ নিসিন্দা । পর্যায়—সিন্দুক, সিন্দুবার, ইন্দ্রসুরথ, নিগদুঠী, ইন্দ্রাণী, পোলমী, - শকুনাণী, কাসনাসিনী, সিন্ধুশক, সিন্ধুক, সুরথ, সিন্ধুবাচিত, সুরমা; সিন্ধুবারক, করহাট ।

নিজর সর্বপা—দেবসর্বপবৃক্ষ ।

নিজরা—১ গুড়ুচী, ২ তালপর্ণী ।

নিদহনী—মদ্বালতা ॥ রত্নমা° ॥

নিবিজা—কাকলী দ্রাক্ষা ।

নিবিষা—একজাতি তৃণ । অবিষা চলিত কথায় নিবিষী । মদ্রস্তক সদৃশ তৃণ; curcuma zedoaria. পর্যায়—অপবিষা, নিবিষী, বিষহা, বিষপহা, বিষহন্ত্রী, বিষভাবা, অবিষা, বিষবৈরণী ।

নিবিষী—kyllingea monocephala. ডাঃ হ্যামিলটনের মতে নেপালের অ্যাকোনাইট ৪ প্রকার—১ সিজিয়া, ২ বিষ, বা বিখ, ৩ বিধ্ম, ৪ নিবিষী । তাঁর মতে নিবিষীতে বিষজাতীয় কোন দ্রব্য নেই । কোলব্রুক বলেন—নিবিষী বিষনাশক । নিবিষী ও জড়বার একই । ডাঃ ডাইমক বলেন—হিন্দুদের নিবিষী একোনাইট নয় । উহা এক প্রকার লতা । উহা বিষনাশক । আসাম অধিবাসীরা costus root হইতে নিবিষী বাহির করিত । হিমালয়ের মেশপালকেরা একপ্রকার একোনাইট খাইত যাহাতে বিষ ছিল না । Ainslieর মতে হ্যামিলটন বর্ণিত nirbishie শব্দ nirbisi হইতে পৃথক । nirbisi শব্দের লাতিন নাম curcuma jedoaria. কিন্তু

আধুনিক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা  
মানেন না। হিমালয়ের লোকে  
শোষোক্তকে নির্বিষী বলিয়া থাকে।  
সিমলা হইতে কুমায়ুন পর্যন্ত ইহা  
মনীল নামে খ্যাত। নেপালী  
নির্বিষী, *cynatus bobatus*.  
জড়াবার—মীর মহম্মদ হোসেন ও  
প্রকার জড়বারের কথা বলিয়াছেন।  
উহাদের মধ্যে খাটাইবৃক্ষ সর্বপ্রকার  
উপকারী। খাইতে প্রথমে মিষ্ট  
পরে তিক্ত। বাহিরের রং কালো।  
ভিতরের বেগুনে ও কটা মিশ্রিত  
ও গ্রন্থিবিশিষ্ট। ২য় ও ৩য়  
প্রকারের তিস্ত, নেপাল ও  
রংপুরে দেখা যায়, ৪র্থ  
প্রকারের গাছ কালো অত্যন্ত তিক্ত।  
ইহা অলিভ গাছের মত দেখিতে।  
৫ম প্রকারের স্পেনজাতীয় ঔষধ।  
উহার নাম *antila*. (*cintila*)।  
বিশ্বকোঁ ॥

নির্মথ; নির্মথন—অগ্নিগম্মনদার,  
অরণি।

নির্মথ—অরণি।

নির্মথদার—অগ্নি উৎপাদনের কাঠ।

নির্মলা, নির্মলী, নির্মলী—[ স°

কতক, অম্বদ্রাসাদ; হি°

নির্মলীফল, পায়পসারী; ম°

নিবধঠীচ্যা, বিয়া, চিহ্নার; গুজ্জ°  
নির্মলী; ক° চিল্লকাপি; ইং  
the clearing nut] *stry-  
chnos potatorum*. কুচিলার  
মত—মধ্যমাকৃতি আরণ্যতরুবি°।  
উড়িয়া, বিহার, মধ্যভারত ও  
পশ্চিম ভারতে জন্মে। বাঙলা  
দেশে কচিং দেখা যায়। নির্মলার  
ফল পাকিলে কালো হয়। বীজ  
গোলাকার। এই বীজ ঘসিয়া  
কাপড় কাচা হয়, জল পরিষ্কার  
করা যায়। ফটকিরির চেয়ে  
নির্দোষ। কতক বৃক্ষ দক্ষিণ  
ভারতে ও লক্ষা ধীপে জন্মে।  
কুচিলার গাছের চেয়েও বড় হয়।  
ফুল হরিতাভ পীত। বীজ  
চ্যাপ্টা বোভামের মত। কুচিলের  
বীজের চেয়ে ছোট ও স্বাদবিহীন।

নির্মট—১ বনস্পতি ২ অপদ্রবৃক্ষ।

নিশাজ্জদ—গুজ্জভেদ।

নিশাম্বা—জতুকালতা।

নিশাপদ্রপ—কুমুদ, উৎপল।

নিশাহস—কুমুদ।

নিশাহাসা—শিউলী ফুলের গাছ।

নিশাহা—১ হরিদ্রা, ২ মালবজাত

জতুকা লতা।

নিশি—হরিদ্রা।

নিশিগদাংপিকা, নিশিগদাংপী—শিউলী  
ফুল।

নিগোত্রা—শ্বেত ত্রিবৃৎ।

নিশ্চলা—শালপর্ণী।

নিম্বুত—দন্তীবৃক্ষ।

নিম্পত্রিকা—করীষবৃক্ষ।

নিম্পাব—৯ বরষটী, ২ কড়ম্বর, ৩ শাদা  
শিম।

নিম্পাবী—বোড়া নামে একপ্রকার শিম্বী  
বা শিম বা বরষটী। হরিবর্ণ  
পর্যায়—গ্রামজা, ফণিনী, নখ-  
পদবিঁকা, মণ্ডপী, ফণিকা, শিম্বী,  
গুচহফলা, বিলালফণিকা; নিম্পাবি,  
চিপটি। শুল্লবর্ণ পর্যায়—  
অক্ষুলিকলা, নখ-নিম্পাবিকা,  
বৃক্শনিম্পাবাষিকা, গ্রাম্যা, নখ-  
গুজফলা, অশনা।

নিসিন্দা—পদপতরুবি°।

নিসিন্দা—[ স° নিগদাংডী, সিন্দুক,  
সিন্দুবার, নীলপদ্প সিন্দুবার;  
নিগদাংদী, ইন্দ্রণিকা; কো°  
নিসিন্দার; আ° পচতিয়া; গুজ°  
নাগোদা; তা° বিলীয়নচি; তে°  
তেল্লাবাভিলী; অ° অথলক; কা°  
ফলগণ্ডু; ও° বেগনিয়া; ই°  
fine-leaved chest tree ]  
নিসিন্দা, ইন্দুর, vitex negun-

do; v. paniculata. ভান্ডীরাদি-  
বর্গের বড় ক্ষুদ্রবি°। ভাটী রোমশ,  
পাতা সুগন্ধ পাতায় ৩-৫টা  
আহুদল, নীচের পিঠ রোমশ।  
ফুলের রং দ্বই প্রকার—  
১ নীলপদ্পী—[ স° নিগদাংডী ]  
বাঙলাদেশে ইহা সর্বত্র দেখা যায়।  
পাতা কোথাও ত্রিপত্র কোথাও  
পঞ্চপত্র। পঞ্চপত্রী নিসিন্দা  
ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশে দেখা  
যায়। সমুদ্রতীরস্থ ভূমিতে প্রায়  
ত্রিপত্রই জন্মে। ২ শ্বেতপদ্পী—  
[ স° সিন্দুবার; ইং indian wild  
piper; কা° তাজনগন্ত- আবি:  
তা° সিরুনোচ্ছ; তে° নিরুবিবি;  
অ° অস্লেজআবী ] vitex  
trifoliac বাঙলায় ক্রিষ্ণ দেখা যায়।

নিসিন্দু—নিসিন্দা, vitex negundo.  
পর্যায়—সিন্দুক, সিন্দু, তাপিজ,  
শুক্লপত্ক, সিন্দুবার, ইন্দ্র  
সুরিষ, নিগদাংডী, ইন্দ্রানিকা।

নিস্তা—ব্রহ্মতা, তেউড়ি।

নিম্ব্রণ পত্রিকা—শ্দহীবৃক্ষ, চলিত  
সিজগাজ।

নিম্ব্রটী—বড় এলাচী।

নিম্ব্রণপদাংপিক—রাজধনুতুর বৃক্ষ,  
ধনুতুরা গাছ।

নিম্নেহকলা—শ্বেতকণ্টকারী ।

নিম্পূহা—অগ্নিশিখাবৃক্ষ ॥ শব্দচ° ॥

নীক—বৃক্ষবি° ॥ উজ্জ্বল° ॥

নীচভোজ্য—পলাতু ।

নীপ—১ কদম্ববৃক্ষ ও ফল; nauclea kadamba [ কদম্ব দ্র° ] ॥ ঋতু-সংহার, ৩।১৩, চরক° ॥ ২ ধাবা-কদম্ব, ৩ বন্ধুকবৃক্ষ, ৪ নীলা-শাকবৃক্ষ বা ফল ।

নীবার, নীবারক—[ হি° তিলী ] উড়ী-ধান । ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—তৃণধানা, বনব্রীহি, অরণ্যধানা, মণিধানা, তৃণোদ্ভব, অরণ্যশালি ।

নীরজ—১ পদ্ম, ২ উশীরী, ছোট কেশে ( চলিত ) ।

নীরাপন্ন—জলবেতস ।

নীরস—দাড়িম ।

নীরিন্দু—আশশেওড়া গাছ ।

নীরুজ—১ কুড়, ২ উশীরী ( ছোট কোণ ) ।

নীল—১ বটবৃক্ষ, ২ তালীশ পত্র, ৩ নীলাসনবৃক্ষ ।

নীল, নীলিনী, নীলী—[ স° গ্রাম্যা, নীলপদ্পী, গন্ধপদ্পা ; হি° নীল; লীল ; ম° ওষ্ঠী ; গুজ° গজী ; ক° হিরীপনীলী ; তৈ° নীলজৈট্ট ; ইং indigo

tree ] নীল গাছ, indigofera tinctoria, i. sumatrana, i. indica. শিম্বাদিবর্ণের বৃক্ষ-বি° । পূর্বে বাংলার প্রত্যেক গ্রামেই নীলের চাষ ছিল । বাংলার নদীয়া, ষশোহর ও মর্শিদাবাদ জিলায় উৎকৃষ্ট নীল হইত ; ক্ষুদ্র ফলপাকাড ২।৩ হাত উঁচু হয় । ফুল দলবন্ধ, নীলাভ গোলাপী রঙ । সমস্ত ক্ষুদ্রপটি ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । ১ মহানীলী—[ গুজ° মোটীগলী ; ক° হিরীপনীল ] বড় নীল, অপরাজিতা । ২ বননীল—tephrosia purpurea.

নীলক—১ অসনবৃক্ষ; ২ মটর ।

নীল কণা—কালোজীরা ।

নীলকণ্ঠ—১ কালোহলুদ, curcuma coesia. হিরিদ্বাদিবর্ণের বৃহৎ শাকবি° । [ হলুদ দ্র° ] ২ পীত শালবৃক্ষ ।

নীলকণ্ঠাক্ষ—রুদ্রাক্ষ ।

নীলকন্দ—১ অরণ্যজাত নীলবর্ণ মূলবি° । ২ দ্রিষকন্দ ভেদ ।

নীলকমল—নীলপদ্ম, nymphaea caerulea. পর্যায়—উৎপল, নীল-পঙ্কজ, নীলপদ্ম, নীলাজ ।

নীলকলমী—কলমী দ্র° ।



নীলকাথাক—ভাল আম ।

নীলকুরটক; নীলকুম্ভা—নীলকিটী ।

নীলকেশী—নীল গাছ ।

নীলগিরিকর্ণিকা—নীল অপরাজিতা ।

নীলচর্ম—ফল্‌সা ।

নীলছদ—খজুরবৃক্ষ ।

নীলঝাজি—ঝাজিবি, *utricularia raticulata* .

নীলকিটী—নীলবর্ণ ঝিঙাপদ্ম-  
বৃক্ষ । পর্যায়—নীলকুরট,  
নীলকুম্ভা, বালা, বাণা, দাসী,  
কটাতর্গলা ।

নীলতরু—নারিকেল ।

নীলতাল—তমাল ।

নীলদর্বা—হীরধ্বং দর্বা । পর্যায়—  
শীতকুম্ভী, হরিতা, শাম্ববী, শ্যামা,  
শীতা, শতপার্বিকা, অমৃতা, পুতা,  
শতগ্রন্থি, অলক্ষবল্লিকা, শিবা,  
শিবেষ্টা, মঙ্গলা, জয়া, স্তভগা,  
ভূতহস্তী, শতমূলা, মহোষধী,  
বিজয়া, গৌরী, শাস্তা, বামনী ।  
পর্যায়—রুহা, অনন্তা, ভার্গবী,  
শতপার্বিকা, শম্প, শতবল্লী, সহস্র-  
বীর্ষা । ভাবপ্র ।

নীলদ্রুম—নীলবর্ণ অসনবৃক্ষ ।

নীলধ্বজ—তমালবৃক্ষ ।

নীলনির্গন্ডী—নীলনিমিস্বে ।

নীলনির্ঘাসক—নীলাসনবৃক্ষ, পিয়াসাল  
বৃক্ষ (চলিত) ।

নীলনীরজ—নীলপদ্ম ।

নীলপত্র—১ নীলপত্র, ২ গুণ্ডতণ,  
৩ অল্পশুকবৃক্ষ, ৪ নীলাসনবৃক্ষ,  
৫ দাড়িম ।

নীলপত্রিকা; নীলপটী—১ নীলগাছ,  
২ শরপদ্মে, বনলীল (চলিত) ।

নীলপদ্ম—নীলোৎপল ।

নীলপর্ণ—১ বৃক্ষবি, ২ পরগাছা ।

নীলপদনবা—কৃষ্ণবর্ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ  
শাকবি । পর্যায়—নীলা, শ্যামা,  
কৃষ্ণাখ্যা, নীলবর্ষাভ ।

নীলপদ্মে—১ নীলভূজরাজ, ২ গ্রন্থি-  
পর্ণ ।

নীলপদ্মা—নীলাপরাজিতা ।

নীলপদ্মিকা—১ নীলগাছ, ২ অতসী ।

নীলপদ্মী—১ শেফালিকা, ২ অতসী ।

নীলপোর—ইক্ষুভেদ ।

নীলফলা—শম্ববৃক্ষ ।

নীলবল্লী—পরগাছা ।

নীলবীজ—পিয়াসাল ।

নীলবৃহা—নীলবর্ণ বৃক্ষভেদ ।  
পর্যায়—নীলবৃহা, অজান্ত্রী,

নীলপদ্মপী, অতিলোমশা ।

নীলবৃক্ষ—পর্যায়—নীল, বাতারি,  
শোথনাশন, নরনামা, নধবৃক্ষ,

নখাল, নরপ্রিয় ।

নীলবস্ত্র, নীলবস্ত্রক—তুল (?) ।

নীলবর্ষাভ—নীলপদননবা ।

নীলবৃষা—বার্তাকী ।

নীলভটা—পিপ্পাশাল ।

নীলভৃগুরাজ—[ হি° নীল ভেগরিয়া ]

নীলকেশদরিয়া । পর্যায়—মহাভূজ,  
মহানীল, সুনীলক, নীলপদ্প,  
শ্যামল ।

নীলমণ্ডল—ফলসা ।

নীলমল্লিকা—১ কিস্ব; ২ কংবেল ।

নীলমাষ—রাজমাষ, (চলিত) বরবাটি ।

নীলষটিকা—কাজলী আক ।

নীলরূপক—পাহাড়ী পিপ্পল, (চলিত)  
পরেণ, সর্বমাষ ।

নীললতা—*thumbergia gradi*  
*flora.*

নীললোহিতা—ভূই জাম ।

নীলশিগ্র—সজনে গাছ ।

নীলসম্মা—কৃষ্ণ অপরাজিতা ।

নীলসম্বর—নীলবাটী ।

নীলসার—তুঁদ গাছ ।

নীলসিন্ধুবার—কালনিসিন্ধে । পর্যায়—  
শীতসহা, নিগদুডী, নীল-  
সিন্ধুক, সিন্ধুক, কপিকা,  
ভূতকেশী, ইন্দানী, নীলকা,  
নীলনিগদুড ॥ শব্দক ॥

নীলশঙ্কখা—গোকর্ণলতা ।

নীলহো—সিংহেল দ্বীপজাত এক প্রকার  
বন্যবৃক্ষ ।

নীলা—১ নীলপদননবা, ২ নীলগাছ ।

নীলাক্সা—কৃষ্ণাপরাজিতা ।

নীলাদ্রিকর্ণিকা—কৃষ্ণাপরাজিতা ।

নীলাপরাজিতা—নীলবর্ণ অপরাজিতা ।

পর্যায়—নীলপদ্পী, মহানীলী,

নীলাগিরিকর্ণিকা, গবাদনী,

বাস্তগম্মা, নীলসম্মা; নীলাদ্রিকর্ণী

॥ শব্দক ॥

নীলাঙ্গ—নীলপদ্ম ।

নীলাম্বর—তালীশপত্র ।

নীলাম্বজ, নীলাম্বজম্বল—নীলপদ্ম ।

নীলাম্বান—পদ্পভেদ । কালাকোরাঠা

নামে এক জাতীয় পদ্পবৃক্ষ

॥ রাজনি°; সমর্থ ॥

নীলাম্বী—[ হি° নল্লবলগদুড ] এক

জাতীয় ক্ষুদ্র বা কন্দ । পর্যায়—

নীলপিটোড়ী, শ্যাম্বী, দীর্ঘ-

শাখিকা ॥ শব্দক ॥

নীলাল—কন্দভেদ । পর্যায়—

অসিতাল, শ্যামলালুক ॥ শব্দক ॥

নীলানী—১ নীলনিগদুডী; ২ নীল

সিন্ধুবার ।

নীলাসন—পিপ্পাসালবৃক্ষ । পর্যায়—

নীলবীজ, নীলপত্র, সুনীলক,  
নীলদ্রুম; নীলমার, নীলনির্বাসক ।  
নীলিকা—১ নীলসিন্দুবার । পর্যায়—  
নীলী, নীলিনী, তুলী, কাল  
দোলা, নীলিকা, রজনী, শ্রীফলী,  
তুচ্ছা, গ্রামীনা, মধুপার্ণিকা,  
ক্লীতকা, কালকেশী, নীলপদুপা  
॥ শব্দক ॥ ২ শেফালিকা ।

নীলিনী—১ নীলবৃক্ষ, ২ নীলবৃক্ষ-  
বৃক্ষ, (চলিত) নীলবোনাগাছ,  
৩ শ্যামত্ৰিপট্টা ।

নীলী—নীলের গাছ । পর্যায়—কাল,  
ক্লীতকিকা, গ্রামীণা, মধুপার্ণিকা,  
রজনী, শ্রীফলী, তুচ্ছা, তুলী, দোলা,  
নীলিনী, নীলা, তুলী, দ্রোণী,  
ঝেলা, নীলপত্রী, রক্তা, নীলিকা,  
নীলপদুপী, কালী, শ্যামা, শোভনী,  
শ্রীফলা, গ্রাম্যা, ভদ্রা, ভারবাহী,  
মোচা, কৃষ্ণা, বাঞ্জনকেশী, মহাফলা,  
অমিতা, ক্লীতনী, কেশী, চীরটিকা,  
গম্ভপদুপা, শ্যামালিকা, রক্তপত্রী,  
মহাবলা, স্থিররংগা, রংগপদুপী,  
দুলি, দুলিকা, দ্রোণিকা ॥ শব্দক ॥

নীলোৎপল—[ স° নীলপদ্ম ] শাপলা ।  
পর্যায়—উৎপলক, কুবলয়, ইন্দী-  
বর, কন্দোথ, সৌগন্ধিক, কুস্পলক,  
অসিতোৎপল, কন্দোটে, ইন্দীবাবর

ইন্দীবাবর, নীলপত্র ॥ শব্দক ॥

নুনবোড়া—[ স° পদ্ম ] দীর্ঘায়ু ক্ষুদ্র  
শাকবি°, *Ionidium suffru-*  
*ticosum*. অনেক শাখাবিশিষ্ট ।  
দীর্ঘায়ু । ঘাসের মধ্যে সকল  
স্থানেই জন্মায় । ফুল গোপালী  
রঙের । পুষ্পদল । ফল ত্রিকোষ ।

নুনিয়া—[ স° লবণিকা ; ও°  
নুননুদিয়া ] নুনো, নুনিয়া,  
*portulaca*. বর্ষায় ছোট শাকবি° ।  
ফুল হলদে রঙের । ১ বড়  
নুনিয়া—*portulaca oleracea*,  
ফুল পুষ্পদল, এক সঙ্গে অনেক  
জন্মায় । পাতা আধ ইঞ্চির  
কিঞ্চ অধিক । ২ ছোট নুনিয়া—  
*p. quadrifida*. ফুল একটি  
একটি । চারিদল । পাতা আধ  
ইঞ্চির চেয়ে ছোট ।

নুরিয়া—*aerana scandens*.

নৃপকন্দ—রাজপলাতু ।

নৃপদ্রুম—আরবধ, সোনাল, রাজাদনী,  
ক্ষীরিণী ।

নৃপপ্রিয়—১ বেড় বাঁশ, ২ রাজপলাতু  
( লাল পিঁয়াজ ), ৩ রামশরবৃক্ষ,  
৪ আমনধান, ৫ আম্রবৃক্ষ ।

নৃপপ্রিয়ফলা—বার্তাকী, ( চলিত )  
বেগুন ।

নৃপপ্রিয়া—১ কেয়া ফুল, ২ পিণ্ড  
থেজুর।

নৃপবদর—নারিকেল কুল।

নৃপবল্লভ—রাজানুবৃক্ষ।

নৃপবৃক্ষ—রাজবৃক্ষ, দোনালা-গাছ।

নৃপমাংগল্যক—আহলবৃক্ষ। কাশ্মীর  
দেশে তরবট গাছ বলে।

নৃপায়াজা—কটুতুবী।

নৃপাহবয়—রাজপলাতু।

নেড়াসিজ ( দেশজ )—সিজবৃক্ষ।

নেত্রপুঙ্করা—রুদ্রজটা লতা।

নেত্রমীনা—ষবতিজা লতা।

নেত্রারি—সেহুডবৃক্ষ, ( চলিত ) মনসা  
( সিজ গাছ )।

নেত্রোপমফল—বাতাদ, ( চলিত ) বাদাম।

নেত্রোষধী—অজশংগী, ( চলিত )  
কৌকিলতা।

নেপালনিম্ব—নৈপালে জাত নিম।

পৰ্যায়—নৈপাল, তর্গনিম্ব,  
জরাস্তক, নারীতিজ, নিদ্রারি,  
সম্মিপাতরিপদ।

নেপালমূলক—হিস্তিকন্দ সদৃশ মূল-  
ভেদ।

নেব্দ—[ স° নিম্ব ; হি° নীম্ব ; উ°  
নেম্ব ; ম° নিম্বনী ; ফা° লিম্ব ;  
ই° lemon ] citrus medica,  
c. bergamia.

পাতা চিরশ্যামল। ফুল শাদা,  
সুগন্ধ, ফল বহুকোষ, বহুবীজ।

১ কমলানেব্দ, কমলালেব্দ দ্র°। ২

করুণানেব্দ—জামিরের জাতবি°,

৩ গোড়া নেব্দ—citrus medica

var limonum, নেব্দ অঁডাকার

ছাল পুরু। ৪ জামীর—citrus

medica. কোমল শাখা বেগুনা।

ফুল প্রায়ই বাহির পিঠে পিঠে

দ্বিগুণ লাল। ফল বৎসরে একাধিক

বার হয়। ৫ কাগজীনেব্দ—c.

medica var acida. ফলের ছাল

পাতলা। ফল গোল। ৬ পাতি

নেব্দ—কাগজীনেব্দের জাতবি°।

ফল লম্বা। ৭ টাবানেব্দ—[ ইং

citron ] টাবালেব্দ; c. medica

var typica. ৮ নারাজিনেব্দ—c.

aurantium ফল প্রায় গোল,

প্রায়ই চাপা; ফুল শাদা, কোমল

ফুল বৎসরে একবার হয়। ৯

বাতাবিনেব্দ—বড় (pomelo),

মাঝারি (shaddock), c. decuma-

ফুল সুগন্ধ। এক জাতের কোষ

শাদা অন্য কোষ লাল। জর্ষীর দ্র°।

১০ সিংহলজাত বৃক্ষবি। সিংহলে

মধুগাছ। বলিয়া খ্যাত।

নেয়ালী—নবমালিকা দ্র°।

নেমিন্—তিনিশবৃক্ষ ।

নেমী—তিনিশবৃক্ষ ।

নৈপাল—১ নেপালীনম্ব, ২ ভূনিম্ববিং,

৩ ইক্ষুজাতভেদ ।

নৈপালী—১ নবমল্লিকা (চলিত)

নেবারী, ২ শেফালিকা, ৩ নীলী ।

নৈয়গ্রোধ—ন্যাগ্রোধ ফল (চলিত)

বটফল ।

নোআফুটকী (দেশজ)—*cardiosperman halieacabum*.

নোআলতা (দেশজ)—নবলতা বৃক্ষবি ।

*dalberzia scandens*.

নোড়, নোয়াঁর—[ স° লবণী, কোল ;

ও° নরকোলি ; দক্ষিণ রাঢ়ে—

শিলআমড়া, শিলআমলা ] নোড় ;

*cicca disticha*, *otaheite*

*gooseberry*. স্নুহিআদিবর্গের

ফলবৃক্ষবি° । শীতকালে পাতা

ঝরে যায় । বসন্তে পুনরোদ্ভব

হয় । ফল শাদা ও অল্প রসযুক্ত ।

নোনাভাটী (দেশজ)—*solanum pubescens*.

নোনা—[ ইং *bullock's heart* ]

আতাবি°, *anona reticulata*.

ফল গোলাকার ; পাঁচ আঁসিয়া,

বিস্বাদ । আতা দ্র°) ।

নোয়ালতা—*brachypterum scandens*.

নৌকা (ফুল)—জলজ শাকবি° ।

*pontedera vaginalis*, *mon-*

*ochoria hastoefolia*. ফুল

নীল রংয়ের নৌকার ন্যায় । ছোট

ছোট নদী তীরে প্রায় জন্মে ।

পাতার বোটা লম্বা, বাণের

আকার ।

ন্যক্ষ—মহিষতৃণ ।

ন্যাগ্রোধ—১ বটবৃক্ষ ২ শমীবৃক্ষ, ৩

মুদ্রাককর্ণগা° ।

ন্যাগ্রোধ—ডুমুর [ ইং *indian fig*

*tree*] *ficus indica*. ডুমুর দ্র° ।

ন্যাগ্রোধমূল—বটবৃক্ষের শিকড় ।

ন্যাগ্রোধা—(চলিত) ইন্দুরকানি, কেহ

কেহ থলকুনীকে ন্যাগ্রোধা বলিয়া

থাকে । পর্যায়—দস্তী, উদ্ভাসর-

পণী ; নিকুশ, মুকুলক, দ্রবতী ;

চিত্রা, মুদ্রিকাহুয়া ॥ চরক° কপ্প.

১২০ ।

ন্যাগ্রোধিকা—আখকর্ণী লতা ।

ন্যম্বজ—কামরাঙা গাছের ফল,

*carambola averrhoa*.

[ প ]

পক্কজ, পক্কজন্মন; পক্করূহ—পদ্মবি° ।

nelumbium speciosum.

পক্কটী—পাকুড় গাছ ।

পত্রার—জলজবৃক্ষ । trapa

bispinosa, Rox;

পক্কজ, পক্করূহ—পদ্ম ।

পখোড়া—[ স° পক্ত-পোড়া ] বৃক্ষবি°  
। রাজনি° ॥

পঙক্তিবীজ—চারাবি° । ববু° ।

পঙ্গুল—একডবৃক্ষ ।

পঙ্গুলাহারিণী—শিমুড়া ফুল ।

পচক—[ হি° পচক, মালয়—পচা,  
সিংহল—গড়মহ ] কাস্মীরজাত  
একপ্রকার গুল্মের মূল । cossyph  
aucklandia.

পচৎপট—বৃক্ষবি°; hibiscus  
phoeniceus.

পচৎসু—সূৰ্যমণি বৃক্ষ ।

পচনী—বনবীজ ।

পচম্পচা—দারুহরিদ্রা; curcuma  
zanthorizon.

পচাপাত—তুলস্যাদিবর্গের শাকবি° ।

দেখিতে অতি জঘন্য কিন্তু পাতা  
অতি সুগন্ধী । শূকাইলেও গন্ধ

থাকে । কেশ তৈলে দেয় ।

pagostema. পাতা ও মিশিয়ে  
কেশমশলা সুগন্ধ করা হয় ।

কেশ ও বস্ত্রাদি গন্ধযুক্ত  
করার জন্য ব্যবহৃত হয় ।

পঞ্চকষায়—১ জাম, ২ শিমুল, ৩  
বেড়োলা, ৪ বকুল, ৫ কুল ।

পঞ্চতিক্ত—১ নিম, ২ গুলগু, ৩ বাসক,  
৪ পটোলপাতা, ৫ কন্টকারী ।

পঞ্চতণ—১ শাল, ২ ইন্দু ।

পঞ্চপত্র—হিন্দীলা গাছ ॥ জ্ঞা° ॥

পঞ্চপল্লব—১ আম অথবা বকুল; ২  
অশ্বথ; ৩ বট, ৪ পাকুর, ৫  
ডুগদুর ।

পঞ্চপংপ—১ চম্পক, ২ আম্র; ৩ শমী,  
৪ পদ্ম, ৫ করবী ।

পঞ্চবটী—১ অশ্বথ, ২ বট, ৩ বেগ,  
৪ অশোক, ৫ আমলা ।

পঞ্চবকুল—১ নাগোধ, ২ উড়ুংবর, ৩  
অশ্বথ, ৪ পারীষ বা গিরীষ বা  
বেতস, ৫ তিল ।

পঞ্চবাণ—কন্দর্পের পাঁচ ফুলের বাণ  
—১ পদ্ম, ২ অশোক, ৩ আম, ৪  
নবমল্লিকা, ৫ রক্তোৎপল ।



পঞ্চবীজ—১ সরিষা, ২ মানী, ৩ জিরা,  
৪ তিল, ৫ পুস্ত্র ।

পঞ্চমূল—পাঁচটি বৃক্ষবিশেষের মূল—

(ক) ১ শাল্মলী, ২ চাকুলা, ৩  
বৃহতী, ৪ কণ্টকারী, ৫ গোক্ষুর ।

(খ) ১ বিল্ব, ২ শোনা, ৩ অগ্নিমন্ত্র,  
৪ গামার, ৫ পারুল । (গ) ১ কুশ;  
২ কাশ, ৩ শর, ৪ ইক্ষু, ৫ দর্ভ  
(উল্লংখ) । তৎপঞ্চমূল—

(ক) ১ শতা, ২ ঋষভক,  
৩ মেদা, ৪ মহামেদা, ৫ জীবনী ।

(খ) ১ শতা, ২ বিদারীকন্দ, ৩  
জীবন্ত, ৪ বিষাগ্নী, ৫ জীবক ।

বলাদি পঞ্চমূল—১ বলা, ২ পুনর্নবী,  
৩ এরণ্ড, ৪ মৃক্ষাপর্ণী, ৫ মাষপর্ণী ।

গোক্ষুরাদি পঞ্চমূল—১ গোক্ষুর,  
২ বদরী, ৩ ইন্দ্রাণী, ৪ কাসমর্দ,  
৫ সর্ষপ । গুড়চ্যাদি পঞ্চমূল  
—১ গুড়চী, ২ মেঘশৃঙ্গী,  
৩ শারিবক, ৫ বিদারী, ৫ হরিদ্রা ।

পটপট্টেচকা—*isobopsis arti-*  
*culata* .

পট—পিয়ালবৃক্ষ ।

পটল—পটোল দ্র ।

পটারি—[ স° কলিকা ] সৌগাণ্ড  
প্রবলাকৃতি ফল ।

পটু, পটুক—পটোল, ২ পলতাশাক,

৩ করলা, ৪ ছত্রাক, কোড়িক ।

পটুকাংকা, পটুপর্ণী—ক্ষীরিণীবৃক্ষ,  
*bryonia grandis* .

পটোট—ছত্রাক ।

পটোল—[ স° কুলফ, অমৃতফল, রাজ-  
ফল ; হি° পরাবর, কডবে পরবল ;  
ম° কডুবেঠা ; গুজ° পোঢ়ল,  
পটোল ; ক° পডবল ;

তে° কন্দ-পোটলা । সেসপদলা ;

ফা° মোরহতী ; ও° পটল ; প°

পলওয়ান ; তা° কাম্বপদাই ;

কোচ—বননতি ; ইং trumpet

flower tree, wild snake

gourd] স্বনামখ্যাত লতিকা ফলকে

পটোল বলে । তিৎপটোল । তিৎ-

পলতা, *trichosanthes dioeca* .

কুম্ভাদিদিবর্গের লতাবি° । ফুল

শাদা । আরণ্যলতা । বহুকাল

সময়ে লালিত হওয়ার এই তিৎ-

পটোলই স্বাদ, পটোলে পরিণত

হইয়াছে । কোথাও কোথাও স্বাদ

পটোলকে লোকে পলতা বলে ।

পর্ষায়—কুলক, তিস্তফল, পাণ্ডু-

ফল, ককশচ্ছদ । আহার ও ঔষধার্থে

সমভাবে উপকারী ॥ রাজনি° ॥

২ কাসমর্দ বৃক্ষ । ৩ কাপাস

বৃক্ষ । ৪ কোশাতকী, *luffa*

acutangula.

পটোলিকা—ধূধূললতা ও ফল;  
তরুই, পড়োল, পরল, luffa  
aegytiaca.

পটু—১ পাট, corchorus olitorius,  
২ লোধগাছ ; লাল লোধ symplo-  
cos racemosa. ( কুমুদ; রোধ,  
লোধ, পটিকালোধ )

পটুক—বৃক্ষবি° ।

পটুরক্ষ, পটুরজন, পটুরঞ্জক—রঞ্জন  
( রং করার ) বৃক্ষবি° । caesal-  
pina pinia sappan.

পটিল—উদ্ভিদবি° । রক্তকরঞ্জ caesal-  
pina bonducilla.

পটিলোধ, পটিকালোধ—লাল লোধ  
বৃক্ষবি° । symplocos re-  
cemosa, Rox, শ্বেত ও রক্তবর্ণ  
বৃক্ষ ।

পটেরক—উদ্ভিদবি° । cyperus  
hexastachyus communis.

পড়োল—পটোলিকা দ্র° ।

পগস—[ তে° উৎপনস, ] কাঁঠাল  
দ্র° ।

পণ্যাম্বা—তৃণবি° ॥ সমর্থ° ॥

পত্তংগ—১ রক্তচন্দন, caesalpenia  
sappan পৰ্যায় : পত্তাংগ,  
পটুরংগ, ভাষ্যবৃক্ষ, রোগকাষ্ঠ,

কুচন্দন । ২ ভীমরাজ, ৩ কেশ-  
রাজ, ৪ শালিধান্যভেদ ।

পত্তর—১ শালিঙ-শাক ১ জলপিপলী,  
৩ পকটীবৃক্ষ, পত্তংগ ।

পত্তরংগ—রক্তচন্দন ।

পত্ত—তেজপত্ত, laurus cassia.  
পৰ্যায়—তেজসপত্ত, তমালপত্ত,  
হদন, দল, পালাশ, অংশুক,  
বাসন, তাপন, স্বকুমারক, তমালক;  
রাম; গোপন; বসন ॥

পত্তক—১ তেজপত্ত; ২ শালিঙ শাক ।

পত্তগন্ধ—তেকটাসীজ, euphorbia  
antiquorum.

পত্তককার—পুরোচী বৃক্ষ ।

পত্তজাসব—পটোল ও তালপাতার  
আসব ।

পত্ততড়ুলা—যবতিস্তা লতা ।

পত্ততরু—বিটখদির ।

পত্তপ্প—লালবর্ণ তুলসীফুল,  
ocimum pilosum ॥ উইল° ॥

পত্তমাল—বেতসবি°, calamis  
rotang.

পত্তাখ্য—তেজপাতা, ২ তালীশপাতা ।

পত্তাল—কাষাল, ইক্ষুদণ্ড ।

পত্তোপক্ষর—কাশমর্দ, casia sophera.

পথিদ্ৰুম—খয়েরজাতীয় বৃক্ষ । mi-  
mosa alba. ॥ উইল° ॥

পথ্যা—হরিদ্রা, terminalia,  
chebula.

পদিনা; পদিনা—সুগন্ধি শাকবি° ।

পদ্ম—[ স° কমল, কুমুদ, কল্লার,  
হল্লক, সন্ধিক ; হি° কন্বল, উ°  
ধাবলকাই ; রঙ্গকাই; গুজ° নীলো-  
ফল; কন্বল ; তা° অল্পতোমরাই;  
অশ্বল ; তে° কোতের; অল্পীতমর;  
তেল্লকলব, এডাকো লুক ;  
ইং waterlily ] রক্তকম্বল, ছোট  
শদি ; কমল, কুমুদ । তন্তুশব্দ দ্র° ।

পদ্মক, পদ্মকাষ্ঠ—[ হি° পদ্মক ;  
ম° পদ্মকাষ্ঠ ; গুজ° পদ্মকতুলা-  
কড়ুং ক° পদ্মক ; তে° পদ্ম-  
সচেকম ] পদ্মকাষ্ঠ, prunus  
pudum, p, sylvetica, কৈদার  
পর্বত ও হিমালয়ে জন্মে ।  
অতি উচ্চ বৃক্ষ ।

পদ্মকন্দ—[ স° জলালুক ] শালুক  
[ কমল দ্র° ]

পদ্মকাটা—[ স° পদ্মকন্টক ] lichen  
papillaris.

পদ্মগলগু—গুলগু । গুড়ুচি দ্র° ।

পদ্মচারিণ—উত্তরাপথ-প্রসিদ্ধ লতা  
বি° । ১ স্থলপদ্মিনী, ২ চারিবৃক্ষ,  
৩ হরিদ্রা ।

পদ্মনাডিকা—স্থলপদ্মিনী ।

পদ্মনাল—মৃগাল ।

পদ্মার্ট—চাকুন্দা, cassia tora

পনস—কাঠাল বৃক্ষ দ্র° ।

পবনাল—[ হি° পুনেরা ] ধান্যবি° ।  
দেবান; জনার ।

পবিহ্র—১ কুশ, ২ তিল; ৩ পুত্রজীব ।

পবিহ্রক—১ কুশ, ২ অশ্বথ; ৩ উড়ুশ্বর ।

পদ্মস্যা—গুডুমবি° । স্বর্ণ-ক্ষীরিকা,  
কুটুম্বিনী ক্ষুদ্রপ, অর্কপুষ্পিকা,  
asclepias rosea.

পদ্মোদর—সুগন্ধী ঘাস, cyperus  
rotundus.

পদ্মোর—ধুয়ের ।

পদ্মার্তিপ্রিয়—খাগরা, শর, saccharum  
spontaneum.

পরাঙ্কল—nelsonia tomentosa.

পরিপুষ্করা—গোমুদক ।

পরিপেল—কেবতী-মুদ্রতক ॥ অম°-টী,  
ভরত° ॥

পরিপেলা—সুগন্ধি ঘাসবি° ।

পরিব্রামি—শ্রবণী, থলকুড়ি ।

পরিব্রুত—বারুণী ।

পরুষ—নীলবিন্ট, xylocarpus  
granatum ॥ বৈদ্যক° ॥

পরুষ, পরুষক—[ স° নীলবর্ণ,  
মৃদুফল, অলপাসিক, পুষ্করুষক ;  
হি° ফালসা, পরুষ ; ম° ফটুঠসা ;  
ক° বেটহা, দাগলি ; তৈ° ঘামণ ;

ফা° পালশা ; ও° ফারসা ] ফলসা  
xylocarpus granatum,  
grewia asiatica. পর্যায়—  
পরুষক, নাগদলোপম, পরুষ,  
অপাশিথ, পবাপর, নীলচর্ম,  
গিরিশীল, পরাবত, পর,  
নীলমণ্ডল। ফলের জন্য গাছ  
উদ্যানে রক্ষিত হয়। শীতের  
শেষে পশ্চদল ফুল হয়। কাঁচা  
ফল কষায়। গ্রীষ্মকালে পাকে।  
পাকিলে নীলবর্ণ ও অল্পমধুর  
হয়। পাতা রৌপ্যযুক্ত। ফল  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্র°।

পরোল—[ স° দীর্ঘপটোলিকা ; ও°  
তরড়া ] তরুই লতা গাছ, luffa  
aegyptica. তিত্তপরোল—1.  
amara: আরণ্য গাছ। ফল  
তেঁতো, পদ্মপুষ্পে কেশর ওঁটি।

পকটী, পকটী, পকটীন—পাকুড় গাছ।

পক্জনী—দারুহরিদ্রা।

পক্জ্যারেতস—নলভেদ।

পক্জ্য—দারুহরিদ্রা।

পক্—১ পান ২ পলাশবৃক্ষ।

পক্ঘণ্ড—পদ্মপহীন বনস্পতি, বৃক্ষ বি°

পক্ধ—পলাশীলতা।

পক্ভেদিনী—প্রিয়ংগু।

পক্মচাল—কর্মরংগবৃক্ষ, কামরাংগা  
averrhoea carambola.

পক্লতা—নাগবল্লী, তাম্বুলীলতা,  
পানগাছ।

পক্লাম—তুলসীগাছ।

পক্কা—১ স্থলপশ্ম, ২ চাকুলিরা, ৩  
কালপণী, ৪ অশ্বিনম্ভ।

পক্কা—১ মাষপণী, ২ শালপণী, ৩  
পশ্চিমপণী।

পক্কাধ্বজ—১ মাষপণী, ২ মাষপণী ॥

পক্টি—[ স° ক্ষেত্র পপটিক, হি°

পিংপোড়া, দবনাপড়া ; ম°

সিবপটী, পিত্তপাপড়া ; গুজ°

পীংপাপড়া, খডননিয়ো ; ক°

পপটিক ; তে° পাপটিকমু ;

কোচবি° পট্-পট্°। শ্বেৎপাপড়ি ;

ফা° পপটিক ; শাংরা ; অ° বকল-

তল্মলক। ] ক্ষেত্রপাপড়া, ক্ষেত্র

পাবড়া ; oldenlandia herla-

cea, o, biflora ছোট ক্ষুপাব°।

জলাশয়ের ধারে জন্মে। ভাদ্রমাসে

অঙ্কুরিত হইয়া চিত্র পর্যন্ত থাকে।

স্বাদ আতিক্রান্ত। ওষবি° বৃক্ষবি°,

পর্যায়—ত্রিষাষ্ট, তিত্ত, চরক ;

রেণু ; তক্ষারি, বরক, অন্নক, শীত,

শীতপ্রিয়, পাংশু, কম্পাঙ্গ,

কর্মকটক, কৃশশাখ, প্রগন্ধ, স্নাতিক,

রক্তপুষ্প, পিত্তারি, কটুপত্র বহু।

পপটিদ্রুম—১ কোকনদেশের কুম্ভীবৃক্ষ,

২ গুগ্গলু তরু।

পপটী—জতুক, একপ্রকার লতা।

পৰ্বততৃণ—পৰ্বতজাত তৃণবি°

॥ সমর্থ° ॥ পর্যায়—তৃণাচ্চ;

মৃগাপ্রিয়, পত্রাচ্চ।

পৰ্বপুষ্পী—নাগদন্তী, হস্তিশদৃণ্ডী,

হাতিশৃঙ্গ।

পৰ্ববল্লী—১ মালাদ্রবী; ২ দ্রবীলতা।

পৰ্বতবাসিন—আকাশগাংসী লতা।

পৰ্বতপোতা—গিরিকদলী।

পৰ্বমূলা—শ্বেতা, শ্বেতদ্রবী।

পৰ্বযোনি—ইক্ষি প্রভৃতি।

পৰ্বরূহ—দাড়িম।

পৰ্বকপাদিকা—কোলিশম্বী, শ্বেত

আলকুশী।

পলকজুই—[স° যুথিকাপণী°; হি°

পলকজুই; তে° নাগামাল্লি]

জুইপোন, rhinacanthus

communis nees. শাখাবিশিষ্ট

গুল্ম। কাণ্ড হইতে উভয় দিকে

যুগ্মপত্র বাহির হয়। বঙ্গদেশে

সর্বত্র পাওয়া যায়।

পলক্যা—পালঙ শাক।

পলকষা, পলকষী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

ruellia longifolia. প্রকারভেদ

—১ গোক্ষুর, ২ রাম্ভা; ৩ গুগু-

গুল, ৪ কিংশুক, ৫ মৃদুভীরী (?),

৬ ক্ষুদ্র গোক্ষুরক, ৭ মহাশ্রাবণী।

পলতা—পটোল লতার পাতা।

পলাডু—[স° দ্রুগণ্ড, মৃদুদ্রুগণ্ড;

হি° প্যাজ; গুজ° দ্রুপরি, দ্রুগনী;

আবী° -বজল; বো° পি°রাজ,

কন্দ; ম° কান্দা; ক° উল্লি; তা°

বেল্ল-বেগম, ইরুল্লি, ইর-

বেগম। তে° বুল্লিগডল,

নিরুল্লি; ফা° প্যাজ; ইং

onion] পে°রাজ allium cepa.

প্রকারভেদ—১ শ্বেত কন্দপলাডু

—(ক) ছোট শ্বেতকন্দ পলাডু।

বাংলায় বড় পে°রাজ বা 'ঘোড়-

পিয়ার' বলে, (খ) বড় শ্বেত-

ক'দ পলাডু—বাংলায় 'পাটনাই

পে°রাজ' বলে। ইহা পিচ্ছিল ও

মধুর। ২ [স° ক্ষীরপলাডু]

রাজপলাডু, রক্তকন্দপলাডু, লাল

পে°রাজ। পলাডু বিভিন্ন ধরণের

—সাইবেরিয়ায় একজাতীয়

পে°রাজ; হিমালয় জাত আর

প্রকার, ইজিপ্টেও একপ্রকার।

ওয়েলসবার্গ সাব্রিনদিগের

পরাজয় উপলক্ষে খ্রী° ৬

শতক হইতে এক জাতীয়

পে°রাজের চিহ্ন ধারণ করিয়া

আসিতেছে। উত্তর হিমালয়ের

জংলী পি°রাজের নাম; a.

rubelium. পর্যায়—সুন্দক,  
লোহিতকন্দ, তীক্ষ্ণকন্দ, উল্লী,  
মুখদংশণ, শূদ্রপ্রিয়, কুমিল্ল;  
দীপন, বহুপত্র, মুখগন্ধক, রোটন  
॥ অম° ॥

পলাল—শস্যাদুনা ধান্য-নাল,  
নিংকলংক নাল ॥ অম° ॥

পলালজ শাক—পোয়াল ছাতু ।

পলালদোহন—আম্রবৃক্ষ ।

পলালোদ্ভিদ—খড়ের পোয়াল হইতে  
যে ছত্রক হয় । ঔষধার্থে ব্যবহৃত  
হয় ॥ রাজনি° ॥

পলাশ—[ স° কিংশুক ; হি° ধাক্,  
স'ওতাল—মদ্রুপ ; কোল—  
সুরদ্ব' । বিহা°—পরস, ফরস ;  
নেপাল—পলাশী ; ইং bastard  
teak ॥ ধোরে ॥ ] butea  
frondosa. পর্যায়—কিংশুক,

পর্ণ, বাতপোথ, যাজ্জিক, পুতদ্র ।

বেদে উল্লেখ আছে । লিঙ্গরাজকর  
পারিজাত । ইহা পলাশ বলিয়া  
পরিচিত । বৌদ্ধেরা পলাশবৃক্ষকে  
পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে । ইহার  
পাতার তিনটি ফলা । কোন কোন  
জায়গায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর নামে  
কথিত হয় । ব্রাহ্মণের পৈতর  
সময় পলাশ-দণ্ডের প্রয়োজন হয় ।

আমেদাবাদ জেলার পলাশ পাতার  
খালা ও বাটিতে ভোজের খাওয়া  
হয় । যত্নে রাখিলে ঐ জিনিস  
দুই বৎসর থাকে ।

পলাশক—পলাশবৃক্ষ, curcuma  
reclinata । ২ শটী ।

পলাশাখ—asafoetida.

পলাশান্ত—যোয়ান ।

পলাশী—লাক্ষা লতা ॥ রাজনি° ॥  
mimusops kauki, Rox.

পল্লবদ্রু—অশোকবৃক্ষ ।

পশুপল্লব—সুগন্ধীতৃণ ।

পশুমোহনিকা—কটরীল ।

পশুহরিতকী—আম্রাতক ফল ।

পসুর—বৃক্ষবি° । কাঠ শক্ত, ইহাতে  
খুঁটি হয় ।

পাংশুল, পাংশুল—কাটাকরঞ্জ cae-  
salpinia bonducella.

পাংশুপত্র—বেতোশাক ।

পাংশুভিক্ষা—খাইফুলের গাছ ।

পাংশুলা—কেতকী গাছ ।

পাককৃষ্ণ—১ পানি আমলা, ২ করঞ্জ  
বৃক্ষ, carissa carandas.

পাকফল—করঞ্জ ।

পাকবন্ধন—পানি আমলা ।

পাকলি—চারাবি° । baubinia  
candida.



পাকলিত—ককটীক, ( কাহারও মতে )  
রোহিণী ।

পাকাটি ( দেশজ )—শুদ্ধ পাত গাছ ।

পাকুড়, পাকুর—[ স° প্রক্ষ; শৃঙ্গী;  
পকটী; হি° পাকরি, পথর; ম°  
পিম্পবি; তে° পসারি । তা°  
পেপরি ] বৃহৎ ও বহুদূর  
বিস্তৃত গাছ, *ficus infectoria*  
Roxb. পাতা অশ্বখ পাতার  
ন্যায়, চওড়ায় কম । বর্ষার পরে  
ফুল ও শীতকালে ফল হয় ।  
বঙ্গদেশে, ছোটনাপুর, ত্রিহৃত  
প্রভৃতি স্থানে জন্মায় । পর্যায়—  
প্রক্ষ, কপীতন, ক্ষীরী, সুপার্ব,  
শৃঙ্গী, গদভাণ্ড, কপীতক, প্রবক ।

পাচী—একজাতীয় লতা ॥ সমর্থ° ॥

পাট—[ স° পটশাক ] পাটগাছ,  
নাড়ীক, নালিতা, *conchorus*  
*capsuloris*. পট দ্র° ।

পাটল—পারুল । সম্ভবত পাটল পদ্য  
থেকে পাটলপদ্য হইয়াছে ।  
ফুল সুগন্ধী । লাল পাটলও হয় ।  
২ [ পাটল-রীহ ] আউসধান, ও  
পদ্মাগবক্ষ ।

পাটলা—পারুলপদ্যবক্ষ ॥ সমর্থ° ॥

পাটী—ক্ষুদ্র বক্ষাব° । *plumbago*  
*zeylanica*.

পাঠা—[ স° পাঠা; ইং *parera*  
*root* ] নিম্নাধা, *stephania*  
*harmendifolia*. আকনাদি  
নামক লতানে গাছ, বনৌষধিবি° ।  
পাতা ২-৪ ইঞ্চি লম্বা, প্রায়  
গোলাকার, বোঁটা ও লতার  
শাখা, পাতার নীচের পিঠ-শাখা;  
উপরের পিঠ-সবুজ । ফুল শাদা,  
সামান্য সবুজ আভাযুক্ত । ফল  
শেষাকুলের মত ছোট লাল ।  
বর্ষাকালে ফুল ও শরৎকালে ফল  
হয় । বঙ্গদেশে পঞ্জাব, নেপাল,  
মিসরদেশ, প্রভৃতিতে জন্মে ।

পাণ্ডু—পটোলফল ।

পাণ্ডুনাগ—পদ্মাগ নামে সুগন্ধিপদ্য ।

পাণ্ডুর—গন্ধতুলসী বা মরুয়া ফুলের  
গাছ ।

পাণ্ডুরক্ষ—পাটরাঙা শাক ॥ রাজব° ॥

পাণ্ডুরদ্রুম—গুল্মবি°, কুড়চীগাছ,  
*echites antidysenterica*.

পাণ্ডুরফলী—বক্ষাব° ॥ সমর্থ° ॥

পাণ্ডুরহা—কুরুবকবক্ষ ।

পাণ্ডুলোসা—গুল্মবি°, *glycine*  
*debilis*.

পাতি—বর্ষজীবী উদ্ভিদ । *junc-*  
*illus inundatus*. আদ্র ভূমিতে,  
সুন্দরবনে, ধানক্ষেতে জন্মায় ।

পাতালগরুড়ী—[ স° সোমবল্লী ; হি° ছেউরা ] তিস্ত অলাব্দ । লতাৰি°  
 ॥ রাজনি° ॥ পৰ্যায়—বৎসানদী,  
 সোমবল্লী, তাক্ষী, গারুড়ী,  
 মহাবলী ।

পাতিলেবু—[ স° নিব্দক, ইং com-  
 mon acid lime ] citrus-  
 bergamia. জম্বীর দ্র° ।

পাতীপাতী—maranta dichotoma.  
 পাতী—তৃণৰি° ।

পাতু—তৃণভেদ ।

পাথরকুচি—[ স° পাষাণভেদী ;  
 bryophyllum calycinum.  
 দীৰ্ঘায়ু শাকৰি° । প্রায় ২ হাত  
 লম্বা । পাতা লোমবিহীন,  
 মাংসল । ফুল বড় বড় লাল  
 রঙের । বেগুনরঙের আমেজ ।  
 মলকাস্থীপ ইহার আদি জন্মস্থান ।  
 প্রায় ২০০ বর্ষের পূর্বে এ দেশে  
 আনীত হয়েছে । কোথাও কোথাও  
 ইহাকে হেমসাগর বলে । কিন্তু  
 হেমসাগর ভিন্ন গাছ । হেমসাগর  
 হলদে রঙের ও বর্ষাকালে ফোটে ।

পাথরচুর—[ স° পাষাণভেদী ; ও°  
 রুকিণী হাত-পোহু ; তা° কপূর-  
 বল্লী ; তে° পিণ্ডিবেট্র ] তুলস্যাদি-  
 বর্গের শাকৰি° । coleus

amboinicus, c. aromaticus-  
 পাতা ছোট ছোট, ফুলও ছোট  
 ছোট নীলাভ । গাছ দেখিতে অতি  
 কদাকার । ভারতের অনেক স্থানে  
 চাষ হয় । আদি জন্ম—মলাকা  
 বীপপুঞ্জ ।

পাথোজ—পশু ।

পাদরুহা—পরগাছা ।

পাদরোহণ—ডুমুরগাছ ।

পাদরোহা—বটবৃক্ষ ।

পাদহীন—আলোক লতা ।

পান—[ স° তাম্বল, পণ° ; ইং  
 betel leaf ] piper betel-  
 দীৰ্ঘায়ু লতাৰি° । সমোক্ষ ও  
 আদ্রজমিতে জন্মে, অনাহ জন্মান  
 না । আজকাল আবাদের প্রণালী-  
 ভেদে দুই প্রকার পান দেখা যায় ।  
 এক রকম 'বোরোজ' জন্মে । অন্য  
 রকম বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া বাড়ে ।  
 বাংলাদেশে বোরোজ পান, কোচ-  
 বিহার ও আসামে 'বারুইপান'  
 এবং গাছের আশ্রিত পানকে 'গাছ  
 পান' বলে । গাছ পান একটু  
 কটু । বাটিলের পানের মত সুগন্ধি  
 পান অন্য কোথাও পাওয়া যায়  
 না । প্রকারভেদ—১ বাংলা, ২  
 মোহুবা, ৩ মহারাজপুর, ৪

বিলোআ; ৫ কপূরী; ৬ কদলবা,  
৭ গোরক পান, *convolvulus plunicaulis*. ইহাদের  
মধ্যে মহারাজপদ পান উৎকৃষ্ট।  
ছাচীপান।

পানকপূর—[কপূরপর্ণ] *clansana heptaphylla*. নারগাদিবর্গের  
ছোট গাছবি°। সন্তপর্ণ। পূর্ব  
বাঙলায় জন্মে।

পানশিউলী—[স° কৃষ্ণ-কাম্বোজী ;  
হি° পানঝুলি ; ম° রিরুবি ; তা°  
নিরপুলাজ্জি ; তে° নেজ-  
পদরুদ্দ.] পাকানো গুস্ত্রবি°,  
*phyllanthus reticulatus*  
*poir.* গুস্ত্রটি ৮-১০ ফুট উচ্চ।  
পাতার গোড়া হইতে ফল ও ফল  
হয়। ফল দেখিতে আপেলের মত,  
কিন্তু আকারে ছোট। বিহার,  
সিকিম, সিন্ধু, আসামে এবং  
বঙ্গদেশে বেড়া ও জঙ্গলের ধারে  
জন্মায়।

পানা—[স° কুষ্ঠিকা; বারিপর্ণী ; হি°  
জলকুম্ভী, কাই ; ম° জলমন্ডবী ;  
গুজ° জলকুম্ভী ; ক° হীম্বলং ;  
তে° তুটিকুর ; ও° দল] জলের  
উপর ভাসমান শৈবালবি°, *pistia*  
*stratiotes*, *salvinia imbr-*

*cata*. বাংলাদেশে সচরাচর তিন  
রকম দেখিতে পাওয়া যায়। কচু-  
আদিবর্গের জলজ শাকবি°। একটি  
গাছে অসংখ্য জন্মায়। (১) টোকা-  
পানা, টোকাপানা—পাতা খুব বড়।

(২) ইন্দুরকান্দিপানা—পাতা  
ছোট। [উন্দুরকণী, আখুরকণী,  
মখিককণী]। (৩) ক্ষুদ্রপানা।

পানি আমলা (দেশজ)—[স° পানীয়া-  
মলক ; হি° পানি অম্বরা] পানি  
আমলা গাছ।

পানীকাঁচড়া (দেশজ)—বৃক্ষবি°।

পানীফল (দেশজ)—[স° শংগাটক ;  
হি° শিগাড়া ; ইং *waterchest*  
*nut*]। জলজ লতাবি°।

পানীমরিচ—পানমরিচ দ্র°।

পানীয়ামলক—সোমরাজী, *serratula*  
*anthelmintica*.

পানীয়ামলক—পানী আমলা, *flacour-*  
*tia cataphracta*.

পানীয়াল—কন্দবি°। রাজনি° ॥

পানীলতা—লতাবি°।

পানীলাজক, লাজুক—*neptunia*  
*oleraceae*. বহুবল্লাদিবর্গের লতা-  
গাছবি°। পাতা ছুইলে মৃদুদ্রা  
যায়। ফুল ছোট লালচে।

পানীতৃণ—*grewia salvifolia*.

পাপড়া—[ হি° পাপড়া ' ক্ষুদ্র শাকবি° ।  
podophyllum emodi. হিমালয়  
প্রদেশে জন্মে ।

পাপবেলী—অন্ধ্রিধবৃক্ষ, clissampelos hexandra.

পাবক - নীলারূপ পুষ্পবৃক্ষবি°, plumbago zeylanica.

পাবন—হরিদ্রাবর্ণ কেশরিরয়া । পর্ষায়  
—স্বর্ণভৃগুগার, হরিপ্রিয়, দেবপ্রিয়;  
নন্দনীয় ।

পাবনী—১ হরিতকী, ২ তুলসী ।

পারাবতফল—গাবফল ।

পারাবতাগ্ন—১ লতাফটকী, ইংগুদী,  
২ বনউচ্ছে, ৩ মহাজ্যোতিষ্মতী  
লতা, ৪ কারজঙ্ঘা ।

পারাবতী—লবনী ফল ।

পারিজাত—[ ইং coral tree; a  
shrub ] সুরপাদপ, erythrina  
fulgens, nictanthes tristio.  
ইহা দেবতরু । পালতে মাদার ।  
সমুদ্র মন্থনের সময় এই গাছ  
পাওয়া যায় । অনেকে ইহাকে  
কোবিদার, পারিজাত অথবা মান্দার  
বলে । পারিভদ্র দ্র° ।

পারিভদ্র—[ স° পারিজাত, পানিধা,  
কটকিংশুক, কটকী, রক্তকেশর,  
বহুপুষ্প, নিম্বতরু, মন্দার ;

হি° ফরহদ ; ম° পানরো ; গুজ°  
পাণ্ডেরবো ; ক° হরিবাল ; তে°  
মুন্সমোতিচেট্টু ; মোদগু ; দ্রা°  
পঞ্জীর ; তা° মুরাক ; ও° পাল-  
ধুরা ; ই° indian coral tree ]  
পালতে মাদার, চোর পালতে ।  
erythrina indica, e. cora-  
llo-dendron. শিম্বাদিবর্গের  
মধ্যমাকৃতি বৃক্ষবি° । ১০।১২  
হাত পর্বন্ত প্রায় উচ্চ হয় । কাণ্ড  
ও শাখা কণ্টকপূর্ণ । ত্রিপত্র ।  
ফুল লোহিতবর্ণ । কঠ শাদা  
ও হালকা । পাতা ত্রিপত্র । বাঙলা-  
দেশে প্রায় বেড়ার ধারে জন্মায় ।  
মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

২ দেবদারু জাতীয়, ৩ সরলবৃক্ষ ।

পারিশ—[ হি° পরশাপিত্তল, পশি° পদ ]  
অম্বথবৃক্ষবি° । পলাশপিত্তল,  
গজহস্ত । পর্ষায়—ফলীশ, কপিচূত,  
কজ্জল, গদভাণ্ড, কন্দরাল,  
কপীতন, সুপাম্বক ।

পারুল—[ স° পাটলী ] ১ পারুল,  
লাল পারুল, blignonia suave-  
len, ২ ঘণ্টাপারুল, সাদা পারুল ।  
প্রায় উপত্যকায় জন্মে । পারুল  
উচ্চ বৃক্ষ । বাঙলায় সর্বত্র দেখা  
যায় না ।

পার্বত—ষোড়ানিম।

পালঙ শাক, পালগে শাক, পালংশাক

—[ স° অশ্ববলা, পালকাম্ ; হি° পল্কাই ; ম° পালকাশাক : তা°

ভেজালিকিরাই ; তে° দাহনা বাচ্চানি ] পুষ্কিকাদিবর্গের বর্ষায়দ শাকবি°। *spinacia oleracea*. পুং ও স্ত্রী পদ্বপ ভিন্ন গাছে

হয়। বঙ্গদেশে সর্বত্র হয়। আদিম বাসস্থান আফ্রিকা। প্রকারভেদ—১

বীট পালং—*beet*, পালঙ্কী *beta vulgaris*. ডাটা মোটা, গোড়ায়

শকরা আছে। ইউরোপে ইহার প্রচুর চাষ হয়। ইহা হইতে চিনি

প্রস্তুত হয়। ২ চুকাপালং—[ স° চক্র ; ম° চুকাবডিল ; তা° সুকান-

কিরাই ] *rumex vesicarius*. অগ্নিশাক-বি°। পাতা বাগের আকার।

ফল ছদে আবৃত থাকে। ইহা কিন্তু পুষ্কিকাবর্গের গাছ নয়। পর্যায়—

চক্রবাস্তক, লিচুক, অগ্নিবাস্তক, দলান্ন, অগ্নিশাকাখা, হিলমাচিকা।

৩ বনপালং—[ হি° সহদেবী-বারি ] দধের ন্যায় আঠাযুক্ত লম্বা

গুচ্ছ। *rumex maritimus* lin. সমগ্র ভারতে জঙ্গলে বা

চাষের জমিতে জন্মায়।

পালক—চিত্রকবক্ষ।

পালকজুই—*ixora undulata*.

পালক, পালঙ্কী—[ ইং *olibanum* ]

গন্ধাবিরজা, কুন্দুর, পালঙ শাক, *boswellia thurifera*. পর্যায়—

কুন্দ, কুন্দক, কুন্দবুরু, খোটীরস, মুকুন্দ, কামদুর, লোবান, তৈলাখা,

শিলারস ॥ সুগ্র° উইল° ॥

পালিটা মাদার, পালিতা মাদার, পালিধা মাদার—[ ইং *indian coral tree* ]

*erythrina indica*. [ পারিভ্র দ° ]

পালিন্দী—১ শ্যামলতা, ২ বামন-হাতি, ৩ শ্বেতাপরাজিতা, ৪ গ্রাম-

মাণা লতা, (চলিত) বলা, ৫ মালবিকা প্রব্রতা, ৬ করলা।

পালিন্দী—তেওড়ি গাছ।

পালিবট—বৃক্ষবি°।

পার্সলি—[ ইং *parsely* ] ধান্য-কাদিবর্গের শাকবি°। *petroselinum sativum*. ইউরোপ হইতে

এদেশে আনীত হয়।

পাষণকুন্দক—পাথরকুচা।

পাষণভদ্র—কুলথ।

পাষণভেদী—[ স° হিমসাগর ; হি° পাথরচুয়ে ] পাথরকুচি, *coleus aromaticus*, *plectranthus*

*scutellaroides*.

পিকবন্ধ, পিকমহোৎসব—আম্রবৃক্ষ ।

পিকভক্ষকা—ভূমিজ জন্মবৃক্ষ,  
বনজাম ।

পিকরাগ, পিকবল্লভ—আম্রবৃক্ষ ।

পিকাক্ষ—রোচনীবৃক্ষ ।

পিকেক্ষণা—কুলেখাড়া ।

পিপ্পল (দেশজ)—পিপ্পলী ।

পিকদেব, পিকপ্রিয়—আম্রবৃক্ষ ।

পিকপ্রিয়া—মহাজন্ম ।

পিকরাগ—আম্রবৃক্ষ ।

পিক্স—[ইং pink] পদ্পবৃক্ষবি° ।  
dianthus. ইউরোপ ইহার আদি  
জন্মস্থান । শীতকালে জন্মে ।

পিগিনাহি—panicum heloolum.

পিঙ্গী—শমীবৃক্ষ ।

পিচ—prunus persica. পীচ দ্র° ।

পিচডক—কুলেখাড়া ।

পিচব্য—তুলাগাছ ।

পিচুক—ময়না গাছ, vangeria  
spinosa.

পিচুতুল—কাপাসের তুলা ।

পিচুফল—ময়না ফল ॥ দ্রব্যগদ° ॥

পিচুমদ, পিছমন্দ—নিম গাছ ।

পিচুমদ—নিম গাছ ।

পিচ্ছ—শিশুগাছ ।

পিচ্ছলদলা—zizyphus jujuba.

পিজ্জল—কুশগাছ ।

পিটলী—[ স° পিডাল, পিডারা,  
কুরঙ্গ ; ও° জন্মাথাই, জন্দা ; হি°  
পিডারা ; তা° অট্টারাম্ ; তে°  
ইরিপোনাফু ] trewia nudiflora.  
এর ডাদি বগের বৃক্ষবি° । বসন্তকালে  
জন্মায় । ফল শক্ত সোলাকার ।  
পদ ও শ্রী পদ্পে ভিন্ন গাছে হয় ।  
আসাম, মালাকা, স্বীপপুঞ্জ ও  
বঙ্গদেশের জঙ্গলে বা নদীর ধারে  
জন্মায় ।

পিড়িগ—[ স° পুকা ] পিড়িগ শাক,  
trigonella corniculata ।  
শিবাদি বগের বর্ষায় শাকবি° ।  
ছোট । ত্রিপণ° । ফুল ছোট ছোপ  
পাতবণ° । বনপিড়ি—mililo-  
tus lencantha.

পিডথজুরী—পিডথজুর । থজুর  
দ্র° ।

পিডপদ্প—১ অশোক পদ্প, ২ জবা,  
৩ পদ্ম ; ৪ তগর, ৫ দাড়িম, ৬  
চীনা গোলাপ ॥ উইল° ॥

পিডপদ্পক—বাস্তুক, বেতো শাক ।

পিডফলা—তিতলাউ ।

পিডবীজ—কর্ণিকারবৃক্ষ ।

পিডবীজক—কর্ণিকারবৃক্ষ ।

পিডার—পিটলী । এক জাতীয় ফল  
শাক ॥ ভাবপ্র° ॥ trewia nudiflora.



পিণ্ডাল; পিণ্ডালক—[ ও° হাণ্ডিয়া  
আলু ] চুবড়ী আলু। [ আলু  
দ্র° ] পির আলু। শক্ত গুল্মজাতীয়  
উদ্ভিদ, *radia uliginosa*.  
পৰ্যায়—গ্রন্থি, পিণ্ডকন্দ,  
গ্রন্থি, রোমশ, রোমকন্দ, রোমালু,  
তামুলপত্র, নানাকন্দ, পিণ্ডক।

পিণ্ডীথেজুর—থজুর দ্র°।

পিণ্যা—ইণ্ডাদিবৃক্ষ।

পিপনাগিনী—১ শমীবৃক্ষ; ২  
কৃষ্ণতুলসী।

পিপ—(?) পাথরচুর। পাথরচুর  
দ্র°।

পিপলাশ—রাঢ়দেশে এই নামে  
এক জাতীয় বৃক্ষ হয়।  
তাহার পাতা ছাল জলে রংগড়াইলে  
হড়হড়ে লাল্য বাহির হয়। গ্রীষ্ম-  
কালে ফল ধরে।

পিপারমেন্ট—[ ইং peppermint ]  
তুলস্যাদিবর্গের শাকবিং; *men-  
tha peperita*.

পিপিরিসারা—*ponzobzia penta-  
ndra*.

পিপলী, পিপুল; পিপুল—[ স°  
পিপলী; মাগধী, কৃষ্ণা, উপকুল্যা,  
কণা; বৈদেহী; কটুবীজ; হি°  
পীপার; ম° পিপঠবী; ক°

হিপলী; গুল্জ° লিডীপীপল;]  
তা° পিপিলী; বো° বজাল  
পিপরিং; ফা° পিপলিপলদরাজ;  
অ° ডারিফল; কোচবিং—পিপলী;  
ইং long pepper.] পিপুল,  
*chadica roxburghii*, *piper  
longum*, *p. officinaum*.

তাম্বুলাদিবর্গের দীর্ঘলতাবিং।  
প্রকারভেদ—১ পিপলী—দাক্ষিণ  
বিহারে জন্মান্বয়। ২ গজাপলী—  
(চাবিকা বা চক্রেচর ফল) করি  
পিপলী। কচনাদিবর্গের স্থল  
দীর্ঘ লতা, প্রতানী, *scindapsus  
officinalis*. পাতা বড়-গোড়ায়  
বাসনা। পুষ্পগুঞ্জী খোলে ঢাকা।  
৩ সিংহলী, সিংহলী—[ সং  
সিংহপিপুলী ] জাহাজী  
পিপুল। সিঙ্গাপুর ও জাঞ্জিবার  
দেশ জাত। ৪ বনপিপলী—  
বঙ্গদেশে জন্মান্বয়। পাতা, মূল ও  
ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পিপল—অশথবৃক্ষ।

পিপলীকা—অশথীবৃক্ষ।

পিপাজ, পিপাজ—[ স° পলাডু; ইং  
onion ] পত্রাবৃত তীর গন্ধযুক্ত  
কন্দবিং। পাতা নলাকার।  
পলাডু দ্র°। *allium cepa*.

প্রকারভেদ—গম্বপিয়াজ—[ইং sh-  
allot] a. ascabonicum.

বাগানে ইহার চাষ আবাদ হয়।  
২ বনপিয়াজ—[সং বনপলাশু;  
হি° জফলি পেঁয়াজ; তা° নারী  
ভেঙ্গায়াম; তে° নাক্কাবাল্ল-গাড্ডা;  
ইং squill] কন্দজাতীয় বর্ষ-  
জীবী উদ্ভিদ, urguinea indica  
kunth. পাতা বাহির হইয়া ফুল  
হয়। মঞ্জরী উপচ্ছেদে ঢাকা থাকে  
না। গ্রীষ্মকালে ফুল ও বর্ষাকালে  
ফল হয়। ছোটনাগপুর, সিমলা,  
বঙ্গদেশ প্রভৃতিতে জন্মায়। ৩ ভূঁই-  
কন্দ পিয়াজ—[ইং bombay  
squill] scilia indica দক্ষিণ  
ভারতে সমুদ্রতীরে জন্মে।

পিয়াল—[সং অণ্ট; বহুবঙ্কল,  
শ্বেতহরীজ, ভক্ষবীজ, পিয়াল; হি°  
চিরৌজি, চিরঞ্জি; ম° চারোখঠঠী;  
গুজ° চাবোলী; ক° চারবীজ; তে°  
সারদুপ্পদ; কাটমরা; ও° চরু।  
ফা° বুক্লে খাজা; অ° হব্দস-  
সমানা] পিয়াল বা পিয়া,  
buchanania latifolia,  
chironjia sapida, spondias  
elliptica. আম্রাদিবর্গের আরণ্য-  
বৃক্ষবি°। পিয়ালবৃক্ষ দক্ষিণাভ্যে

সমুদ্রতীরবর্তী পর্বতীয় প্রদেশে  
জন্মে। ইহার গাঁড়ি মোটা, সোজা  
ও খুর উঁচু হয়। বহু শাখা  
সম্মিশ্রিত। পাতা ১০।১২ আঙুল  
লম্বা ও ৫।৬ হাত চওড়া। ফুল  
ছোট, শ্বেতাভ হরিদ্বর্ণ, ফল  
পাকিলে কাল হয়, মানুষে খায়।  
ফলে শ্বাদু তৈল আছে। ফল ছাল  
ও বীজের শাঁস ঔষধার্থে ব্যবহৃত  
হয়।

পিয়াল—[সং পীতশাল, নীলাসন;  
ও° অসন; হি° অসেন; ইং  
indian kino tree] আসন,  
pterocarpus morsupium.  
শিম্বাদিবর্গের বন্য বৃক্ষবি°।

পীচ—[ইং peach] পিচ্, prunus  
persica. মধ্যমাকার ইউরোপীয়  
ফলবৃক্ষবি°। ফল রৌপ্যবৃত্ত  
বর্ষাকালে পাকে।

পীডা—সরলবৃক্ষ, pinus longifolia  
। উইল°।

পীত—ওষধি চারাবি°। আতাইস।

পীতকন্দ—গাজর।

পীতকরবীক—পীতবর্ণ করবীপুপে  
বৃক্ষবি°। পষায়—পীতপ্রসব,  
সুগন্ধিকুম্ভম।

পীতকা—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা, ৩

ঋণ'ঋথকা, ৪ কুম্ভাণ্ড, ৫

ষোষলতা, ৬ পিড়িংশাক ।

পীতকাণ্ঠ—পদ্মকাণ্ঠ ।

পীতকীলা—আব'তকী লতা ।

পীতকদ্রুবক—পীতঝাঁটি ।

পীতচন্দন—হরিদ্রাবর্ণ চন্দন ।

পীতঝাঁটি—হলদে ঝাঁটি ফুলের গাছ ।

পীতদ্রু—১ সরলবৃক্ষ; ২ দারুহরিদ্রা ।

পীতনাশ—আনারস ।

পীতপাটলা—[ স° পাটেলী; হি°  
পাদার; তে° কালিগোট্র; বো°  
পাতাল ] আট-কপালী, ধারমার,  
*stereospermum tetragonum*.

বড় গাছ, প্রায় ৩০-৪০ ফুট উঁচু

হয় । বসন্তকালে পাতা ঝরে যায় ।

পীতফল—বৃক্ষবি°, *tropis aspera*.

পীতবর্ণ—১ তালবৃক্ষ, ২ কদম্ববৃক্ষ,  
৩ হরিদ্রবৃক্ষ, ৪ কাণ্ডনবৃক্ষ ।

পীতবল্ল—আকাশলতা, (চলিত)  
আলোকলতা ।

পীতবৃক্ষ—১ বড় সোনাগাছ; ২  
পীতলোম্ববৃক্ষ, ৩ সরল; দেবদারু  
। ভাবপ্র° ।

পীতমৃগ—সোনামৃগ ।

পীতমূলক—গাজরফল । পর্যায়—বসু,  
খড়ীর, প্রবেশ, জয়, শারদ ।

পীতমূলী—রেউচিলে ।

পীতবৃধী—ঋণ'জুই ।

পীতরক্ত—পদ্মকাণ্ঠ ।

পীতরক্তা—চাঁপাকলা ।

পীতরস—কেশর ।

পীতশলি—সরুধান ।

পীতশাল (সল)—[ হি° অসন;  
তে° মদি°; বো° অইন ] অসনবৃক্ষ  
॥ কালিকাপদ্ম° ৬৮ অ° ॥ বৃক্ষবি°,  
*pentaptera*.

পীতসহাচর—পীতঝাঁটি ।

পীতসার—অঁকোট গাছ ।

পীতসারক—১ নিমগাছ, ২ অঙ্কোট  
বৃক্ষ ।

পীতা—১ হরিদ্রা; ২ দারুহরিদ্রা, ৩  
বড় লতাফটুকী । ৪ প্রিয়ঙ্গু, ৫  
বনমাতুলছ, ৬ কর্ণিলিংশিংশা,  
৭ অতিবিষা, ৮ চাঁপাকলা, ৯  
দেবদারু, ১০ শালপর্ণী, ১১  
অম্বগন্ধা, ১২ আকাশলতা ।

পীতাক্ষ—১ শোয়ানাক ভেদ, ২ পীত  
লোম্ববৃক্ষ, ৩ নাগরঙ্গবৃক্ষ ।  
৪ হরিদ্রা ।

পীতান্নান—পীতঝাঁটি ।

পীতিকা—১ হরিদ্রা, ২ দারুহরিদ্রা,  
৩ ঋণ'ঋথী ।

পীতিনী—শালপর্ণী ক্ষুপ ।

পীতুদার—১ উদ্ভবর, ২ দেবদারু ।

পীনসা—কাঁকড়া ।

পীন্দর—flacouritic sapi.

পীপরি—ছোটপাকুড় ।

পীপুলিজঙ্গল—crotalaria sam.

পীবর—চারাগাছ, asparagus racemosus.

পীল—[স° গুড়ফল; বিরচনফল; হি° পীল; ম° থোরিপিল, কিস্কে; ও° খারীজালা; ক° মিরিয়ে উগনি; তে° গোলডচেট্ট; তা° কৌকু; ফা° দরখতে মিস্‌বাক্; অ° দিরাক্] salvadoro persica, s. indica, s. wightiana, s. oleoides. পীল গাছ ঝাপড়ি, বহুশাখ। কান্ড ককর্শ ও বিদীর্ণ হইয়া থাকে। ফুল ছোট, হরিদ্রাভ পীত ও বহুসংখ্যক। ফল; অতি ক্ষুদ্র, পিপুলের দানার চেয়েও ছোট। লাল, তীব্র সুগন্ধী। পাকা ফল স্বাদু; লোকে খায়। ফল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকারভেদ—১ পীল গাছ; ২ কণ্ডুক শাখ ও শরত্বে ফুল; ৪ কিস্কিরাত বৃক্ষ, ও কঙ্কনাদি দেশপ্রসিদ্ধ পীন গাছ, dillenia speciosa. ৬ মহাপীল—বৃহৎ পীলবৃক্ষ। পীলদনী—১ মর্বা, ২ কণ্ডুক শাক।

পীলপত্র—মোটালতা, (চলিত)

লতাকরাড়; ২ অশ্বস্তুকবৃক্ষ (চলিত) চলিতাগাছ।

পীলপত্রা—ক্ষীরমোরটা।

পুখা—hedyotis pumila.

পুইশাক, পুইশাক, পুতিকা—[স° উপোদকী, পোতকী, পুতিকা; হি° পোইকা শাক্; ম° মামাঠুঁদু লঘুবেথোর; ও° পোখী] basella alba; b. rubra. পুঁজিলরস খাদ্য লতা শাকবি; basella cordifolia. ইহাদের অনেকগুলি জাতি আছে—কাহারও ডাঁটা লাল; কাহার ডাঁটা শাদা। প্রকারভেদ—১ উপোদকী—পাকা ফল পেয়ে বেগুনে রংয়ের রস বাহির হয়। ২ বনজোপোদকী—অপেক্ষাকৃত সরু, লাল, yerra [স° বন্যোপোদকী] রক্তবর্ণ পুঁই, বনপুঁইশাক, basella rubra. ৩ ক্ষুদ্রোপোদকী—বাংলা নাম নাই। ৪ মূলপোতী—বাংলা নাম নাই।

পুঁড়ী আক—[স° পোঁড়ক ইক্ষু] [আখ বা ইক্ষু দ্র°]

পুগ—সুপারী।

পুঞ্জাতুক—জীবনবৃক্ষ।

পুট—জাতীফল।

পুটকন্দ—কোলকন্দ ।

পুটীকানি—১ পদ্মসমূহ, ২ পদ্মলতা ।

পুটিকা—এলা ।

পুটোদক—নারিকেল ।

পুডুরীক—১ শ্বেতপদ্ম, ২ সহকার,  
৩ দমনকবৃক্ষ, ৪ ধান্যবি° ।

পুডুরীক—স্থলপদ্ম ।

পুড্র—১ ইক্ষুভেদ, ( চলিত ) পুঁড়ি  
আক; saccharum offici-  
narum. ২ তিলকবৃক্ষ ।

পুড্রক—১ মাধবীলতা, ২ তিলকবৃক্ষ,  
৩ ইক্ষুভেদ ।

পুড্রকা—১ মাধবীলতা, ২ তিলকবৃক্ষ,  
৩ শুল্কজাতি পুস্পবৃক্ষ ।

পুড্রসাহস—পুডুরিয়া গাছ ।

পুণ্যগন্ধ—১ চম্পক, ২ স্বর্ণযুথিকা ।

পুণ্যতৃণ—শ্বেতকুশ ।

পুণ্যা—তুলসী ।

পুণ্ডিতকন্যা—পুণ্ডিতকা, পুণ্ডিনাশাক ।

পুত্রক—দমনকবৃক্ষ ।

পুত্রকন্দা—লক্ষণাকন্দ ।

পুত্রজননী—পুত্রদাত্রীবৃক্ষ ( ? ) ।

পুত্রজীব, পুত্রজীব—[ স° ] শ্রীপদাপহ,

পুত্রজীব, কুমারজীব, পুত্রজীবক;

পবিত্র, গভর্দ, স্নতজীবক; হি°

পি°তৌজিয়া, জিয়া-পুটজ; ম°

পুত্রজীবকবৃক্ষ, জীবনপুস্তর; গুজ°

পুত্রজীবক; তে° শীশ, কুবরজুবী°

জিয়াপুতা; জিয়া পুত, জিয়া-

পোতা, putranjiva roxbur-

ghii, nageia putanjiva. স্নদ্বি-

আদিবর্গের ছায়াতরু। উচ্চ হয়।

কাণ্ড সরল ও দীর্ঘ। কোলাপুত্রে

প্রচুর জন্মে। বাঙলায় প্রায় দেখা

যায় না। ফালগুন-চৈত্রে ফুল

হয়। ফুল ছোট-ছোট পীতভ

হরিদর্ণ। মানুষ্যের অভক্ষ্য।

ফল পোষ মাসে পাকে। লোকে

ইহার মালা গাঁথিয়া পরে। কাঠের

রং শাদা ও খুব শক্ত। পাতা ও

বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

পৰ্যায়—পবিত্র, গভর্দ, স্নতজীবক

কুটজীব, অপতাজীব, সিদ্ধিজ।

পুত্রদা—১ বন্দ্যাককোটকী, ২ লক্ষণা-

কন্দ; ৩ গভর্দাত্রীক্ষুপ, ৪ শ্বেত-

কটকারী; ৫ জীবন্তী।

পুত্রদাত্রী—মালব দেশ প্রসিদ্ধ লতাবি° ।

পৰ্যায়—বাতারি, ভ্রমরী, শ্বেত-

পুস্পিকা, বৃতপত্রা, অতিগন্ধালু,

বেশীজাতা, সুবল্লরী।

পুত্রপ্রদা—১ ক্ষরিকা, ২ বন্দ্যাক

ককোটকী।

পুত্রভদ্রা—বৃহজ্জীবন্তীলতা।

পুত্রশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গী।

পদ্মশ্রেণী—মুখিকপর্ণী, *salvinia cucullata*.

পদ্মিনী—[ স° পদ্মিন, রোচনী ; হি° পোদিনো; ফুদিনো ; অ° তুদানজ ; ইং wild minto, mint. ]  
তুলস্যাদিবর্গের শাকবি°, *mentha viridis*, m. *syvestis*.  
সুগন্ধযুক্ত। ইহার চাটনি হয়।  
বর্ষজীবী গাছ, গন্ধ অতিশয় উগ্র।  
ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার গাছ।  
কাশ্মীর ও বঙ্গদেশে চাষ হয়।  
পদ্মিনী তিন প্রকার—১ বন্য, ২  
পর্বতীয়, ৩ জলজ। উদ্যান  
পালিত কয়েকপ্রকার পদ্মিনী  
আছে। তাহাদের নাম—১  
*mentha viridis* (spear-  
mint), ২ m. *iucana* (pepper-  
mint), ৩ m. *sativa*, ৪ m.  
*aquatica*, ৫ m. *arvensis*.

পদ্মকা শাক—নটিয়া শাকবি°।

পদ্মনর্বা—[ স° বর্ষাভ্র ; হি°  
(শ্বেতপদ্মনর্বা) বিষখপরা,  
(রক্তপদ্মনর্বা) সাঁঠ, গদহপদ্মণী ;  
ম° ঘেটুটখী পত্বী ; ক°  
বিলিয়দ্ বেল্লড কিল ; তে°  
গালজের, অতিকমর্মেদি ; তা°  
ডুকরন্তেকিরে ; বো° পদ্মনর্বা ;

অ° হন্দকুকী ; ও° পদ্মনি ]  
সাপদ্মণ্য, গাদাপদ্মণ্য, পদ্মণ্য,  
*boerhaavia diffusa*, b.  
*erecta*, b. *repens*, *triathema*  
*monogyna*. ছোট শাকবি°।  
বহু শাখা-প্রশাখযুক্ত। ১ শ্বেত-  
পদ্মনর্বা—ভল্লুঠিতা, ফল  
পাকান্ত প্রভানবতী। উচ্চ সরস  
ভূমিতে জন্মায়। পাতা কোমল,  
মাংসল ও প্রায় গোলা। ফুল  
শাদা। বীজ নটেশাকের বীজের  
মত। পর্যায়—বৃশ্চিরা, চিরাচিকা,  
বিশাখ, কঠিল্ল, শশিবাটিকা, পৃথ্বী  
সিতবর্ষাভ্র, ঘনপর্দ, কাঠিল্লক।  
২ রক্তপদ্মনর্বা—ফল পাকান্ত  
নহে। ইহা মূল শব্দক হয় না।  
পদ্মনায় ইহা হইতে জন্মায়।  
পাতা (পাতনা), ডাঁটা ও  
ফুল লাল। শাক কষায়। রাঢ়  
দেশে ইহার শাক খায়। মূল  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—  
শোধয়ী, বর্ষাভ্র, প্রাব্যায়ণী,  
কঠিল্লক, রক্তপত্রিকা, সারিণী,  
বৈশাখী। ৩ নীলপদ্মনর্বা—  
কৃষ্ণবর্ণ স্বনামপ্রসিদ্ধ শাক।  
পর্যায়—নীলা, শ্যামা, কৃষ্ণাখ্যা,  
নীলবর্ষাভ্র, নীলিনী।



পুনর্ভব—রক্তপুনর্ভব।

পদ্মাগ—[ স° পদ্মাগ, শব্দপদ্মপ ;

হি° পদ্মাগ, পদ্মাক, সুলতান-

চম্পক ; ও° পদ্মাগ, পদ্মাং ;

গুজ° পদ্মাগ, সুরপদ্মাগ ; ম°

গোড়ী উজ্জীন, কডবী উজ্জীন ;

ক° সুরহোস্তেরভেদ ; তে° সুর-

পোমচেট্ট ; তা° পিঙ্গ ; ইং

mast wood, alexandrian

laurel ] পদ্মাং, দীর্ঘাকার পদ্মপ-

বৃক্ষ, mallotus philippinen-

sis, callophyllum inoph.

নাগকেশরাদিগের তরুবি°।

উড়িয়ায় প্রচুর জন্মে। বহুশাখ

হারাভর। কান্ড প্রায় সরল হয়

না। পাতা অশাখাকার। শিরাবহুল,

মসৃণ, ফুল বড়, সাদা ও সুগন্ধি।

পাকিলে হরিদ্রাভ পাত। বীজ

থেকে তেল হয়। তেল তিক্ত ও

সুগন্ধি ( পদ্মাং তেল—

pinney oil )। পাতা ও ফুল

ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। কঁড়ি

হইতে হরিদ্রা রং তৈরি হয়।

পৰ্যায়—পদ্মবৃষ, তঙ্গ, কেশর,

দেববল্লভ, কুষ্ঠীক, রক্তকেশর,

পদ্মামন, পাটলদ্রুম, রক্তপদ্ম,

রক্তরেণু, অরুণ। ১ সুরপদ্মাগ—

[ স° বৈদ্যক ] ochrocarpus

longifolius, পাতা পদ্ম, প্রতি

গাটে তিনটি থাক। চট্টগ্রাম,

উড়িয়া প্রদেশে ও ভারতের পশ্চিম

উপকূলে জন্মায়। ঔষধার্থে

ব্যবহৃত হয়। ৥ রাজনি°, রাজব° ॥

পদ্মাট, পদ্মাড়—চট্টমদ°।

পদ্মামন—পদ্মাগবৃক্ষ ( ? )।

পদ্মহৃদ—উল, imperata cylina,

২ তৃণবি°, saccharum cylin-

dricum.

পদ্মাসিনী—সহদেবী লতা।

পদ্মীমোহ—ধূস্তুর ( ? )।

পদ্মবৃষ—পদ্মাগবৃক্ষ, ২ তিলবৃক্ষ।

পদ্মক—তুচ্ছান্য।

পদ্মাক—তুচ্ছান্য, আগড়া।

পদ্মা—লাগলীবৃক্ষ।

পদ্মকর—১ অমিফল, খড়্গফল, ২

পদ্ম।

পদ্মকরক—পদ্মকর মূল।

পদ্মকর কর্ণিকা—স্বলপশ্চিমনী।

পদ্মকরনাড়ী—স্বলপশ্চিমনী।

পদ্মকরপণ—পদ্মপত্র।

পদ্মকরপর্ণিকা—পদ্মকরপর্ণী, স্বল-

পশ্চিমনী।

পদ্মকরমূল—কামীরজাত মূলবি°।

orris root. Iris germanica.

পৰ্যায়—মূল, পদক, পদ্মপত্রক;  
পদকরিণী, কীর, পোঁকর,  
পদকরাহর, কাশ্মীর, ব্রহ্মতীর্থ;  
বাসারি, মূলপদক, পদকরজটা,  
পদকরশিকা। ঔষধার্থে ব্যবহৃত।

পদকরকমূল—১ কদম্ববৃক্ষের মূল, ২  
পদ্মমূল।

পদকরণীজ—পদকরমূল।

পদকরশিকা—১ পদকর মূল, ২ পদকর  
সাগর।

পদকরাখা—পদকরাহর।

পদকরাদি—গণ যথা—পদকর, পদ্ম,  
উৎপল, তমাল, কুমুদ, নড়, কপিথ,  
বিষ, মৃগাল, কদম্ব শালুক বিগহ,  
করীষ, গিরীষ, যবাস, প্রবাহ,  
হিরণ্য, কৈরব, কল্লোল, তট, তরঙ্গ,  
পঙ্কজ, সরোজ, রাজীব, নালীক,  
সরোরূহ, পটক, অরবিষ, অশোজ, অঙ্গ, কমল, পয়স।

পদকরাদ্য—পদকর মূল।

পদকরাদ্যা—স্থলপাশ্মিনী।

পদকরাহর—পদকর মূল।

পদকরাহর—পদকর মূল।

পদকরিণী—স্থলপাশ্মিনী, পদকর  
মূল।

পদটি—১ অশ্বগন্ধা, ২ বৃক্ষ, বৃক্ষ  
নামক ওষধি।

পদটিদ—১ অশ্বগন্ধা, ২ বৃক্ষ নামক  
ওষধি।

পদ্প—১ পদকর মূল, ২ লবঙ্গ।

পদ্পগণ—অর্ক প্রকাশ চিকিৎসায়

উল্লিখিত চার প্রকার স্থলপদ্ম—  
সেবতী, গুলদাবতী, নেপালী,  
গুলাব, গুলাবাস, দাঁডনী,  
জাতী, ফটী, বাজবল্লী।

ছয় প্রকার ক্ষুদ্র যুথী—  
চম্পক, নাগচম্পক, বকুল,  
কদম্ব, কুন্দ, শিবমল্লী। দুই  
প্রকার কদম্ব। দুই প্রকার কেতকী  
—কিঞ্জিরাভ, কণিকার। দুই  
প্রকার অশোক—বাণপদ্প। চার  
প্রকার কদম্বক—তিলক, মূচু-  
কুন্দ। চার প্রকার বন্ধক—চার  
প্রকার জবা। দুই প্রকার বসুন্ধরী  
—অগস্তি, দমন, মারু, পপরী,  
বহুকণিকা, দুই প্রকার পাটলা,  
দুই প্রকার সিন্ধুযুথী। এই সকল  
লইয়া পদ্পগণ।

পদ্পগণা—শুদ্ধ যুথিকা।

পদ্পগবেধকা—নাগবলা।

পদ্পচামর—১ দমনবৃক্ষ, ২ কেতক  
বৃক্ষ।

পদ্পজাসব—পদ্ম, উৎপল, নলিন-  
কুমুদ, সৌগন্ধিক, পদুড়ীক,

শতপত্র; মধুক, প্রিয়ঙ্গু ও ধাতকী  
এই ১০টি পদ্য দ্বারা এই আসব  
তৈরি হয় ।

পদ্যপদ—বৃক্ষ ।

পদ্যপপিণ্ড—অগ্নোকবৃক্ষ ।

পদ্যপফল—সাদা কুমড়া ॥ কুমড়া দ্র° ॥

পদ্যপফল শাক—লাউশাক ।

পদ্যপফলা—কুম্ভাণ্ড লতা ।

পদ্যপমঞ্জরিকা—নীলপশ্মিনী ।

পদ্যপমঞ্জরী—ঘৃতকরঞ্জ, ঘোড়াকরঞ্জ ।

পদ্যপমৃত্যু—দেবনলবৃক্ষ ।

পদ্যপরক্ত—সদ্যর্মণিবৃক্ষ ।

পদ্যপরোচন—নাগকেশর ।

পদ্যপশুন্য—উদ্যবর ।

পদ্যপসৌরভ—কলিকারীবৃক্ষ, (চলিত)  
বিষলাক্ষলিয়া ।

পদ্যপহীন—উদ্যবরবৃক্ষ ।

পদ্যপা—বৃহচ্ছতপদ্যপা, (চলিত)  
শূলকা ।

পদ্যপিনী—১ ধাতকী, ২ তুলক (?),  
৩ স্বর্ণকিতকী ।

পদ্যপিশ্বী—শিষীল ভাভেদ ।

পদ্যই—পদ্যতিকা, পদ্যইশাক । প্রকার-  
ভেদ—সফেদ পদ্যই (বেল), basela  
alba, রক্তপদ্যই (বেল), basela  
cordifolia.

পদ্যগ—[স°] ক্রমুক, দীর্ঘপাদপ,

চিকণীপদ্যগ; হি° সুপারি; ম°  
সুপারি; গুজ° সুপারি; ক° অড-  
কেমর; তে° পাক্সায়া; উ° শূয়া;  
কো° গুয়া; ফা° পোপিল; অ°  
কোকিল; ইং peper betel]  
সুপারি, গুবাক, গুয়া, arca  
catechu. ১ গুবাক, ২ অকোট,  
৩ পনসবৃক্ষ, ৪ তুতবৃক্ষ, ৫ কট-  
কিবৃক্ষ । প্রকারভেদ—১ সৈরী,  
২ তৈলবর্ণ, ৩ গুহাগর, ৪ ঘোটা,  
৫ চেডল (সুগন্ধি কোকন দেশে  
প্রসিদ্ধ); ৬ বেলগুণ, ৭ চন্দ্রাপদ্য-  
রোম্ভব, ৮ আম্রদেশোরোম্ভব,  
(লাল) 'বনগুয়া' চট্টগ্রামে ও 'হাম-  
গুয়া' শ্রীহটে জন্মায় । এতিন  
'জাহাজী', 'শ্রীবধনী' 'মালগ-  
চন্দী' সুপারি আছে । কোচবিহারে  
দেশওয়ালী লোকে কাঁচা ব্যবহার  
করে । বুনীগুয়া আসামে জন্মায় ।  
পর্যায়—চিকণী, চিকা, চিকণ,  
সোণ্ডক, উষ্মগ, ক্রমুবৃক্ষ ।

পদ্যগম্ভ—প্রক্ষবৃক্ষ, পাবুড় গাছ ।

পদ্যগোট—১ হি°তালবৃক্ষ, হে°তাল  
গাছ, ২ এক জাতীয় খেজুর ।

পদ্যগিন্—গুবাক গাছ ।

পদ্যগীকল—গুবাক ।

পদ্যজ্যমান—শ্বেতজীরক ।

পদ্ম—১ শ্বেতকুশ, ২ ব'ইচি গাছ, ৩  
প্রক্ষবৃক্ষ, ৪ তিলকবৃক্ষ ও নিব'দ্য  
ধান্য, ৬ দূর্বা ।

পদ্মগন্ধ—বব'রক, কালিবাবুই শাক ।

পদ্মতৃণ—শ্বেতকুশ ।

পদ্মদ্রু—পলাশবৃক্ষ ।

পদ্মধান্য—তিল ।

পদ্মনা—হরিতকী, গন্ধমাংসী (?) ।

পদ্মফল—পনস, কাঁঠাল ।

পদ্মতা—দূর্বা ।

পদ্মিত—রৌহিষ তৃণ ।

পদ্মিতক—পদ্মিতকরঞ্জবৃক্ষ । পৰ্যায়—  
প্রকীৰ্ণ, পদ্মীকরজ, পদ্মিতকুরজ,  
পদ্মিতক, পদ্মীক, কলিকারক,  
কলিমাগক, কলহনাশন ।

পদ্মিতকটক—ইন্দ্রদীবৃক্ষ ।

পদ্মিতকরজ—করঞ্জভেদ । ইহা এক  
প্রকার কটু রসাস্রিত করঞ্জবি°  
॥ সমর্থ° ॥

পদ্মিতকটক—ইন্দ্রদীবৃক্ষ ।

পদ্মিতকাষ্ঠ—দেবদারু, সরলবৃক্ষ ।

পদ্মিতকাষ্ঠক—সরলবৃক্ষ ।

পদ্মিতকাষ—পদ্মিতকরজ ।

পদ্মিতগন্ধ—১ স্নগন্ধীবৃক্ষ, ২ ইন্দ্রদী  
বৃক্ষ ।

পদ্মিতগন্ধা—সোমরাজী ।

পদ্মিতগন্ধিকা—বাচুকী, পদ্মিতকা ।

পদ্মিতপল্লবা—১ রাজসুখবী (?),  
২ গল্লাকরলা (?) ।

পদ্মিতপদ্ম—ইন্দ্রদীবৃক্ষ, জিন্নাপদ্ম ।

পদ্মিতফল—সোমরাজী ।

পদ্মিতফলী—সোমরাজী । পৰ্যায়—  
অবলংগুজ, বাচুকী, সুপর্ণিকা,  
কুণ্ঠয়ী, পাশিলেখা, কৃষ্ণফলা,  
সোমা, সোমবল্লী, কালমেঘী ।

প্রতিবব'রী—বনতুলসী ।

পদ্মিতবাত—বিল্ববৃক্ষ, aegle mar-  
melos.

পদ্মিতবৃক্ষ—শোনাক, bignonia  
indica.

পদ্মিতমজ্জা—ইন্দ্রদীবৃক্ষ ।

পদ্মিতময়রিকা—১ অজগন্ধা, ২ বন্য-  
তুলসী ।

পদ্মিতমারুত—বিল্ববৃক্ষ ।

পদ্মিতমেদ—অরিমেদ, বিটখদির ।

পদ্মিতযদ্বলা—রৌহিষতৃণ ।

পদ্মিতরজ্জু—লতাভেদ ।

পদ্মিতশাক—বকবৃক্ষ ।

পদ্মিতৈলা—জ্যোতিষ্মতী, নল্যাফটকী ।

পদ্মিতদলা—তেজপত্র ।

পদ্মিতপত্র—১ বড় সোনা গাছ, ২ পীত  
লোহ ।

পদ্মিতপর্ণ—১ করঞ্জবৃক্ষ, ডহরকরঞ্জা  
২ ইন্দ্রদীবৃক্ষ ।

পাতীক—পাতিকরঞ্জ ।

পাতীকরঞ্জ, করঞ্জরঞ্জ—১ করঞ্জা,  
২ নাটাকরঞ্জা ।

পম্ব—[ ইং mulberry ] morus  
indica.

পক্কা—পিড়িং শাক ॥ রাজনি° ॥ trigo-  
nella corniculata.

পশ্চিমপণী—[ স° লক্ষ্মদুমান, শৃগাল-  
বিনা, চিত্রপণী, চক্রপণী ; হি°  
পিঠখন, পিঠোনা ; ম° পীঠবন,  
গুজ° পুটপণী ; ক° নরিয়ল  
বোনে, তোরে মোত ; তে°  
কেল্লাকদুপন ; উ° কুটপণী ; কো°  
পিঠানী, চাকুলে ] চাকুলে,  
চাকুলিয়া, uraria logopoides,  
u. picta. ২৩ হাত উচ্চ  
ক্ষুদ্রবি° । বর্ষাশেষে অক্ষুরিত ও  
বসন্তে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় । মূল বা  
সমগ্র ক্ষুদ্রপ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

পশ্চিমপণী—পশ্চিমপণী ।

পেঁপে—[ স° পপীতা, পপোতা ; হি°  
পেঁপিয়া ; গুজ° পপায়ী ; অ°, ফা°  
অম্বালিহি°ড ; ক্যানারিজ—পপ্যান  
গয়ে ; তা° পপায়ী ; মলয়লম—  
কপলম ; তে° বপৈয়া পপু ; ও°  
ভাডা ; অমৃতভাডা ; প° অরুণ্ড,  
অরুণ্ডা ; ইং pop, papaw, pa-

pénd tree ] পেঁপে, পেঁপিয়া ;  
carica papaya. নিউগিনি ইহার  
আদি জন্মস্থান । ১৬শ শতাব্দীতে  
পতুগীজরা এদেশে আনিয়াছিল ।  
পুং ও স্ত্রীপদ্যে ভিন্ন গাছে হয় ।  
ভারতের সর্বত্র জন্মায়, কাঁচা অব-  
স্থায় রন্ধন করিয়া খাইতে হয়,  
পাকা অবস্থায় মিষ্ট ।

পেটোরী—[ স° পেটিকা ; ও° পেড়ি-  
পেড়িকা ] জবাদিবর্গের আরণ্য  
ছোট গাছ, abutilon asiatic-  
um, a. indicum. সম্মুখকালে  
ফুল ফোটে । ফল শীতকালে  
পাকে ।

পেয়ারাজ, পেঁয়াজ—[ স° পলাডু ; ইং  
onion ] allium cepa. পলাডু  
দ্র° ।

পেয়ারা—[ স° পারেবত ; হি° সরিফা ;  
অমরুৎ ; তা° বিল্লয় গোয়াপকাম ;  
তে° ইরাজাম পশু ; অ° অমরুৎ ;  
ইং guava ] পেয়ারা, পিয়ারা,  
psidium guava, p. pyri-  
ferum. আমেরিকার গাছ ।  
জন্মকাদিবর্গের ছোট ফলতরু  
বি° । বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ফল হয় ।  
ফল মাদা । কাশী, পাটনা ও  
প্রয়াগ অঞ্চলের পেয়ারা উৎকৃষ্ট ।

পেবণ—বিধার স্নাইবৃক্ষ, তেঁকেটা  
সিজ।

পেস্তা—[ স° পিস্ত, অভিষুক ; ফা°  
পিস্তে ; ইং pistacia nut-]  
আম্রাদিবর্গের বৃক্ষবি° । pistacia  
vera. আফগানিস্তানের পশ্চিম  
বালকদেশ হইতে কাবুলীরা  
ভারতে আনে।

পৈড় (উড়িয়া)—ডাব।

পোয়াল (দেশজ)—তৃণ।

পেটগল—১ খাগড়া, ২ কাশ, কেশ।

পোতকী—পুঁইশাক।

পোদিকা—কলম্বীশাক।

পোরেশ—thespesia populuesides.

পোরেশ পিপুল—thespesia popu-  
luesides.

পোষ্ট—পুতীক, কাঁটাকরুণ।

পোস্ত—[ স° অহিফেন, পোস্তবীজম্ ;  
নেপাল—আফিম ; প° খসখস,  
পোস্ত, ছোদ, আফীম খিসখিস ;  
গুজ° আফিনা, পোস্ত,  
খুশখুশ ; দাক্ষিণাত্য—আকিম,  
খশখশকে ; বো° খসখস ; তা°  
অবিনি, গশগশ, পোস্তকতোল,  
গশগশ তোল, কসকস ; তে°  
অভিনী, গসগসাল তোলা,  
গসগসাল, কসকস ; ইং poppy ]

papaver somniferum. বন্য  
পোস্তদানার গাছ, papaver  
setigerum, লাল দানা গাছ—p-  
rheas, p. dubium.

পোম্বক—ইক্ষুভেদ। পুঁড়ীআক ॥  
রাজনি ॥ পর্ষায়—পোম্বক,  
ভীরুক, বংশক, শতপোরক, কাস্তার,  
তপেসেক, কাণ্টেক, সূচিপত্রক,  
নৈপাল, দীর্ঘপত্র, নীলপোর,  
কোশকুণ।

পোম্বক—১ পুঁকরমূল, ২ পম্বমূল,  
৩ এরডমূল, ৪ মূলপম্ব।

প্রকর—পুঁপাদির স্তবক।

প্রকীর্ষ—১ করুণভেদ, নাটাকরুণ, ২  
ঘাতকরুণ, ৩ রীঠাকরুণ।

প্রগম্ব—পপটি (?)।

প্রগ্রহ—কর্ণিকারবৃক্ষ।

প্রচডম্বতি—বরুণবৃক্ষ।

প্রচেতসী—কটফল।

প্রচোদনী, প্রচোদিনা—কটকারিকা।

প্রতিপত্রফলা—ছোট উচ্ছে।

প্রতিপর্ণাশিকা—দ্রবস্তীবৃক্ষ।

প্রতুডক—জীবক শাক।

প্রত্যকপর্ণী—রক্তাপাগা, দ্রবস্তী,  
দস্তীবৃক্ষ।

প্রথমকস্ম—শুক্লমরুবকবৃক্ষ, শ্বেত  
বকফল।



প্রথমা—হরীতকী ।

প্রপথা—হরীতকী ।

প্রপদ্মাড়, প্রপদ্মড়, প্রপদ্মাট, প্রপদ্মাড়,

প্রপদ্মাল—চক্রমর্দ; বাকৃন্দিয়া

বৃক্ষ ॥ সমর্থ ॥

প্রপারিকা—কটকারী ।

প্রপৌণ্ডরিক—শালপর্ণী বৃক্ষের ন্যায়

পত্র ও পদ্পর্বাংশট বৃক্ষবিং ।

রাজর্নিং ॥

প্রবাল—রক্তোৎপল ।

প্রভদ্র—নিম্ব ।

প্রভাকর—অর্কবৃক্ষ ।

প্রভাতীক্ষাদন্ধা—সরিষা ।

প্রমদ—ধন্তুর ফল ।

প্রমদ—সুগন্ধিযুক্ত বৃক্ষভেদ ।

প্রমোদক—শালিধান্যবিং ।

প্রমোদিন—জিহ্নিনীবৃক্ষ ।

প্রমোহ—নিম্ববৃক্ষ ।

প্রম্ব—লতাক্ষুর, তালের শোঁটা,

শশার বীজ ।

প্রম্বক—গন্ধখড় ।

প্রসবক—পিয়ালবৃক্ষ ।

প্রসাতিকা—সুস্বাদু খানা ।

প্রসাদক—দেধান, বেতোশাক ।

প্রসারণী—[ স° সরলী, প্রতানিকা,

চারুপদ্মপী; হি° গন্ধপ্রসারণী,

পসরং; তে° গোষ্ঠেমগোরু

চেট্ট, সবিরেল চেট্ট; কো°

বন্ভদালে ] গাদাল, গন্ধ-

ভদালে; *po:deria foetida*.

বৃক্ষাশ্রিত আরণ্যলতাবিং । পাতা

মর্দনে একরকম দুর্গন্ধ বাহির হয় ।

পর্বাণ—সুপ্রসরা, সারিণী, প্রসরা,

চারুপর্ণী, রাজবলা, ভদ্রপর্ণী,

প্রতানিকা, প্রবলা, রাজপর্ণী,

ভদ্রবলা, চন্দ্রবল্লী, প্রভদ্রা । ঔষ-

ধার্থে ব্যবহৃত হয় ॥ রাজর্নিং ॥

প্রসারিন্—১ লংছালদুলতা, ২ দেধান ।

প্রসদ—১ কদলী, ২ বীরুলতা ।

প্রস্তরপী—শ্বেত দর্বা ।

প্রস্তরভেদ—পাথরকুচা ।

প্রস্থিকা—১ আশ্রিতকবৃক্ষ, ২ পদ্দিনা ।

প্রহর্ষণী—হরিদ্রা ।

প্রহসন্তী—১ ঘৃথী, ২ বাসন্তী ।

প্রাকফল—[ ফল না হইয়া ফল হয় ]

কাঠাল ।

প্রাচীনা—১ বনতিষ্ঠিকা, আকর্নাতি,

২ রাশনা ।

প্রাচীনামলক—পানি-আমলা । ভাবপ্র° ॥

আমলকী দ্র° ।

প্রাতিকা—জবাবৃক্ষ ।

প্রাব্যায়ণী—আলকৃশী ।

প্রাব্যেষণ—১ কদম্ববৃক্ষ ২ কটজ

বৃক্ষ ও ধারা কদম্ব ।

প্রাবৃষণ্য—১ কর্পিকচ্ছ, ২ রক্ত  
পদনর্বা।

প্রাবৃষ্য—১ কুটুহ, ২ ধারাকদম্ব,  
৩ বিকটক।

প্রামাদা—১ বাসকবৃক্ষ ২ অটরুদ্ববৃক্ষ।

প্রিয়—১ বেতসলতা, ২ ধারাকদম্ব,  
৩ প্রিয়ঙ্গু।

প্রিয়ক—১ পিয়াশালবৃক্ষ ২ ধারাকদম্ব;  
৩ মহাকদম্ব, ৪ প্রিয়ঙ্গু; ৫  
অসনবৃক্ষ।

প্রিয়কাম্য—উদ্ভিদভেদ, *terminalia*  
*tamentosa*।

প্রিয়কর—১ বৃহজ্জীবন্তী, ২ শ্বেত  
কটকারী; ৩ অশ্বগন্ধ।

প্রিয়ংগু—[ স° গন্ধফলী, গন্ধপ্রিয়ংগু;  
হি° ফুলপ্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গু,  
ফুলফেল; ম° গম্বলা; গুজ°  
খডলা; ক° নেপিলগু; তে°  
প্রেক্ষণপুচেট্ট; তা° প্রিয়ঙ্গু;  
বো° গহনী ] প্রিয়ংগু গন্ধপ্রিয়ঙ্গু;  
*aglaia roxburghiana*। নিম্বাদি  
বর্গের মধ্যমাসুতি বন্যবৃক্ষবি°।

প্রিয়ঙ্গুবিগক দ্রব্য। এক প্রকার  
কটা রংয়ের ছোট ফলবি°।

পূর্বকালে শ্রীলোকেরা অনুলেপ-  
নাত্ব ব্যবহার করিতেন। সুগন্ধী।

পাঁচ পর্ণে পাতা। পশ্চিম ভারত,

বিহারে জন্মে। পর্যায়—শ্যামা,  
মহিলহুয়া, লতাগোবন্দনী, গুন্দ্রা,  
ফলিনী, ফলী, বিশ্বসেনা, গন্ধফলী,  
কারুন্ডা, প্রিয়ক, প্রিয়বল্লী,  
ফলপ্রিয়া, গোরী, বৃন্তা কঞ্জ,  
কঙ্কনী, ভঙ্কুরা, গোরবল্লী,  
সুভগা, পর্ণভেদিনী, শূভা,  
জীতা; মুল্যা, শ্রেয়সী। প্রকার-  
ভেদ—১ রাজিকা, ২ পিঙ্গলী, ৩  
কন্দু ৪ কটুকী, ৫ ধাতকী।

প্রিয়তমা—মহুরেশিখাবৃক্ষ (?)।

প্রিয়দর্শন—ক্ষীরিকাবৃক্ষ।

প্রিয়শালক—শালবৃক্ষবি°।

প্রিয়াম্বু—আম্রবৃক্ষ।

প্রিয়াল—[ হি° পিয়াল; পিয়াল,  
পিয়াল, চিরোজী; প° চিরোলী,  
চিরোজী; গড়বাল;—পিআল,  
পিয়াল, মুরিয়া, কাট্‌ভিলবা;  
ও° চরু; বো° পিয়াল, চারোলী ]  
পিয়াল, *buchananía lati-*  
*folla*। পর্যায়—চার, অখট্ট, খর-  
ক্ষু, ললন, চারক, বহুবৃক্ষ,  
সমুদ্র, তাপসপ্রিয়, স্নেহবীজ,  
উপবট; মক্ষবীষ, পিয়াল, বহুল-  
বৃকল, রাজাদন; তাপসেণী,  
সমিকদ্রু, ধনুপট।

প্রিয়াল—দ্রাক্ষা।

প্রোংফল—তালবৃক্ষ । পর্যায়—

সিংহলাঙ্গুল, ছড়ী, ছটা, পিজা ।

প্রক্ষ—[ স° সুপার্শ্ব, চারদর্শন,

ক্ষীরী ; হি° পাকড়, পাকর ; গুজ°

পিপৰ্ব ; ক° বসুদরি ; কো°

পাকড়ী ] পাকড় গাছ, *flicus*

*infectoria. f. religiosa.*

পাকড় দ্র° । হৃষপ্রক্ষ পাকড়—দ্র° ।

প্রক্ষাদি—প্রক্ষ ; নাগ্রোধ, অশ্বখ, ইজুদী,

প্রিগ্র, করু, কক্ষতু, বৃহতী ।

প্রব—পকটীদ্রুম ।

প্রবক—প্রক্ষ ।

প্রবগ—শিরীষবৃক্ষ ।

প্রবজ—প্রক্ষবৃক্ষ ।

প্রাক্ষ—প্রক্ষবৃক্ষের ফল ।

প্রীহয়—রোহিতক গাছ ।

প্রীহশত্রু—বয়ড়া গাছ ।

প্রীহারি—অশ্বখ গাছ ।

## [ ফ ]

ফঞ্জিকা—১ দেবতাড়, ২ দুরালভা ৩

দাণ্ডিবৃক্ষ, ব্রাহ্মণ্যটিকা ।

ফঞ্জিপত্রিকা—আখুপণী, *salvinia*

*cucullata.*

ফঞ্জী—১ ভাগী, বামুনহাটী, ২

বৃন্দদারকাঁবি, ৩ দান্তিবৃক্ষ, ৪

কৃষ্ণোদুশ্বরিকা ।

ফণিজা—ফণিমনসাবৃক্ষ ।

ফটকী—[স° কটভী ; ও° ফুটফুটিয়া]

শিবকুলি, *cardiospermum*

*halica.* আরণ্যলতাবি° । পাতা

বিধা । প্রিপণ° । ফুল সাদা, প্রায়

বার মাস হয় । ফুলদল চারি, কেশর

আট । ফল ত্রিকোষ । ২ নয়া ফটকী

—[স° লতাকটভী, পারা-বতার্ঘ্য]

ফণিজা—ফণিমনসার গাছ ।

ফণিজিহ্বা—মহাশতারবী ।

ফণিজিহ্বিকা—শ্বেতশারিবা, মহাশতা-

বরী ।

ফণিম্বক—১ ক্ষুদ্রপত্র তুলসী, ২ রক্তবর্ণ

তুলসী, ৩ জম্বীরভেদ, ৪ রাম

তুলসী, *ocimum gratissimum.*

পর্যায়—সমীরণ, মরুবক, প্রস্থ-

পুষ্প, জম্বীর ।

ফণিভাষিকা—কৃষ্ণোদুশ্বর, কাবডুম্বর ।

ফণিমনসা—[স° কস্থারী ; হি° নাগ-

ফণা] *opuntia dillenii.*

ফণিলতা, ফণিবল্লী—নাগবল্লীলতা,

( চলিত ) পানগাছ ।

ফণিহং—ক্ষুদ্র দুরালভা ।

ফরদ—ক্ষুদ্রবৃক্ষি°, erythrina indica.

ফরেন্দ্র—জন্মবৃক্ষ।

ফল স্টক—পনসবৃক্ষ, কাঁচালগাছ।

ফলগা—চাটগায়ে শিঠি গাছের নাম  
ফলগা। শিঠি দ্র°।

ফল্গু—কাকডুমুরক ফল্গু বলে  
॥ রাজব° ॥

ফলাঢ্যা—বনকলা।

ফলাগিফা—কারবেল্লী, উচ্ছে।

ফলাধ্যক্ষ—রাজাদনবৃক্ষ।

ফলান্তি—বিশ।

ফলায়—অম্বেতস।

ফলান্ধ—নারিকেলবৃক্ষ।

ফলিকা—নিপাবী ববটী।

ফলিন—১ পনসবৃক্ষ, ২ শ্যোনাক  
বৃক্ষ।

ফলিনী—১ প্রিঙ্গবৃক্ষ। ২ অগ্নি-  
শিখাবৃক্ষ, ৩ তালমূলী (?), ৪  
নখকরঞ্জ বৃক্ষ, (চলিত) মেইদী, ৫  
বিষলাঙ্গলিয়া, ৬ শ্যোনাকবৃক্ষ।

ফলী—১ প্রিঙ্গবৃক্ষ, ২ তালমূলী;  
৩ আম্রাতক বৃক্ষ।

ফলেন্দ্র—বৃহদাকার জামফল। পর্যায়  
—নন্দ, রাজজন্ম, মহাকলা,  
সুর্ভাগ্য, মহাজন্ম, ॥ রাজনি° ॥

ফলেপাকী—গম্ভীরাবৃক্ষ বিশেষ।

ফলেপা—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রপবি°। পর্যায়  
—দ্রোণা, দ্রোণপদুপী।

ফলেরুহা—পাটলবৃক্ষ, পারুলগাছ।

ফলেলাক্ষ—জীবনবৃক্ষ।

ফলোত্তমা—১ কাকলী দ্রাক্ষা, ২ দক্ষিণা,  
৩ দ্বিফলা।

ফলোৎপত্তি—আম্রবৃক্ষ।

ফল্গু—কাকডুমুর।

ফল্গুনী—কাকোদম্বরিকা।

ফল্গুবৃন্তাক—১ পীতলোধবৃক্ষ, ২  
শ্যোনাকবি°।

ফল্গুবৃন্তাক—শ্যোনাকভেদ।

ফান—অপকৃষ্ণ উদ্ভিদবি°।

অবীজক; বাংলাদেশের সমতল-  
ভূমিতে অনেক প্রকার ফান  
জন্মায়। স্যাঁতসেতে জায়গা,  
বর্ষাকালে গাছের ডালে অনেক  
রকম ফান দেখতে পাওয়া যায়।  
প্রকারভেদ—*angiopteris ivecta*  
*acrosticum* *surivinum*.  
ইত্যাদি।

ফাঙ্গুন—১ অর্জুনবৃক্ষ, ২ দর্বাভেদ।

ফুটী—[স° চিঁড়িট, ফুটি; হি°  
কচিঁড়িয়া, গুরুভাইহঁ; ম° চিবুত;  
গুজ° চিভাং; তে° বড়রংগ  
পণ্ড] ফুটি, পাকা কাঁকড়।  
*cucumis* *momordica*, c.

melo var momordica. কুম্ভাসাদিবর্গের ফললতাবি°। ফল কাকিড়ের মত কিন্তু লম্বা, চিকণ, পাকিলে ফাটিয়া যায়। হলুদে ও সবুজে মিশ্রিত পাতা।

ফুরুশ—*Lagarstroemia indica*. খাতকাদিবর্গের উদ্যানজাতীয় পুষ্পক্ষুপবি°। ফুল বড়, লাল, অল্প শাদা। ফুল ষট্‌দল কিংবা, কুক্ষিতধার কেশর অনেক। বর্ষা-রম্ভে ফুটে।

ফুলকপি—[ই° cauliflower] পত্র-বেষ্টিত ফুলের মত বৈদেশিক সবজী, *brassica oleracea caulifolia*, কপি দ্র°।

ফেনা—সাতলা ক্ষুপ।

ফুলসে—*Aeschynomena aspera*.

ফেনিলা—[স° অরিষ্ট] বড়রিঠা, *sapindus emarginatus vahl*.  
২ ছোটরিঠা, *s mukorossi gaertn*.

## [ ব ]

বাংশ—[তা° মনুগিল ; তে° কটিকই ; যদরু ; ইং bambu] বাঁশ, *bambunia dinacea*. ২ তলতা বাঁশ। বাংলাদেশে অধিক পরিমাণে জন্মে। ৩ বেগু।

বাংশকইক্ষু—ইক্ষুবি°। সামসাড়া নামক ইক্ষু।

বাংশপত্রী—নাড়ীহিংগু তুর্গবি°  
॥ রাজনি° ॥

বাংশিক—অগরু দ্র°।

বাইচ—[স° বিকঙ্কত] বৈকঙ্কত বৃক্ষ।

ফলবৃক্ষ। গ্রাম্য ও বন্য কষ্টকা-

কীর্ণ-শাখ ক্ষুদ্র বৃক্ষ ও ক্ষুপবি°। ফল ক্ষুদ্র গোল ও বাঁজগত। কাঁচায় লালবর্ণ ও পাকিলে কালো।

বক—[স° অগস্তি, অগস্তপদ্ম, বক্র-পদ্ম ; গুজ° অগাথিয়ে ; ক° অগস্তো] বকপদ্মবৃক্ষ ; বাসনাফুল ২ পলাসবৃক্ষ। অগস্তি দ্র°। *sesbana grandiflora*, agati g. সরল, চিকণ, লোমশূন্য ; বর্ষজীবী উদ্ভিদ, *linderine pyxidaria*.

বকমকাষ্ঠ—[স° পট্টাকু, পট্টরক্ষ ; পট-

রঙ্গ; হি° বক্স; ইং sapon wood] caesalpinia sapon. কাণ্ডনাদিবর্গের মধ্যমাকৃতি বৃক্ষ-বি°। ডাটা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়। ব্রহ্মদেশে অধিক জন্মে।  
বকুল—[ স° সীধুগন্ধ, শীর্ষ-কেশরক; হি° বকুল, মূলসরি, মৌলসরি; ও° বেলেসরী, বউল-কাড়ি, বর শোলী; গুজ° বোলঝারি; ম° ওভানি বকুঠধ; মালয়—এলেনগি; তে° পাবড়া, পোগড়চেট্টু; দ্রা° ঘোলসরি; ইং 'pointed leaved mimusops'] প্রসিদ্ধ ঘনপত্র পদ্যপর্ব, mimusops elengi, চিরশ্যালবৃক্ষের অন্যতম।  
দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ। ভারতে সর্বত্র, আন্দামান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ৪০-৫০ হাত উচ্য। ফল ছোট, সাদা ও তীব্রগন্ধ। ফুল হইতে আতর তৈরী হয়, কাঠ শক্ত ভারী, ভেতরের কাঠ লাল, বাইরের কাঠ লাল আভা বৃক্ষ ধূসর বর্ণ; গ্রীষ্ম কালে ফুল, বর্ষায় লাল ফল হয়। পর্ষায়—বকুল; সীধুগন্ধ, মধুপদ্যপ, শ্রী-মদ্যদোহন, সুরভি, লমরানন্দ, মদ্যামোদ, চিরপদ্যপ, করক,

শারদিক; ধন্বী° রাজনি°° রাজব°, ভাবপ্র°।

বক্রপদ্যপ—বকফুলের গাছ।

বক্রাণ—বেতুগাছ° উইল°।

বজ, বজন—[ হি° বৈগন; ই° egg plant ] বেগুন, বাতাকু, solanum melongena.

বচ, বচা—[ স° কুলঞ্জ, শ্বলগ্রাহি; ইং sweet flag ] কন্দবি°, zingiber zerumbet. প্রকার

ভেদ—১ অরুণবর্ণ বচ—[ স° ক্ষুদ্রপর্ণী, ইক্ষুপর্ণী, উগ্রগন্ধা; হি° উচ্; ম° বেব্ব; গুজ° ঘোড়াবজ; তা° বশম্ব; ] কচু

আদিবর্গের শার্কবি°° ভাবপ্র°, রাজনি°° হিমালয়ের পর্বতীয় প্রদেশে জন্মে। ২ শ্বেত বচ—

গোরা বচ। আকরকোরা, acorus calamus, ৩ মালাবর বচ, ৪ মহাবরী বচ, ৫ স্নগন্ধা বচ alpinia-galanga, °° বেল°°

বচাদিবর্গ—বচা, মৃত্যু, দেবদারু। শৃষ্ঠ, আতাইচ°° জ্ঞা°°

বজরা—[ ই° bullrush spiked millet ] বাজরা দ্র°।

বজ্রকণ্টক—কোকিলাক্ষ বৃক্ষ, কদলেখাড়া।



বজ্রদন্ত—পর্বতীয় শাকবি°। পাতা  
লোমশযুক্ত, শাদা। ইহার পাতা  
সহজে দন্তফুট হয় না বলিয়া  
এই নাম।

বজ্রা—১ গুল্ম লতা, গুল্মচট্টা, ২  
মনসাগাছ।

বজ্রুল—*dalbergia ougeinensis*.

১ অশোকবৃক্ষ, *jonesia asoka*;  
২ সাধারণ রেত, *calamus*  
*roteng*, ৩ পদ্মবি°, *hibiscus*  
*mutabilis*.

বজ্রুলপ্রিয়—[ ইং *ratan*. ] বেতবি°

বট—[স° ন্যাগোধ, জটাল; হি° বগট,  
বড়কল; তা° বোর, বর; ক°  
আল; ও° বোর; গুল্ম বড়;  
ম° বড়; ফা° দীর্ঘবেশ; অ°  
দাতুণবায়; তে° মরিচেট, পেডি  
ময়ী; সিংভূম—নুগ; ইং *ban-*  
*yan tree*. ] বৃহৎ বৃক্ষবি°, *ficus*  
*indica* বা *bengalensis*. ভার-  
তের সর্বত্র হয়। প্রায় ১০০ ফুট;  
উচ্চ, শাখাগুলি বহুবিস্তৃত। পর্ষায়  
—বট, জটাল, রোহিণী, ন্যাগোধ,  
অবরোহী, বিটপী, রক্তফল,  
স্কন্দরূহ, মণ্ডলী, মহাছায়, শৃঙ্গ,  
যক্ষাবাস, যক্ষতরু, পাদরোহিণী,  
নীল, ক্ষীরী, শিখারূহ, বহুপাদ;

বনস্পতি, নবভূ° রাজনি°

বটপাত্রী—পাথরকুচি গাছ, পর্বতীয়  
বৃক্ষ° রাজনি° *aletris hya-*  
*cinthoides* ॥ উইল° ॥

বটর—স্বগন্ধী ঘাস, *cyperus*.

বড় এলাচি—[ স° স্থলৈলা ] এলাচি  
দ্র°।

বড় কানড়—কানড় দ্র°।

বড় কোলকেসেন্দা—*cassia occiden-*  
*talis*. কালকাসেন্দা দ্র°।

বড় কুঁকরচিত্তা—বন্য তরুবি°।  
কুকুরচিত্তা দ্র°।

বড় গোক্ষুর—গোক্ষুর দ্র° [ হি°  
ফরিদবুটি, বড় গোখরু; তে°  
পেডাপেলেরু ] *pedalium*  
*murex*.

বড় ঘলঘসা—ঘলঘসা দ্র°।

বড় বেত—বেত দ্র°।

বড় মেথি—মেথি দ্র°।

বড় রিঠা—রিঠা দ্র°।

বর্ণগব্ধ—[ ইং *indigo plant* ]  
নীলবৃক্ষ; *indigofara tin-*  
*ctoria*.

বৎসাদনী—*menispermum glab-*  
*rum*.

বৎসানাভ—কাঠবিষ, *aconitum*  
*ferox*.

বদর—[ স° বয়র, সেবি, কোলফল,  
শেয়াকদুল ॥ রাজনি° ॥ ] কুল,  
zizyphus jujuba. প্রকারভেদ  
—রাজবদর—[ স° সৌবীর, পথ-  
ফল, মধুর ফল ] z. vulgaris.  
কুল দ্র° ।

বদরগা—[ ইং toothache tree ]  
figave budrunga.

বদরফলী—ভূমিবদরীলতা ।

বদরবল্লী—ভূমিবদরীলতা ।

বদরামলক—বৃক্ষবি°; flacourtia  
cataphracta.

বদরী—আলকদ্বীপ দ্র° ।

বদরীফলা—নীলশেফালিকা ॥ জ্ঞা° ॥

বধূর—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥ অজভক্ষ  
দ্র° ।

বধূ—১ অনন্তমূল; ২ শটী, ৩ পিড়িং  
শাক ॥ রাজনি° ॥

বনআদা—[ স° বন আদ্রক ] zin-  
giber casunar. আদা দ্র° ।

বন আনারস—জচ্চলী আনারস ।  
আনারস দ্র° । বিলাতি কেয়া;  
agave americana.

বনওকরা—ওকরা দ্র° ।

বনকদলী—কাঠকলা । কলা দ্র° ।

বনকন্দ—বুনোওল । ওল দ্র° ।

বনকাপাস, বনকার্পাসিকা—[ স°

অরণ্যকার্পাসী; ভারবাজী; হি°  
প° কাকতুড়ী; ম° কুরকী]  
কাডী দ্র° ।

বনখেজুর—বন্যখেজুর; caryota  
urens.

বনচন্দ্রিকা—চন্দ্রমালিকা ফুল, বন-  
মালিকা ।

বনচম্পক—বনচাঁপা ।

বনচাঁড়াল—চাঁড়ালবল্লকী নামে দ্বিবর্ণ  
ক্ষুদ্রবি° । পল্লীগ্রামে দেখা যায় ।

বনচাঁলিদা—সরল গুণ্মবি° । বর্ষজীবী  
উদ্ভিদ, পাতা পক্ষাকার, ফল চেরী  
ফলের মত, কালো এবং নরম,  
leca crispa lin.

বনচিচিন্দা—[ হি° জংলী চিচিন্দা ]  
trichosanthes cucumerira.

বনপটন দ্র° ।

বনজাম—ভংই জাম, জামের মত বন্য  
জাম ।

বনজীরা—বনজীরে । জীরা দ্র° ।

বনজোয়ান—বনজোয়ান দ্র° ।

বনজীরা—বনযীরে । জীরা দ্র° ।

বনজোয়ান—বনযোয়ান দ্র° ।

বনঝাউ—[ স° সভক । ঝোবদক ; হি°  
ঝাউ ; গুজ° ঝরন-ঝাউ ; তা°  
সিরাসভদ্র ; তে° পক্ষি ] অরণ্য-  
জাত ঝাউ, tamarix gallica l.

গাছ ছোট, গুল্ম। ফুল ও পরে  
ফল হয়।

বনভিষিক্তা—তিত লাউ। লতানে  
গাছ, *cissampelos hexandra*.

বনতুলসী—তুলসী দ্র°।

বনদীপ—বনচাঁপা, *michelia cham-  
paca*.

বননারাজা—[সং বিল্লিপদ্রুপ; হি°  
লজ্জালা; লক্সনা; গুজ° ঝরেরা]  
*biophytum sensitivum*.  
রাস্তার কিনারায় ও খাস জমিতে  
জন্মায়।

বননীল—[সং শরপদ্রুপা। রক্তশর-  
পদ্রুপা; তে° টেলা-বৃত্তপানি]  
বহুজীবী বহুশাখা বিশিষ্ট গুল্ম-  
জাতীয় উদ্ভিদ। *tephrosia  
purpurea*. পর্যায়—কাণ্ডপদ্রুপা,  
ইষপদ্রুপিকা, বাগপদ্রুপা, সাম্বক-  
পদ্রুপা, ইষপদ্রুপা। প্রকারভেদ—  
শ্বেতবননীল—[শ্বেতশরপদ্রুপা] *t.  
villosa*.

বননেবু—আসসেওড়া।

বনপটল—[হি° জংলী চিচিঙ্গা; তা°  
পদুদেল; মালয়—কটুপটলক]  
বনচিচিঙ্গা, *trichosanthes  
cucumerina*. সমগ্র ভারতে  
জন্মে।

বনপল্লব—*hyperanthera morunga*.

বনপালঙ্ক—[ইং sharp dock] পালং দ্র°।

বনপিপ্পলী—পিপ্পলী দ্র°।

বনপেঁয়াজ—পলাশু ঘ্র°।

বনফলসা—[ইং wild violet]

বনবার্বীককা—দুলালতুলসী।

বনবিড়াল—[সং চণ্ডালিকা; ইং  
*telegraph plant*] শিষাদিবর্গের  
বন্য ক্ষুদ্র ক্ষুপিব°। *desmodium  
gyrams*. প্রায় ২ হাত উঁচু হয়।

বনবীজপুরুক—অত্যম্মা দ্র°।

বনমল্লিকা—কাঠমল্লিকা, অগম্মী লতা-  
পদ্রুপ। এই লতা অরণ্যে জন্মিয়া  
বড় গাছকে আশ্রয় করে। ফল  
ফুটিলে সমস্ত বন আমোদিত হয়।  
গাছে উঠে বলিয়া কাঠমল্লিকা।

বনমোথি—[সং বনমোথিকা; প°  
সিজি] এক প্রকার আগাছা,  
*melilotus indica*, ইহার ফুল  
সাদা, শীতের সময় ফুল হয়, পরে  
ফল। ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

বনযোয়ান—[সং বনযমানী] বন  
জোয়ান, *seseli indicum*. সরল  
বর্ষজীবী ঔষধি। ৪-১২ ইঞ্চি  
উচ্চ। অনেক শাখা আছে।

বনরিঠা—[তে° শিকৈ-কেই, গোপ্ত]  
*acacia concinna*.

বনলবঙ্গ—[ স° ভুলভঙ্গ, বল্লভীভঙ্গ ;  
 হি° বনলাউগ ; ম° পানলবঙ্গ ;  
 তাঁ° নিরঙ্করশব্দ ] বর্ষজীবী গুল্ম-  
 জাতীয় গাছ, *jussiaea suffruticosa*.  
 বহুশাখাবিশিষ্ট, ফল  
 দেখিতে লবঙ্গের ন্যায় । শীতকালে  
 ফুল ও ফল হয় । বঙ্গদেশে আর্দ্র  
 ভূমিতে জন্মায় । ফুল পীত বর্ণ,  
 লম্বা । কেহ কেহ লাল-লবঙ্গীবলে ।

বনশগ—*crotalia verrucosa*.

বনশুলফা—[ হি° পীতপাপড়া ;  
 ক° পপটিক ; গোড়—ক্ষেতপাপড়া ]  
 বিস্তৃত বর্ষজীবী গুল্মবি°;  
*fumaria parviflora*. ফুল  
 দেখিতে গোলাপ ফুলের মত ।  
 ফুলের অগ্রভাগ বেগুনে রংয়ের ।  
 শীতকালে ধানক্ষেতে দেখা যায় ।

বনশরৎ—বনওল ॥ রাজনি° ॥

বনসক্ষেদপই—*basella alba*.

বনহারিদ্ৰা—বনহলদী, শর্দূট, *curcuma aromatica* ॥ বেল° ॥, *C. zedoaria*.

বনামল—ফলবি°; *carissa carandus*.

বনালিকা—সূর্যমুখী, *heliotropium indicum*.

বন্দা, বন্দাকা, বন্দার—পরজীবী লতা,  
*epidendrum tessellatum*.

বন্ধুজীব—[ স° বন্ধুক ; হি° গেজুলিয়া,  
 দোপরিয়া, ; তা° নাগাপ্প ]  
 বাঁধুলি ফুল, দৃপ্তরেমণি, কাঠলতা,  
 দোপাটি, *pentapetes phoenicea* lin, পর্যায়—ওষ্ঠপুষ্প,  
 অর্কবল্লভ, মধ্যস্নান, বাগপুষ্প,  
 হারিপ্রিয় । ছোট ঔষিদ্, লোমযুক্ত ।  
 বন্ধুক—বাঁধুনী ফুল, *pentaptera tomentosa*.

বন্ধুলি—বাঁধুলি ফুলের গাছ ও  
 ফল । রক্তবর্ণপুষ্প বৃক্ষ । বন্ধু  
 জীবক । ইহা বেলা দ্বিপ্রহরে  
 ফোটে ও বৈকালে শুকায় বলিয়া  
 হি°-ত দৃপ্তহরিয়া বলে । শাদা,  
 কাল, পীত ও লাল বর্ণ ভেদে  
 চার প্রকার ।

বন্যোপোদকী—বনপাই ॥ রাজনি° ॥

বপুষ্টমা—পদ্মচারণী লতা, *hibiscus mutabilis*.

বয়ড়া—বহেড়া দ্র° ।

বরই—[ স° বদরী ] বদরী দ্র° ।

বরক—ধান্যবি° । চীনাধান ॥ রাজনি° ॥

বরচন্দন—দেবদারুবৃক্ষ ।

বরমালা—কোজোবৃক্ষ, *callicarpa arborea*. ছোট নাগপুত্র, উত্তর  
 প্রদেশ, বিহারে জন্মায় ।

বরা—*cissampelos hexandra*.

বরুণবৃক্ষ—[স° অশ্বরীষ, শ্বেতদ্রুম ;  
 হি° বরুণ, বরবল্লা, বরুণা ; কো°  
 বন্যার গাছ ; মা° বায়বরুণা ; গুজ°  
 বরুণো ; বায়বরুণা ; তা° নরুভল ;  
 সর্বাংশগমরম ; উশাক্‌মনু ; ও°  
 বরুণ ; গুজ° বরুণো, বায়বরুণা ;  
 তে° উসিকি ] উচ্যবৃক্ষবি°,  
*crataeva religiosa*, *capparis*  
*trifolia*, *cap. roxb.*, *evasia*  
*longifolia*; ত্রিপত্র, ফুল শাদা,  
 ফুল কয়েত বেলের মত । প্রায় গোল,  
 আকৃতি তার চেয়ে ছোট, ফুল বড়  
 বড় । ঈষৎ হলুদ রঙ, পাতা ও  
 মূলের ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।  
 বহু বীজযুক্ত । পর্যায়—শ্বেত-  
 পুষ্প, তিস্তাশাক, কুয়ারক, শ্বেত-  
 দ্রুম, সাধুবৃক্ষ তমাল, মারুতপহ ।

বর্ণপ্রসারণ—অগরু দ্র° ।

বর্ধমানবৃক্ষ—এরুডবৃক্ষ; ভ্যারাণ্ডা  
 গাছ ।

ববটি, ববটী—[ ইং cow pea ; স°  
 রাজ্যাস, ববটি ] *vigna catjang*,  
*dolichos sinensis*.

ববর—কালো বা বহুই গাছ ॥ রাজনি° ॥  
 ববর, ববল, ববল—(স° দীর্ঘ  
 কণ্টক, তীক্ষ্ণকণ্টক, সুস্কয়পত্র,  
 পীতপুষ্প) বাবলা গাছ ॥ রাজনি° ॥

বমী—[ ইং smoth garlic pear ]  
*cratoera tapia*.

বর্ষাভূ—পুননবা শাক ।

বহ—গ্রাম্পপূর্ণ বৃক্ষ ।

বলদ—ক্ষেতপাপড়া, জীবক (?) ।

বলপাশুড়কর—কন্দুবৃক্ষ ।

বলমোটা—(চলিত) জয়ন্তীগাছ ।

বলসম্ব—যষ্টিক ধান্য ।

ববজা—তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥

বলা—[ হি° খিরেটী, বরিয়ায় ; অ°  
 সরুশোণ, বরিয়ায় ; ক° বেণে  
 গরগ ; গুজ° বলদানা, খিরেটী ]  
 বালা, বেড়োলা, বাড়িয়ালা, *pari-*  
*tium tertuocum*, *sida cor-*  
*difolia*. ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° । পাতা  
 ১/২-২ ইঞ্চি লম্বা, হৃৎপাণ্ডাকৃতি,  
 পাতা পানের মত এবং  
 সুস্কয় রোমশ । ফুল পীতবর্ণ  
 ॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—  
 বাট্যালক, সমছা, উদাদকা, ভদ্রা,  
 ভদ্রোদনী, ক্ষরকাণ্টিকা, ভদ্রবলা,  
 মোটা, পাটী, বলাচ্যা, কল্যাণিনী,  
 বলা ॥ রাজনি° ॥ প্রকারভেদ—(১)  
 অতিবলা—[ হি° কংকী, ককাইয়া ;  
 কো° আঠার মামুড়কি ; ম°  
 বিককতী, আকই ; গুজ° খপাটা ;  
 ক° মল্লদ্রুদ্রবে ] পেটারি,

বাতাবীলেবু—[সং মধুজম্বীর; হি°  
বাতাভিনেবু, সাদামূল; প°  
চকোট; তে° এদাপান্ত; গুজ°  
কোট্ট] বড় জাতীয় লেবু  
citrus decumara. গাছ ৩০-  
৪০ ফুট উচ। ফল তালের ন্যায়;  
ছাল পুরু, শাঁস লাল ও সাদা,  
মিষ্ট বা অম্ল। পৰ্যায়—মধু-  
জম্বীর, মধুজম্ব, মধুরজম্বল,  
শংখপ্রাবী, শকরক। ইহার আদি  
বাস মালয় উপদ্বীপ ও পলি-  
নেশিয়া। বঙ্গদেশে সর্বত্র জন্মায়।

বাতারি—লোহিত এরুড।

বাতোলা—গোজিহ্বা লতাবি°।

বাদাম—[সং বাতাদ] প্রকারভেদ—১

চীনে বাদাম—[সং বুকানক; হি°

মুগফলি; গুজ° ভোয়া-চেনা; ম°

ভুই-মুগ; তা° বাক-দলাই]

arachis hypogaea. ভারতের

সর্বত্র চাষ হয়। আমেরিকার গাছ।

বর্ষজীবী লতানে-জড়ানো লতা।

বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল

হয়। ২ হিজলী বাদাম—[হি°

কাজু; ম° কাজু, কাজুরি; তা°

কোলামারা, মর্দাউরি] কাজু বাদাম,

anacardium occidentale Lin.

চিরসবুজ পত্রাচ্ছাদিত মাঝারি

গাছ। কঠিন আবরণ ত্রিপল মোটা

বাদাম। উড়িয়া, চট্টগ্রাম, গোয়া,

আন্দামান, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি

স্থানে চাষ হয়। এই গাছ আমে-

রিকা হইতে পতুগীজরা এখানে

প্রথমে আনে। এই গাছের বীজের

রস হইতে মদ ও ফল হইতে এক

রকম আলকাতরা (tar) তৈয়ারি

হয়—যা নৌকায় মাথাইলে পোকা

ধরিতে পারে না। পৰ্যায়—

বাতাদ, বাতবেরী, নেত্রোপমফল।

৩ বনবাদাম—জল্লী বাদাম, পাত-

বাদাম—এরই নাম বাতাদ। ৪

কাগজীবাদাম—কাবুলীবাদাম।

বানরাঘাত—লোধবৃক্ষ, *sylocos*  
*racemosa*.

বানরী—[ইং cowage] আলকুশী

গাছ। আলকুশী দ্র°।

বানল—তুলসীবৃক্ষ।

বানীর—বেতস গাছ ॥ রাজনি° ॥

বানেয়—সুগন্ধি তৃণবি°।

বান্ধিদ—কতিউকী ওষধিবৃক্ষ,  
*wrightea antidysenterica*.

বান্দর লাঠি—সোন্দাল গাছ; *cassia*  
*fistula*.

বান্দুলি—বান্দুলি দ্র°।

বার্চি—[সং বার্কি; হি° বার্বাচি]



বার্বচি; বো° বাওয়াচি; তা°  
কপৌকরিণি; তে° কর্দ-বাগি]  
লতাক্ষস্তরী, বার্বচি; *psoralea*  
*corylifolia*. শিশুআদিবর্গের  
গাছ। ভারতের সমস্ত স্থানে  
জন্মায়। এর বীজ অল্পবর্ষে  
চিকিৎসায় বহু প্রাচীন কাল হইতে  
ব্যবহৃত হইতেছে।

বাবলা—[স° বব্দর; হি° বাব্দর,  
বাবুল, কিকর; বাবলা; তে°  
নাল্ল-তুন্মা; তা° কারুভেলম; ম°  
বাবুল; গুজ° বাডল; সাঁওতাল  
গরুর; ইং *indian-gum arabic tree*] বাবুল; *acacia*  
*arabica*. মাঝারি গাছ, ভারতের  
প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। ২৫-৩০  
ফুট উচ্চ। শাখা সরল, শাখায়  
কাঁটা থাকে। কাঠ খুসরবর্ণ,  
ভেতরের কাঠ লাল আভাযুক্ত  
শাদা। শীতকালে ফুল ও ফল  
হয়। পর্ষায়—বধূর, যুগলাক্ষ,  
তীক্ষকটক, কষ্টাল, গোণ্ড;  
পংস্ত্রীজ, দড়বীজ, কম্বাক,  
অভাভক্ষ্য ॥ রাজনি° ॥

বাবুইতুলসী—তুলসী দ্র°।

বাবুল—বাবলা দ্র°।

বামন—বৃক্ষবি°। *alangium hexa-*

*petalum*.

বামনহাটি; বামনহাটি—[স° ব্রাহ্মণ-  
হাট, ভাগী; বাতারি, কাসজি°;  
হি° রাবজী; গুজ°, ম° ভারজী;  
সিংভূম—সিরিতেক] ব্রহ্মবৃষ্টি,  
*clerodendron siphonanthus*,  
*c. indica*. গুজুবি°। ৪-৮  
ফুট লম্বা। বঙ্গদেশে পতিত  
জমিতে, জঙ্গলের কিনারায় জন্মে।  
কুমারন ও দক্ষিণ ভারতেও  
জন্মে। পর্ষায়—ভাগী (ভাঙ্গা),  
গদাভিশাক, ফজী, অক্ষরক বুল্লরী,  
বর্বা; দর্বা; বর্বার, ভুগজা, পম্মা,  
হাট, কাসজি°, সুরুপা, লমবের্টা,  
শাকমাতা ॥ রাজনি° ॥

বামাপীড়ণ—বৃক্ষবি°, *salvadora*  
*persica*.

বামাবর্তী—অতিমোড়া গাছ।

বারণব্দা—কলা।

বারব্দা—কলা।

বারিকটক—জলজচারী, *pistia stra-*  
*tiotes*, ২ *trapa bispinosa*.

বারিকুজ—জলজচারী।

বারিচন্দ্র—জলজচারী।

বারিদ্র—ছাতক, *cuculus melano-*  
*leucos*.

বারিপণী, বারিপ্রশন—জলজচারী।

বারিবদন—ফলবি° ।

বারিবদরা—চারাবি°, *flacourtia cataphracta*.

বার্তাকী; বার্তাকু—[ ইং egg plant ]

বেগুন, *solanum melongena*.

বাল—১ সুগন্ধি তৃণ, ২ নারিকেল ।

বালতনয়—খদির দ° ।

বালপত্র, বালপত্রক—খয়ের ।

বালপদ্মপী—মৃধিকাবি°, *jasmine auriculatum*.

বালা—[ স° হুঁবের, বালক ] *pavonia odorata* Willd. ১ যুথী,

২ নারিকেল, ৩ যুতকুমারী

॥ আপ° ॥

বালুক, বালুকী—শস্য-বি° ।

বালুকী, বালুকী—শস্য-বি° ।

বালেয়—চারাগাছ, *siphonanthus*

*indicus*.

বালেয়শাক—চারাবি° ।

বাসা, বাসা—চারাবি°, বাসকগাছ ।

বাসক—[ স° বৈদ্যমাতা ; হি° উদি

সম্বলদ ] বাসক নামক পদ্ম

বৃক্ষবি°, *justicia gendarussa*.

ইহার পাতাগুলি চওড়া বস্তুমা-

কৃতি । ডাটাগুলি হৃদয় । পাত

৫-৬ ইঞ্চি লম্বা ও ১/২ ইঞ্চি

চওড়া । গুড়ি সরল । প্রকার-

ভেদ—রক্তবাসক—j. *rubrum*.

বাসকের মত সাধারণত দেখা যায়

না । কুচবিহার, দার্জিলিংএ

প্রচুর পরিমাণে হয় । ফল লাল,

পাতা মোটা, লম্বা ও খুব সবুজ ।

ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

বাসন্ত—চারাগাছ, *vangueria spi-*

*nosa*, লতানে *gaertnera*

*racemosa*.

বাসন্তী—মদনবৃক্ষ, মাধবীলতা, নব-

মল্লিকা, যুথী ।

বাস্তুক, বাস্তুক—বেতুয়া নামক শাক,

বেথোশাক ॥ রাজনি° ॥, *cheno-*

*podium album*. ৭

বাহস—শাকবি°, *marsilia dentata*

॥ উইল° ॥

বাহারীকন্দ—[ স° শাকরী বা বরাহী-

কন্দ ; হি° গেঠী ; তে° পাচি-

তোকে ; বো° ডুকরকল ] কন্দ

জাতীয় উদ্ভিদ, *tacea integri-*

*folia*.

বাঁহ্লক, বাঁহ্লক—১ কদমকদম গাছ, ২

হিন্দু [ ইং *asafoetida* ] ।

বিকঙ্কট—চারাবি°, *ruellia longifo-*

*lia*.

বিকঙ্কটক—গোকঙ্কটক নামক বৃক্ষবি° ।

বিকিরণ—*asclepias gigantea*.

বিহুটি—[ স° বৃষ্টিকালী, বিষণী ;  
 হি° বহুরটা ; ম° বৃষ্টিকালী ]  
 গুচ্ছাবি°; *targia involucrata*.

ঘনশাখাযুক্ত; ৪-৫ ফুট উচ্চ ।  
 বঙ্গদেশের সর্বত্র, পতিত জমি  
 ও বেড়ার ধারে জন্মায় । পর্যায়—  
 বিষণী, বিষয়ী, নেত্ররোগহা,  
 উষ্ট্রকা, থলিপণী, দক্ষিণবর্তকী,  
 ভাসুরপদ্মপা, ক্ষীরবিষণিকা, স্বর্ণ  
 পদ্মপা ॥ রাজনি° ॥

বিটখদির—বিষ্ঠার ন্যায় দৃগ্গন্ধযুক্ত  
 খদিরবি° । গুল্মেবাবলা ।

বিড়ুর—বেতবি°, *calamus rotang*.

বিড়ংগ, বিরংগ—[ স° বিড়ংগ ; হি°  
 বারেংগ, বাবিরঙ, বারবিড়ং ; ও°  
 বাবুরংগে ; বো° কারকানিক ;  
 তা° বায়ুবিলাগন ] লতাবি° ।  
*embelia ribes*. নামান্তর—  
 কুমিল্ল । ৮

বিতণ্ড—*nerium odorum*.

বিতুল্ল—শার্কবি°, *marsilia qua-*  
*drifolia*.

বিদার—চারাবি°, *hedysarum gan-*  
*geticum*.

বিদারী—ভংইকুমড়া, *tricosanthes*  
*cordata*.

বিদ্যা—বৃক্ষবি°, *premna spinosa*.

বিদ্যাদল—ভোজপত্র গাছ ।

বিনদ—বৃক্ষবি°; *echites schola-*  
*ris*.

বিনয়—চারাবি°, *sida cordifolia*.

বিপর্ণক—পলাশ গাছ; *butea fron-*  
*dosa*.

বিমর্দ—চারাবি°, *cassia esculanta*.

বিভীতক—বহেড়া, বয়ড়া ।

বিশ্ব, বিশ্বকা—তেলাকুচা ।

বিশ্বট—[ হি° সুহোতা, তেতিয়া ]  
*sinapis dichotoma, rox*.

বিশ্বদ—সুপারি গাছ, *areca faufel*.

বিরণ—সুগন্ধি তণ ।

বিললা—চারাবি° ।

বিলাতী ঝাউ—[ হি° জর্জল সারু ;  
 তে° ইরুডা ; তা° সাবুন্ধু পাটাই ]  
*casuariniae equisetifolia*.

বিলাতী বেগুন—[ হি° বিলায়তি  
 বায়গুন ; ইং tomato ] টমেটো,  
*lycopersicum coculentum*.

বিলাতী মেন্দী—[ তা° কুলিনভল ;  
 ও° হবলাস ; প° হাকালাল ]  
 গুল্মজাতীয় গাছ, *myrtus*  
*communis*. ফল মটরের ন্যায়,  
 বেগুনে রং বিশিষ্ট ।

বিলিশ্ব—[ স° বিলিশ্ব ; হি° বেলাম্বদ,  
 ছোট গাছবি°, *averrhoa*

blimbi, বঙ্গদেশে সর্বত্রই দেখা যায়।

বিল্ব—[ স° বিল্ব ; হি° শ্রীফল, বেল ; ম° বেল, বিলিন্দফল ; গুজ° বিল্দ ; তে° মায়ডু ; তা° ভিলভ পজম ; ক° বেল্লবন ; ইং bengal quince ]  
বেল, aegle marmelos  
corr. বড় বৃক্ষ, হিন্দুদের পবিত্র বৃক্ষ। ২৫-৩০ ফুট উচ্চ। ত্রিপত্র যুক্ত পাতা গ্রীষ্মকালে ঝরিয়া যায়। ফুল দ্বিযং সবুজ শ্বেতবর্ণ, ফল বড় গোলাকার, পাকা বেল সুস্বাদু। ভারতে প্রায় সকল স্থানে জন্মে—বঙ্গদেশে ও বিহারে প্রচুর পরিমাণে হয়। পর্যায়—বিল্ব, শল্য, হৃদাগন্ধ ত্রিশাকপত্র, ত্রিশিখ, শিলাটু, শাণ্ডিল্য, শ্রীফল, শিবদ্রুম, শৈবপত্র, শিবেষ্ঠ, শৈলদ্রুম, পত্রশ্রেষ্ঠ, গন্ধপত্র, দুরারহ, ককটাহর, সংফলদ, সদাফল, সমীরসার, সুভূতিক। রাজনি° ॥

বিশল্যা—১ গুল্মবি° menispermum cordifolium, ২ দন্তী, croton polyandrum., ৩ তেউড়ী, convolvulus turpethen.

বিশাখ—চারাবি°, momordica charentia.

বিশাখজ—কমলালেবু।

বিশালত্রক—বৃক্ষবি°।

বিষয়—বিশনাশকারক শাকবি°,।

বিষধমী—[ইং cowhage] আলকুশী  
গাছ, carpopogon prulens.

বিষনার্শন—mimosa sirisa.

বিষনন্দ—bignonia indica.

বিষপুষ্প—চারাবি°, vanguardia spinosa.

বিষমুণ্ডি—কড়িসিঙ্গে বা বিষদোড়ি নামক ক্ষুদ্র গাছ।

বিষহন্তী—অপরাজিতা।

বিষানিকা—মেঘশৃঙ্গী।

বিষুক্কাস্তা—পুষ্পবৃক্ষবি°। অপরাজিতা, clitoria ternatea.

বিষুগন্ধী—[ হি° শত্ৰুপুষ্পী ; তা° বিষুকরুণ্ডী ; তে° বিষুকরুণ্ডা ; সাওতাল—তাণ্ডীকো-দেবাহা ] বিষুকান্দী, বিষুগন্ধি, evolulus alsinoides. বর্ষজীবী গুল্মবি°। বহুশাখাবিশিষ্ট। পাতা ছোট ও বড় দুই রকমের হয়। ফুল নীল বা শাদা। বর্ষার শেষ হইতে শীত অবধি ফুল ও ফলের সময়। ভারতে সর্বত্রই ঘাসের সঙ্গে জন্মায়।

বিষুবল্লাভা—echites carryphyllata.

বিসপ্রসূন—পদ্ম ।

বিহিদানা—[ হি° বিহিদানা ; তা°  
সিমাইয়া-মাদলা ভিরাই ; কাশ্মীর-  
বামস্তু ] বহু বক্রাকৃতি শাখায়ুক্ত  
বৃহৎ গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ । ভারতে  
হিমালয় প্রদেশে জন্মায় । *cydo-*  
*nia vulgaris*. আদি জন্ম—  
ইউরোপ, আমেরিকা । ভারতে  
হিমালয় প্রদেশে চাষ হয় । ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত হয় । পুড়িয়া বাইলে  
বেলেস্তারার প্রলেপ স্বরূপ ব্যবহৃত  
হয় ॥ ডাইমক ॥

বীজক—বিজয়াসার নামক বৃক্ষ ।

বীজতাড়কা—[ স° বৃন্দদারক ; হি°  
বিধারা, কালা-বিধারা ; ম° দোনি  
কান্তি ; গুজ° বরধারো ; ক°  
এরুডমুণ্টে ; তা° সমুদ্রপচাই ]  
বহুদূর ব্যাপী বৃক্ষারোহী জড়ানো  
লতা, *argyrea speciosa*;  
*lettsonia nervosa*, লতার  
গায়ে সুন্দর পশমের মত নরম ও  
শাদা লোম আছে । বর্ষাকাল হইতে  
শীতকাল পর্যন্ত ফুল ও ফল  
হয় । ফুল গোলাপী সুগন্ধী ।  
পর্যায়—বৃন্দদারক, আবেগী,  
জুহক, দীর্ঘবালুক, বৃন্দ,  
কোটরপুংপী, অজান্তী, ছাগ-

লান্ধিকা ॥ রাজনি° ॥ বঙ্গদেশে বহু  
স্থানে জন্মায় ।

বীজপদুর—ট্যাবালেবু ।

বীটিকা—সুপারি গাছ ।

বীতশোক—অশোকবৃক্ষ ।

বীনা—[ স° তুরবা ; হি° বীনা ; তে°  
নাল্লমোড়া ; ম° মডাই-পাটাই ;  
সিন্ধু—তিস্মার ] বীণা গুল্ম-  
জাতীয় উদ্ভিদ, *avicennia*  
*officinalis*. গাছ প্রায় ২৫ ফুট  
উঁচু । পাতা সাড়ে ইঞ্চি লম্বা ও  
চওড়া আধ ইঞ্চি । পাতার নীচে  
লোম । বর্ষাকালে ফুল ও ফল  
হয় । সুন্দরবন, চট্টগ্রাম প্রভৃতি  
স্থানে জন্মায় ।

বীর—১ কলা গাছ, ২ আতিষবৃক্ষ ।

বীরগ—সুগন্ধি তৃণবি° ।

বীরতরু—১ অজুঁনবৃক্ষ, ২ গুল্মবি° ।

বীরবক্ষ—অজুঁনবৃক্ষ ।

বীরভদ্রক—সুগন্ধি তৃণবি° ।

বুদ্ধানক—চিনাবাদাম, *arachis hypo-*  
*gea*.

বৃক—বকপুংপে গাছ ।

বৃক্ষক—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ; *wrightea*  
*antidysenterica*.

বৃক্ষনাথ—বটবৃক্ষ ।

বৃক্ষরুহ—পরজীবী বৃক্ষ, *cymbi-*

*dium tessalloides.*

বৃক্ষাদ—১ বটবৃক্ষ, ২ পিপুলগাছ।

বৃক্ষাদিনী—১ পরজীবী গাছ, ১ গুল্মবি°।

বৃক্ষোৎপল—১ থয়ের, ২ কর্ণিকার-বৃক্ষ।

বৃক্ষগুড়—তৃণবি° ॥ রাজনি° ॥

বৃক্ষদারক—[ স° বৃষাডক, বৃষদার ; হি° বিধারা ] বিস্তারক, বীজতাড়ক; *argyreia speciosa*. লতাবি°।

কোন গাছকে মাটি থেকে আগ্রস করে উঠে, কচিপাতা জোড়া ভাবে থাকে, বড় হলে খুলে যায়। পাতাগুলি পানের মত। পেছনে সাদা ছোট ছোট লোম থাকে। শরৎ-কালে ফুল, হেমন্তকালে ফল হয়।

বৃষবিভীতক—আমড়া, অন্নাতক, *spondias magnifera*.

বৃষাকী—বেগুন দ্র°।

বৃষচক—কটকময় গুল্মবি°, *vanguiria spinosa*.

বৃষচকা, বৃষচকপ্রিয়া—শাকবি°, *basella rudra*.

বৃষিকালী—বিছটি গাছ।

বৃষ—ঋষভ নামক ঔষধ লতা।

বৃষকণী—গুল্মবি°। সুদর্শনা নামক লতা।

বৃষগন্ধা—ছাগলবেল গাছ।

বৃষপটী—ইন্দুরকানি পানা।

বৃষপর্বা—তৃণ।

বৃষ্যা—১ শতাবরী ২ আমলকী।

বৃহজ্জীবন্তী—স্বনামধন্য বৃক্ষবি°।

বৃহৎ কাল শাক—গুল্মবি°।

বৃহৎকাশ—কাশতৃণ।

বৃহতিকা—ছোট বেগুন, বার্তাকী।

বৃহতী—[ হি° বরহটা, কটাই, বাড়ী

খাতাই ; ক° হেগগুল্ম ; ম° থোর ভোবলী ; তে° কৃকমাচী ; তা° চেরুবট ] ব্যাকুড়, *solanum indicum* lin. গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ। ১—৬ ফুট উচ্চ। গাছ

অনেক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, পাতা পাংলা। ছোট। সারা বছর ফুল ও ফল হয়।

পর্যায়—বৃহতী, মহাতি। লাস্তা, বার্তাকী, ভটাকী,

বহুপটী, বনবৃষাকী। প্রকারভেদ

—১ গোধিনী। পর্যায়—সপতন বৃষিক, পীততুন্দুলা, পদ্রপ্রদা;

বহুফলা। ২ শ্বেতবৃহতী—

পর্যায়—শ্বেতা, শ্বেতমহোটিকা;

শ্বেতসিংহী, শ্বেতফলা; শ্বেত-

বার্তাকিনী, শ্বেতবৃহতী।

বেগপদুরা—[ স° মাতুলজ : হি° দোঙ্গন নেবু ; ম° মহানুজ ; গুল্মজ গীজোন্ন



-লিম্বু ; তেঁ মাঠোফল-পুটেট্ ]  
 ট্যাবালেবু । ছোলফ লেবু,  
*citrus medica lin* বহুশাখা-  
 বিশিষ্ট ছোট গাছ । পৰ্শায়—  
 বীজপদর, রুচুক, ফলপদরক,  
 মাতুলজ ॥ ভাবপ্র ॥ আদি জন্ম—  
 পূর্বএসিয়া ।

বেগুন—[ সঁ বার্তাকু । বজন;  
 বাতিফল ; বস্তাক, হিঁ বায়গন;  
 ভটা, বহগন, ভটা ; মঁ বাংগে ;  
 গুজ্জ বিংগনি ; কঁ বদনে ; তাঁ  
 কুথিবেকই ; ওঁ বাইগুন ; অসঁ  
 বেছনা ; ইং brinjal ] কাঁটাযুক্ত  
 বর্ষজীবী বা দ্বিবর্ষজীবী উদ্ভিদ;  
*solaum melongena lin*, গাছ  
 ২—৪ ফুট উচ্চ, পাতার ডালে কাঁটা  
 আছে । কখনও কখনও কাঁটা হয়  
 না । পাতা ৩—৬ ইঞ্চি দীর্ঘ ।  
 সারা বৎসরেই বেগুনের ফল ও  
 ফল হয় । প্রকারভেদ—১ কুলি  
 বেগুন—লম্বা, সূর্য প্রায় বাকা;  
*s. esculanta dunol.* গাছ  
 বেগুনের গাছের ন্যায় । ২  
 গোঠবেগুন—[ সঁ গোষ্ঠ বার্তাকু ;  
 অসঁ হাকুভী ; তাঁ সন্দাই ; তেঁ  
 কোন্দাভুণ্ট ; মাঁ কাটুনটা ]  
 ৩ শ্বেতবেগুন—মুগীর ডিমের

মত মত শাদা বেগুন । গুল্ম  
 জাতীয় উদ্ভিদ । ৮—১২ ফুট  
 উচ্চ । বঙ্গদেশে রাস্তার ধারে ও  
 জঙ্গলের ধারে জন্মায় । ৪ রাম  
 বেগুন [ সঁ গভদা : তাঁ আনাই-  
 চুড়াই ; তেঁ মলাকা ; মাঁ আনাট  
 চুটা ] ছোট গুল্ম জাতীয় গাছ, *s.*  
*ferox lin.* গাছ বেগুন গাছের  
 মত ও কটকিত । ডাটার কাঁটা  
 আছে, ২—৪ ফুট উচ্চ । পাতা  
 ঘন ও শক্ত লোমযুক্ত । পাতা  
 ত্রিকোণকৃতি ও খণ্ডিত । শীত-  
 কালে ফল ও ফল হয় । পর্বতীয়  
 প্রদেশে, চট্টগ্রামে, হুগলি, হাওড়ায়  
 দেখা যায় । ৫ বাঁচে বেগুন—  
 পাকা বীজবহুল বেগুন । ৬  
 মুক্তকেশী—গোল লালভ নীলবর্ণ  
 বেগুন । ৭ বিলাতি বেগুন—  
 টমেটো ।

বেজানী—ওষধিযুক্ত । *serratula*  
*anthelmintica.*

বেড়গাছ—কাঁটা বাঁশ ।

বেড়োলা—বলা দ্রু ।

বেণা, বেনা—[ সঁ উশীর, ধারণ ;  
 হিঁ খস ; মঁ বালা ; কঁ বাল-  
 দেবের ; তাঁ ভোটভার ; তেঁ  
 বটিবেল্ল ; মাঁ ভোটভার ] খসখস ।

*andropogon squarrosus* lin

কাণ্ড ২—৩ ফুট। শিকড় দেখিতে  
হাসের পালকের মত। পাতা  
২—৩ ফুট সরু; অগ্রভাগ লম্বা।  
শিকড় গ্রীষ্মকালে দরজায় ঝুলিয়া  
তাহাতে জল দিলে ঘর শীতল হয়।  
বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়।

বঙ্গদেশে বালুকাময় নদীর ধারে ও  
নীচ স্থানে হয়। পুষ্প—উশীর,  
মৃগাল, জলবাস; হরিপ্রিয়; বেণী-  
গমূলক, শিতিমূলক, রণপ্রিয়,  
বারণ, জলবাস ॥ রাজনি° ॥

বেণার—[ স° অরিষ্ট, কোনল, রীঠা-  
কীঞ্জ; ইং soap-berry ]  
রীঠাগাছ।

বেণু—বাঁশ।

বেণুককর—কটকময় চারা; বাঁশের  
কোড়া, করীর, করীল।

বেণুপত্রী—বাঁশপত্র চারাবি°।

বেত—[ স° অভ্রপদ্যবেতস; হি°  
বেত; ম° বেডিস, খোরবেত;  
ক° বেতস; গুজ° নেতর; তে°  
পীরাবা ] বেত গাছ, বেতগাছ  
*calamus viminalis* Willd.  
বেতগাছ বঙ্গদেশের সর্বত্র গ্রামের  
ধারে ও জঙ্গলে হয়। প্রকারভেদ  
—ছাঁচিবেত—[ স° ষোণিগদ,

সুদ; ম° বেত ] লতানে ঔষধ।  
কড়ে আশ্রদের মত মোটা। গাছে  
কাটা আছে। বেত কখন কখন  
২০০-৩০০ ফুট লম্বা হয়। লম্বা  
বেতক rattan বলে। পুষ্প—  
বেত, ষোণিগদ, মধুপচক ॥  
রাজনি° ॥

বেতস—বেত গাছ।

বেতোশাক—[ স° বাস্তক; হি° বড়ো-  
বথুয়া; ম° চিবিল; গুজ° চীল,  
টাংকো, তে° পাপ্পকুরা; তা°  
পার, পুষ্করাই ] গুল্মজাতীয়  
ঔষধ, *chenopodium al-  
bum* lin. ১—৩ ফুট উচ্চ।  
বঙ্গদেশে, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি  
জেলায় বাগানে ও আলুর জমিতে  
জন্মায়। পঞ্জাব ও হিমালয়  
প্রদেশেও হয়।

বেল—বিষ দ্র°।

বেল (ফুল)—[ স° বল্লিকা, বার্ষিকা;  
হি° চাম্বা, মতিয়া, মদ্রা; তা°  
মল্লিগাই; তে° বন্দমল্লি; মা°  
মদ্রা; বো° বটমোগরা; ক°  
দুন্দুভিমল্লিগে ] বেল, মতিয়া,  
বনমল্লিকা, *jasminum sambac*  
ait. লতানে গাছ, বনে জন্মায়।  
বাগানেও চাষ হয়, ৩-৪ ফুট উচ্চ।

ফুল শাদা; সুগন্ধযুক্ত; ফুলে অনেক পার্শ্ব থাকে। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে ফুল ও ফল হয়। পৰ্যায়—বল্লিকা, মোদিনী, বট-পত্রা, কুমারিকা, সুগন্ধাঢ্যা, বৃন্ত-পদ্মপা, মস্তাভা, বাৰ্বিকা, ত্রিপট্টা, মূলভা, ব্রহ্মা।

বেলা—[স° মল্লিকা; বল্লী] মল্লিকা জাতীয় ফুলবি°। বেলার গন্ধ হইতে তীব্রতর। বোটা মূলতর ও পদ্মপদল অধিক পুরু।

বেলি—পদ্মপিং, jasmine.

বেলেড়া—অতিপত্রা দ্র°।

বেলেজ—গোলমরিচ, piper nigrum.

বৈচ—[স° স্বাদুকষ্টক; হি° কট্টার; কাট্ট; বঞ্জ; তে° কনুরেগু; পশ্মক-নরু; ক° হলমাইকা; ও° বনচ কুড়ি; প° কুকোয়া] ব°ইচি, বৈচ, flacourtia indica mer. ছোট লম্বা গুল্মবি°। পাতা নরম; গাছে লম্বা ও ছোট কাটা আছে। পাতা ২-৩ ইঞ্চি লম্বা, চওড়া কিছু কম। পাতার কিনারা করাতের দাঁতের মত। ফুল ছোট, ফল গোলাকার। ফল মিষ্ট। বিহার; বঙ্গ, ছোটনাগপুরে, উড়িষ্যার সাধারণ গুল্মে জন্মায়। ২ [স°

বিকঙ্কত; হি° কন্দাই; তে° কজম; কালরেড; প° খটাই] ছোট কাটাযুক্ত বোঁচবৃক্ষ, f. sepia-ria rox. ফল মটরের ন্যায়, একটু লম্বাকৃতি গোল। গ্রীষ্ম-কালে ফল পাকে। অল্পমধুর। সুন্দরবনে প্রচুর জন্মে। পৰ্যায়—বিকঙ্কত, ব্যাঘ্রপাদ, গ্রন্থিলা, কন্ঠ-পাদ, বহুফল, গোপঘোঁটা, সুবদ্রুম, মৃদুফল, দণ্ডকাষ্ঠ, যজ্ঞায়, ব্রহ্মপাদপ, পিণ্ডরোহিক, পত্নী। কিংকিনী ॥ রাজনি°।

বৈজয়ন্ত—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°।

বৈজয়ন্তিকা—জয়ন্তবৃক্ষ।

বৈশ্রবণাবাস—ডুমুর গাছ, আজীর গাছ।

বোর—[স° বোরক] তৃণধান্যবি°, এই তৃণের দ্বারা মাদুর তৈয়ারী হয়। বাকুড়—বৃহতী দ্র°।

ব্যাঘ্রপাদ—বৈচ°।

ব্যাঘ্রবৃক্ষ—রক্তএরুড গাছ।

ব্যাটালক—বেড়েলা।

ব্রণহ—এরুডবৃক্ষবি°।

ব্রণহা—লতাবি°; menispermum glabrum.

ব্রততি—লতানে গাছ।

ব্রহ্মকমল—পাহাড়ী ফুল, সাধারণত

পাহাড়ীরা বলে বরফের ফুল,  
saussurea obvallata,

হিমালয়ের সাধারণত ১২-১৩  
হাজার ফুট মধ্য ব্রহ্মকমল দেখা  
যায়। মাটি থেকে ৩-৪ হাত  
উঁচু। একটা গাছের ডাঁটাতে  
মাত্র একটি করে ফুল হয়। ফিকে  
হলুদ রঙের বেশ বড়, মিষ্ট।  
এর পাতা অনেকটা আনারসের  
পাতার মত। গাড়োয়াল, কৈদার  
বদরীতে এবং ওখানকার আরও  
মন্দিরে এই ফুল দিয়ে পূজো  
হয়ে থাকে। সাধারণত জুলাই-  
আগস্ট মাসে ফুল হয়।

ব্রহ্মকুশা—অজমোদা। বাম্বুলী।

ব্রহ্মকোশী—অজমোদা।

ব্রহ্মগর্ভ—আদিত্য।

ব্রহ্মচারিণী—১ বারুণীবৃক্ষ, ২ ব্রাহ্মী  
শাক।

ব্রহ্মজটা—দমনকবৃক্ষ।

ব্রহ্মণ্য—[ইং mulberry tree]

তঁত গাছ, morus indica.

ব্রহ্মণ্যাদি—১ মৃগতৃণ, ২ তঁতবৃক্ষ,  
৩ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ।

ব্রহ্মত্ব—১ সম্ভবণ ২ বামনহাটি।

ব্রহ্মদ—ব্রহ্মবৃষ্টি।

ব্রহ্মদণ্ডী—অজদণ্ডী, বামনহাটি গাছ।

ব্রহ্মদণ্ডী—চারাবি°, ligusticum  
ajwaen.

ব্রহ্মদারু—তঁত গাছ। পর্যায়—নন্দন,  
পুষ, ক্রুম, যুষ, পুগ।

ব্রহ্মপাদপ—পলাশবৃক্ষ, ২ বৈচ গাছ।

ব্রহ্মবধু—অকবৃক্ষ।

ব্রহ্মবৃক্ষ—১ ব্রহ্মবচলা, ২ আদিত্য-  
ভক্তা, ৩ ব্রাহ্মীশাক, ৪ পলাশবৃক্ষ।

ব্রহ্মাদিনী—লজ্জালুকা ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

ব্রহ্মাদি—১ সুরমা, ২ সোমবল্লী, ৩ ব্রহ্ম-  
চারিণী, ৪ বামনহাটি।

ব্রাহ্মী—[স° ব্রাহ্মী; হি° শ্বেতচামলী,  
ব্রাহ্মী; তা° নীরব্রাহ্মী; তে° সাম-  
বাণীচেট্র; ম°, গুজ° ব্রাহ্মী;  
সিংভূম—লন্দনবিল; বো° বামব্রাহ্মী]  
লতানে উদ্ভিদ। ভিজা মাটিতে  
বাড়ে ও গাঁট হইতে শিকড় বাহির  
হয়। কাণ্ড নরম ও রসযুক্ত,  
গায়ে সূক্ষ লোম। ফুল ফিকে  
নীলবর্ণ ও শাদা। শিরাগুলি  
বেগুনে, গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল  
হয়। সমস্ত গাছ তিত। বঙ্গ-  
দেশের বহু স্থানে, নদী ও  
পুকুরের ধারে ভিজে মাটিতে  
জন্মায়। প্রকারভেদ—১ বামন-  
হাটি, ২ সোমলতা, ৩ মহাজ্যো-  
তিষ্মতী, ৪ বাড়াহী, ৫ হিচৈগাছ।

## [ ভ ]

ভক্ষপত্রা—নাগবল্লী ।

ভক্ষালাব্দ—রাজালাব্দ ।

ভগবদ্ভূম—মহাবোধিবৃক্ষ ।

ভদ্রবাসা—হরিদ্রা ।

ভঙ্গা—ভাঙ, *cannabis sativa* .

ভঙ্গুরা—১ অতিবিষা, ২ প্রিয়ঙ্গু ।

ভঞ্জন—অৰ্দ্ধবৃক্ষ ।

ভঞ্জর—দেবকুলোভূত তরু ।

ভটা—রাখালশা ।

ভটক—মারিষবৃক্ষপ ।

ভট্টা—১ চিণ্ডোটক, ২ বার্তাকু ।

ভট্টাকী—১ বার্তাকী, *solanum melongena*, ২ বৃহতী, ৩ বৃন্তাক ।

ভট্টক—শ্যোণাকবৃক্ষ ।

ভাউকা—মঞ্জিষ্ঠা, *rubia manjith, rox.*

ভাউর—শিরীষবৃক্ষ । *mimosa sirisha.*

ভাউল—শিরীষবৃক্ষ ।

ভাউ—১ শিরীষবৃক্ষ, ২ শ্বেতাবিঃ ।

ভাউতকী—মঞ্জিষ্ঠা ।

ভাউর—১ সমাষ্টল ক্ষুপ, ২ তড়ুলীয় শাক, ৩ শিরীষবৃক্ষ, ৪ বটবৃক্ষ ।

ভাউরলতিকা—মঞ্জিষ্ঠা ।

ভাউরী—মঞ্জিষ্ঠা ।

ভাউল—মঞ্জিষ্ঠা ।

ভাউক—শ্যোণাকবৃক্ষ ।

ভদ্র—১ কদম্ব, ২ শ্লুহীবৃক্ষ, ৩ রাম্ভা, ৪ নীলপদ্ম, ৫ চন্দন, ৬ মৃন্তক, ৭ ইন্দ্রবর, ৮ দেবদারু ।

ভদ্রক—১ ভদ্রসুস্তক, ২ নাগরমুখা, ৩ দেবদারু ।

ভদ্রকণ্ট—গোক্ষুর (?) ।

ভদ্রকালী—১ প্রসারিণী, গন্দভাদুলিয়া, নাগরমুস্তা ।

ভদ্রকাশী—ভদ্রমুস্তা ।

ভদ্রকাষ্ঠ—দেবদারুবৃক্ষ ।

ভদ্রগন্ধিকা—মৃন্তক, লতানে গাছ । *asclepias pseudosarsa.*

ভদ্রঘন—১ ভদ্রমুস্তা, ২ নাগরমুস্তা ।

ভদ্রচন্দন সারিবা—কৃষ্ণসারিবা ।

ভদ্রচড়—লঙ্কাথায়ীবৃক্ষ, লঙ্কাসিজ, *euphorbia tirucalli.*

ভদ্রজ—ইন্দ্রযব ।

ভদ্রতরুণী—কুঞ্জকবৃক্ষ ।

ভদ্রদন্ত—সরল কাঠ ।

ভদ্রদন্তিকা—বৃক্ষাব° ৥ রাজনি° ।

পর্যায়—কেশরুহা; ভিষগ্ভদ্রা;  
আর্বতকী, জ্বররাণ্গী, জয়াহ্বা।  
উষ্ণ, কটু ও রেচক ॥ রাজর্জি ॥

ভদ্রদারু—দেবদারুবি, *pinus deva-*  
*daru*.

ভদ্রদার্বাদিক—দেবদারু, কুষ্ঠ, হিরিদ্ৰা,  
বরুণ, মেঘাংগী, শ্বেতবেড়েলা,  
নীলকিণ্টকী, গাণ্কারিকা, দুরালভা,  
সঙ্কলকী, পারুল, অজর্জুন, পীত-  
কিণ্টকী, গুলঞ্চ, এরুড, পাষণ্ডভেদী,  
শ্বেতআকন্দ, শতমূলী, পুনর্নবা;  
সাম্বরলবণ, গর্জাপ্পলী; কাণ্ডন-  
বৃক্ষ, বামনহাটি, কাপাস, বশিচ-  
কালী, মালিগুণাক, যবকুল, কুলথ  
এই গুলিই ভদ্রদার্বাদিকগণ।

ভদ্রনাসিকা—দ্রাক্ষস্তীবৃক্ষ, বলালতা,  
(চলিত) বহলা।

ভদ্রপর্ণা—কটুম্বরা, প্রসারিণী, গন্ধ-  
ভাদুলিয়া।

ভদ্রপর্ণা—গাম্ভারী, প্রসারিণী।

ভদ্রবৎ—দেবদারু।

ভদ্রবতী—কটফল, ভদ্রপর্ণা, *gmelina*  
*arborea*.

ভদ্রবর্মণ—নবমল্লিকা।

ভদ্রবলা—গন্ধভাদুলিয়া, পর্যায়—  
সরগা, প্রসারণী, কটুম্বরা, রাজধলা।

ভদ্রবল্লিকা—অনন্তমূল, গোপবল্লী।

ভদ্রবল্লী—[সং অফোতা] ১ মল্লিকা,  
২ মাধবীলতা, ৩ মদনমালী বা  
হাপরমালী।

ভদ্রমল্লিকা—নবমল্লিকা, *cucumis*  
*madraspatanus*.

ভদ্রমুঞ্জ—তুণ্ণবি। রামশরতুণ  
॥ রাজর্জি ॥ পর্যায়—শর, বাণ,  
তেজন, ইক্ষুবেষ্টন। গুণ—শীতল  
ও মধুর। দাহ, তৃষ্ণা, মূত্রদোষ  
ইত্যাদি শান্তিকারক ॥ ভাবপ্র ॥

ভদ্রমুস্তক—নাগরমুস্তক, নাগরমুস্তা  
॥ রাজর্জি ॥

ভদ্রমুস্তা—নাগরমুস্তক ॥ রাজর্জি;  
ভাবপ্র ॥ *cyperus pertenis*  
সুগন্ধি তুণ্ণবি। পর্যায়—  
বরাহী, ওন্দা; গ্রীষ্ম, ভদ্রকালী,  
কেশরু, ক্রোড়েটা, কুরুবিন্দাখ্যা,  
সুগন্ধি; গ্রীষ্মলা, হিমা, বল্যা;  
রাজকশেরু, কচ্ছোখা, মুস্তা,  
অনেদ, বারিদ, অম্ভোদ, মেঘ,  
জীমূত, অন্ধ, নীরদ, অন্ন, ঘন,  
গাঙ্গেয়।

ভদ্রঘব—ইন্দ্রঘব, *wrightea anti-*  
*dysenterica*.

ভদ্রগ্রী—চন্দনবৃক্ষ।

ভদ্রা—রান্না, কটফল। পর্যায়—  
প্রসারণী, কটফল, অনন্তা, জীবন্তী,



অপরাজিতা, নীলা; বলা, শমী,  
বচা, দস্তী, হরিদ্রা, শ্বেতপর্বা,  
কাশ্মরী (?), সাবিকবিশেষ,  
কাকোড়বরিকা ।

ভদ্রালপটিকা—গম্মালী, *poederia foetida* .

ভদ্রাবতী—কটফলবৃক্ষ ।

ভদ্রৈল—বড় এলাচ ।

ভদ্রোদনী—বলা, নাগবলা; *sida cordifolia* .

ভব—চালতা । *dillenia speciosa* .

ভবদারু—দেবদারুবৃক্ষ ।

ভবা—১ কামরাঙ্গা গাছ, ২ নিম গাছ;  
৩ কারবেলা; ৪ চালতা ॥ রাজনি°  
রাজব° ॥

ভব্যা—গজপিপ্পলী ।

ভরণী—ঘোষকলতা ।

ভল্লক—১ ইংগুদিবৃক্ষ, ভল্লাতকবৃক্ষ ।

ভল্লপদ্মহী—গোরক্ষতডুকা ।

ভল্লাতক—[স° অরুক্ষর; হি° ভিলাজ,  
ম° বিববা, বিম্বা, বিম্বে; গজু°  
ভিলামং; ক° কেরবীজ; তে°  
নাল্লাজীড়ী; ও° ভল্লিপ; তা°  
শোনকোট্টই; ফা° বিলাদর; অ°  
হবুলকব; ইং marketing nut,  
cashew nut] ভেলা; ভালা;  
ভালেয়া ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

*semicarpus anacardium* .

আম্রাদিবর্গের অতি উচ্চবৃক্ষ ।  
বালেশ্বর ও বীরভূম হাজারিবাগ,  
অণ্ডলে প্রচুর জন্মে । কাণ্ড সরল ।  
ফুল ছোট ও হরিদ্রাভপাত । ফল  
কাল । শীতে পাকে । ভেলাগাছের  
কাঠে প্রচুর আঠা থাকে । ফল বর্ষা-  
কালে হয়, ফলের রস গায়ে লাগিলে  
ফুসকুড়ি হয় । রজকেরা ও তন্তু-  
বায়েরা এই রসের সঙ্গে চুন  
মিশিয়ে কাপড়ে দাগ দেয় । এর  
কাল রস বানিস করতে প্রয়োজন  
হয় । পর্ষায়—অরুক্ষ, অরুক্ষর,  
অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভল্লী, বীর-  
বৃক্ষ, গোকবৃং ।

ভল্লাতকী—ভল্লাতক গাছ ।

ভল্লিকা—ভল্লাতক গাছ ।

ভল্লী—ভল্লাতক গাছ ।

ভশিরা—কন্দাব° । *beta bengalensis* .

ভষা—শ্বৰ্ণক্ষীরী (?) ।

ভস্মক—১ বিড়ঙ্গ (?), ২ ভাগী (?) ।

ভস্মগৰ্ভ—তিনিশবৃক্ষ ।

ভাট, ভাইট, ভাট—[স° ঘণ্টাকর্ণ,  
ঘণ্টক; ও° গেছুটি; হি° ভাট]  
ভাট, ঘেটুফুল, ঘেট; *clerodendron infortunatum* . ভাণ্ডীরা-

দিবর্গের আরণ্য ক্ষুদ্রপত্রি। ফুল  
সাদা রঙের ফাঙ্গান মাসে ফোটে।  
ফল ঘোর রক্তবর্ণ। ২ volka-  
meria infortunata.

ভাট ( দেশজ )—volkameria  
odorata.

ভাটাই—*andropogon aciculatus*.

ভাড়া—[ মং ভুগরাজ ] *tridax*  
*procumbens*. সোমরাজ্যাদি  
বর্গের শাকবি। কদাকার দীর্ঘ-  
জীবী। পাতায় কাটা আছে। ফুল  
দু রকম। হলদে রঙের।

ভাটশোলা—*aeschynomene palu-  
dosa*.

ভাগু—গর্দভাগু গাছ; গাঁধিভাট বা  
পাকুর গাছ।

ভাডীর—১ ভাট গাছ; *cleroden-  
dron infortunata*. ২ বট গাছ।

ভাদাল—গন্ধভাদাল, গাঁদাল।

ভাদালিয়া মূথা—ভদ্রমূত্রক।

ভাদ্রিক—চীনা ধান।

ভানু—অক বৃক্ষ, আকন্দগাছ।

ভানুফলা—কদলী, *mus sapien-  
taum*.

ভারতী—ব্রাহ্মী।

ভার্গবী—দুর্বা, নীল দুর্বা; শ্বেত  
দুর্বা, *panicum dactylon*.

ভার্গী—[সং সুরূপা, গর্দভ শাক, ব্রাহ্মণ-  
যন্তিকা; হি ভারগী, ব্রহ্মনেটী;  
কো ভামটী; মং ভারঙ্গী; গুজ-  
ভারঙ্গী; কং কিহ দেগু; তে ভন্ট-  
ভারঙ্গী; নেপা চুয়া] বামনহাটী,  
বামনহাটী। ॥ রাজনি ॥ ব্রহ্মযন্তি।  
*siphonanthus indica*, *cle-  
rodendron serratum*, *c.*  
*siphonanthus*. পর্যায়—ভদ্রভ-  
শাকী, ফজী, অঙ্গারবল্লবী, ব্রাহ্মী,  
ব্রাহ্মণযন্তি, বাস্তারি, ভুজা, পদ্মা-  
যন্তি, ভারঙ্গী, বাতির, কামজিৎ,  
সুরূপা, ভ্রমরেন্টা, শত্রুমাতা ॥ রাজনি ॥  
বাঙলায় প্রচুর জন্মে। কাণ্ড সরল,  
অশাখ বা খুব কম শাখাশ্রিত।  
পাতা কাণ্ডের চারিদিকে স্তরেস্তরে  
বিন্যস্ত, ফুল সাদা। মূলের  
ছাল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

ভাৰ্গজী—বনকাপাসী

ভাৰ্গবৃক্ষ—পশুপত্ৰগাছ (?)।

ভাৰ্গাক—শাকভেদ;।

ভিষ্ক—শ্রাবণীক্ষুপ।

ভিডা—ভিডী নামে এক জাতীয় গাছ  
॥ রাজনি ॥ পর্যায়—ভিডীতক,

ভিডক, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুপাদ, চতুঃ  
পদ, সুশাক, অসুপদ্রক, করপর্ণ-  
বৃন্তবীজ।

ভিন্নভিন্নাঘন—[ইং chick pea] চণক  
ছোলা (?), *cicer arictinum*.

ভিন্নযোজনী—পাষাণহেদক বৃক্ষ ।

ভিন্নরাজ—কেশরাজনামক বন্যশাকবি°,  
*Wedelia calendulacea*.

ভিন্নশিষ্টক—শ্বেত গুঞ্জা ।

ভিন্নভূষণ—গুঞ্জাবৃক্ষ ।

ভিন্নোট—লোম্বীবৃক্ষ ।

ভিন্নকুপ্রিয়া—গুড়ুচী ।

ভিন্নগুজিতা—কন্দগুড়ুচী ।

ভিন্নগুভদ্রা—ভদ্রদণ্ডিকা ।

ভিন্নগ্যাৎ—বাসক ।

ভিন্নমোত্তর—কুম্ভাঙ্গ ।

ভিন্নর—১ কষ্টকারী, ২ শতাবরী; ৩  
ইক্ষুভেদ ।

ভিন্নরূক—ইক্ষুবি° ॥ ভাবপ্র° ॥

ভিন্নভূষণা—গুঞ্জা ।

ভিন্নণ—হিষ্টাল ।

ভূজগপুষ্প—পুষ্পবৃক্ষ ভেদ ।

ভূজগ্ৰন্থাতিনী—সপর্ককালিকা । পর্ষায়  
—সূরি, সপর্কাকী, ক্ষুৎকরী,  
পূহা ।

ভূজগ্ৰন্থদমনী—নাকুলীকন্দ (?) ।

ভূজগ্ৰপার্ণিনী—নাগদমনী ।

ভূজগপুষ্প—ক্ষুৎপভেদ ।

ভূজগ্ৰলতা—নাগবল্লী ।

ভূজগক্ষী—রাশ্না । পর্ষায়—নাকুলী,

সরসা, নাগবৃক্ষা, গন্ধনাকুলী.  
নকুলেটা, ভূজগক্ষী, সপর্কাকী;  
বিষনাশিনী ।

ভূজগ্ৰাখ্য—নাগকেশর, *measua  
ferrea*.

ভূইআদা—হরিদ্রাদিবর্গের বহু পত্র  
সমম্বিত শাকবি° । *hedychium  
coccineum* খুব উচ হয় । ফুল  
পাশদে রংয়ের । পুংকেশর একটা ।

ভূইআমলা—[স° ভূম্যামলকী] *flaco-  
urtia cataphracta* [আমলকী দ্র°]

ভূইওকড়া—*verbena nodiflora*.

ভূইকামড়ি—ভূমিতে বিস্তৃত হওয়া  
লতাবি°, *merremia emar-  
ginata, convolvulus remi-  
form*. কলম্বী আদিবর্গের  
লতাবি° । গাটে গাটে শিকড় ।  
পাতা অর্ধচন্দ্রাকার, বেঁটা লম্বা ।  
ফুল ছোট হলদে রংয়ের ।

ভূইকুমড়া—কুমড়া দ্র° । যে কুমড়া  
মাটিতেই থাকে মাচায় উঠে না ।

ভূইখেজুর—ছোট খেজুর ।

ভূইচাপা—ভূমিচপক, *kaempferia  
rotunda*, চপক দ্র° ।

ভূইছাতী—ছত্রাক ভেদ ।

ভূইজাম—বনজাম দ্র° । *premna  
herbacea*.

ভুইডালিম—ডালিম দ্র° ।

ভুইডুম্বর—*figus repens*.

ভুইশণ—গুল্মভেদ, *crotoberia prostrata*.

ভুদম্ব—[হি° কোটিমুন্ডী, ভুই-  
কদম] ১ অলম্ববৃক্ষ, কোকসিম,  
*ligusticum ajwaen*. ২ মহা-  
প্রাণিকা ।

ভুদম্বক—যবানী ।

ভুদম্বী—গোরক্ষমুন্ডী ।

ভুদশ—১ মহাপ্রাণিকা, ২ ওল ।

ভুদপিথ—*feronia elephantum*.

ভুদব্দারক—[হি° ছোটল সোড়া]  
বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° সমর্থ° ॥ পর্যায়  
—ক্ষুদ্রগ্লেস্মাক্ষক, ভুশেল, লঘু  
শেল, লঘুপিচ্ছিল, লঘুশীত,  
সূক্ষ্মফল, লঘুভূতদ্রুম, ভুদব্দ-  
দার ॥

ভুদুম্মাণ্ডী—ভুইকুমড়া ।

ভুদকেশ—১ শৈবাল, ২ বট ।

ভুদকেশী—অবলগুজ, সোমরাজ ।

ভুদজ্জরী—ক্ষুদ্র খেজুরবি° ॥ রাজনি° ॥

পর্যায়—ভুদজ্জা, বসুধাখজুরিকা,  
ভুমিখজুরী ।

ভুদজব্দ—১ গম । ২ বইচগাছ, ও  
বনজাম ।

ভুদকেশ—১ শ্বেত দূর্বা । পর্যায়—

গোলামী, ভুতকেশী, অল্পকেশী,  
কেশী । ২ নীলনিগুন্ডী (?), ও  
রাখালশসা, ৪ শ্বেততুলসী, ও  
শেফালিকা, ও জটামাংসী, ৭ পুত্র-  
জীবী ।

ভুতকেশী—শাকবি°, *corydalis gova-  
nlana*. প্রকারভেদ—১ ভুতকেশ,  
২ শেফালিকা, ও নীলসিন্ধুবার ।  
পশ্চিম হিমালয় প্রদেশে জন্মে ।  
মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

ভুতকেশরা—মেথিকা, মেতি ।

ভুতল্ল—১ লশুন, ২ ভুজবৃক্ষ ।

ভুতল্লী—১ তুলসী, ২ মর্দাভিতকা (?) ।

ভুতজটা—জটামাংসী, *valeriana  
jatamansi*

ভুতদ্বাবিন্—ভুতাক্ষবৃক্ষ, রক্তকরবীর ।

ভুতদ্রুম—গ্লেস্মাক্ষক ।

ভুতনাশন—১ রুদ্রাক্ষ, ২ ভেলা, ও  
সর্ষপ ।

ভুতপতি—কৃষ্ণতুলসীবৃক্ষ ।

ভুতপত্নী—তুলসী ।

ভুতপদ্ম—শ্যোণাকবৃক্ষ ।

ভুতবাস—কলিদ্রুম (?), *terminalia  
belerica*.

ভুতবৃক্ষ—১ শ্যাওড়া গাছ, *trophis  
aspera*, ২ শ্যোণাক গাছ, *bign-  
onia indica*.

ভূতবৃক্ষক—প্লেথোস্টকবৃক্ষ, চালতা  
গাছ ।

ভূতবেশী—১ শ্বেত শেফালিকা, ২  
নিগর্দুডী (?) ।

ভূতভৈরবী—[ সঁ ভূতভৈরবী ; ওঁ  
ভূতত্রী ] বটকর্ণাদিবর্গের  
আরণ্য ক্ষুদ্র বৃক্ষবিং, *pemna*  
*integrifolia*. কদাকার । পাতা  
চওড়া । গন্ধ বড় তীব্র । ফুল  
ছোট ছোট । বর্ষাকালে প্রস্ফুটিত  
হয় ।

ভূতালিকা—পিড়িং শাক ।

ভূতমকুম্ভ—*croton oblongi-*  
*folium* ॥ বেল ॥

ভূতসার—শেণাগকভেদ ।

ভূতহনু—ভূজবৃক্ষ ।

ভূতহস্তী—১ বক্ষ্যাকর্কেটকী,  
নীলদর্বা ।

ভূতহারিণ—১ দেবদারু, ২ রক্তকরবীর ।

ভূতাক্ষুণ—[ হিঁ গম্বোজদ্বান ]  
হেঁচেতা গাছ, ॥ রাজনিং ॥ *aniso-*  
*melis malabérica*. পর্যায়—  
ক্ষবক, ক্ষুরক, তীক্ষ্ণ, ক্রুর, ক্ষব,  
রাজোষেদনসংজ্ঞ, ভূতদ্রাবী,  
গ্রহাঞ্জয় ।

ভূতি—১ রোহিষ তৃণ, ২ ভূতৃণ ।

ভূতিক—১ ভূনিম্ব, ২ বট ফল,

ও যমানী ।

ভূতীক—১ ভূনিম্ব, ২ যমানী,  
ও ভূতৃণ ।

ভূতৃণ—১ গম্বতৃণ, (চলিত) গম্বখড়  
॥ রাজনিং ॥ পর্যায়—রোহিষ,  
গোময়প্রিয়, রামকপূর, সতৃণ,  
শর, শ্যামক, ধ্যামক, পোর, দেব-  
জম্বক ॥ শব্দ ॥ ২ ভূজৃণ  
পর্যায়—রোহিষ, ভূতি, ভূতিক,  
কুটুম্বক, মালাতৃণ, সমালম্বী,  
ছত্র, অতিছত্রক, গৃহবীজ, সুগম্ব,  
গুচ্ছাল, পুংস্ত্রবিগ্রহ, বধির,  
অতিগম্ব, শৃংগীরোহ, কয়েন্দুক ।

ভূতেষ্টা—কৃষ্ণতুলসী ।

ভূদরাশ্রয়া—মুষিককণী ।

ভূদরীভবা—আখপণী ।

ভূদয়ী—মুষিককণী (?) ।

ভূধাত্রী—ভূম্যালকী ।

ভূনিম্ব—[ সঁ কিরাতীতক্তক, অনাৰ্ঘ-  
তিক্ত ; হিঁ চিরায়তা ; মঁ কিরা-  
ইত ; কাড়েকিরাইত, ফলিকিরাইত ;  
গুজঁ কীরয়াত ; কঁ নেলবংউচু ;  
তেঁ নেলানেম ; ফাঁ নেনিহাদ ;  
অঁ কসব্দঝারিবঃ ] চিরেতা  
চিরাতা ॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥ *gent-*  
*iana chirayta*, *swertia chi-*  
*rata*. পর্যায়—অনাৰ্ঘতিক্ত,

কৈরাত, রাজসেনক, কিরাততিত্ত, হৈম, কান্ততিত্ত, কিরাতক, কটতিত্ত।  
পৰ্বতীয় লতাবি° । নেপাল  
দেশজাত ভূনিম্বকে 'নেপাল'  
বলে। সমগ্র ক্ষুদ্রপ ঔষধার্থে  
ব্যবহৃত হয়।

ভূনীপ—ভূমিকদম্ব।

ভূপদী—মল্লিকা।

ভূপলাশ—বিশালী।

ভূপাটলী—টোকাপানা। ( ক্ষুদ্র  
বৃক্ষবি° ) ॥ রাজনি° ॥ পৰ্যায়—  
ভূকুম্ভী, ভূতানী, রক্তপদীপকা।

ভূপেষ্ঠ—রাজাদনীবৃক্ষ।

ভূফল—হরিতমুগ।

ভূবদরী—[ হি° বাড়বের ] ক্ষুদ্রকোলী  
॥ রাজনি° ॥ পৰ্যায়—ক্ষিতবদরী,  
বজ্রীবদরী, বদরবজ্রী, বহুবলিকা,  
লঘুবদরী, বদরীফলী, সূক্ষ্মবদরী,  
মেঠোকুল, ক্ষুদ্রকোল বা বদরফল  
॥ রাজনি° ॥

ভূমিকদম্ব—কদম্ববি° ॥ রাজনি° ॥  
পৰ্যায়—ভূনীপ, ভূমিজ, ভূগ-  
বল্লভ, লঘুপদুপ, বৃন্তপদুপ।

ভূমিকদম্বকা—মুণ্ডারীবৃক্ষ।

ভূমিকন্দলী—লতাভেদ।

ভূমিকদমাড—[ স° ইক্ষুগাম্বিকা,  
বিদারী ] ভূই কুমড়া।

ভূমিখজুরীকা—ছোট খেজুর ॥

ভাবপ্র° ॥ পৰ্যায়—স্বাধী, দুরা-  
বোহা; মৃদুচ্ছা; ক্ষুদ্রফলা; কাক-  
কটী, স্বাদুমস্তকা।

ভূমিচম্পক—ভূইচাঁপা গাছ, kaemp-  
feria rotunda. পৰ্যায়—  
তাম্রপদুপ, সন্ধিবন্ধ, দ্রুমণ।

ভূমিচারী—আখকণী লতা।

ভূমিজ—ভূমিকদম্ব।

ভূমিজম্বু—বনজাম ॥ রাজনি° ॥ pre-  
mna herbacea. পৰ্যায়—  
নাদেয়িকা, নাদেয়ী, ভূজম্বু,  
ভূজম্বুকা, কাকজম্বু, শীতপল্লবা,  
হৃষফলা, ভূগবল্লভা; হৃষা, ভ্রম-  
রেষ্ঠা, পিকভক্ষা; কাষ্ঠজম্বু।

ভূমিভূম্বর—[ স° গ্রায়মানা; চটুগ্রা°  
বল্লসডুম্বর ] ভূইভূম্বর, বল্ললতা,  
গোরী শিওরা, খটীশুম্মার, ficus  
heterophylla. এর দুই প্রণী  
হয়; ১ f. scabrella, ২ f. re-  
pens. নদীর ধারে হয়।

ভূমিদা—মাল্লিকাপদুপ বৃক্ষ।

ভূমিদাড়িষ—[ নেপালে—ছুবা ]  
careya herbacea. সমতল  
ভূমিতে ফাগুন ও চৈত্র মাসে  
জন্মে।

ভূমিপাশ—বৃক্ষভেদ।



ভূমিপিণ্ডা—তালবৃক্ষ, borassus  
flabelliformis.

ভূমিপত্র—শ্যোগাকবৃক্ষ ।

ভূমিবল্লী—মাকীন্দকা লতা, ভূই  
আমলা ।

ভূমিমণ্ডা—অষ্টপাদিকালতা । মদন-  
লীলী বা হাপরমালী ।

ভূমিমণ্ডপভূষণা—মাধবীলতা ।

ভূমিলগ্না—শুল্কাপরাজিতা ।

ভূমিলতা—শম্পপদ্মপীলতা ।

ভূমীসহ—[সং বরদাতু ; হি° ভূংরসহ]

ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ ভাবপ্র° সমর্থ° ॥

পর্যায়—বারদাতু, বরদাতু, থরচ্ছুদ ।

ভূম্যক্ষুদ্রা—[ হি° ভূইত খড় ]

ভূইখড় ।

ভূম্যামলকী—[ সং ভূম্যালকী ; ও°

বাড়ীঅলা ; হি° অরুনেলী ;

তালিশপত্রী, পানি আমলক, পানি

আমলা ॥ ভাবপ্র° ॥ phyllanthus

niruri; flacourtia cataphra-

cta. পর্যায়—বহুপদ্মী, জড়া;

অধ্যাভা; তালি আমলকী, অজটা,

সক্ষফলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুলক, ঝটা

অমলা, অজ্জটা, তালী, শিবাঝটা,

মলা, ঝটামলা, অমলাজ্জটা, ভূম্যাম-

লকিকা, শিবামলকী, বহুপদ্মা,

বহুফলা; বহুবীৰ্বা; ভূধাত্রী,

( রাজনিবর্ষটের মতে )—তালী;

তমালী, তমালিকা, উচ্চটা, দৃঢ়-

পাদী; বিতুল, বিতুলিকা, ভূধাত্রী,

চারটা, বৃষা; বিষয়ী, বহুপত্রিকা,

বহুবীৰ্বা অহিভয়দা; বিশ্বপর্ণী,

হিমলয়া; অজ্জটা, ধীরা ॥ শব্দ° অম° ॥

বর্ষায় শাকবি° । পাতা ফুল

ফলে আমলকী তুল্য গাছ । বাংলা,

আসাম, ব্রহ্ম, বোম্বাই প্রদেশে

জন্মে । অনেক স্থানে এর চাষ

হয় । [ আমলা দ্র° ]

ভূম্যামলী—ভূম্যামলকী ।

ভূম্যাহুলী—অপরাজিতা লতা ।

ভূম্যাহুলা—ক্ষুদ্রপরিবেশ । পর্যায়—

কুষ্ঠকেতু; মাকীন্দরী, মহোষধ ।

এর ভূম্যক্ষুদ্রা নামও পাওয়া

যায় ।

ভূম্যাদরাশ্রয়া—মৃষিককণী লতা ।

ভূম্যদ্রা—ভূমিধ্বজরী ।

ভূমিদ্রা—বৃষ্টিকালী ।

ভূমিপত্র—ঔষধতণ ।

ভূমিপলিতা—পান্ডুরফলী (?) ।

ভূমিপদ্মা—শতপদ্মা (?) ।

ভূমিফলী—পান্ডুরফলী ।

ভূমিফেনা—১ সপ্ততলা বৃক্ষ; চামার

কসা, ২ সাম্ভবৃক্ষ ।

ভূমিবলা—অতিবল ।

ভূরিমঞ্জরী—শ্বেততুলসী বৃক্ষ ।

ভূরিমঞ্জী, ভূরিমালিকা—অশ্বষ্ঠা(১) ।

ভূরিরস—ইক্ষুবৃক্ষ ।

ভূরিলগ্না—শ্বেতাপরাজিতা ।

ভূরিসুগন্ধ—[সং ভূরিসুগন্ধ] নারঙ্গা-  
দিবর্গের ক্ষুদ্রবিং । প্রায় কামিনী-  
ফলের মতদেহতে কিন্তু এর পাতা  
সুগন্ধ । এজন্য এর পাতা বাজনে  
দেয় । *murraya koerigii*

ভূরুণ্ডী—১ হাতিশৃঙ্গা, ২ মহাকরঞ্জ,  
৩ আদিত্যভক্তা, *heliotropium*  
*indicum* .

ভূরুহ—১ অজর্নবৃক্ষ, ২ শালবৃক্ষ ।

ভূরুহা—১ মাংসরোহিণী, ২ দ্রবী ।

ভূজ—[ হি° ভোজপত্র ]° রাজনিং,  
ভাবপ্রং, রাজবং । পর্যায়—বক্ষদ্রুম,  
ভূজ, সূচর্মী, ভূজপত্রক, চিত্রশুক,  
বিন্দুপাত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক,  
ভূতল্ল, মৃদুমল্ল, শৈলেশ্দ্রুহ, চর্মী,  
বহুবক্কল, ছত্রপত্র, শিব, স্থিরচ্ছদ,  
মৃদুশুক, পাঠপদ্মক, ভূজ, বহু  
পাঠ, বহুশুক, মৃদুশুক । হিমালয়ে  
জন্মে । গাছ বেশি বড় হয় না ।

এক বর্ষের অধিককাল বাঁচে না ।

ভূজপত্র—ভূজপাতা ।

ভূজপত্রক—শেওড়া গাছ ।

ভুলগ্না—শঙ্খপ্ৰপী ।

ভূশকরা—কন্দভেদ ।

ভূশেল—ভূকর্ষদারক, ভূঁইচালতা ।

ভূস্তৃগ—ভূতৃগকে বলে ।

ভূঙ্গা—ভাগী ।

ভূঙ্গির্পাণকা—ছোট এলাচ ।

ভূঙ্গিপ্রয়—খলিকদম্ব ।

ভূঙ্গিপ্রয়া—মাধবীলতা ।

ভূঙ্গবৃক্ষ—১ কুন্দবৃক্ষ, ২ কদম্বভূঙ্গ ।

ভূঙ্গমারি—কোনদেশের কোবিকা  
পদ্মবৃক্ষ ।

ভূঙ্গমোহিন—১ চম্পকবৃক্ষ, ২ স্বর্ণ  
চম্পক ।

ভূঙ্গরাজ—[সং ভূঙ্গরাজ, মাক'ব,  
কেশরাজ ; হি° ভঙ্গরা, ভাঙ্গরা,  
ভগরোয়া, ভেগরিয়া, কুকুরভাঙ্গরা ;  
কো° ছোট ভূঙ্গরাজ; কালকেশদুরি ;  
ম° মাকা ; গুজ° ভাঙ্গরো ;  
ক° গরুগমরু ; ফা° জমদ'র ;  
তে° গুন্টকনগরটেট্ট । ভূঙ্গরাজ-  
পটেট্টে ; ও° কলাকেশদুরা ; অ°  
হমীজ্ ] ভীমরাজ, কেশদুতে, কেশদ-  
রীয়া । *wedelia calendulacea*,  
*eclipta alba*, e. *prostrata* .  
সোমরাজ্যাদিবর্গের আরণ্যশাক-  
বিং । কেশদুতে, কেশরাজ । পদ্ম-  
ভেদে তিনপ্রকার—১ শ্বেতপদ্ম  
ভূঙ্গরাজ—*eclipta erecta*, ফুল

সাদা । ২ পীতপুষ্প ভূম্বরাজ—  
ভীমরেজ *wedelia calendula-*  
*cea* । ৩ নীলপুষ্প ভূম্বরাজ—  
নীলকেশরিনা । দাড়ায়মান বা  
ভুল্লুণ্ঠিত ক্ষুদ্রপৰ্ব । সরস  
ভূমিতে জন্মে ।

ভূম্বলভ—ধারাকদম্ব, ভূমিকদম্ব ।

ভূম্বলভা—১ ভূমিজম্বদ । ২

তরণীপুষ্পবৃক্ষ ।

ভূম্ববৃক্ষ—ভীমরাজ গাছ ।

ভূম্বসুহৃদ—কুন্দপুষ্পবৃক্ষ ।

ভূম্বসোদর—কেশরাজ, কেশুরে ।

ভূম্বানন্দা—যুথিকা ।

ভূম্বাভীষ্ট—আম্ববৃক্ষ ।

ভূম্বার—লবঙ্গ ।

ভূম্বাক—ভূম্বরাজবৃক্ষ ।

ভূম্বাহব—ভূম্বরাজ ।

ভূম্বিন—বটবৃক্ষ ।

ভূম্বী—১ অতিবিষা, ২ বটীবৃক্ষ,

৩ ভাং ।

ভূম্বীফল—আমড়া ।

ভূম্বগেটা—১ ঘটকুমারী, ২ ভাগী,

৩ কাকজম্বদ ।

ভূম্বটকা—শ্বেতগুঞ্জা ।

ভূম্বপত্রিকা—মহানীলী ।

ভূম্বপর্ণী—মণ্ডুকপর্ণী ।

ভূম্বকী—মণ্ডুকপর্ণীবৃক্ষ ।

ভেড়ী—ঢেড়শ । উড়িষ্যার উত্তরাংশে  
'মেড়াশিঙ্গা' বলে (এর ফল বেকৈ  
মেড়ার শিংয়ের মত হয় বলে) ।

ভেদন—১ হিন্দু, ২ অল্পবেতস ।

ভেরাডা—[স° এর'ড, গালব ; ও°  
গব] ভেরাডা; রেড়ী, এড়'ডাদি-  
বর্গের বৃক্ষবি° । রেড়ীগাছ । রেড়ী  
দ্র° ২ লাল ভেরাডা [রাঢ়ে নাম  
স্বল্পস্বর] বিলেতী বাইগব । *jatro-*  
*pha gossypifolia* । আমেরিকা  
রোজিল এর আদি জন্মস্থান ।  
৩ বাঘভেরেডা, গাবভেরেডা—[স°  
ব্যাগ্নপুচ্ছ, পণ্ডাফুল ; ও° বাইগব ;  
নদীয়া—কচ ; ইং *physic nut*]  
*jatropha curcas* . পাতার পাঁচ  
আফুল আছে । ফুল ঈষৎ হলদে ।  
ফলে তিনটি আঁটি ।

ভেরু—[স° বিল্ল ; হি° ভেরা ; উ°  
ভেরু ; তে° বিল্লা ; ইং *Indian*  
*satin wood*] *chloroxylon*  
*swietenia* . নিম্বাদিবর্গের মধ্য-  
মাকৃতি বন্যাবৃক্ষবি° । উড়িষ্যা,  
মধ্যভারত ও দক্ষিণভারতের অরণ্যে  
জন্মায় । কাঠ সুগন্ধ ও চিকণ ।

ভেলক—ভেলা । পর্যায়—প্লব; কোল,  
উড়ুপ, তারণ, তরণ, তারকণ্ড,  
তরীষ ।

ভোগিগম্মিকা—১ সপ'গন্ধ বৃক্ষ, ২  
লবঙ্গজ্বলন্ত বৃক্ষ ।

ভোরার (দেশজ)—গুড়ম্ভেদ, *rhizo-*  
*phora mangie*.

ভৌম—রক্তপূর্ণবা ।

ভ্রমরচ্ছলী—লতাবি° । পর্যায়;—  
ভ্রমরহনা, ভ্রমরা, ভ্রমরুলিকা ।

ভ্রমরমারী—মালবদেশের প্রসিদ্ধ পদুপ-  
বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

ভ্রমরা—ভ্রমরচ্ছলী ।

ভ্রমরার্তিথি—চম্পকবৃক্ষ ।

ভ্রমরানন্দ—১ বকুল, ২ রক্তগ্রান ।

ভ্রমরেষ্ট—শ্যোণাকভেদ ।

ভ্রমরোৎসবা—মাধবীলতা ।

## [ ম ]

মউআ—[ স° মধুক, আতারী ; ও°  
মোহা ; কোল—কুণ্ডুকুম ; হি°  
মউআ, মহুআ, মহুলা, মউল,  
জাংগলী, মোক্তল, জাংগলী মহোবা,  
মোবা ; মধ্যপ্র° মহোবা ; বোম্বা°  
বোহা ; মোবা, মহুয়া ; দাক্ষিণাত্য  
—জাংগনী, মোহা, মোহ ; গুজ°  
মহুড়, মহুয়া : ম° মউদ, রাণাচ,  
মোহা চা ঝাড়, রাণাচ, পেচা ঝাড়,  
মোহা, মাহা ; সাও° মাটকোম ;  
ভীল—মহুয়া ; ব্রহ্ম—কানসন ]  
মহুলা, মউল, বনমহুয়া, মউয়া ;  
*bassia longifolia*. চৈত্র-বৈশাখে  
ফুল হয় । আয়ুর্বেদে ব্যবহার :  
তেলের প্রদীপ দিলে শিরঃপীড়া  
ভাল হয় । কাঁচ ছাল বেটে প্রলেপ

দিলে বাতবেদনার উপশম হয় ।  
ছালের রস ও দধি গাত্রব্রণনাশক ।  
এর খোল পোড়ালে তার গন্ধ ও  
ধূমে কাঁট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর  
পলাইয়া যায় । খোল পুড়ুরে  
ফেললে মাছ মরে যায়, কোষপ্রদাহে  
শুষ্ক ফুলের পুলাটিস দিলে অণ্ড-  
কোষস্থ শিরার স্ফীতি ও বেদনার  
উপশম ঘটে । রঙের কৃষ্ণতা গাঢ়  
করতে এর ছালের রস দেওয়া হয় ।  
বীজের শাস থেকে যে তেল হয়  
তাকে গোড়রা বলে 'জোনি' স°  
মধুকসার । ঘায়ে ভেজাল  
দেওয়া হয় । এই তেল থেকে  
উৎকৃষ্ট সাবান ও বাতি তৈরি  
হয় । ফুল থেকে একরকম ধূস্র-

বর্ণের মদ তৈরি হয়। পাতা সিম্ব  
করে গায়ে মাখলে খোস-পাঁচড়া  
সারে। ॥ রাজনি° রাজব° ॥

মউআলু—[ স° মধুআলু ; হি° মান  
আলু ; বোম্ব° কাস্ত, কাস্টে-  
কাগী, কেটৎ ; দাক্ষিণ্য° ছোট  
পিঁড়ালু ; তে° কাটকেলেংগ,  
কুম্বর বড্ড ; সাঁও° বীরসপিং ; ইং  
goa potato ] মোআলু, dios-  
corea aculata. মধ্য, দক্ষিণ বংগ  
ও পশ্চিম ভারতে এর চাষ হয়।

মউরি—[ স° মিশ্রিয়া, শতপদ্মপী,  
মধুরিকা ; হি° সোবা, সোয়া,  
সুতোপ্সা ; কাশ্মি° সৌই ; ইং  
dill, sowa ] শুলফা, সোবা,  
শুলপ, শুলফা pencedowam  
graveolens. প্রাচীন ভারতে  
ও গ্রীসে এই মসুরিকা ব্যবহারের  
উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের  
নিউ টেস্টামেন্টে ও পেলোডিয়াম  
ও দিওস্করিদাস গ্রন্থে এর প্রমাণ  
আছে।

মউল—মধুদ্রুম। bassia longi-  
folia. [ মধুক দ্র° ]।

মকরুদ—কন্দপদ্মবৃক্ষ, jami-  
num pubescens.

মকরুদবতী—পাটলপদ্ম, পারুল

গাছ, bignonia suaveolens.

মকরাকর, মকরাকার—কষ্টকরঞ্জ,  
কাঁটাকরঞ্জ।

মকর, মকুল—বকুল গাছ, পীতভ  
সুগন্ধি পদ্মপবৃক্ষবি°।

মকুলক—দাড়ীবৃক্ষ।

মকুশ্ট, মকুশ্টক—বনমুগ, মৃগকলাই।  
ব্রাহ্মভেদে মধুর, কষায় ও রুচি-  
কারী ॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥

মকুলক—দাড়ীবৃক্ষ।

মকা—জনাবৃক্ষ [ জনাব দ্র° ]।

মক্ষবীৰ্য—প্রিয়ালবৃক্ষ।

মথানা (দেশজ)—annesbia spino-  
sa; enyalis ferox.

মঘ—পদ্মপাৰি°।

মঘী—আউসধান।

মংগলছায়—বটবৃক্ষ, ficus infecto-  
ria.

মংগলা—১ শুল্কদুর্বা, ২ করঞ্জভেদ, ৩  
হরিদ্রা, ৪ নীলদুর্বা।

মংগল্য—(ক) ১ অম্বথ, ২ বিল্ব, ৩  
মসুরক, ৪ জীবক, ৫ নারিকেল,  
৬ কপিথ, ৭ রীঠাকরঞ্জ, ৮ জীব  
শাক ॥ ভাবপ্র° ॥ (খ) ১ ছায়মান,  
২ বট, ৩ বিল্ব, ৪ গোঁজহা, ৫  
তুর্গাবি°।

মংগল্যক—মসুর কলাই ॥ ভাবপ্র° ॥

মংগল্যকুসুমা—শংখপদ্পী ।

মংগল্যানামধেয়া—জীবন্তী ।

মংগল্যা—১ শমী, ২ অধঃপদ্পী, ৩

মিসি (?), ৪ শরুবচ (?) ও রোচনা

(?), ৬ প্রিয়ঙ্গু, ৭ শংখপদ্পী, ৮

মাংগলী, ৯ জীবন্তী, ১০ বচা (?),

১১ হরিদ্রা, ১২ চিড়া, ১৩ দর্বা ।

মচকতাচনী—গুম্মভেদ, ২ পটোলী-  
বৃক্ষ ।

মজ্জারস—১ সপ্তলা, ২ মনসাবি ।

মজ্জাসার—জাতীফল ।

মণ্ডকপত্রী—সরপত্রীলতা ।

মঞ্জার—তিলকবৃক্ষ, বঙ্গী ।

মঞ্জারী—তিলবৃক্ষ, তুলসী ।

মঞ্জারীক—১ গন্ধতুলসী, ২ তিলক-  
বৃক্ষ, ৩ তুলসী, ৪ বেতসলতা ও  
অগোকবৃক্ষ ।

মঞ্জিকলা—কদলী, কলা ।

মঞ্জিষ্ঠা—[সং লেহিতলতা, রক্তযষ্ঠী ;

হি° মঞ্জিৎ, মজীঠ ; ম° মঞ্জিষ্ঠ ;

গুজ° মজীঠ ; ক° মঞ্জিষ্ঠা ; তে°

মঞ্জিষ্ঠতিঠি, তাম্রবল্লী ; তা°

মজিষ্ঠা ; ফা° রূনাগ ; অ° ফব্বহ-

তুসিরগ উরুকুম্বাগান] রক্তবর্ণ

এক প্রকার লতা ॥ রাজনি°, রাজ-

ব°, ভাবপ্র° ॥ মঞ্জিষ্ঠা, ইং ind-

ian madder] rubia cordif-

olia, r. manjistha. পর্যায়

—বিবসা, জিহ্বী, কালমেধিকা,

মণ্ডকপত্রী, ভেড়ারী, যোজন-

পল্লী, কালমেধী, কালা, জিহ্বী,

ভাণ্ডারী, ভাণ্ডকা, ভাণ্ড, হরিণী.

বক্তা, গৌরী, যোজনবল্লিকা, বপ্রা,

রোহিণী, চিত্রলতা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী,

জননী, বিজয়া, মঞ্জুষা, রক্ত

যষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কাল-

ভাণ্ডকা, অরুণা, জ্বরহস্তী, ছত্রা,

নাগকুমারিকা, ভাণ্ডার-লতিকা.

রাঙ্গাম্বী; বস্ত্রভষণ্য । শিকড় ও

ডাটার রসে কাপাস সূতো ও

কাপড় রং হয় ।

মটর—[স° বতুল ; হি° মটর ; ম°

বাটাবা ; ও° মটর ; ইং yellow

vitchling.] মটর কলাই, lath-

yrus appaco. মটর কলাইশাককে

‘সতীন কলাই’ বলে । এর চাষ

হয় । সুগন্ধক । প্রকারভেদ

—১ দেশী মটর—[ইং field

pea] pisum arvense. ফুল

বেগুনে রংয়ের । ২ ছোট মটর

—[ইং grey pea] sativum

quadratum. ৩ কাবুলি মটর

—[ইং pea] p. sativum. ফুল

সাদা । সুগন্ধ মটর—lathyrus



odoratus.

ম'ড—১ এর'ডবৃক্ষ, ২ শাকভেদ ।

ম'ডক—মাধবীলতা ।

ম'ডপা—নিপাপী, শিম ।

ম'ডপী—ক্ষুদ্রপত্র পাই শাক, ক্ষুদ্র  
পত্রোপাদকী ।

ম'ডলপত্রিকা—রক্তপুনর্নবা ।

ম'ডলিন—বটবৃক্ষ ।

ম'ডলী—দর্বা ।

ম'ডা—আমলকী ।

ম'ডুক—শ্যোগাক ( ? ) ।

ম'ডুকপর্ণ—শ্যোগাকবৃক্ষ ।

ম'ডুকপর্ণী—[সঁ মঞ্জিষ্ঠা ; আদিত্য-  
ভক্তা ; হিঁ চরেলী, বক্ষমা'ডুকী ;  
গুজ'খড়ভরামি ; তেঁ ম'ডুকব্রক্ষী ;  
তাঁ বল্লরীকৈরী ; পঁ ঢোলামানা-  
মানি ॥ রাজব' ॥ থলকুড়ী, *hyd-  
rocotyle asiatica*. পর্যায়—  
ভেকী, ম'ডুকী, ম'লপর্ণী, ম'ডুক-  
পর্ণিকা । থলকুড়ি যেখানে  
সেখানে তৃণচ্ছাদিত ভূমিতেও  
জন্মে । ভল্লদাঁঠিত লতাবি' ।  
প্রতি গ্রান্থি থেকে শিকড় বের  
হয় । সমগ্র ক্ষুদ্র কষায় । পাতা  
বড়, গোল অনেকটা ঠোঙার  
মত । ফুল লাল । আর এক প্রকার  
ম'ডুকপর্ণী আছে, তার পাতাছোট,

গোল ও সমতল । কোচবিহারে  
তাকে 'কুদেমানামানি' বলে ও  
শাক হিসেবে ব্যবহৃত হয় । শ্বাদ  
কষায় ও মধুর । সমগ্র ক্ষুদ্রপাই  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

ম'ডুকমাতৃ—ব্রাহ্মী দ্র' ।

ম'ডুকা—মঞ্জিষ্ঠা ।

ম'ডুকী—১ আদিত্যভক্তা, ২ ব্রাহ্মী,  
৩ থলকুড়ী ।

মৎকুণ—নারিকেল ।

মৎকুনারি—১ ইন্দ্রাশন, (চলিত) সিংধ,  
*cannabis sativa* ২ শণবৃক্ষ ।মৎসাগম্বা—লাহুলী বৃক্ষ, জল-  
পিপলী ।

মৎস্যাপিত্তা—কতকী চারা ।

মৎস্যাক্ষক—সোমলতা ।

মৎস্যাক্ষী—১ ব্রাহ্মী, ২ সোমলতা, ৩  
গন্ডদর্বা ।

মৎসাদনী—জলপিপলী ।

মতিদা—১ জ্যোতিষ্মতী লতা, শিমুড়ী  
ক্ষুদ্রপ ।

মন্ত—ধন্তুর ।

মদকর—ধন্তুর গাছ, ধাতকীবৃক্ষ ।

মদকুদ্রুম—তালবৃক্ষ ।

মদগন্ধ—সপ্তচ্ছদবৃক্ষ, ছাতিম গাছ ।

মদগম্বা—অতসী ।

মদয়ী—পতিকা শাক, *basella*.

lucida.

ঐদন—[স° শলাক, ধারাকল] ময়না  
দ্র°। ১ মধুকর, ২ ময়নাগাছ, ৩  
খদির গাছ, ৪ অকোট গাছ, ৫  
বকুল গাছ।

ঐদনক—দমনকবৃক্ষ।

ঐদনী—ধাতকীবৃক্ষ।

ঐদনিনা—মল্লিকা গাছ।

ঐদনেচ্ছাফল—আম্রবৃক্ষ।

ঐদভিগুনী—শতমূলী, asparagus  
racemosus.

ঐদয়ন্তিকা, ঐদয়ন্তী—১ মল্লিকা, arab-  
ian jasmine ২ কাটমল্লিকা।

ঐদশাক—উপোদকী, (চলিত) পংহ।

ঐদশোড়ক—জায়ফল।

ঐদসার—তুলবৃক্ষ।

ঐদহসিনী—মহাকরঞ্জ।

ঐদহেতু—ধাতকী।

ঐদাঢ্য—তালবৃক্ষ।

ঐদাঢ্য—লোহিত কিশ্টী।

ঐদির—খয়ের।

ঐদ্যপদ্য—ধাতকী।

ঐদ্যবাসিনী—ধাতকীবৃক্ষ।

ঐদ্যমোদ—বকুলবৃক্ষ।

ঐদ—১ মধুকর, ময়নাগাছ, ২ অশোক  
গাছ।

ঐদকবৃক্ষ—[স° মধুক; হি° মোহা,

মহুআ; দ-ভারত—মোহা; বো°  
মউয়া। মোহি; ব্রহ্ম° কনজাম্ভ  
কানমো] মহুল বা মৌল পদ্য  
বৃক্ষ ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ মহুয়া  
গাছ, *bassia longifolia*.

মধুককটিকা—মধুর জম্বীরবি°, মউ-  
কটিকা। পর্যায়—কুশা, বীজপদ্য,  
মধুর, মধুককটী।

মধুককটী—মধু বীজপদ্য।

মধুকাক্ষ—মধুকবৃক্ষ, মউল গাছ।

মধুককটিকা, মধুককটী—জম্বীর  
বি°। (চলিত) মধুর, মহুর।  
পর্যায়—মাতুলদা, স্বগন্ধা,  
সিরিজা, পতিপদ্যিকা, অত্যঙ্গা,  
দেবদত্তী।

মধুকীর—খজুরবৃক্ষ।

মধুখজুরিকা—মিষ্ট খেজুর ॥ রাজনি° ॥  
পর্যায়—মধুককটিকা, কোলক-  
কটিকা, কটিকিনী, মধুক-  
লিকা, মাধবী, মধুরা, মধুরখজুরী  
মধুখজুরী ॥ শব্দক°।

মধুগন্ধ—বকুল গাছ, অজর্দন গাছ।

মধুগন্ধপ্রসূনক—অজর্দনবৃক্ষ।

মধুগাঙ্গন—শোভাঙ্গন বৃক্ষ, সজিনা  
গাছ। *hyperanthera mor-  
unga*.

মধুজম্বীর—মিঠা লেবুর গাছ, জামের

লেবু ॥ রাজনি° ॥ citrus lim-  
etta.

মধুজীরক—[ হি° সৌক; ইং com-  
mon anise ] pimpinella  
anisum.

মধুজীবন—বিভীতক গাছ ।

মধুতাল—গ্রীতালবৃক্ষ ।

মধুতৃণ—ইক্ষু ।

মধুদত্ত—আম্রবৃক্ষ ।

মধুদত্তী—পাটলাবৃক্ষ ।

মধুদ্রব—লাল সজিনা গাছ ।

মধুদ্রুম—মৌলগাছ ।

মধুনালিকেরক—বামন নারিকেল ।

কোকনদেশে জাত । পর্যায়—  
মাধবীকফল, মধুফল, অসিতজফল,  
মাক্ষিকফল, মৃদুফল, বহুকর্ট,  
দ্রুফল ।

মধুনিপাপ—মকুটশিম্বী, মকুটশিম ।

মধুনী—ক্ষুপবি° । মাকড়হাতা;

মাকড়হাউলি । পর্যায়—ঘৃতমন্ডা,

রায়সোলী, স্রুমফলা ।

মধুপর্ণিকা—১ গাভারীবৃক্ষ, ২

নীলীবৃক্ষ ।

মধুপর্ণী—১ গাম্ভারীবৃক্ষ, ২ নীলী-

বৃক্ষ, ৩ মধুবীজপদ্র, ৪ বিকঙ্কত

বৃক্ষ ।

মধুপালিকা—গম্ভারী, gmelina

arbora.

মধুপীলদ—আখরোট ।

মধুপদ্রপ—১ মধুদ্রুম, ২ শিরীষ গাছ,

৩ অশোক গাছ, ৪ বকুল গাছ ।

মধুপদ্রপা—১ নাগদন্তীবৃক্ষ, ২

বীতকীবৃক্ষ ।

মধুফল—বিকঙ্কতবৃক্ষ ।

মধুকলিকা—মধুধজুরিকা ।

মধুবহুল—১ বাসন্তী লতা, ২ শুল্ক-

যদাথিকা ।

মধুবল্লী—কারবেল্লক, করলা ।

মধুবিশ্বী—কন্দুরুলতা, কন্দুরুকী ।

মধুবীজ—দাড়িম ।

মধুবীজপদ্র—[ হি° মিঠা বিজোরা ]

মধুককটীমা, মধুপর্ণী ॥ রাজনি° ॥

পর্যায়—মধুককটী, মধুবল্লী,

মধুরককটী, মধুরফলা, মহাফলা,

বধমানা ।

মধুমজ্জন—আখোট গাছ ।

মধুমৎ—কাশ্মীরবৃক্ষ ।

মধুমস্ত—মহাকরঞ্জ ।

মধুমল্লী—মালতী ।

মধুমালতী—১ বাসন্তী লতা, ২

মালতীফুলের গাছ ।

মধুমল—মোআলদ ।

মধুঘণ্টী—[ ইং sugar cane ] ইক্ষু-

দ্র° ।

মধুর—১ জীবক, ২ রক্তশিগ্র, ৩ রাজাগ্র, ৪ রক্তেশ্বর, ৫ বীজপদর, ৬ মজ্জরতণ, ৭ মাতুলঙ্গবৃক্ষ, ৮ বাতামবৃক্ষ, ৯ বন্যবদর, ১০ মধুকবৃক্ষ, ১১ শ্বেতনিপাব, (চলিত) বরষাটি, ১২ মটর।

মধুরক—জীবকবৃক্ষ।

মধুরককটী—মিষ্টলেবু।

মধুরককুম্ভ—ছাঁচিকমড়া।

মধুরখজুরী—মধুরজুরীবৃক্ষ।

মধুরগণ—১ কাকোলী, ২ ক্ষীর-কাকোলী, ৩ জীবক, ৪ ঋষভক, ৫ মৃগাপর্ণী, ৬ মাষপর্ণী, ৭ মেদ, ৮ মহামেদ, ৯ গুলজ, ১০ কাকড়াশুজী।

মধুরজম্বীর—মিঠা জামীর লেবু  
 ॥ রাজনি ॥ পর্যায়—মধুরজম্বীর,  
 মধুরজম্ব, মধুরজম্বল, রসদ্রাবী,  
 শর্করক, পিষ্টদ্রাবী।

মধুরজম্বল—মধুর জম্বীরবৃক্ষ।

মধুরজীবকাদি—১ জীবক, ২ ঋষভক, ৩ মেদা, ৪ মহামেদ, ৫ ঋষি, ৬ বৃষি, ৭ কাকোলী, ৮ ক্ষীরকাকোলা, ৯ সুপপর্ণীক্স।

মধুরজ্ব—ধববৃক্ষ, ধাওয়া গাছ।

মধুরফল—১ রাজবদর, নারকুলে কুলের গাছ, ২ তরমুজ।

মধুর ফলা—মিঠা লেবু।

মধুরবিম্বী—কুন্দুরুলতা, কুন্দুরুলকা।

মধুরবর্গ—১ শালিধান্য, ২ ষাটধান্য, ৩ ষব, ৪ গোধূম, ৫ মাসকলায়, ৬ পাণিফল, ৭ কেসুর, ৮ শশা, ৯ গোমক, ১০ ককটী, ১১ অলুবি, ১২ তরমুজ, ১৩ কতকফল, ১৪ গিলোভা (জম্বীরবি), ১৫ পিয়াল, ১৬ পম্ববীজ, ১৭ গাম্ভারী ফল, ১৮ মোল (?), ১৯ দ্রাক্ষা, ২০ ঋজুর, ২১ ক্ষীরই, ২২ তাল, ২৩ নারিকেল, ২৪ ইক্ষু-বিকার (?), ২৫ পীতবেলেলা, ২৬ আলকুশী, ২৭ ভূমিকুম্ভ, ২৮ পল্লঙ্গা, ২৯ গোন্ধুরী, ৩০ মূর্বলতা, ৩১ মহুরি, ৩২ কুম্ভ।

মধুরবল্লী—মধুরবীজপদর।

মধুরবাতাম—মিঠা বাদাম।

মধুরবীজপদর—মিষ্ট লেবু গাছ।

মধুররস—১ ইক্ষু ২ তাল।

মধুরসা—১ মূর্বী, ২ দ্রাক্ষা, ৩ গাম্ভারী, ৪ দর্শিকা, ৫ প্রসারণী (?), ৬ শতপুষ্পী, শুল্ফা।

মধুরস্রবা—পিণ্ডখজুরী।

মধুরা—১ শতপুষ্পা, ২ মধুককটিকা, ৩ মেদা, ৪ কাকোলী, ৫ শতাবরী, ৬ বৃহজ্জীবন্তী (?), ৭ পালক্য

শাক; পালম শাক; ৮ মহাশিম্বী,  
৯ কদলীবৃক্ষ, ১০ ঋষভক, ১১  
মসুর, ১২ মহামেদা, ১৩ মধু-  
খজুরীবৃক্ষ; ১৪ মাতুলজ, ১৫  
মধুরিকা, মৌরি; ১৬ কাজিক।

মধুরাজলুক—মৌ-আলদ।

মধুরাত্নক—আম্রাতক।

মধুরাম্বরস—নারঙ্গী লেবু গাছ।

মধুরিক—মৌরী ॥ রাজনিং ॥ পৰ্যায়—  
শালের, শীতশির; ছত্রা; মিশী,  
মিশ্রেরা, সালের, মিসি, মিসী;  
মিশি; অবাকপদুপী, মজল্যা,  
মধুরা, মধুরী।

মধুরেণু—১ কটভীবৃক্ষ, ২ শব্দপদুপ  
পাটলা।

মধুলতা—শলী তৃণ।

মধুলিকা—মধুলী। ১ শমীধান্য, ২  
কপিলদ্রাক্ষা, ৩ রাজিকা (?)।

মধুবীজপদুর—মধুককটিকা, মধুপর্ণী  
॥ রাজনিং ॥

মধুশকরা—শ্বেতনিপাব।

মধুশাক—মধুকবৃক্ষ, মউল গাছ,  
bassia latifolia.

মধুশিগ্র—১ লাল সজিনা গাছ, ২  
শ্বেত শিগ্র।

মধুগিতা—শ্বেতনিপাব।

মধুশ্রেণী—মর্বা ॥ ভাবপ্রং ॥

মধুস্বসা—জীবন্তীবৃক্ষ।

মধুষ্ঠীল—মউল গাছ।

মধুসরস—মহুয়া।

মধুসম্ব—কপিলদ্রাক্ষা।

মধুসুদনী—পালম শাক।

মধুস্রব—১ মধুকবৃক্ষ ২ মোরট লতা,  
৩ পিণ্ডী খেজুর গাছ।

মধুস্রবস—মধুকবৃক্ষ।

মধুস্রবা—১ জীবন্তী ২ রক্তলজ্জালুকা,  
৩ মর্বা, ৪ ক্ষীরমর্বা, ৫ গোয়া-  
নিয়া লতা।

মধুস্রাব—১ মোরট লতা, ২ মধুক  
বৃক্ষ।

মধুক—[সং মধুক, গুড়পদুপা; হি°  
মহুয়া; ও° মহুয়া; ই° mahwa  
tree] মোয়া, মউল, মহুয়া  
bassia longifolia, b. latifolia.  
পৰ্যায়—গুড়পদুপ, মধুদ্রুম, বান,-  
প্রস্থ, মধুষ্ঠীল, মধুক, মধু, মধু-  
পদুপ, মধুস্রব, মধুবৃক্ষ, রোধ-  
পদুপ, মাধব ॥ শব্দ° ॥ পশ্চিমবঙ্গ,  
মধ্যভারত ও উত্তর ভারতের ডাঙ্গা  
জমিতে জন্মে। মহুয়া ফল  
পড়িছে এক প্রকার মদ তৈরি হয়।  
ফলের বীজে তেল হয়।

মধুকপর্ণসাহস্রী—তুলসী গাছ।

মধুকপর্ণা—অশ্বট্টা, আমড়া।

মধূলিকা—মধুকবৃক্ষ । পর্যায়—দীর্ঘ-  
পত্রক, গোড়শাক, মধুল, স্বৰূপ-  
পত্রক ।

মধূলিকা—১ মূৰ্বা, ২ গোখরম, ৩  
মাকড়হাতা ।

মধ্যদেশভবা—শালিধান্যাবি° ।

মধ্যন্দিন—বন্ধক গাছ ।

মধ্যপদ্ম—জলবেতস ।

মধ্যমা—ছোট জাম গাছ ।

মধ্যস্থি—লতাভেদ, *grewia asia-  
tica*.

মধ্বাল, মধ্বালক—মৌ আল  
॥ রাজব° ॥

মধ্ববাস—আম্রবৃক্ষ ।

মনসা গাছ [স° সিজ ; হি° মূহর ; কো°  
পাতাওঁসিজ ; ম° নিবড়ক ; গুজ°  
থোরদা°ভলিযো ; ক° নিবাডিক ; তে°  
চেম্‌ড ; ফা° লাদ্‌লাম ; অ°  
জকুম, ও° পাতরিয় সিজ ] ক্ষুদ্র  
ক্ষীরি বৃক্ষবি°, মনসাগাছ, *euph-  
orbia liguberia*. বহুকণ্টকযুক্ত  
মনসা গাছকে (স°) স্নহী, স্নদক,  
সুধা আর সুতীক্ষ্ম অঙ্গ কণ্টকযুক্ত  
মনসা গাছকে (স°) সেহুড বলে ।

প্রকারভেদ—১ ত্রিশিরা মনসা [স°  
ত্রিধারা স্নহী] *euphorbia  
antiquorum*. ২ চৌধারা

মনসা, ৩ খরসানী মনসা,  
৪ বিলাতী মনসা, ৫ ফণমনসা,  
*cactus indicus*. ফেনীমনসা,  
ফণমনসা, নাগফণা (ও° নাগফণা)  
*opuntia dillenii*. কণ্টকপূর্ণ  
ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° । পাতা নাই, কাটা  
সবুজ চেঁটা ও গ্রন্থীযুক্ত । ফুল  
হলদে রংয়ের বড় বড় । শব্দক  
ভূমিতে বেড়ার ধারে জন্মে ।

মনোজবা—অগ্নিজিহ্বাবৃক্ষ ।

মনোজ্ঞ—কুন্দপদ্ম

মনোজ্ঞা—১ বন্যাককটিকা । ২ আব-  
তকী, ভদ্রদন্তিকা বৃক্ষ, ৩ শুল-  
জীরক, ৪ জাতীপদ্ম ।

মনোহর—কুন্দবৃক্ষ ।

মনোহরা—১ জাতী, ২ স্বর্ণফুলী ।

মশানক—[ম° মারবেল্লি, কলিঃ—  
মারবল্লী,] তর্গবি° । পর্যায়—হরিত,  
দ্রুমল, তর্গান্বিপ ॥ রাজনি° ॥

মশট—বারিভদ্রবৃক্ষ ।

মন্দা—[স° বন্দা] বঙ্গীকরণ, লতা-  
করণ । পরবৃক্ষজীবী, আম,  
অশ্বথ গাছে হয় । পাতা সবুজ ও  
পুরু ।

মন্দার—[হি° পঞ্জিকা, পঞ্জরা, ফরাদ,  
মন্দার ; কাছাড়ী—মাদার ;  
ও° পালদয়া, চালদয়া ; ম°



পাছারা; কন্দরা, পঞ্জারু; গুজ্জ°  
পনরবো; তে° মহামেদ; ইং coral  
tree ] ১ পালিতা মাদার, ery-  
thrina indica; e. fulgen.  
স্বর্গীয় পঞ্চ বৃক্ষান্তর্গত দেব-  
বৃক্ষবি° (মন্দার, পারিজাত,  
সন্তান, কলশবৃক্ষ ও হরিচন্দন—  
এই পঞ্চ দেববৃক্ষের মধ্যে মন্দার  
প্রধান। এরা অমর। মাঝারি  
আকারের গাছ, শীঘ্র বড় হয়।  
হিমালয় হতে কুমারিকা পর্যন্ত  
জন্মে। ফুল লাল। ২ অক°  
বৃক্ষ, আকন্দ, ও ধূতরো গাছ।

মন্দারপদ্ম—মাদার ফুল।

মন্মথানন্দ—আম্রভেদ।

মন্যুগণী—ভেকপণী, থলকুড়ি।

মন্বাদ্য—ধানাবি°।

মপষ্ট; মপষ্ট, মপষ্টক; মপষ্টক—  
বনমৃগ।

ময়চা—গুল্মমলতা ভেদ।

ময়ন—মদনবৃক্ষ।

ময়নাকাটা—[স° মদন, শল্য, পিণ্ডীতক,

মরুবক; হি° মৈনফস, করহর;

আ° কোৎকোড়ং; কো° ময়না;

ও° পাতর; ম° গেঠঠ; গুজ্জ°

টোল; ক° বোনগরেরগয়; বোনগরে-

এড়ুডু; তে° বসন্তকর্ডামিচেট্রু;

তা° মডুককরয়; নেপা° মৈদন;  
অ° জোজুটেক; ইং the eule-  
tic nut ] আচ্ছদাদিবর্গের  
ক্ষুপবি°, randia dumetorum.  
ময়নাকাটার গাছ মধ্যমাকৃতি। ফুল  
সাদা ও ছোট ও পঞ্চদল। গ্রীষ্ম-  
কালে ফোটে। ফল গোলাকার,  
পাঁকিলে পীতবর্ণ হয়। কোচবিহারে  
প্রচুর পরিমাণে জন্মে। পাকা  
ফলের বীজ ওষুধার্থে ব্যবহৃত  
হয়।

ময়নটক—মুগ, phaseolus mungo.

ময়নরক—১ অপামার্গ, ২ পদ্যতিক্রমক।

ময়নরজ্জ্ব—শ্যোণাক গাছ।

ময়নবিদলা—অশ্বত্থা, আমড়া।

ময়নশিখা—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°, celosia

cristata. পর্যায়—খরাস্বা, কারবী,

দীপ, লোচমস্তক, অপামার্গ, বিহ-

চুড়া, শিখিনী, শিখালু, সুশিখ,

শিখা, শিখাবলা, কোকশিখা।

মরকতপত্রী—পাচী নামক পত্রশাক।

মরাকালী—বিহুটি গাছ।

মরালিকা—মনসাবি°।

মরিচ—[স° শ্যাম, মরিচ; হি° মিরী,

কালমরিচ; তে° মিমিয়লু; তা°

মিলগু; ইং black pepper ] ১

গোলমরিচ ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

piper nigrum. পর্যায়—পবিত্র, শ্যাম, কোল, বল্লাজ, উষণ; যবনেটে, বৃন্তফল, শাকাজ, ধর্মপত্তন, কটুক, শিরোবন্ত, বীর, কফাবরোধি, মূষ, সর্বহিত, কৃষ্ণ, বেঙ্গজ, কোলক, বরিণ্ট। ॥ নিষণ্ট ॥ তাম্বুলাদিবর্গের লতাবি। ফল কাল ক্ষুদ্র গোল তীর কটুরসযুক্ত। ত্রিবাংকুর, দক্ষিণ ভারত ও মালাবার প্রদেশে জন্মে। বাঙলায় ও অসম প্রদেশে অল্প অল্প জন্মে। স্ত্রী ও পুং পদ্য প্রায় ভিন্ন গাছে হয়। প্রকারভেদ—ক শ্বেতমরিচ [ সফেদ মরিচ; ইং white pepper ], খ ধানলক্ষা মরিচ—capsicum fastigiatum. ২ কঙ্কাল (?), ৩ কতক ফল, ৪ কৃষ্ণমরিচ, লাল মরিচ, লক্ষ্যমরিচ, ৫ গন্ধতুলসী, ৬ কাফলী মরিচ, c. grossum.

মরিচপত্রক—সরলবৃক্ষ।

মরিচসদৃশ—ককোলবৃক্ষ।

মরিচ—মরিচ দ্রু।

মরু—মরুবকবৃক্ষ।

মরুজা—মৃগেবীরু।

মরুজাতা—আলকুশী।

মরুৎ—১ মরুবকবৃক্ষ, ২ গ্রহিণপূর্ণ

বৃক্ষ, পিড়িংগাছ।

মরুৎকর—রাজমাষ।

মরুতক—মরুবকবৃক্ষ।

মরুভবা—তাম্বুলাক্ষুদ্রপ, খিরাই।

মরুদ্রুম—বিটখাদির।

মরুমালা—পৃষ্ঠা; পিড়িংগাছ, trigonella corniculasa.

মরুব—মরুয়া, নাগদানা ॥ রাজনি, ভাবপ্র ॥ পর্যায়—স্বরপত্র, গন্ধপত্র, ফণিজ্যক, বহুবীর্ষ, শীতলক, সুবাস, সমীকরণ, জম্বীর, গ্রহকুসুম, মরুরক, আঙ্গম সুরভিপত্র, মরিচ।

মরুবক, মরুবক—১ কটকবৃক্ষবি, vanguardia spinosa. পর্যায়—পিণ্ডীতিক, বসন, করহাটক, শল্য, মদন। ২ স্বপ্পপত্র তুলসী। পর্যায়—সমীকরণ গ্রহপুচ্ছ, ফণিজ্যক, জম্বীর। ৩ জম্বীর ভেদ। ৪ মরুয়া ফুল। পর্যায়—শুক্লপদ্য, তিলক, কুলক। ৫ নাগদানা। পর্যায়—স্বরপত্র, গন্ধপত্র।

মরুথা—ক্ষুদ্র দুরালভা।

মরুক—শঠী।

মরুভবা—১ কাপাসী (?), ২ যবাস (?), ৩ হুসখাদির, ৪ দুরালভা।

মরুয়া—[স° মরুবক; হি° মরুবা]  
তুল্যাদিবর্গের স্নগন্ধ শার্কবি°।  
গন্ধতুলসী, বাবুইতুলসী, *oclimum basilicum*.

মকটীপাংলী—অপামার্গ, *achyranthes aspera*.

মকটীপ্রম—ক্ষীরবৃক্ষ, *mimosa karki*.

মকটী—১ অপামার্গ, ২ অজমোদা,  
৩ মাকড়া করঞ্জ।

মকটেন্দু—কুচিলা।

মতমান কদলী—মতবান বীপজাত  
বলিয়া এই নাম। এই জাতীয়  
কদলী আকৃতি ও মিষ্টতায় অন্য  
কদলী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিভিন্ন  
নাম—অমৃত মতমান, ঢাকাই  
মতমান, মালভোগ। কদলী দ্র°।

মমরী—দেবদারু বি°।

মলয়—শাল্মলী কন্দ (?)।

মলপু—কাকোড়ুম্বরিকা, *figus oppositifolia*, Rox.

মলয়দ্রুম—১ মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ,  
২ চন্দনবৃক্ষ।

মলয়া—তেউড় গাছ।

মলহাত—শাল্মলীকন্দ, *salmalica malabarica*.

মলহর—জৈপাল গাছ।

মলা—১ ভূম্যালকী, ২ আম্রহরিদ্রা।

মলাকা জামরুল—জামরুল বৃক্ষভেদ।

মলাকা কাঁজি—মল্লিকা সঁাঝ, *aldrovanda verticillata*.

মল্লতরু—পিয়াল গাছ।

মল্লি—মল্লিকা।

মল্লিকা—[স° মল্লিকা; হি°  
মোতিয়া; ম° রানমোগর; গুজ°  
ডোলর; কলি° বল্লিমল্লিকে  
(গে); তে° মল্লিপদপাল, মল্লি-  
চেটু; ও° মল্লি; ম° বেনি-  
মোগরা] বেলী, বেলা, মল্লিকা ॥  
রাজনি° ॥ *jasminum sambac*.  
শ্বেতবর্ণ স্নগন্ধ পদপবি°।  
বেল ও বেলার দল মল্লিকা  
অপেক্ষায় সংখ্যায় অধিক ও পুরু।  
মল্লিকার পাপড়ি ও বোটা সরু  
ও দীর্ঘ। পুষ্প—তৃণশূন্য,  
ভূপদী, শতভীরু, তৃণশূন্য,  
শীতভীরু, ভূপল্লী, গোরী, বন-  
ভদ্রিকা, প্রিয়া, সোম্যা, নারীটো,  
গিরিজা, সিতা, মল্লী, মদয়ন্তী,  
চন্দ্রিকা, মেদিনী। প্রকারভেদ—  
(১) বৃক্ষমল্লিকা—[স° বটপল্লী,  
স্নগন্ধাঢ্যা, বৃক্ষপদপ, মল্লভা]  
*tuscan jasmine*. (২) নব-  
মল্লিকা—[ইং *arabian jas-*

mine ] *jasminum sambac*.

(৩) বনমালিকা—[ ইং narrow leaved jasmine ] কাঠমালিকা,

সদৃশ, *jasminum sambac*, *j. augustifolium*. (৪) শিব-

মালিকা—[সং বন্ধুক, অকংবন্ধুক] ।

মালিকাখ্যা—ত্রিপুরপলী পদ্প, এক-  
প্রকার যুথিকা । পর্যায়—মোহিনী,  
বটপত্রা, মোহনা ।

মালিকাপদ্প—১ কটজবন্ধুক, কুড়িচি,  
২ করুণবন্ধুক, ৩ মালিকাপদ্প ।

মালিনী—অতিমৃদুক পদ্পবন্ধুক ।

মালিপত্র—ছত্রক ।

মল্লী—মালিকা ।

মশকিন্—উদুম্বরবন্ধুক ।

মশচ্ছদ—গুন্মভেদ; দেওতাড়তৃণ,  
*andropogon serratus*.

মশাপর্ণ—কুঞ্জকবন্ধুক, *glycine debilis*.

মষীলেখ্যদল—শ্রীতালবন্ধুক ।

মসিকা—শেফালিফা ।

মসিনা, মসীনা—[সং মসংগা] তিসী ।  
অতসী দ্র° ।

মসুরিকা—মোরী দ্র° ।

মসুর—[মং মসুর] কলাইবি° ॥ রাজনি°

ভাবপ্র° ॥ *lens esculenta*,

*ervum hirsutum*, *cicer*

*lens*. পর্যায়—মছল্যক, মসুর,

রীহিকাপ্তন, মসুরামসুরা, রাগদালি,  
মছল্য, পৃথুবাঁজক, শুর,

কল্যাণবাঁজ, গুড়বাঁজ, মসুরক,  
মগল্যা, মসুরকা । ভারতের

সর্বত্রই এর চাষ হয় । পাতায় ৮

পর্ণ থাকে, শাঁটিতে দুটি বাঁজ ।

প্রকারভেদ—খাড়ী মসুর—[সং  
খাঁডক] বড় মসুর ।

মসুরাবদলা—১ কৃষ্ণত্রিবং, কালতেউড়ী,  
২ শ্যামলতা, ৩ আগ্নাতক, ৪ মেঘ-  
শুকী (১) ।

মসুরা—১ মসুর কল্যাণ ২ মেঘশুকী  
(১), ৩ ত্রিবং, তেউড়ী ।

মসুরী—১ ত্রিবং, ২ রক্তত্রিবং ।

মস্তকী—[ফা° মস্তিকা-ই-রুমা; আ°  
মস্তগী] ক্ষুদ্রবন্ধুকবি° । ভূমধ্য-

সাগরের কাছে ইহার আদি  
জন্মস্থান । সে দেশ থেকে ভারতে

আসে । রোমদেশীয় নাম—রুমী  
মস্তকী । গাছের নিষাস (*mastic*)

ধূনার মত রজনবি° । বানিসের  
জন্য ব্যবহৃত হয় । (১) কাবুলী

মস্তকী—*pistacia mutica*.

বেলুচিস্থানে জন্মান ।

মহতী—১ বৃহতী, ২ বাতাকী, বেগুন ।

মহা—গোপবল্লী, গোরক্ষচাকুলিকা ।

মহাকটভী—শেবতকটভীগাছ ।

মহাকটকিনী—ফণিমনসা, cactus indicus.

মহাকটা—শেবস্তীবৃক্ষ ।

মহকদম্ব—কৈলিকদম্ব ।

মহাকন্দ—রাজপলাণ্ডু, hingtsa repens ॥ উইল ॥

মহার্কাপথ—বিষবৃক্ষ ।

মহাকরঞ্জ—বড় করঞ্জ, বৃহদাকার করঞ্জ ॥ রাজনি ॥ পর্যায়—ষড়্গ্রন্থা, হস্তিচারিণী, উদ্কীর্ণ বিষয়ী, কাকয়ী, মদহস্তিনী, শারঙ্গেষ্টা, মধুমতী, রসায়নী, হস্তিরোহণক, হস্তিকরঞ্জক, স্মনস, কাকভাণ্ডী, মধুমন্ডা ।

মহকর্কার—গুল্মভেদ ।

মহার্কাণ্ণকার—আরববৃক্ষ ।

মহাকাল—১ মাকাল । পর্যায়—উরুকাল, কিম্বাপ, কাকমদক, কাকমদ, দেবদালিকা, দালা, দলিক, জলঙ্গ, ঘোষকাকৃতি ২ গুল্মভেদ, ৩ আম্রবৃক্ষভেদ ।

মহাকুমুদা—কাশ্যরী, গভারী (?) ।

মহাকুম্ভী—কটকল ।

মহাকৃষ্ণ—কৃষ্ণাপরাজিতা ।

মহাকোশফলা—দেবদালীলতা, দেয়া-তাজা ।

মহাকোশতকী—[ হি° নেনুয়া ; তে° এনুগবীর ; ও° তরতি ] হস্তি-ঘোষা, হস্তিকোশতকী, ধুন্দুল, luffa aegyptiaca.

মহাক্লীতন, মহাক্লীতিনকা—শালপর্ণী ।

মহাক্লীর—ইক্ষুগাছ ।

মহাগদমহীরুহ—চালমুগরার গাছ ।

মহাগন্ধ—১ কুটজ গাছ; ২ জলবেতস, calamus faciculatus; ৩ নাগ-বলা, কৌবিকাপৃপ ।

মহাগন্ধা—সোমবল্লী ।

মহাগন্ধা—পুষ্টিপর্ণী ।

মহাগোধূম—বৃহৎ গোধূম বা গম ॥ ভাবপ্র° ॥ পশ্চিম দেশে জন্মে ।

মহাগোপা—শারিবা, অনন্তমূলা ।

মহাচণ্ড—পর্যায়—বৃহচণ্ড, বিবারি, সূচণ্ডকা, শুক্লচণ্ড, দীর্ঘপত্রী, দিব্যগন্ধা ।

মহাচিত্রপাটল—গুল্মভেদ ।

মহাচণ্ড—বৃহচণ্ড ক্ষুদ্র, বড়, চেঁচকো ।

মহাচত—মহারাজাম্রবৃক্ষ ।

মহাচহদ—দেবতাড়বৃক্ষ ।

মহাচছায়—বটবৃক্ষ, বিপুলছায়াযুক্ত বৃক্ষ ।

মহাজম্বীর—[ হি° বড় জিহ্বা ] করুণা-লেবু ।

মহাজম্বু, মহাজম্ব—বড় জামগাছ ।

রাজনি° ॥ পর্যায়—রাজজম্বু,

স্বর্ণলতা, মহাফলা, পিৰ্কাপ্রয়া,

কোকিলেট, মহালীলা, বৃহৎফলা ।

মহাজাতি—বাসন্তীপুষ্পলতা ।

মহাজালী—১ পীতবর্ণ ঘোষা (?) ; ২

আবর্তকী লতা, ৩ রাজকোষতকী ।

মহাজ্যোতিষ্মতী—[ হি° বড়ী মাল-

কাংনী] বড় লতাকটকী । পর্যায়—

তেজোবতী, বহুরসা, কনকপ্রভা,

তীক্ষ্ণা, স্রবণনকুলী, লবণা,

অগ্নিদীপ্তা, তেজস্বিনী, সুরলতা,

অগ্নিফলা, অগ্নিগভা, কঙ্কালী,

শেলস্নতা, স্নতৈলা, স্রবেশা, বায়সী,

তীব্রা, কাকান্ডী, বায়সদনী,

গীলতা, গ্রীলতা, সৌম্যা, ব্রাহ্মী,

লবণকিংশুকী, পারাবতপদী, পীতা,

পীততৈলা, যশস্বিনী, মেঘা,

মেঘাবতী, ধীরা ।

মহাঢা—কদম্ববৃক্ষ ।

মহাতরু—শুভ্রবৃক্ষ ।

মহাতালী—আবর্তকীলতা ।

মহাতিষ্ঠ—১ মহানিম্ব, ঘোড়ানিম, ২

কিরাততিষ্ঠক, চিরেতা ।

মহাতিষ্ঠা—১ যবতিষ্ঠা (?) । ২

পাঠা (?) ।

মহাতীক্ষ্ণ, মহাতীক্ষ্ণা—ভল্লাতক

বৃক্ষ ।

মহাতুবী—মহালাবু ।

মহাদন্তা—নাগবলা ।

মহাদারু—দেবদারু ।

মহাদিকটভী—শ্বেতাকিণহী লতা ।

মহাদূষক—শালিধান্যবি° ।

মহাদ্রুম—১ অশ্বখগাছ, ২ তালগাছ,

৩ মধুকগাছ ।

মহাদ্রোণা—[ হি° বড়ীদ্রোণ পুষ্পী ]

দ্রোণ-পুষ্পী ॥ রাজনি° ॥

মহানাগ—সুরপুন্নাগবৃক্ষ ।

মহানিম্ব—[ হি° মহারুখ, বকাহন ;

ও° মহানিম ] মহানিম, *ailanthus*

*excelsa*, ঘোড়ানিম ॥ রাজব° ॥

বনানিম, *melia azadirachta*.

পর্যায়—কৈটব, পবনেট, পর্বত ।

সুউচ্চবৃক্ষবি° । প্রায় ৪০।৫০ হাত

উঁচু । দেখতে প্রায় নিম্ন গাছের

মত । পাতা বহুপর্ণ, প্রায় দেড়

হাত দূ হাত পর্যন্ত বড় হয় । ফল

লম্বাকার । উড়িয়া প্রদেশে ও

ছোটনাগপুরে জন্মান্ব । নিম্ন দ্র° ।

মহানীলা—মহাজম্বু ।

মহানীলী—নীল অপরািজিতা ॥

রাজনি° ॥

মহাপঞ্চমূল—১ বিষ্ণু, ২ অগ্নিমঞ্চ,



০ শ্যোণাক, ৪ কাশ্মরী, ৫  
পাটলা ।

মহাপর্ণবিষ—১ শৃঙ্গী, ২ কালকট  
(?), ৩ মৃস্তক, ৪ বৎসনাভব, ৫  
শতকর্ণী ।

মহাপণ্ডুল—রক্তৈরুডবৃক্ষ ।

মহাপত্র—বড়পাতা গুল্ম ।

মহাপত্রা—মহাজম্বু ।

মহাপদ্ম—শুক্লপদ্ম, শ্বেত উৎপল ।

মহাপাটল—বৃক্ষভেদ ।

মহাপারুষক—বৃক্ষভেদ ।

মহাপারেবত—এক জাতীয় ফলবৃক্ষবি°  
॥ রাজনি° ॥ পৰ্ণায়—স্বর্ণপারেবত,  
সাম্মানিজ, খাৰিক, রক্তৈরবতক,  
বৃহৎপাবেবৎ, দ্বীপজ, দ্বীক-  
খজুর ।

মহাপিণ্ডীতক—মহামদন নামে এক  
কৃষ্ণবর্ণ বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥

মহাপিণ্ডীতরু—[ হি° পেড়িয়া ]  
শ্বেতপিণ্ডীতরু, বড় ময়না গাছ,  
কাল ময়না ॥ রাজনি° ॥ পৰ্ণায়—  
শ্বেতপিণ্ডীতরু, করহাট, ক্ষুর,  
শস্ত্রকোষতরু, শর, পিণ্ডীতরু ।

মহাপীলু—পীলুফলের গাছ  
॥ রাজনি° ॥ পৰ্ণায়—বৃহৎ পীলু,  
মহাফল, রাজপীলু, মহাবৃক্ষ,  
মধুপীলু ।

মহাপদ্রুদন্তা—শতমূলী, *asper-  
agus racemosus*.

মহাপদ্রুদন্তিকা—মহাশতাবরী ।

মহাপদ্ম—১ কদম্ববৃক্ষ, ২ কালমৃগ,  
৩ রক্তকাণ্ড, ৪ লবণবৃক্ষ, ৫ অপরা-  
জিতা, ৬ ধূম্রুল ।

মহাপোটগল—শরতর্গবি° ।

মহাফল—১ বিষ্ণুবৃক্ষ, ২ নারিকেল-  
বৃক্ষ, ৩ তালবৃক্ষ, ৪ পীলুবৃক্ষ ।

মহাফলা—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ রাজজম্বু,  
৩ কটুভূষী, ৪ মহাকোশাতকী, ৫  
কমলালেবু, ৬ বনবীজপুরুক, ৭  
নীলী, ৮ নাগফলা ।

মহাবলা—১ অতিবলা, পীতপদ্মপী,  
২ পিণ্ডপলী, ৩ নীলাবৃক্ষ, ৪  
ধামনবৃক্ষ, ধাওয়া গাছ ।

মহাবল্লী—লতানে গাছ, *gaertnera  
racemosa*.

মহাবীৰ্ণ—১ বনকাপাসী, ২ মহা-  
শতাবরী ।

মহাবৃক্ষ—১ সিজগাছ, ২ সেহুডবৃক্ষ,  
৩ বরঞ্জবৃক্ষ, ৪ তালবৃক্ষ, ৫ মহা-  
নীলবৃক্ষ ।

মহাবৃহতী—গুল্মভেদ, *solanum  
molongena*. -২ বার্তাকী,  
বেগুন ।

মহাবেগবতী—বৃক্ষবি° ।

মহারীহ—স্বটোধান ।

মহাভদ্র—কাশ্মীরী (?) । ২ বাতাকী,  
বেগুন ।

মহাভরী—[ স<sup>১</sup> শটীগন্ধমূলী ] মহা-  
ভরীবচ, শটী, *curcuma zedoaria*. হিরদ্রাদিবর্গের বন্য বৃক্ষ-  
বি<sup>১</sup> । চট্টগ্রাম ও পূর্ব হিমালয়ে  
জন্মে ।

মহাভীত—লজ্জালব্ধপ ।

মহামন্দার—বৃক্ষভেদ ।

মহামর্চিলন্দ—বৃক্ষভেদ ।

মহামূল—রাজপলাশড্র ।

মহাম্র—তিস্তিড়ি, তেতুল ।

মহারজত—ধতুরা ।

মহারজন—কুসুমভদ্রপ ।

মহারস—১ খজুর, ২ কশেরু, ৩  
৩ ইক্ষু, ৪ জম্বুবৃক্ষ ।

মহারাজচত—উত্তম আমকে বলে  
। রাজনি<sup>১</sup> ॥

মহারাক্ষটী—১ জলপিপলী, ২ শাক-  
ভেদ, মারাটী ।

মহারিষ্ট—মহানিশ্চ দ্র<sup>১</sup> ।

মহারোচ—বৃক্ষভেদ ।

মহাধ—মহাসোমলতা ।

মহাদ্রক—১ বুনো আদা, ২ শ্চুঠী ।

মহাধা—বৃক্ষবি<sup>১</sup> ।

মহালিকটভী—শ্বেতকির্ণহীবৃক্ষ ।

মহালোধ—লোধবি<sup>১</sup>; পাটিয়া লোধ ।

মহাবরা—দ্রবা<sup>১</sup> ।

মহাবরোহ—পাকুড় গাছ ।

মহাবল্লী—মাধবীলতা ।

মহাবাতকিনী—বনবেগুন ।

মহাবাষিকা—বৃক্ষভেদ ।

মহাবীরা—ক্ষীরকাকোলী ।

মহারোচ—বৃক্ষভেদ ।

মহাশণ—শণবীজ ।

মহাশণপদ্মস্পিকা—আতুর্ষীফুলের গাছ,

মহাশ্বেতা ফুলের গাছ

। রাজনি<sup>১</sup> ॥

মহাশণা—আরণ্যশণ ।

মহাশতা—মহাশতাবরী ।

মহাশতাবরী—[ হি<sup>১</sup> কহুহীমূল ]

মহাপদ্রবদান্তিকা বৃক্ষবি<sup>১</sup>

॥ রাজনি<sup>১</sup> ॥ পর্যায়—শতবীর্ষা,

সহস্রবীর্ষা, সুদ্রসা, মহাপদ্রব-

দান্তিকা, বীরা, তুঙ্গিনী, বহু-

পদ্মিকা, উর্ধ্বকণ্ঠী, মহাবীর্ষা,

ফর্ণিজিহ্বা, মহাশতা, সুবীর্ষা

॥ শব্দ ॥

মহাশমী—বড় শমী গাছ, *acacia*  
*suma*.

মহাশাখা—নাগবলা ।

মহাশালি—মোটোধান । পর্যায়—

সুগন্ধক ।

মহাশীতা—শতমূল্য।

মহাশুভ্রী—হাতিশুভ্র।

মহাশোভী—কটভীগাছ।

মহাশ্যামা—১ শ্যামলতা, *echites frutescens* ॥ উইল ॥ ২ কাল শিশু গাছ।

মহাপ্রবণী—মহাপ্রাবণিকা।

মহাপ্রাবণিকা—খলকুড়ী ॥ রাজনি ॥

পর্যায়—মহামুণ্ডী, লোচনী, কদম্বপুপী, বিকচা, ক্লোড়া, চোড়া, পলকবা, নদীকদম্ব, মুণ্ডাখ্যা, মহামুণ্ডণিকা, পাতাস্থবিরা, লোতনী, ভুকদম্ব, অলম্বুযা।

মহাশ্বেত—মহাশগপুপিকা।

মহাশ্বেতা—কৃষ্ণ ভূমিকুম্ভাড। পর্যায়—ক্ষীরবিদারিকা, ক্ষীরবিদারী, ঋক্ষগন্ধিকা, ক্ষীরবেলী, ক্ষীরকন্দা, ক্ষীরিকা। ২ শ্বেত অপরাঞ্জিতা, সিতা, ৪ শ্বেত কিনিহী-বৃক্ষ।

মহাসম্ভা—[হি° কগহিয়া, খিড়িহিটরা; বো° থেরচিকনা, ভেদ] বৃক্ষবিশেষ ॥ রাজনি ॥ পর্যায়—ওদনিকা, ওদনাহরয়া, বুদ্ধা, রুহা, বৃদ্ধবলা, তণ্ডুলা, ভুজঙ্গজিহ্বা, শীতপাকিনী, শীতবলা, শীতাবলা, বালোত্তরা, বরাখিরাহিট্রী, ব্যালজিহ্বা ॥ রাজব° ॥

মহাসর্জ—১ অসন বৃক্ষভেদ, *terminalia tomentosa*, ২ পনসবৃক্ষ, *artocarpus integrifolia*.

মহাসহ—কুঞ্জকবৃক্ষ। *glycine debilis*, ২ *wrightea antidysenterica*.

মহাসহা—১ মাষপণী, ২ অগ্নানবৃক্ষ, কবৃক্ষ।

মহাসার—বিটখদির।

মহাসন্ধা—জম্বুবৃক্ষ।

মহাস্থাল—বৃক্ষভেদ।

মহিলা—প্রিয়ঙ্গুলতা।

মহিলাহরয়া—প্রিয়ঙ্গুলতা।

মহিবকন্দ—মহাকন্দবি°। পর্যায়—শুল্লাল, লুপাপকন্দ, শুল্ককন্দ, মহিবীকন্দ।

মহিবমৃতক—শালিধান।

মহিবল্লী—[হি° স্থিরহিট্রি, ম° মহিবল্লী; কলিঙ্গ—গ্রাম্যবল্লী] লতাবি°। পর্যায়—সোম্যা, প্রাতি-সোম্যা, অন্তর্বালিকা, খণ্ডশাখা।

মহিবীকন্দ—মহাকন্দবি°।

মহিবীপ্রয়া—শুল্লীতণ।

মহীজ—আদা।

মহরয়া—মধুরাম্বাদ ফলবি°, মৌল। মউআ দ্র°। প্রকারভেদ—জলম-ধুক—[জলমহরয়া; ক° জলমহে];

তোয়েইপে] *bassia longifolia*.

কদম্বাক্ত জলাভূমিতে জন্মে। কাণ্ড বড়। পাতা মোটা গাছের পাতার চেয়ে লম্বা, ফুল শাদা ও একটি লাল, একটি জৈষ্ঠ মাসে হয়। ফল আকারে বোম্বাই কদলের মত, ভাদ্র-আশ্বিনে পাকে।

মহেন্দ্রবারুণী—[ মং বড়িল, ইন্দ্র-বারুণী ; কলিঙ্গ—হিরিয় হামেক ]

১ বড় মাকাল, ২ রাখালশা।

পর্যায়—চিটবল্লী, মহাফলা,

মহেন্দ্রী, ধনুঃশ্রেণী, চিত্রফলা;

ব্রহ্মসী, ব্রহ্মসা; আত্মরক্ষা,

স্থানদুর্গা, বিশালা, দীর্ঘবল্লী,

মহাফলা, মরুসম্ভবা, মহাধারুণী,

বৃহৎফলা, বৃহৎধারুণী, সৌম্যা,

গজচিভিটা, চিত্রদেবী।

মহেন্দ্রী—মহেন্দ্রবারুণীলতা।

মহেরুগা—শলই, শল্লকীবৃক্ষ, লুবান,

*boswellia thurifera*.

মহেলিকা—বড় এলাচ।

মহেশবন্ধু—বেলগাছ।

মহেশ্বরী—১ অপরাজিতা, ২ শবতিস্তলতা।

মহেরুগা—শলই এরুগা।

মহেলা—বড় এলাচ।

মহোটিকা—১ বৃহতী, ২ কুড় গাছ (?)।

মহোৎপল—পদ্ম;

*nymphaea*

*nelumbo*.

মহোদয়া—নাগবলা।

মহৌষধ—১ শৃংখী, ২ লশুন, ৩ বারাহী

কন্দ, ৪ পিপ্পলী, ৫ অতিবিষা।

মহৌষধি—১ দূর্বা, ২ লজ্জালু ক্ষুদ্রপ।

মহৌষধী—রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণ-

লতাদিকে মহৌষধী বলে।

শ্বেত কণ্টকারী, ২ ব্রাহ্মী, ৩ কটুকা ?

৪ অতিবিষা, ৫ হিলমোচিকা (?)।

॥ বৈদ্যক ॥

মাংসদলন—প্রাইয়বৃক্ষ, *andersonia*

*rohitaka*.

মাংসদ্রাবিন—অন্নবেতস।

মাংসফল—তরমুজ।

মাংসফলা—১ বাতাকী, ২ তরমুজ।

মাংসাদনীবৃক্ষ—অগ্নিরূহা।

মাংসারি—অন্নবেতস।

মাংসী—১ জটামাংসী, ২ ককোলী,

৩ বেড়েলা।

মাইফল—মায়ফল দ্রু।

মাকড়াংগা—গুল্মভেদ।

মাকড়জাল—গুল্মভেদ, *gordonia*

*integrifolia*.

মাকড়জালি—ধানাদিবর্গের উচ্চ সরু

তৃণবৃ; *digitaria sangui-*

*nalis*.

মাকন্দ—আম্রবৃক্ষ । রসাল ।

মাকন্দী—১ আমলকী, ২ মাদানী (?)

[ হি° মাদানী ] পর্যায়—বহুমূলী;  
মাদনী, গন্ধমূলিকা ।

মাকাটী ( দেশজ )—তুলার বীজ ।

মাকাল—[ স° ইন্দ্রবারুণী, মহাকাল  
॥ শব্দক° ॥ ; হি° ইন্দায়ণ ; ম° লঘু  
ইন্দ্ররস, কাঁবউঠঠ ; গুজ° ইন্দ্র-  
বানীয়া ; ক° হাশ্মেকেক ; তে°  
ঐতিপুচ্ছা ; ফা° খুজ্জাতলখ ;  
অ° হজল ; ও° মহাকাল ]  
রা খালশা, *bryonia scabrella*,  
*citrulus colocynthis*.

কুম্মাডাদিবর্গের লম্বা লতাবি° ।  
ফুল পীতবর্ণ, পাকলে কাল হয় ।  
ফল দেখতে সুন্দর কিন্তু বিযাক্ত,  
পাকলে সিন্দুর রং হয় । পাতা  
পাঁচ আগুলিয়া ; নিচের পিঠ  
মসৃণ । ইহা বেড়া বা গাছের  
আশ্রয়ে উর্ধ্বে ওঠে ও বিস্তৃত হয় ।  
এক-একটি লতা ২৫-৩০ বৎসর  
বাঁচে । তাই উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে ইহার  
নাম ‘চিরযুবতী’ লতা । প্রকারভেদ  
—ছোট মাকালের ফলের মধ্যে  
সুগন্ধ থাকে ও বড় মাকাল—  
বেলের মত, *tricosanthes brac-*  
*teata, citrulus colocynthis*.

মাক্ষিক ফল—মধু নারকেল গাছ ।

মাখনা—[ স° মখাম ; হি° মাখানা ;  
ও° কাঁটাপথ ] মাখনা, *euryale*  
*ferox*. জলজ গাছবি° । অনেকটা  
কুমুদের মত, কিন্তু গায়ে কাঁটা  
আছে । পাতা প্রায় গোলাকার ।  
ফুল খানিকটা জলে ডুবে থাকে ।  
বাংলাদেশে ( পূর্ববঙ্গে ) অধিক  
পরিমাণে দেখা যায় ।

মাখমশিম—শিম্বীজাতীয় । *canava-*  
*lia gladiata*. বড় মাখমশিম—  
*canavalia leucasperma*.

মাগধ—১ শুল্কজীরক, ২ পিপ্পলীমূল,  
৩ শুল্কজীরক, ৪ জীরক ।

মাগধিকা—পিপ্পলী ।

মাগধী—যুথিকা, ২ পিপ্পলী, ৩ ব্রুটি  
( গুজরাতে এলাচ ) ।

মাঘা—কুম্ভপদম্প ।

মাক্সল্যাকার—১ দূর্বা, ২ হরিদ্রা, ৩  
মাষপণী, ৪ হরিতকী ও গোরোচনা  
(?), ঋষি (?) ।

মাগল্যকুম্মা—শথপদম্পী ।

মাগল্যপ্রবরা—বচা, বচ ।

মাগল্যা—১ গোরাচনা, ২ শমীবৃক্ষ,  
৩ জীবন্তী ।

মাচীক—দেবদারু ।

মাচীপত্র—সুরপর্ণ নামে পত্রশাক ।

মাজু—[স° মায়াফল, মজ্জফল, ছিদ্রাফল,  
ফা° মাজু ; ইং dyers oak] মাজু-  
ফল, *quercus infectoria*.  
পারস্য ও আফগানিস্তানে ও  
এসিয়া মাইনরে জন্মায়।

মাটাম্বক—বৃক্ষভেদ।

মাড়—[বো° ভেলীমাড় ; ম° মাড় ;  
কলি° বেনো ;] কোঙ্কনদেশ প্রসিদ্ধ  
বৃক্ষ। পর্যায়—দীর্ঘ ; মাড়াদ্রুক,  
যজবৃক্ষ, বিতানক, মদ্যদ্রুম।

মাড়ুয়া—শস্যভেদ, মরুয়া, মূর্হা,  
*cleusine coracana*.

মাগক—মান দ্র°।

মাগকচু—মানকচু দ্র°।

মাভগ—অশ্বথ গাছ, *figus religiosa*.

মাতুল—১ ব্রীহিভেদ, মদনদ্রুম, ৩  
ধতুরা।

মাতুলক্রম—১ ধতুরা গাছ, ২ শালমলী  
গাছ।

মাতুলপত্রক—ধতুরা ফল।

মাতুলপদ্ম—ধতুরা ফল।

মাতুলা, মাতুলানী—১ কলায়, ২ ভজা,  
৩ শণ, ৪ প্রিয়ঙ্গু গাছ।

মাতুলঙ্গ—[হি° বীজোরা ; ম°  
মাহর্নিঙ্গ ; ক° মালধা] ছোলঙ্গ  
গাছ, ট্যাবালেবুর গাছ, *citrus*  
*medica*. পর্যায়—ফলপূর,

বীজপূর, রুচক, মাতুলঙ্গ,  
শ্বফল, ফলপূরক, লঙ্গদ্ব, পূরক,  
পূর, বীজপূর্ণ ; অববৃকেশর। ২  
দাড়িষ, দাড়িম।

মাতুলঙ্গশিকা—ছোলঙ্গ লেবুর মূল।

মাতুলঙ্গিকা—বনবীজপূর।

মাত—১ আখরুণী, ২ ইন্দ্রবারুণী. ৩  
মহাপ্রবণী, ৪ জটামাংসী।

মাতনন্দন—১ মহাকরুণ গাছ, ২ গুচ্ছ-  
করুণ গাছ।

মাতসিংহী—বাসক গাছ, *justicia*  
*adhatoda*.

মাথী—মৈথী।

মাদন—১ লবঙ্গ, ২ মদন গাছ, ৩  
ধতুরা গাছ।

মাদার—মান্দারক গাছ, *erythrina*  
*fulgens*.

মাদার, মন্দার—[স° ডহ, লকুচা ; তে°  
কম্বারেড, লকুচাম ; ম° লোই ; ও°  
জেউট। (স্থানবি°) চে° ফল ; ইং  
monkey jack] দেফল, *artoc-*  
*carpus lacoocha*. কাঠাল  
গাছের মত উদ্যানতরুবি°। বর্ষা-  
কালে জন্মে। ফল পাকলে হলদে  
হয়।

মাদয়ের (দেশজ)—গুচ্ছবি°। *vol-*  
*kameria madocera*.



মাদুরকাটি—মুস্তকাদিবর্গের তৃণাবি° ।

*cyperus tegetum*, প্রায় দহাত  
লম্বা হয় ।

মাদুরপাতী—*scirpus tegetus*.

মাধব—১ মধুকবৃক্ষ, ২ কৃষ্ণমুগ, ৩  
জীরকবৃক্ষ ।

মাধববল্লী—লতাবি°, *gaertnera*  
*racemosa*.

মাধবলতা—ধান্যবি° ।

মাধবিকা—মাধবীলতা ।

মাধবী—[স° মাধবীলতা, বাসন্তী ; হি°  
মাধবী ; গুজ° মাধবীলতা, রক্ত-  
পিণ্ডী ; ম° পীতবেল ; ক° ইন্দ্র-  
গোষ্ঠে, বিববৃন্তগে ; তে° মাধব-  
তোগে ; প° পুলগদ্রবিন্দু,  
মাধবীলতা, *gaertnera race-*  
*mosa*, Rox, *hiptage madha-*  
*blata*. পৰ্যায়—অতিমুক্ত,

পুণ্ড্রক, বাসন্তীলতা, অতিমুক্তক,  
মাধবিকা, মাধবীলতা, চন্দ্রবল্লী,  
সুগন্ধা, ভ্রমরোৎসবা, ভৃগুপ্রিয়া,  
ভদ্রলতা, ভূমিমণ্ডপভূষণা,

বাসন্তীদত্তী, লতামাধবী । মাধবী-  
লতা লম্বা ও মোটা । চাঁপা ফুলের  
মত পাতা, ফুল সুগন্ধী, বসন্তকালে  
ফুল হয় সাদা রং—হলদে রংয়ের  
আমেজষ্মক । ফলে তিনটে পাখা

থাকে । ২ তুলসী ।

মাধবেটা—বারাহীকন্দ ।

মাধবোন্মব—রাজাদনী, (চলিত) খাঁণী  
গাছ ।

মাধবীক—১ মহারাফুলের মদ । ২  
নিম্পাব, শিম ।

মাধবীকফল—মধুনাকেলবৃক্ষ ।

মাধবীকমধুরা—মধুরথজুরিকা ।

মাধবীকা—সাদা শিম ।

মাধবীমধুরা—মধুরথজুরিকা ।

মান, মানকচু—মানক, মানগাছ ও  
তাহার কন্দ । পর্যায়—স্থলপদ্ম,  
মাগ, বৃহচ্ছদ, ছত্রপত্র ।

মানক—[স° মাগক, মহাপত্র, স্থলপদ্ম ;  
হি° মানকন্দ ; ম° কস্ আল ;  
কো° ভোগমানা ] মান, *calocasia*  
*indica*, *c. montana*. কচুদি-  
বর্গের শাকবি° । কচুগাছের চেয়ে  
মানগাছ বড়, পাতাও বড় । এর  
মূল মানুষের ভক্ষ্য । রোদে  
শব্দক পুণ্ড মানকন্দ ওষুধার্থে  
ব্যবহৃত হয় । ৥ রাজনি° ৥

মানতরু—ক্ষেতপাপড়া ।

মানদ্রুম—শালমলীবৃক্ষ ।

মামারি ( দেশজ )—লতাবি° ।

মায়াফল—মাইফল । পর্যায়—মায়িকফল,  
মায়িক, ছিদ্রাফল, মায়ি ।

মায়িক—মাইফল ।

মায়রা—কাকোদ্রবীরিকা ।

মায়রী—বনযমানী ।

মার—ধুস্তুর ।

মারকগণ—আকন্দ, ইন্দুরকাণিপানা, কটকী, নটেশাক, পুনর্নবা, পান, পিণ্ডতগর, বৃহতী, মন্ডুকপর্ণী, মদনফল, শতমূলী, হিংশেসাক ।

মারকবর্ণ—মুখা, বচ, চিতা, গোক্ষুর, তিতলাউ, দস্তী, জাতিপুষ্প, রাস্না, শরপুংখ, ঘৃতকুমারী, চণ্ডালিনী, ওল, কুচিলা, হারমুচ, লজ্জাল, ঘোষা, লাক্ষা, দন্তোৎপল, বালা, পিপুল, নিসিন্দা, বনএলাচি, বিষলাজলিয়া, শাল, আকন্দ, সোমরাজ, রাবভক্তা, কাকমাচী, শ্বেতআকন্দ, অপরাজিতা, বায়সতুণ্ডী, সিজ, বেড়েলা, শূঠী, বরাহকান্তা, হাতিশুড়ী, কদলী, রাস্না, কাচাতেতুল, হরিদ্রা, দারুহারদ্রা, পুনর্নবা, শ্বেতপুনর্নবা, ধুস্তুর, কাকজংঘা, শতমূলী, ক্ষীরীণ, পরগাছা, তিল, ভেকপর্ণী, মূর্বা, মূর্বা, হরিতকী, তুলসী, ইন্দুরকাণি, কাকুড়, বনবর্গলতা, তালমূলী, হিং, শূরচী, সজিনা, জলাপ্পলী, ভক্তরাজ, প্রসারিণী,

সোমলতা, শ্বেতসর্বপ, অসন, হংসপদী, ব্যাঘ্রপদী, পলাশ, ভেলা, ইন্দ্রবার্ণী ।

মারিষ—[ স° দীর্ঘনাল, তড়ুলীয় শাক ॥ রাজনি° ॥ রক্তপর্ণ, বিন্দুপর্ণ ; হি° মরসা, নবড়া ; ম° ভাজী ; কো° কাঁটাখুড়িয়া ; তৈ° ডুগলকুয়া ; গুজ° ডাঙো ; উ° নেউটাশাক ] কাঁটানটে শাক, *amaranthus spinosus*. কাঁটানটের ক্ষুপ কণ্টকপর্ণ । পাতা ছোট । মূল ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় । পর্বাণ—কক্ষর, মারিষিক । প্রকারভেদ—১ শ্বেত, ২ রক্ত ।

মারীচ—গোলমরিচ ।

মারীচপত্রক—সরলগাছ ।

মারীচপত্রিকা—সরল দেবদারু, সজ্জ তরু ।

মারীচবল্লী—মরিচগাছ ।

মারীষ—মারিষ শাক ।

মারুয়া—[ স° রাজিকা, রাগী ; ও° মাণ্ডিয়া ; তৈ° রাগ ] *eleusine caracena*. ধানাদিবর্গের শস্য তৃণবি° । চাষ হয় । সোজা তৃণের মত গাছ হয় । কাকপর্ণ নিকষ্ট জমিতেও জন্মে । মহাষ্মর প্রদেশে ইহা দারিদ্রজনের

প্রধান খাদ্য ।

মারুতাপহ—বরুণ গাছ, *capparis trifollata*.

মার্কাটপ্পলী—আপাং ।

মার্কাডকা—লতাৰি° ॥ ভাবপ্র° ॥

মার্জার—১ রাঙচিত্তে; ২ পুতি-সারিবা (?) ।

মার্জারগন্ধা, মার্জারগাণ্ডিকা—মৃগানি,  
মৃগজাতীয়, *phaseolus tribolus*.

মার্জারী—কস্তুরী ॥ রাজনি° ॥

মার্ত্তবল্লাভা—আদিত্যভক্তা ।

মার্ব; মার্বিক—মারিষশাক ।

মালক—১ শুলপশ্ম, ২ নিমগাছ ।

মালতী—[ স° মালতীলতা, অতি-মুদ্রক; ও° গন্ধমালতী, হি°, ম°, গজ° মালতী ] মালতী, *echites caryophyllata*; *jasminum grandiflorum*. পর্যায়—

হৃদয়গন্ধা, জনেতা, সন্ধ্যাপুষ্প;  
তৈলভাবিনী, সুমনা, জাতি, জাতী,  
সমনস ॥ রাজব° ॥ তগরাদিবর্গের  
লতাৰি° । ফুল শাদা, বর্ষাকালে  
অধিক সংখ্যক সন্ধ্যাকালে ফোটে ।

আকারে ছোট ও সুগন্ধি ।

প্রকারভেদ—পীতমালতী, *jasminum humile*. পর্যায়—

স্বর্ণযুথিকা, হেমপুষ্পিকা ।

চামেলি—*aganosma calisna*.

মালতীপত্রিকা—জয়ন্তী ।

মালতীফল—জাতীফল, জায়ফল ।

মালবিধা—তেউড়ী ।

মালবিটাপন—কুস্তী গাছ ।

মালা—১ বল্লীদর্বা, ২ ভূম্যামলকী ।

মালা আঁকড়া—তুণবি°, *eleusine indica*.

মালাকট—অপমার্গ ।

মালাকঠ—গুল্মভেদ, *achyranthus aspera*.

মালাকন্দ—মূলবি° ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—  
আবিলকন্দ, গ্রিসিখদলা, গ্রিসিখ-  
দল, পাদিকন্দ, কন্দলতা ।

মালাতৃণ; মালাতৃণক—[ স° ভূস্তৃণ,  
গন্ধখড় ] সুগন্ধি তুণবি° । পর্যায়—  
রোহিষ, ভূতি, ভূমিক, কুটু-  
বক, ভূস্তৃণ, পাল্ল, ছত্রাতিচছত্র ।

মালাদর্বা—গাটগা দর্বা । পর্যায়—  
বল্লীদর্বা, অলিদর্বা, মালাগ্রাসিখ,  
গ্রাসিখলা, গ্রাসিখদর্বা; শূলগ্রাসিখ,  
বেল্লনী, গ্রাসিখমুলা, রোহংপর্বা,  
পর্ববল্লী, শিবাখ্যা ।

মালাফল, মালামণি—রুদ্রাক্ষ ।

মালারিটা—পাটী নামে সৃগন্ধ পত্র ।

মালাশ্রেষ্ঠতমা—তুলসীগাছ ।

মালিক—১ মল্লিকা বিশেষ, চন্দ্র-  
মল্লিকা, ২ অতপী, মসিনা, ও  
সপ্তলা (?) ।

মালিকা—১ সপ্তলা, ২ পদ্মী (?) ।

মালিনী—১ অগ্নিশিখাবৃক্ষ, ২ দুরা-  
লতা ।

মালিক, মালিক—কৃষ্ণপত্র তুলসী ।

মালধানী—জতাবী ।

মালুর—বিষবৃক্ষ ।

মাল্যক—মদনবৃক্ষ ।

মাল্যপদ্প—শণবৃক্ষ ।

মাল্যপদ্পিকা—শণপদ্পী ।

মাল্যা—তৃণভেদ ।

মাষ—[ স° মাষক, মাষকলায়, ঋগ্ধি ;  
হি° উদ্ ; ম° উভীদ, ও° বিরহি ]  
মাষকলাই, চিরকলাই ॥ ভাবপ্র°  
‘রাজব°’ ॥ পর্যায়—কুরূবিন্দ, ধান্য-  
বীর, বৃষাকর, মাংসল, বলাঢ্য,  
পিপ্পা, পিতৃভোজন ।

মাষপত্রিকা, মাষপণী—মাষাণী বা  
বন্যমাষকলাই ॥ রাজনি° ॥ ভাবপ্র°  
glycine debilis. পর্যায়—হয়-  
পদ্পী, কাম্বোজী, মহাসহা,  
সিংহপদ্পী, ঋষিপ্রোক্তা, কৃষ্ণবৃন্তা,  
পাণ্ডু, লোমশপর্ণিনী, আদ্রমাষা,  
মাংসমাষা, মঞ্জল্যা, হয়পদ্পিকা,  
হংসমাষা, অশ্বপদ্পা, পাণ্ডুরা,

মাষপর্ণিকা, কল্যাণী, বজ্রমূলী,  
শালপণী, বিসারিণী, আত্মোন্মবা,  
বহুফলা, স্বরম্ভ, সুলভা, ঘনা,  
সিংহবিম্বা, বিশাচিকা ।

মাষাণি, মাষাণী—[ স° মাষপণী, হি°  
মষবন, বনউদী, ম° রানউভীদ ;  
গুজ° অভবাড, অউদবেল ; ক°  
বানোডিড্কা উট্টু ; তে° কার-  
মীনদর ] মাষাণি, *terumnus*  
*labialis*, *teramnus debilis*.  
পর্যায়—সুলভা, আত্মোন্মবা,  
পাণ্ডুলোমশা, মাষপত্রিকা, বহু-  
ফলা, কৃষ্ণবৃন্তা, অশ্বপদ্পিকা,  
বজ্রমূলী, হয়পদ্পী, শিম্বাদি-  
বর্গের সুদীর্ঘ বন্যলতা । বন্য  
মাষকলাই । পাতা ত্রিপর্ণ । ফুল  
লাল, নীলের ঈষৎ আমেজযুক্ত,  
পাতার নিচের পিঠ লোমময় ।

মাসকরোন্মব—যাটিক শালিধান্য ।

মাসন—ঔষধীবৃক্ষবি°, *serratula*  
*anthelmintica*.

মাসিন্দার—পদ্পবৃক্ষবি°, *callicarpa*  
*incana*.

মাহিষবলরী—কৃষ্ণবৃদ্ধদারক ।

মাহিষবল্লী—মধুসৌমলতা ।

মাহেন্দ্রী—ইন্দ্রবারুণীলতা ।

মিন্দী (দেশজ)—মেন্দীগাছ; *lawsonia inermis*.

মিরা—মুর্বা ।

মিশী—১ মধুরিকা, মোরী, ২ শত পুষ্পী, শুল্কা মিশী, ৩ জটামাংসী, ৪ থেসিকা, ৫ মহাদভ (এক প্রকার কেশ), ৬ বাসুদনী, ৭ অজমোদা ।

মিশ্রপুষ্প—মৌখিকা ।

মিশ্রবর্ণফলা—বার্তাকী ।

মিশ্রেয়া—১ মোরী । ভাবপ্র°; ২ শাকবি, ৩ শতপুষ্পা ।

মিষি—মিশী দ্র° ।

মিষিকা—১ জটামাংসী, ২ মধুরিকা ।

মিষ্টানিব—নিম্ববৃক্ষ ভেদ ।

মিষ্টানিব—মধুর জম্বীর, মিষ্ট নেবু ।

মিষ্টপাট—বৃক্ষভেদ (ইং Jew's mallow) *corchorus olitorius*.

মিসি—মিশী দ্র° ।

মিহির—অকবৃক্ষ ।

মীনেন্দ্রা—গণ্ডদুর্বা ।

মীনপিস্ত—কটুকী ।

মীনাক্ষী—১ গণ্ডদুর্বা ২ ব্রাক্ষীশাক ।

মীনান্নীণ—দদবান্ন (?) ।

মীশাণ—মহারবধবৃক্ষ ।

মুকুন্দ—১, শ্বেতকরবী ২ গাম্ভার গাছ ।

মুকুন্দক—পলাশদ্র° ।

মুকুন্দর—১ বকুল গাছ, ২ মল্লিকাপুষ্প গাছ, ৩ কুল গাছ ।

মুকুন্ঠ, মুকুন্ঠক—মুগানী । পৰ্যায়—  
ময়ূষ্টক, মুকুন্ঠ, মপষ্টক,  
মুঘাষ্টক, মুকুন্ঠক, ময়ূষ্টক ।

মুকুন্দলক—দাড়ীবৃক্ষ ।

মুক্তজাড়—*Phyllanthus emblica*,

মুক্তবরী, মুক্তবুরি, মুক্তবর্ষা—[স] অরিস্তমঞ্জরী; হি° কদুপী, থোকালি ও ইন্দুমারিণ; তে° হরিব মঞ্জরী; গুজ° দাদরো; ব°চ্ছকট; তা° কুপাইমেনি; তে° কদুপাই চেট্র; ইং Indian acalypha} *acalypha indica*, a. *paniculata*. স্নদহিআদিবর্গের বহু শাখা বিশিষ্ট ছোট গাছ। ফুল ছোট হলদে রংয়ের; ফলও ছোট, তিন ভাগে বিভক্ত। সমস্ত গাছটি বিশেষত পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

মুক্তপালেবত—বৈপথজ্জরীবৃক্ষ ।

মুক্তবন্দনা—মল্লিকাবৃক্ষ ।

মুক্তসার—কদলীগাছ ।

মুক্তাপুষ্প—কন্দফুলের গাছ ।

মুন্ডাফল—লবলী ফল (?) ।

মুন্ডা—১ জীরক, ২ ডহু, ডেলো (?) ।

মুন্ডাগন্ধক—পিঁপ্লাম্ব ।

মুন্ডাচীরী—পিঁপ্লাম্ব ।

মুন্ডাধূষণ—পিঁপ্লাম্ব ।

মুন্ডাধোতা—বামুনহাটি ।

মুন্ডাধিপ্রয়—নারঙ্গ ।

মুন্ডাধ্বজ—দাড়িমবৃক্ষ ।

মুন্ডাধাচিকা—অশ্বষ্ঠা ।

মুন্ডাধাসা—১ গন্ধতণ, ২ তরঙ্গজ  
লতা ।

মুন্ডাধাচী—আমড়া গাছ ।

মুন্ডাধাক—তুলসী গাছ ।

মুন্ডা, মুন্ডানি—[ সঁ মুন্ডা ; হিঁ মুন্ডা ;

মুন্ডাবন ; ওঁ মুন্ডা ; মঁ রানমুন্ডা ;

কঁ কোহসর ; গুজঁ অববাড

মগবেল্য ; তেঁ কারু, পেসারা ;

ইং a sort of kidney bean ]

মুন্ডা, মুন্ডানি, phaceolus radi-

atus, p. mung. শিম্বাদিবর্গের

কৃষিজাত কলাইবিঁ । পর্ষায়—

মুন্ডাপর্গী, শিম্বী, মার্জারগন্ধিকা,

বনজা, বনমুন্ডা, শূঙ্গাপর্গী,

মকুশ্চক । প্রকারভেদ—১ বন্য-

মুন্ডা—[ সঁ বনমুন্ডা, মুন্ডাপর্গী ]

অরণ্যজাত মুন্ডাকলাই, মুন্ডানি, p.

aconitifolius. ২ কালিমুন্ডা—

কৃষ্ণমুন্ডা, ৩ ঘোড়ামুন্ডা—

[ সঁ মহামুন্ডা ] বড় লতানিয়া

গাছ । ৪ সোনামুন্ডা—[ সঁ পীত-

মুন্ডা ] পীতবর্ণের, ৫ হালিমুন্ডা—

[ সঁ হরিৎমুন্ডা ] হলদে বর্ণের ।

মুন্ডাকুন্দ, মুন্ডাকুন্দ—[ সঁ মুন্ডাকুন্দ ;

হিঁ মুন্ডাকুন্দ, মেচকুন্দ ; মঁ, গুজঁ

কঁ মুন্ডাকুন্দ ; তেঁ লোলমুন্ডা ;

তাঁ টাড্ডো ; ওঁ বইলো, মুন্ডাকুন্দ ]

মুন্ডাকুন্দ চাঁপা, pterospermum

suberifolium rox. রাঢ় দেশে

চলিত নাম—কনকচাঁপা, p. aceri-

folum. ॥ রাজনিঁ ভাবপ্রঁ ॥

পর্ষায়—বহুপত্র, পত্রবৃক্ষ, সুন্দল,

সুসুন্দল, দীর্ঘপত্রপী, রক্তপ্রসব,

ছত্রবৃক্ষ, চিত্রক, প্রতিবিম্বক, হরি-

বল্লভ, অর্ঘ্যাহ, লক্ষণক ।

ফুলের গাছ । ফুল সুগন্ধি,

বসন্তকালে ফোটে ।

মুন্ডাচিলিজ—১ মুন্ডাকুন্দ গাছ, ২ তিলক

গাছ, ৩ রাজাদনবৃক্ষ ।

মুন্ডাক—মুন্ডাকর গাছ ।

মুন্ডা—[ সঁ মৌজক, মুন্ডা, মৌজীতণ ;

হিঁ মুন্ডা ; ওঁ মজা ] মঁজ,

মঁজা ॥ রাজনিঁ ভাবপ্রঁ ॥ তর্গবিঁ,

শরণ তণ, sachharum arun-

dinaceum, s. munja. মুন্ডা

তর্গবিঁ । রাঢ়দেশে জন্মে না ।



বিহার থেকে আরম্ভ করে উত্তর  
দক্ষিণাঞ্জে প্রচুর জন্মে।  
উপনয়নের সময় মৌজী মেখলা  
ধারণ করতে হয়। গাছের ছালে  
দাঁড়ি তৈরি হয়। পৰ্যায়—মৌজী,  
তৃণাখ্য, ব্রাহ্মণ্য, তেজনাহস্য;  
বাণীরক, মৃগজক, শীরী, দর্ভা-  
হস্য, দ্রবমূল, দৃঢ়তৃণ,  
দৃঢ়মূল; বহুপ্রজ, রজন, শত্রুভজ।

মৃগজবৎ—সোমলতা ভেদ।

মৃগজাত—তৃণবি°।

মৃগজাতক—পদ্মপব্ধবি°। রাজবি°।

মৃন্ড—স্বাণ্ডবৃক্ষ, মৃন্ডাগাছ।

মৃন্ডচণক—কলায়, বড়ছোলা।

মৃন্ডধান্য—ধান্যবি°।

মৃন্ডজক—১ শালিধান্য; ২ শ্বেতবট-  
বৃক্ষ।

মৃন্ডাণিকা—বোরো ধান।

মৃন্ডফল—নারকেল গাছ।

মৃন্ডশালি—শালিধান্যবি° ॥ রাজনি° ॥

শালি দ্র°। পৰ্যায়—মৃন্ডজক;

নিঃশব্দ, অশব্দক।

মৃন্ডা—বড় থলকুড়ী।

মৃন্ডাখ্যা—মহাপ্রাণিকা।

মৃন্ডাভিতকা—[ স° মৃন্ডাভিতকা,  
অলম্বদ্বা, ভূকদম্ব, মহাপ্রাণিকা,  
কদম্বপদ্পিকা; হি° গোরখ-

মৃন্ডী; ম° বোড়ধরা; গৃজ°  
গোরখমৃন্ড; ক° হিরীপবোড-  
তর; তে° বোরসরপ চট্ট; তা°  
কোটক; অ° কামাদরীষদৃ°]  
মৃন্ডমৃন্ডিয়া, বড়থলকুড়ী; মৃন্ডাভির,  
sphoeranthus indicus.  
সোমরাজ্যাদিবর্গের ছোট গৃন্ডমৃন্ডি°।  
ফুল বেগুনে রংয়ের,  
ছোট, কদমফুলের মত দেখতে,  
পাতা ছোট ও লম্বা, ধানক্ষেতে  
জন্মে। গাছ গম্ভীর। এর  
এক সুগন্ধ জাতি শব্দে স্থানে  
জন্মায়। পৰ্যায়—অলম্বদ্বা,  
প্রাণী, পলকদ্বা, প্রবণা, কদম্ব-  
পদ্মপা, ভূতয়ী, কদম্বা, অরুণা  
॥ শব্দ° ॥

মৃন্ডীরিকা—মৃন্ডাভিতকা।

মৃন্ডীবৃক্ষাগ্ধারক—মৃন্ডকৃন্দবৃক্ষ।

মৃন্ড—১ তৃণবি°, cyperus notun-  
dus. ২ কলায়শৃঙ্গির প্রকারভেদ,  
phaseolus aconitifolius.

মৃন্ডবেল—গৃন্ডমৃন্ড; tasminum  
zambac.

মৃন্ডা, মৃন্ডা—[ স° মৃন্ডক, মৃন্ড; হি°  
মোখা; কো° কেলা; ম° মোখে;  
গৃজ° মোখা; ক° মৃন্ডা; তে°

তুফমুস্তা ; তা° কোরয় ; দ্রা°  
 গরমোটা ; ফা° শাদকফী ; অ°  
 মৃৎকজমীন° ] তৃণবি° । *cyperus rotundus*. ডাটা ত্রিকোণ,  
 পাতা তিন সারি। প্রকারভেদ—  
 ১ সুগন্ধি মৃতা—[স° ভদ্রমৃৎক  
 —গ্রন্থিলা, কাস্ত্রামৃৎক, *cyperus*  
*tuberosus*, ২ নাগরমৃতা—[স°  
 নাগরমৃৎক ; হি° নাগরমোথা ;  
 ম° নাগরমোথে ; গৃজ°  
 নাগরমোথা ; ক° নাগরমৃস্তা ;  
 তে° সকহতুজ ] *c. scari-*  
*asus*; *c. pertenus*. নীচ জলা  
 ভূমিতে জন্মে। ৩ কেউদমোতা,  
 কেশুরিমোতা—[স° কৈবর্তমৃৎক ;  
 হি° কেরটিমোতা ; ম° কেবড়ী-  
 মোথা ; গৃজ° কৈবর্তমোথা ]  
*c. tenniflorus*. জলে জন্মায়।

মৃৎগ—মৃগ, ॥ রাজনি° ॥ মৃৎগানি দ্র°।

মৃৎগদলা—মৃৎগানী।

মৃৎগপণী—মৃৎগানী, *phaseolus*  
*trilodus*, *p. acontifolius*.

॥ ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—কাকমৃৎগা,

সহা, ক্ষুদ্রসহা, শিষ্বী, মার্জারি-

গন্ধিকা, বনজা, রিঙ্গিণী, হস্তা,

সুপপণী, কদ্রজিকা, কোশিলা,

ব্রগোম্ববা, মৃদুমৃৎগা, আরণ্যমৃৎগা,

বন্যা।

মৃদুগর—১ মল্লিকাভেদ, ২ কম্মিরবৃক্ষ,

গন্ধরাজ ॥ রাজনি° ॥

মৃদুগরক—কামরাঙ্গা গাছ।

মৃদুগল—রোহিষতৃণ।

মৃদুগষ্ট—মৃৎগানী।

মৃদুগষ্টক—বৃদনমৃৎগ।

মৃদুনি—১ বজ্রসেনবৃক্ষ, ২ প্রিয়ালবৃক্ষ,

৩ পলাশ, ৪ দমনক।

মৃদুণিকা—ব্রাহ্মীপুষ্প।

মৃদুনিখজ্জরিকা—খজ্জরীবি°।

মৃদুণিচ্ছদ—১ ছাতিমগাছ, ২ মেথিকা।

মৃদুনিভরু—লাল বকফুলের গাছ।

মৃদুনিদ্রম—১ শ্যোণাকবৃক্ষ, ২ বক-  
 বৃক্ষ।

মৃদুনির্নির্মিত—ঢেঁড়গাছ।

মৃদুনিপত্র—দমনকবৃক্ষ, দনা।

মৃদুনিপাদক—বকবৃক্ষ।

মৃদুনিপ্রিয়—১ পার্শ্বরাজধান্য, ২

পি°ডীখজ্জরবৃক্ষ, ৩ প্রিয়ালবৃক্ষ।

মৃদুনিপ্রিয়া—তিলবাসিনী শালি (?)।

মৃদুনিপত্র—দমনকবৃক্ষ।

মৃদুনিপুষ্প—বকফুল, বকগাছ।

মৃদুনিপুগ—গুবাকবিশেষ। পর্যায়—

রামপুগ, কামীন, সুরেষ্ঠ।

মৃদুনিবর—পু°ডরীকবৃক্ষ।

মৃদুনিবল্লভ—প্রিয়ালবৃক্ষ।

মর্নিবৃক্ষ—বকবৃক্ষ ।  
 মর্নিভক্ত—উড়িধান ।  
 মর্নিশস্ত্র—শ্বেতদর্ভ ।  
 মর্নিমৃত—দমনক গাছ ।  
 মর্নিহব্ল—সমষ্ঠিলক্ষুপ ।  
 মর্ন্দী—গুল্মভেদ, *sphaeranthus mollis*.  
 মর্দাঙ্গিকা—মর্দবা ।  
 মর্দরাজী—১ কৃষ্ণশিগ্রবৃক্ষ, ২ রক্ত-  
 পদ্পদ্ম শোভাজনবৃক্ষ ।  
 মর্দরজফল—পনসগাছ ।  
 মর্দগা—মোরগফুল, *celosia cristata*.  
 মূলা—মূলক ।  
 মূর্শটি—শ্বেতকঙ্কধান ।  
 মূর্শলিকা, মূর্শলিকা—তালমূলী নামে  
 কন্দশাক, *curculigo orchio-*  
*des*.  
 মূষলী—[ স° হেমপদ্মপী ; হি°  
 মূসলী, কো° গয়গাচি, বো°  
 তালমূলী ; ম° মূসঠাখী ; গুজ°  
 মূসলী ; ক° নেলতাডো ; তে°  
 নিলয়তালি গডল ] তাকমূলী,  
*curculigo orchiodes*. পর্যায়  
 —পল্লী, সুবহা, তালপটিকা,  
 গোখাপদী, হেমপদ্মপী, ভুতালী,  
 দীর্ঘকন্দিকা, মূষলী, তালিকা,

তালমূলিকা, অশোণী । প্রকারভেদ  
 —১ বেতামূষলী—*asparagus*  
*adocendens*. ২ কৃষ্ণামূষলী ।  
 মৃক্ষ—মোক্ষবৃক্ষ, ঘণ্টাপারুল গাছ ।  
 মৃক্ষক—[ হি° মোষ ] ঘণ্টাপারুল  
 গাছ, *schrebera swiet-*  
*nioides*. পর্যায়—গোলীড়,  
 মাটল, ঘণ্টাপারুলি, মোক্ষ,  
 মোক্ষক, মৃক্ষ, মোচক, মৃক্ষক,  
 গোলিক, মেহন, ক্ষারবৃক্ষ, পাটলী,  
 বিষাপহ, জটাল, বনবাসী, সুতী-  
 ক্ষক, গোলিহ, ক্ষারশ্রেষ্ঠ, ঘণ্ট,  
 ঘণ্টাক, ঝাট ॥ রাজব° ভাবপ্র° ॥  
 মৃষ্টি—ঘণ্টাপারুল গাছ ।  
 মৃষ্টক—রাজসম্প ।  
 মৃসটী—ধান্যবি° ।  
 মৃসাম্বর—*aloe socotrina*. ॥ ওয়াট ॥  
 মৃস্ত—মৃস্তক, মৃতা, *cyperus ro-*  
*tundus*. পর্যায়—করুবিন্দ,  
 মেঘ, মৃতা, মৃস্ত, রাজকসেরু,  
 মেঘাখ্য, গাঙ্গের, ভদ্রমৃস্তক,  
 অল্পনামক, অক্ষ, গ্রীভদ্রা, ভদ্রক,  
 ভদ্রা ।  
 মৃস্তক—মৃতা ।  
 মৃস্তা—মৃস্তক ।  
 মৃতফলা—১ ককটী, ২ ত্রপা ।  
 মৃতবীজক—অসনবৃক্ষ ।

মুরলা—ককটী ।

মুরশোধনিকা—বনককটীবি° ।

মুরিকা—সল্লকীবৃক্ষ ।

মূৰ্খপদ্ম—শিরীষপদ্ম ।

মূৰ্ব, মূৰ্বা—[ স° মূৰ্বা, মধুরসা, অতিরসা ; হি° চূর্ণহার, মইরা ; ম° মোরবেন ; ক° মূহুরসি ; তে° মাগচেট্ট ; তা° মরুল ; কা° মোরহরী ] সূচীমুখী, বোড়াচক্র, মুরলা, *sauseviera zeylanica*, *s. roxburgharus*. সূচীমুখী কাণ্ড নেই। ফুল শাদা, ফল পীতবর্ণ। আরণ্য লতা° । ছায়াবৃত স্থানেই সচরাচর জন্মায় । পূর্বকালে এর আঁশ (fibre) থেকে ক্ষয়িদেয়, কটিসূত্র ও ধনুকের গুণ তৈরি হয় ।

মূৰ্বিকা—মূৰ্বা ।

মূল—১ পিপ্পল মূল, ২ পুষ্কর মূল, ৩ কুড়বি° ।

মূলক—[ স° মূলক, দীর্ঘমূলক, দীর্ঘপত্রক ; হি° মূরই ; ম° মঠঠা ; গুজ° মূলা ; ক° মূলজী ; তে° শর্ভিতম্পা ; ফা° তুখ ; অ° ফজলবড়রুল ; ও° মূলা ; ইং garden radish ] মূলা, *raphanus sativa*.

পৰ্বাঙ্গ—রাজালুক, মহাকন্দ, হস্তদন্তক, নীলকণ্ঠ, মূলাঙ্গ, দীর্ঘমূলক, মৎস্কর, কন্দমূল, সিত, শংখমূল, হরিৎপর্ণ, রুচির, দীর্ঘকন্দক, কুঞ্জরক্ষার মূল ; প্রকারভেদ, (১) চাণাখামূলক—[ স° স্থূলমূল, মহাকন্দ, মরুসম্ভব ] ; (২) পিণ্ডমূলক । (৩) গুঞ্জনক—[ স° ষবনেষ্ট, বতুল ; হি° জঙ্গলীগাজর ; ম° রাণগাজর ; গুজ° পতালগাজর ; অ° জজার-বীরং ; ফা° গজরেদস্তি ] গুঞ্জন একপ্রকার মূলা ; গুজর ( গাজর ) নহে ।

মূলকচ্ছদ—কাল সজিনা ।

মূলকপর্ণী—সজিনা গাছ ।

মূলকমূল—ক্ষীরকণ্ডকীবৃক্ষ ।

মূলকবিষ—কন্দবিষ ভেদ ।

মূলকশাক—মূলোশাক ।

মূলকেশর—লেবু ।

মূলগ্রাশ্ঠি—বল্লিদূৰ্বা ।

মূলজ—১ আদ্রক, ২ উৎপলাদি ।

মূলপর্ণী—মন্ডুকপর্ণী ।

মূলপুষ্কর—কুড়ভেদ ।

মূলপোতী—পাতিকাশাকভেদ, পাই-শাকবি° ॥ রাজনি ॥ পৰ্বাঙ্গ—ক্ষুদ্রবল্লী পোতিকা ।

মূলফলদ—কাঁটালগাছ ।

মূলমুড়িয়া—গুল্মভেদ, *beobotrys nemoralis*.

মূলরস—মোরটলতা ।

মূলবিষ—করবীরাদি ।

মূলা—শতাবরী, *raphanus sativas*  
॥ বেল ॥

মূলাভ—মূলক ।

মূলিকামূল—ক্ষীরিকামূল ।

মূলিনীবর্ণ—১ নাগদন্তী, ২ শ্বেতবচা,  
৩ শ্যামা, ৪ ত্রিবৃৎ, ৫ বৃদ্ধদারকা,  
সপ্তলা, ৬ শ্বেত অপরাঞ্জিতা;  
৮ মূক্ষপর্ণী, ৯ গোড়ুয়া, ১০  
জ্যোতিষ্মতী, ১১ বিম্বী, ১২  
শগপদ্পী, ১৩ বিষাণিকা, ১৪  
অম্বগন্ধা, ১৫ দ্রবন্তী, ১৬  
ক্ষীরিণী ।

মূলৌষধি—গুল্মভেদ ।

মূলী—তালমূলী ।

মূক্ষমারী—শ্রুতশ্রেণীলতা ।

মূক্ষকর্ণী—১ মূষাকর্ণী, ২ দ্রবন্তী ।

মূষাক্ষরয়া—১ আখকর্ণী, ২ দন্তীবৃক্ষ ।

মূষা—১ দেবতাড়ক, ২ গোক্ষুরবৃক্ষ ।

মূষাকর্ণী—আখকর্ণী ।

মূক্ষপর্ণী—জলজতৃণবি° । পর্যায়—

চিরা, উপচিরা, ন্যাগ্রোধী, দ্রবন্তী,

স্ববরী, বৃষা, প্রত্যকশ্রেণী,

সুতশ্রেণী, পদ্রুশ্রেণী, আম্রপর্ণিকা  
বৃষপর্ণী, আখপর্ণী, মূষিকা,  
সিঞ্চা, ফিঞ্জপর্ণিকা, মূষিকপর্ণিকা  
মূষীকর্ণী, সুকর্ণিকা ।

মূষিকা—মূষিকপর্ণী ।

মূষিকাক্ষরয়া—মূষিকাকর্ণী ।

মূষিপর্ণিকা—মূষিকপর্ণী ।

মূক্ষ—দর্শিবি° ।

মূর্ণাপ্রস—জলকদলী ।

মূগভক্ষা—১ জটামাংসী, ২

রাখালশশা ।

মূগভোজনী—রাখালশশা ।

মূগরসা—মহাবলা ।

মূগরাটিকা—জীবন্তী ।

মূগলান্ডিকা—ফলিবি° ।

মূগা—মহদেবীলতা ।

মূগাংগজা, মূগাজীব—বারুণীলতা ।

মূগাদনী—১ ইন্দ্রবারুণী, ২ সহদেবী,

৩ মূগেবর্জু ।

মূগেক্ষণা—মূগেবর্জু ।

মূগেন্দ্রাণী—বাসক ।

মূগেবর্জু—[ হি° সৌধিনী ] শ্বেতেন্দ্র

বারুণী, শাদা রাখালশশা ।

সৌধিনী পদ্রুপবৃক্ষ । পর্যায়—

মূগাক্ষী, শ্বেতপদ্রুপা, মূগাদনী,

চিত্রবল্লী, বহুফলী, কপিলাক্ষী,

মূগেক্ষণা, চিরা, চিত্রফলা, পথ্যা

বিচিত্রা, মৃগচিভিটা, মরুজা,  
কন্ডিনীদেবী, কটফলা, লব-  
চিভিটা ।

মৃগেষ্ঠ—গন্ধরাজ ফলের গাছ ।

মৃগাল—১ উশীর, গন্ধবেগা, ২ বেগার  
মূল, ৩ শালুকবি, পদ্মের নাল  
॥ রাজনি ॥

মৃগালিন, মৃগালী—পদ্ম ।

মৃতজীব—তিলকবৃক্ষ ।

মৃতজীবনী—দর্শিকা ।

মৃতজীবিন—দর্শিকা ।

মৃতালক—সাদাকী, অড়হর কলার ।

মৃৎখলিনী—চর্মকষাবৃক্ষ ।

মৃত্যুপদ্ম—১ ইক্ষু, ২ কদলীগাছ ।

মৃত্যুফল—১ মাকাল ফল, ২ মহাকাল  
লতা ।

মৃত্যুফলা—কদলীবৃক্ষ ।

মৃত্যুবৃণ—বিষবৃক্ষ, *aegle mar-  
melos* .

মৃদক্ষফল—কাঠাল, *artocarpus  
integrifolia* .

মৃদজী—শ্বেতঘোষা ।

মৃদ—১ মৃতকুমারী, ২ শ্বেত জাতী  
ফলের গাছ ।

মৃদকণ্টক—শ্বেত ঝাটী ।

মৃদকণ্টকফলা—কাঁকড় গাছ ।

মৃদগন্ধিক—গন্ধভেদ ।

মৃদগন্ধি—মজ্জরতৃণ ।

মৃদচর্মিণ—ভূজবৃক্ষ ।

মৃদচ্ছদ—১ ভূজবৃক্ষ, ২ গিরিজ  
পালিবৃক্ষ, ৩ কঙ্করদ্রুম, ৪  
শ্রীতাল, ৫ কোকণদেশ প্রসিদ্ধ  
পোন্ডাল, ৬ নল, ৭ শিপিণী-  
তৃণ, ৮ পিণ্ডীখজুরীবৃক্ষ । ৯  
রক্তলঙ্কাশ্রমক ।

মৃদতাল—শ্রীতাল ।

মৃদচ্ছত—ভূজবৃক্ষ ।

মৃদদভ—শুক্ককুশ ।

মৃদপত্র—১ নল, ২ ভূজবৃক্ষ, ৩  
শাকবি, রক্তচিল্লী ।

মৃদপত্রী—রক্তচিল্লীশাক ।

মৃদপদ্ম—শিরীষবৃক্ষ ।

মৃদফল—১ ব'ইচগাছ, ২ মধুনারি-  
কেল, ৩ বিকঙ্কতবৃক্ষ ।

মৃদবীজ—বিকঙ্কতবৃক্ষ ।

মৃদল—অঞ্জীর ফল ।

মৃদলা—সুলেমানী খজুরীবৃক্ষ ।

মৃদলতা—শুলীতৃণ ।

মৃদংপল—নীলপদ্ম ।

মৃধী—দ্রাক্ষালতা ।

মৃধীকা—১ কাঁপল দ্রাক্ষা, ২ দ্রাক্ষা ।

মেআরমী (দেশজ)—গন্ধভেদ, *limo-  
dorum candidum* .

মেউদী—[ স° মেন্দী ; হি° উদ° ]



মেহদী ; তে° গোরস্ট ; ফা° হিন-  
হেনা ; অ° হিন্না অকান কাফল ;  
ইং henna ] মেউদী, মে°দি,  
মেন্দী, lawsonia alba. ধাত-  
ক্যাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবি° । শাখা  
কাটাশূন্য । ফুল চতুর্দল, পাতা  
বেটে স্তম্বলোকে রাপা রঞ্জিত করে ।  
ছাল ও পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।

মেথলা—চাকদুলিয়া ।

মেঘনাদ—১ পলাশ গাছ, ২ তুড়ুলীয়  
শাক, *amarantus campestris* .

মেঘনামন—মুস্তক ।

মেঘনীলক—তালীগাছ ।

মেঘপুষ্প—মুস্তক ।

মেঘপুষ্পী—বেতস ।

মেঘফল—বিকঙ্কতফলবৃক্ষ ।

মেঘবর্ণ—নীলীবৃক্ষ ।

মেঘস্তনিতোস্তব—বিকঙ্কতবৃক্ষ ।

মেঘাখ্য—মুস্তক ।

মেঘাগম—কেলিকদম্ব ।

মেগস্টিন—[ ইং mangosteen ]  
*garcinia mangostana* নাগ-  
কেশরাদিবর্গের বৃক্ষবি° । মালয়দ্বীপ  
এর আদি জন্মস্থান । অধুনা  
উড়িয়া প্রদেশে জন্মে । বঙ্গদেশেও  
অল্প পরিমাণ দেখা যায় । গাছ-  
পাকা ফল সুস্বাদু ।

মেচক—১ শোভাজনবৃক্ষ, ২ মৃক্ষক-  
বৃক্ষ, ৩ পীতশাক ।

মেচকা—বনকাপাস ।

মেচকাভিধা—বৎসাধনীলতা, পাতাল  
গরুড়ালিতা ।

মেটুলা—বৃক্ষবি°, *spondias mag-  
nifera* .

মেড়াশৃঙ্গী—অজশৃঙ্গী, *asclepias  
gigantea* .

মেদ্রশৃঙ্গী—মেঘশৃঙ্গীবৃক্ষ ।

মেথ্য—মেথি ।

মেথিকা, মেথী—[ স° মেথিকা, মেথী ;  
হি° মেথী ; তা° বেডাম ; তে°  
মেতুল ; ফা° সেম্বালিতা ; অ°  
হালবা ; পিমনেৎ ; ইং fenug-  
reeth ] মেথী, *trigonella fo-  
rumgraecum* . পর্যায়—মেথিনী,  
মেথী, দীপনী, বহুমাত্রিকা,  
বোধিনী, গন্ধবীজা, জ্যোতি,  
গন্ধফলা, বল্লরী, চন্দ্রিকা, মস্থা,  
মিশ্রপুষ্পা, কৈরবী, কুণ্ডিকা, বহু-  
পণী, পীতবীজা । শিষ্যাদিবর্গের  
কৃষিজাত শাকবি° । অনেকটা  
পিড়িং গাছের মত । পঞ্জাব ও  
কাশ্মীর প্রদেশের অরণ্যেও জন্মে ।  
এর বীজ ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয় ।  
প্রকারভেদ—১ বড় মেথী, ২ বন

মেথী—[ ইং mililot ] mili-  
lotus parviflora.

মেথিনী—মেথী।

মেদিনী—কামরী (?)।

মেধাবৎ—মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

মেধ্য—ষব।

মেধ্যা—১ রক্তবচ, ২ রোচনা, ৩  
কেতকী, ৪ জ্যোতিষ্মতীলতা, ৫  
শম্পদুপী, ৬ ব্রাকী, ৭ শ্বেতবচা,  
৮ শমী, ৯ ইক্ষু, ১০ অপরাজিতা।

মেদ্বি—মেদী।

মেবা—আতা, annona squamosa.

মেরাডু—polygola arvensis.

মেলা—মহানীলী।

মেঘ—জীবশাক।

মেঘকুম্ভ—চাকুন্দে গাছ।

মেঘলোচন—চাকুন্দে।

মেঘবল্লী—অজগৃহী।

মেঘবিষাণিকা—মেঘশৃঙ্গী।

মেঘশৃঙ্গী—[ স° অজগৃহী; হি°  
জ্যোতিষ্মতী; ম° মেডকঠী;   
গুজ°—মড়াশিঙ্গ; ক° উরিয়মর;  
ফ° কিস্ত; অ° বকিস্ত ] মেডা-  
শিঙ্গে, গুদুমার, gymnema  
sylvestre. পর্যায়—নন্দীবৃক্ষ,  
মেঘবিষাণিকা, চক্ষু, চক্ষুবহন,  
মেডশৃঙ্গী, গুহদ্রুমা ॥ শব্দ°

ভাবপ্র° ॥ মধ্যভারত ও দক্ষিণ  
ভারতে জন্মায়। মেঘশৃঙ্গী  
নিকটস্থ বৃক্ষ বেণ্টন করিয়া বাড়ে।  
ছালে আঘাত করিলে দুধের মত  
আঠা বাহির হয়। পাতা লম্বা;  
ফুল ছোট পীতবর্ণের। প্রকারভেদ  
—বৃশ্চিকালী—asclepias mon-  
tana. ফুল শাদা, মেঘশৃঙ্গী  
আশ্রয়বৃক্ষকে বামদিক হইতে বেণ্টন  
করে; কিন্তু বৃশ্চিকালী ডানদিক  
হইতে বেণ্টন করিয়া বাড়ে।

মেঘা—গুজরাতী এলাচ।

মেঘাঙ্ককুম্ভ—চাকুলে।

মেঘান্ত্রী—বস্তান্ত্রীবৃক্ষ, অজান্ত্রীলতা,  
ছাগলবাটি।

মেঘাল—বর্ষা গাছ।

মেঘাস্রব—চাকুলে।

মেঘী—১ তিনিশবৃক্ষ, ২ জটামাংসী।

মেস্তা—[ ইং red sorrel ] hibis-  
cus cannabinus, h. sabda-  
riffa ॥ বেল° ॥ জবাদিবর্গের  
ছোট গাছবি°। মেস্তাপাট,  
crotalaria juncea.

মেস্তাপাট—[ ইং deccan hemp ]  
hibiscus cannabinus, crotala-  
sia juncea ॥ বেল° ॥ কষ্টক-  
পূর্ণ গাছ। বিদেশ থেকে এ

দেশে জন্মে। দক্ষিণ-ভারতে এর চাষ হয়। বাঙলায় খুব কম হয়।  
 মহগনি—[ ইং mahogany ]  
 নিম্বাদিবর্গের উচ্চ বৃক্ষবি°।  
 আমেরিকা এর আদি জন্মস্থান।  
 পাতা ছোট, ফুল হয় কিন্তু ফল প্রায় হয় না। প্রকারভেদ—s. macrophylla. গাছ ছোট, তার পাতা বড়। ফল ও ফুল দুই হয়।  
 মৈলা—নীলীবৃক্ষ।  
 মোকা—গুল্মভেদ।  
 মোক্ষ—পাটলিগাছ।  
 মোক্ষাণী—sapium. অরণ্যবৃক্ষবি°।  
 উত্তর ভারতে জন্মে। চীনদেশ আদি জন্মস্থান।  
 মোষা—১ পাটলা, ২ বিড়ঙ্গ, ৩ বদরী।  
 মোচ—১ কদলীফল, ২ শোভাজনবৃক্ষ।  
 মোচক—১ কদলী, ২ শিগ্র, ৩ মৃক্ষক-বৃক্ষ।  
 মোচাণকা, মোচনী—কষ্টকারী।  
 মোচা—১ শাল্মলি তরু, ২ কদলীবৃক্ষ, ৩ নীলীবৃক্ষ, ৪ শল্লকীগাছ।  
 মোচাট—১ কৃষ্ণজীরক, ২ থোড়, ৩ কদলীগাছ, ৪ চন্দনগাছ।  
 মোচিক—মোচাফল, কলা।  
 মোচিনী—কষ্টকারী।  
 মোচী—হিলমোচিকা।

মোটা—১ বেড়েলা, ২ জয়ন্তী, ৩ চুকা-পালং।  
 মোটিমন্দ—গুল্মভেদ, tacca laevis.  
 মোথ—মুখা।  
 মোদকী—১ মূর্খা, ২ জিঙ্গিনী (?)।  
 মোদদায়িনী—জাতীপুষ্পবৃক্ষ।  
 মোদরন্তী—কাঠমল্লিকা।  
 মোদা—১ অজমোদা, ২ শিমূলগাছ।  
 মোদাখা—আমগাছ।  
 মোদাঢ্যা—অজমোদা।  
 মোদিনী—১ অজমোদা, ২ মল্লিকা  
 ॥ রাজনি° ॥ ৩ ষড়িকা।  
 মোরগফুল—ময়ূরশিখা নামক পুষ্প।  
 মোরট—১ ইক্ষুমূল, ২ অঙ্কোটফুল, ৩ ক্ষীরমোরট।  
 মোরটক—১ ইক্ষুমূল, ২ লতাকরাড়-বৃক্ষ।  
 মোরটা—মূর্খা।  
 মোহনবাল্লিকা—বন্দাক।  
 মোহিন—১ ত্রিপুরমালীপুষ্প, ২ বটপত্রী।  
 মোহিনী—১ পাইশাক, বটপত্রী (?)।  
 মোইচা—লতাভেদ।  
 মোউআল—[ স° মঞ্চাল ] আলুভেদ,  
 dioscorea spinosa. আলু দ°।  
 মোকুড়া—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°, moacura  
 gelonoides.

মৌজীতৃণাখ্য—মুঞ্জতৃণবি° ।

মৌরী—[ স° মধুরিকা; ও° পান  
মহুরি; ইং aniseed ] ধান্যাদি-  
বর্গের বর্ষায়ন শস্যবি° । ফল

পানের মসলারূপে ব্যবহৃত হয় ।

মৌরীর আরক ওষুধার্থে ব্যবহৃত  
হয় ।

মৌবী—মুর্বা বা মুরগাতৃণ সম্বন্ধীয় ।

[ ৪ ]

যক্ষ্মী—দ্রাক্ষা ।

যক্ষ্মতরু—বটবৃক্ষ ।

যক্ষোড়বৃক্ষ—অশ্বথ ফল ।

যজ্ঞভূমুর—যগ্গীভূমুর ॥ ভাবপ্র° ॥

যজ্ঞবল্লী—সোমলতা ।

যজ্ঞবৃক্ষ—১ বটবৃক্ষ, ২ বিকল্পতবৃক্ষ ।

যজ্ঞযোগ্য—উড়ুম্বর গাছ ।

যজ্ঞাহা—সোমলতা ।

যজ্ঞিক—পলাশবৃক্ষ ।

যজ্ঞীয়—উড়ুম্বরগাছ ।

যজ্ঞীয় ব্রহ্মপাদক—বিকল্পতবৃক্ষ ।

যজ্ঞোড়ুম্বর—যজ্ঞভূমুর । পর্যায়—

হেমদংশী, যজ্ঞফল, যজ্ঞাহা,

হেমদংশক, উড়ুম্বর, জন্তুফল ।

যতুক, যতুকা—বৃক্ষবি° ।

যত্নগোল—মটরকলায় ।

যব—[ ইং barley ] ধান্যাদিবর্গের  
শস্যবি°, উত্তর ভারতে এর

চাষ অধিক পরিমাণে হয় । শীঘ্ৰে

ছয় সারি যব হয় । পর্যায়—সিত

শাক, সিতশত, মেধ্য, দিব্য,

অক্ষত, কণ্টকী, ধান্যরাজ, তীক্ষ্ণ-

শাক, তুরগাপ্রিয়, শক্ত, পবিত্রধান্য

॥ রাজনি° ॥

যবক—যব ।

যবকণ্টক—ক্ষেতপাপড়া ।

যবকলশ—ইন্দ্রযব ।

যবগ—লতাবি° ।

যবনক—গোধূম ।

যবতিক্তা—লতাবি° ॥ রাজনি° ॥

যবনাপ্রিয়—মরিচ ।

যবনাল—দেধান ।

যবনেষ্ট—১ মরিচ, ২ গুঞ্জ (১), ৩

লশুন, ৪ নিম্ব, ৫ পলাণ্ড, ৬

রাজপলাণ্ড ।

যবফল—১ বংশ, ২ জটামাংসী, ৩

কটুজ, ৪ পলাডু, ৫ ইন্দ্রযব, ৬

প্রক্ষবক্ষ ।

যবশাক—চিল্লীশাক; গোরবাস্তুশাক ।

যবশাহ, যবসাহস্রা—যমানী ।

যবাগু—যাউ ॥ রাজব° ॥

যবাগুজ—যমানী ।

যবান—যমানী ।

যবানিকা, যবানী—জোয়ান, যোয়ানি

॥ রাজনি°, ভাবপ্র° ॥ পৰ্যায়—

দীপাক, দীপা, যবসাহস্র, যবাগুজ,

দীপনী, উগ্রগন্ধা, বাতারি,

যবজ, দীপনীয়, শুলহস্তী, যবা-

ণিকা, উগ্রা, তীরগন্ধা ॥

যবাস—১ দুরালভা, গান্ধারী গাছ ॥

রাজনি° ॥ alhagi maurorum.

২ কণ্টকীক্ষুপ ।

যবাসক—দুরালভা ।

যবাসা—গুণ্ডাসিনী তৃণ ।

যবাহ—দুরালভা ।

যমদ্যুতিকা—তেতুলগাছ ।

যমদ্রুম—শিমুলগাছ ।

যমপ্রিয়—বটবক্ষ ।

যমলপত্রক—১ অশ্বশুকবক্ষ ২ কোবি-

দারবক্ষ ।

যমানিকা—জোয়ান । পৰ্যায়—অজ-

মোদা, উগ্রগন্ধা, ব্রহ্মদৰ্ভা ।

যমানী—[ স° শব্দধান্য ] ॥ রাজনি° ॥

যমাগিকা ।

যশস্কর—বৃহজ্জীবন্তী লতা ।

যশস্বিনী—১ বনকাপাস; ২ যবতিস্তা-

৩ মহাজ্যোতিষ্মতী ।

যশ্টি—১ ভাগী, ২ যশ্টিমধু ।

যশ্টিক—ভাগী, বামুনহাটী ।

যশ্টিকা—যশ্টিমধু ।

যশ্টিমধু—[ স° মধুযশ্টি; মধুক ; হি°

মূলহাট, মিঠিলকড়ী ; কো°

যশ্টিমধু ; ম° জ্যেষ্ঠমধু ; ক°

যশ্টিমধু, বল্লিষাক মধু ; গুজ°

জ্যেষ্ঠমধনোমূল, জ্যেষ্ঠমধনো-

শীরী ; তৈ° যশ্টি মধুকম্ ; কা°

বেথমেহেকুমক ; অ° অস্ন-

উশস্, কোবেসশ্ ] ॥ রাজনি° ॥

নিম্বাদিবর্গের সুস্বাদু মূলবি° ।

স্বাদে মধুর ও অম্প তিক্ত । প্রকার-

ভেদ—(১) ক্রীতনক, ক্রীতক—এই

যশ্টিমধু আবার দুই রকম (ক)

আনুপ—আদ্রভূমিতে জন্মায় (খ)

শ্বেলজ । (২) জন্মস্থানভেদে তিন

রকমের যশ্টিমধু উল্লেখ আছে ;

মিশরীয়, আরবীয়, তুরস্কীয় ।

পারস্য, সিন্ধুদেশ ও পঞ্জাবের

যশ্টিমধু অধুনা প্রচলিত ।

যশ্টিমধুকা—যশ্টিমধু ॥ ভাবপ্র° ॥

যশ্টিমধুলতা—অমোজা ॥ উইল° ॥

যাণ্টলতা—জ্বরারিপদ্মপত্রবৃক্ষ ।

যাণ্টপদ্ম—পত্রজীববৃক্ষ ।

যাজ্ঞিক—১ দর্ভভেদ, ২ অশ্বখ ।

যামীরলেবু—জম্বীর, জামীর ।

যাবক—১ শালিধান্যবিং, ২ কুলখ ।

যাবনাল—শিম্বীধান্য, কালজনার,  
জোয়ার ধান্য ॥ রাজনিং ॥ পর্ষায়  
—যবনাল, শিখরী, বৃন্ততড়ল,  
দীর্ঘনাল, দীর্ঘশর, ক্ষেত্রেশ্বর,  
ইক্ষুপত্রক ।

যাবনালশর—শর তর্গবিং ॥ রাজনিং ॥

যাবনালনিভ—যাবনাল ।

যাবনী—রসাল ইক্ষু ।

যাবি; যাবী—যবতিস্তা লতা ।

যাবিক—যবনাল ।

যাই—যাধিকা পদ্ম ।

যাক্তরসা—১ গন্ধরাস্না, ২ সামান্য  
রাস্না, কাটা আমরুল ।

যাক্তশ্রেয়সী—গন্ধরাস্না ।

যাক্তা—১ এলাজী, ২ রাস্না ।

যাগপত্র—কোবিদার গাছ ।

যাগপত্রিকা—শিংশপা গাছ ।

যাগলাথ্য—বাবলা গাছ ।

যাগক্ষিগন্ধা—বীজতাড়ক ।

যাম্পত্র—১ রক্তকান্তনবৃক্ষ, ২ ভূজ-  
বৃক্ষ, ৩ সন্তপর্ণবৃক্ষ ।

যাম্পত্রিকা—শিংশপা গাছ ।

যাম্পর্ণ—১ কোবিদারবৃক্ষ, ২ সন্ত-  
পর্ণবৃক্ষ ।

যাম্পলা—১ ইন্দীবরা লতা; ২  
বিহুটী ।

যাম্পলিনী—দাম্পিকা ।

যাম্পলোস্কম—*asclepias rosea*.

যাবতী—প্রিয়হু, ২ স্বর্ণযাধিকা, ৩  
হরিদ্রা ।

যাবতীষ্ঠা—স্বর্ণযাধিকা ।

যাইপানী—গুজ্জভেদ, *justicia*  
*nasuta*.

যাকা—১ কক্ষোদম্বর, ২ যমানী ।

যাকাবাস—শ্যাওড়াগাছ ।

যাকারী—বিষলাঙ্গুলিয়া ।

যাধিকা—১ পাঠা (?), অগ্নানক, ৩  
জাইফুল ॥ রাজনিং, ভাবপ্রং ॥ ৪  
পীতবর্ণ হলে হেমপদ্মিকা ।

পর্ষায়—গণিকা, অশ্বষ্ঠা, মাগবী ।

যাপক—প্লক্ষবৃক্ষ ।

যাপদ্র, যাপদ্রুম—খদিরগাছ ।

যোগেশ্বরী—বন্দ্যাককোটকী ।

যোয়ান, যোয়ানি—[ সঁ য়ানি, শুল-  
হস্তী, দীপ্যক ; তীরগন্ধা ; হিঁ  
অজ্জবাইন, আজমান ; কোঁ  
বাইন ; মঁ ও'বা ; গুজ্জ  
অজমা ; কঁ ওড় ; তেঁ বায়দ ;  
তাঁ অমন ; ফাঁ নানুধা ; জঁ



[ র ]

কম্বলমুণ্ডী ] বড় ঘোয়ান,  
জোয়ান, *ptychotis ajowan*,  
*carum copticum*. প্রকারভেদ  
—১ বনুঘোয়ান—[ স° বন্যঘোয়ানী,  
অজমোদা, উগ্রগন্ধা, গন্ধদলা ;  
হি° অজমোদা ; কো° ঘোড়জঙ্গ,  
ম° অজমোদা ; গুজ° বোড়ি অজ-  
মোদা ; ক° অজমোদা ; তে° আজ-  
মোদা ; কা° কপাস ; অ° হবুল-  
কতরুকেরফস ] *sesell indicum*,

*cnidium diffusa*. ২ খোবাসনী  
[ স° খুরাসানী যবানী, যাবনী  
যবানী ; হি° খুরাসানী অজবায়ন ;  
খুবাসানী ও° বা ; গুজ° খুরাশানী  
অজমা ; তে° খুরসান বামর ; তা°  
খুরশানী ওনাম ; ফা° বঞ্জ ; অ°  
বজরুল বঞ্জ ] পারসীক যবানী,  
তুরকা, মদকারিগী, *conium*  
*maculatum*.

[ র ]

রক্তকটা—বইচি গাছ ।

রক্তকন্দ—কদম্ব ভেদ ।

রক্তকদলী—চাপাকলা ।

রক্তকন্দ—১ পলাশু, ২ রক্তাল ।

রক্তকমল—কুমুদের মত ফুল

বিশেষ, কিন্তু ঘোর রক্তবর্ণ,

পদ্মবি° ॥ রাজনি° ॥ *nymphoea*

*rubra*. পর্যায়—কোকনদ, রক্তা-

মোজ, অরুণকমল, শ্যেণপদ্ম,

অরবিষ, রবিপ্রিয়, রক্ত-বারিষ

। অম° ॥

রক্তকম্বল—রক্তোৎপল, রক্তনাল [ও°

ধবলকৈ°, রক্তকৈ°, দাফি° অল্লিকুল,

গুজ° কম্বল, নীলোৎপল] শালুক,

নাল, লালবর্ণ কুমুদফুল, ছোট

মন্দী, *nymphoea lotus*,

পর্যায়—কমল, কুমুদ, কল্লার, হল্লক

(হেলা) সম্ম্যক । ৩০ ফুট উঁচু হয় ।

ফুল লাল, শাঁটির মত ফল,

তার মধ্যে লাল গোল বীজ, বীজের

উভয় দিক কুন্ডপৃষ্ঠ ।

রক্তকরবীর, রক্তকরবীরক—[ হি° লাল

কনেল ] লাল করবী ফুলের গাছ

। রাজনি° ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—রক্ত

প্রসব; গণেশকুম্ম, চণ্ডীকুম্ম,

কুর ভূতদ্রাবী, রবিপ্রয়।

রক্তকা—পানীয়ামলক (?)।

রক্তকাণ্ডন—[ হি° কাচনার, কোনিয়ার, কুরাল, পদারিরা, থৈরাল, গদারিয়াল, গারিয়াল, বারিয়াল, সোনা, কলিয়র কান্দন; থৈরবাল ; বো° কোবিদার, ও° বোরধ ; রক্ষ° বেচন ; মহলয় কাণি, মহহেল গণি ] কোবিদার পদ্ম, *bauhinia variegata*, b. *purpurea*. পর্যায়—বিদল, মোরিক, কাণ্ডনাল, তাম্রপদ্ম কুদার।

রক্তকান্তা—রক্তপদনবা।

রক্তকুমুদ—রক্তকৈরর, *nymphoea rubra*, Rox.

রক্তকুরদুটক—লাল ঝাটি. *barleria prionitis*.

রক্তকুম্ম—ধন্বনবৃক্ষ, ধামনা গাছ।

রক্তকেশর—পারিভদ্র।

রক্তকৈরর—রক্তকুমুদ।

রক্ত কোকনদ—রক্তপদ্ম।

রক্তখাদির—লালবর্ণ খাদিরবি° ॥ রাজনি°,

ভাবপ্র° ॥ *acaciacatechu*. পর্যায়

—রক্তসার, সুসার, তাম্রসারক, বহু-

শল্যা যাজিক, কুষ্ঠনোদন, মৃপদ্ম,

অশ্রুখাদির, অরুস, গায়ত্রী, দন্তধাবন,

কটকী, বলিপত্র, বহুশল্যা, যাজিক।

রক্তখাডব—দৈপথজরী বৃক্ষ।

রক্তগন্ধা—অশ্বগন্ধা।

রক্তগভা—নখরঞ্জনী বৃক্ষ; মেহেদী গাছ।

রক্তগ্রন্থি—রক্তলজ্জারতী।

রক্তগ্ন—রোহিতকবৃক্ষ। রয়না গাছ, রোঢ়াগাছ।

রক্তগ্রী—গাটিগ্না দূর্বা।

রক্তচন্দন—লালচন্দন, *pterocarpus*

*santabinus*. ॥ রাজনি° রাজব°,

ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—তিলপণী,

পত্রাঙ্গ, রঞ্জন, কুচন্দন, তাম্রসার,

তাম্রসারক, ক্ষুদ্রচন্দন, অকচন্দন,

রক্তাঙ্গ, প্রবালফল, পত্রাঙ্গ, পত্রা,

রক্তবীজ।

রক্তচিগ্রক—রক্তচিতা বা রাঙাচিতা গাছ, *plumbago rosea*.

রক্তজবা—লালজবা, *hibiscus rosa sinensis*. জবা দ্র°।

রক্তঝাবৃক—লাল ঝাউগাছ, *tamarindioica*.

রক্তঝিট—লালঝাটি। পর্যায়—কুদুবক।

রক্ততৃণ—গোমুত্রিকা তৃণ।

রক্তগ্রীবৎ—লাল তৈউড়ী ॥ রাজনি° ॥

পর্যায়—কালিন্দী, ত্রিপটু, তাম্র-  
পুষ্পিকা, কুলবর্ণা, মসুরী,  
অমৃত্য, কাকনাসিকা ।

রক্তদ্রুম—পিয়াল গাছ ।

রক্তনাল—জীবশাক ।

রক্তনির্ঘাস—রক্তবীজাসন বৃক্ষ ।

রক্তপত্র—পিঁডাল ।

রক্তপাঠা, রক্তপত্রিকা, ১ রক্তপদনর্বা ।

২ নাকুলী, রাধনা ।

রক্তপদী—লজ্জাবতী লতা ।

রক্তপদ্ম—রক্তবর্ণ কমল ।

রক্তপর্ণ—রক্তপদনর্বা ।

রক্তপল্লব—অশোক গাছ ।

রক্তপাকী—বৃহতী ।

রক্তপাদী—হংসপাদীলতা, vitis  
pedata । ২ লজ্জালতা,  
mimosa pudica.

রক্তপিণ্ড—১ জ্বাপদ্ম । ২ চিনা  
গোলাপ, hibiscus rosa-sinen-  
sis ॥ উইল ॥

রক্তপিণ্ডক—১ রক্তাল, ২ জ্বাবৃক্ষ ।

রক্তপিণ্ডাল—[ ম° বাতাল ] লাল  
চুবড়ি আল, dioscorea sativa.

রক্তপিভহা—গাটিয়া দূর্বা, panicum  
dactylon.

রক্তপীতফলা—মধুর বিবকা ।

রক্তপদনর্বা—শাকবি° । পর্যায়—ক্রুরা,

মণ্ডলপত্রিকা, রক্তকাস্তা, বর্ষকৈতু-  
লোহিতা রক্তপত্রিকা, বৈশাখী.  
শোকঘ্নী; রক্তবর্ষভ, পুষ্পিকা,  
বিকম্বরা; বিষঘ্নী, প্রব্র্ষেণ্যা,  
সারিণী, বর্ষাভব; শোণপত্র, ভোম-  
পদনর্বা, নব, নব্য ॥ রাজনি° ॥

রক্তপুষ্প—১ করবীর, ২ রক্তকাণ্ডনবৃক্ষ.  
৩ দাড়িমবৃক্ষ, ৪ বকবৃক্ষ, ৫  
বন্ধুকবৃক্ষ, ৬ পদ্মাগবৃক্ষ ।

রক্তপুষ্পক—১ পলাশ বৃক্ষ, ২  
রোহিতক বৃক্ষ, ৩ শাল্মলি বৃক্ষ ।

রক্তপুষ্পা—১ শাল্মলীবৃক্ষ, ২  
পদনর্বা, ৩ কনকদলীবৃক্ষ,  
চাঁপাকলা, ৩ সিদ্দুরী (?), ৫ নাগ  
দমনী, নাগাদলা ।

রক্তপুষ্পিকা—১ লজ্জাল গাছ, ২ রক্ত-  
পদনর্বা, ৩ ভূপাটলী, ৪ টোকা-  
পানা ।

রক্তপোস্ত—লাল পোস্ত, papaver  
rhoeas.

রক্তপ্রসব—১ রক্তকরবীর, ২ রক্তঝাটি,  
মধুকুন্দগাছ ।

রক্তফল—১ বটগাছ, ২ শাল্মলীগাছ ।

রক্তফলা—১ তেলাকদা, momordica  
monadelpha, ২ শোণাল, ৩  
বাতাঁকু ।

রক্তবধন—বাতাঁকু, solanum

molongena. -

রক্তবর্ষাভূ—রক্তপদনর্বা ।

রক্তবাবিজ—রক্তপদ্ম ।

রক্তবাসক—বাসক দ্রু° । *justicia rubrum.*

রক্তবীজ—১ দাড়িম; ২ অরিস্টক ফল, বিটা ।

রক্তবীজকা—তবদীগাছ ।

রক্তবৃক্ষ—পদনর্বা ।

রক্তবৃক্ষা—গেফালিকা, *nyctanthus arbortritis.*

রক্তবেড়োলা—*sida rhombifolia*, ফুল ছোট, হলদে ।

রক্তমঞ্জর—১ নিচলবৃক্ষ, ২ নিব্ববৃক্ষ ।

রক্তমঞ্জরী—রক্তকরবারী ।

রক্তমন্ডল—রক্তপদ্ম ।

রক্তমন্ডলিকা—লাল লজ্জাবতী লতা ।

রক্তমরিচ—লঙ্কামরিচ ।

রক্তমলাতক—রক্তঝাঁট ।

রক্তমুখ—ষষ্ঠিক ধান্য ।

রক্তমূলক—দেবসর্বপর্বৃক্ষ ।

রক্তমূলা—লজ্জাবতী লতা ।

রক্তরজা—মেহেদীগাছ ।

রক্তরসা—রাশনা ।

রক্তরসোন—লালরশুন ।

রক্তরেণু—১ পলাশকলিকা, ২ পদ্মাগ ।

রক্তরেণুকা—পলাশকলিকা ।

রক্তরৈবতক—স্বীপান্তর ঋজুরগাছ ।

রক্তরশুন—পর্যায়—মহাকন্দ, গুঞ্জন, দীর্ঘপত্রক, পৃথুপত্র, শ্বলকন্দ; যবনেট ।

রক্তশালি—রক্তবর্ণ ধান, দাদধানি চাল, *oriza sativa.* ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—ভাগ্যশালি, শোণশালি, লোহিত শালি ।

রক্তশালুক—রক্তকমল কন্দ ।

রক্তশামলি—লাল শিমূল গাছ ।

রক্তশিগ্রু—রক্তশোভাজন বৃক্ষ ॥ রাজনি° ॥ পর্যায়—রক্তক, মধুর, বহুলচ্ছদ, সুগন্ধ, কেশরী, সিংহ, মৃগারি ।

রক্তশিমূল—শামলী, *solamolia malabrica* পর্যায়—শূলফল; দীর্ঘদ্রুম, সমদ্রুম, বহুবীর্ষ; রম্যপুষ্প, কণ্টকদ্রুম, রক্তোৎপল, মোংগাখা, তুলবৃক্ষ, মোচনী, চিরজীবী, কুন্ডলী, তুলিনী, পূরদী ।

রক্তশিখী—পালশিম ।

রক্তশেখর—পদ্মাগবৃক্ষ ।

রক্তসঙ্কোচ—[ই° saf flower] কুসুম্ব-পুষ্প ।

রক্তসঙ্কোচক—রক্তপদ্ম ।

রক্তসজিনা পুষ্প—ফলবি° ।

রক্তসন্ধ্যক—রক্তকমল ।

রক্তসরোরুহ—রক্তপদ্ম ।

রক্তসৰ্প—রাইসরষে ।

রক্তসহা—লালঝাটি গাছ

রক্তসার—১ অল্পবেতস, ২ রক্তখদির,

৩ রক্তবীজাসনগাছ, ৪ রক্তশিংশপা,

৫ বারাহীকন্দ ।

রক্তসৌগন্ধিক—রক্তকল্লার ।

রক্তহর—ভল্লাতক (?) ।

রক্তা—১ কঁচ, ২ উষ্ট্রকাণ্ডী পদ্ম

বৃক্ষ, ৩ শিম্বীভেদ, ৪ বচা ও

লক্ষণাকন্দ ।

রক্তাঙ্গী—১ জীবন্তী, ২ কটুকা (?), ৩

মঞ্জীষ্ঠা ।

রক্তাঢকী—লাল অড়হর ।

রক্তাপরাজিতা—[ হি° লালচিরচিরা ] ।

লাল অপরাজিতা ।

রক্তাপামার্গ—[ সি° অক'পদ্মপী ]

লাল আপাং ॥ রাজনি° ॥ পৰ্যায়—

ক্ষুদ্রাপামার্গ, আঘটক, দক্ষিণিকা,

রক্তবিট, কলাপত্রিকা ।

রক্তাঙ্গ—রক্তকমল ।

রক্তাভ—লালজবা ।

রক্তান্দরুহ—রক্তপদম ।

রক্তান্ন—জলপাই ।

রক্তান্নাতক—লালবিল্টীফুল ।

রক্তান্নান—লালবর্ণের ফুলবি° ।

পৰ্যায়—রক্তসহা, অপরিম্নান, রক্তা-

ন্নানক, রাগপ্রসব, রক্তপ্রসব, কুরুবৃক্ষ,

রামালিঙ্গনকাম, স্নভগ, বধুৎসব-

প্রসব, ভ্রমরানন্দ । ॥ রাজনি° ॥

রক্তাবি—মহারাত্রীক্ষুপ ।

রক্তাক—লাল আকন্দ ।

রক্তাল—শকরকন্দ আল, ॥ রাজনি° ॥

পৰ্যায়—রক্তপিণ্ডাল, রক্তপিণ্ডক,

লোহিত, রক্তকন্দ, লোহিতাল ।

রক্তাশোক—অশোকবৃক্ষ ।

রক্তাম্বরপদ্ম, রক্তাম্বারি—রক্তকরবী

ফুল ।

রক্তিকা—১ কঁচ, ২ লাল সৰ্প ।

রক্তেক্ষু—লাল আক ॥ রাজনি° ॥

পৰ্যায়—সুক্ষপত্র, শোগ, লোহিত,

উৎকট, মধুর, হৃষ্মদল, লোহি-

তেক্ষু ।

রক্তৈরুড—লাল ভেরুডা ॥ রাজনি°,

ভাবপ্র° ॥ পৰ্যায়—ব্যাঘ্র, হরিকর্ণ,

রুবু, উরুবু, নাগবর্ণ, চণ্ড,

উত্তানপত্রক, করপর্ণ, পাচন,

শিংশ, ব্যাঘাতন, রক্তক, চিত্রবীৰ,

হুইরুড ।

রক্তৈবীৰু—ইন্দ্রবারুণীলতা ।

রক্তোচ্চটা—শ্বেতগুঞ্জা ।

রক্তোৎপল—১ রক্তপদ্ম, ২ শাল্মলী-

বৃক্ষ ।

রক্তন—আচ্ছাদিবর্ণের পদ্ম-

কদুপবি°। ফুল লাল, চতুর্দল,  
অনেক গুচ্ছাকারে ফোটে।  
রঙ্গনী—[ স° রঙ্গন ; ইং the ran-  
goon creeper ] হরিতক্যাদি-  
বর্ণের পুষ্পলতাবি°। ব্রহ্মদেশ  
ও মালয় দেশ এর আদি বাসস্থান।  
ফুল প্রথমে সাদা ও পরে লাল  
হয়। জোড়া জোড়া পাতা, দীর্ঘা-  
কার, ফুল পঞ্চদল, পুংকেশর  
দশটি।  
রঙ্গপত্রী—নীলীবৃক্ষ।  
রঙ্গলতা—[ হি° মরোরফলী, মেস্‌দু ]  
আবতকী লতা, অংমোড়া, he-  
licterus isora.  
রঙ্গলাসিনী—শেফালিকা।  
রঙ্গবালিকা—বৃক্ষভেদ। পর্ষায়—রঙ্গ-  
বল্লী।  
রংগারি—করবীর।  
রঙ্গপুষ্পী—নীলীবৃক্ষ।  
রঙ্গিন—শতমূলী।  
রঙ্গিনী—[ ই° the sandwitch is-  
land creeper ] পুষ্পলতাবি°।  
পাতা পানের মত, বিদেশ হতে  
আনীত। ফুল গোলাপী রংয়ের  
দ্বিদল, বর্ষাকালে দুবার ফুল হয়।  
ফুলের শীষের অগ্রে অশি।  
রঙ্গ্‌স্টালক—সাল আল।

রঙ্গনী—১ হরিদ্রা, ২ জতুকালতা, ৩  
দারুহরিদ্রা, ৪ বাস্তুক, ৫  
নীলিনী (?)।  
রঙ্গনীগন্ধা—[ হি° গুলফভ, গুলচেরী,  
গুলসন্ধ্যা ; ই° tube rose ]  
polianthes tuberosa. উদ্যান-  
জাত সুগন্ধি পুষ্পে শাকবি°। কদ  
হতে গাছ হয়। বর্ষাকালে ফুল  
হয়। ফুল সাদা, লম্বা শীষে  
জোড়া জোড়া ছয় পাপড়ি যুক্ত  
ফুল হয়। রাতে মধুর গন্ধ  
বিকীর্ণ করে। ছয় কেশরযুক্ত।  
রঙ্গনীদ্বয়—হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা।  
রঙ্গনীপুষ্প—১ পর্দাতকরঞ্জ, ২ রঙ্গনী-  
গন্ধাফুল।  
রঙ্গনীহাসা—শেফালিকা পুষ্প। nyc-  
tanthus arbor-tristis.  
রঙ্গদাল—বৃক্ষভেদ।  
রঞ্জক—১ ভেলার গাছ, ২ মেদীগাছ।  
রঞ্জন—১ রক্তচন্দন, ২ হিন্দুল, ৩ মঞ্জ-  
ত্বণ, ৪ জাতীফল, ৫ কম্পল্ল বৃক্ষ,  
৬ শেফালিকা, ৭ হরিদ্রাপপটী।  
রঞ্জনক—কটফল।  
রঞ্জনকেশী—নীলীবৃক্ষ।  
রঞ্জনদ্রু—১ অচ্ছক গাছ, আচ্ছ গাছ,  
২ ধনক গাছ।  
রঞ্জনী—নাটাকরঞ্জ, ২ নীলগাছ।



রূপপ্রিয়—সুগন্ধী তুণের মূলবিং;  
andropogon muricatum.

রূপমুষ্টি—কুচিলাগাছ।

রূপমুচ্ছজা—ককটশংখী।

রূপক, রূপা—ফলহীনবৃক্ষ, মৃদুকপণী  
salvinia cucullata.

রূপসত্তরা—চিরঞ্জীবা, পিড়িংশাক,  
trigoneli corniculata.

রূপতী—রক্তগুণ্ডা।

রূপদ্রুত, রূপদ্রুম—১ যে বৃক্ষের কাঠদ্বারা  
রথের চাকা প্রভৃতি তৈরী হয়,  
তিনিশ গাছ, dalbergia ougei-  
nensis ২ বেতস গাছ।

রূপপরিষায়—১ তিনিশ গাছ, ২  
বেতলতা।

রূপাক্ষী—ঋষি নামে ঔষধিবিং।

রূপাল, রূপালপুষ্প—বেতস বৃক্ষ,  
calamus rotang.

রূপিনাথ—১ পশু, ২ বাঁধুলি ফুল।

রূপিপ্রিয়—রক্তপশু।

রূপ—রক্তাশোক বৃক্ষ।

রূপণী—বালাখ্যবৃক্ষ।

রূপা—[ ইং plantain ] musa  
sapienta. কলা দ্রু।

রূপাকলাই—ববটি দ্রু।

রূপা—১ পটোল মূল; ২ চম্পকবৃক্ষ,  
৩ বকবৃক্ষ।

রূপাক, রূপাকক্ষীর—ষোড়ানিম।

রূপাপুষ্প—শাল্মলীবৃক্ষ।

রূপফল—কুচিলা গাছ।

রূপা—১ স্থলপশ্মিনী, ২ মাকাল।

রূপামলী—ভূই আমলা।

রূপদন—[ সঁ রসোন, লশদন, রসোনক,  
শুক্ল কন্দ, শ্বেচ্ছকন্দ ; হিঁ লশদন;  
লহশন ; মঁ পাণ্টার লশদন ; কঁ  
বিলীয় বেঙ্গলী ; তেঁ তেল্লা উল্লী  
গাণ্ডু ; তাঁ বজ্জিহ পাণ্ডু ; ফাঁ  
সীর ; অঁ সুমইকঁসুদি'বদন ; ইং  
garlic ] মূলবিং, শ্বেচ্ছকন্দবিং  
শ্বেত পিঁয়াজের ন্যায় তীর গন্ধ  
কন্দবিং, allium cepa. প্রকার-  
ভেদ—মহারূপদন—[ মঁ মহারসোন ]  
এর পাতা রূপদনের চেয়ে লম্বায়  
চওড়ায় বড়, মূল মোটা।

রূপপতি—আদিত্যপত্র ক্ষুদ্র।

রূসদা—শ্বেতানিসন্দা।

রূসদালিকা—পুঁড়ী আক।

রূসদাবিন—মধুর জম্বীর।

রূসনা—১ রাশনা, ২ গন্ধভদ্রা, গন্ধ-  
ভাদাল।

রূসপদার্থিকা—লতা ফটকী।

রূসফল—১ নারকেল গাছ; ২ আমলকী  
গাছ।

রসবন্ধকর—সোমলতা ।

রসা—অক্লোথি, *cisampelos hexandra*, ২ শস্যবি, *panicum italicum*.

রসাঢ়—১ আমড়া, ২ রাশ্না ।

রসাধকা—কাকোলী দ্রাক্ষা ।

রসায়—১ অম্রবেতস, ২ পলাশীলতা ।

রসায়ক—তৃণবি° ।

রসায়ক—তৃণবি°, *saccharum munja*.

রসায়নফলা—হরীতকী ।

রসায়নবর—কঙ্কু ধান্য ।

রসায়নী—১ গড়ুচী, ২ কাকমাচী, ৩ মহাকরঞ্জ, ৪ গোরক্ষদৃশ (?), ৫ মাংসচ্ছদা (?), ৬ মঞ্জিষ্ঠা (?), ৭ কর্ণক্ষেফাটা, ৮ আলকুশী, ৯ শূক-  
ত্রিবৃতা, ১০ শত্ৰুপদৃশী, ১১ কন্দ-  
গড়ুচী ।

রসাল—১ ইক্ষু, ২ আম্র, ৩ পনস, ৪ কন্দরতৃণ, ৫ গোধূম, ৬ পদুড়ক-  
নামেক্ষু, ৭ অম্রবেতস ।

রসাল—১ দূর্বা, ২ বিদারী, ৩ দ্রাক্ষা,  
৪ শিখারিণী (?) ।

রসালায়—মহারাজায় ।

রসালিকা—সপলা ।

রসালিন—কৃষ্ণচর্ণক ফুল ।

রসালিহা—চাকুলিয়া । *hemionites*

*cordifolia*.

রসালী—পুঁড়ি আক ।

রসালেক্ষু—করকশালি ইক্ষুবি° ।

রসাস্বাসা—পলাশীলতা ।

রসাস্থ—১ লঘু শতাবরী, ২ রাশ্না ।

রসোনক—রশুন, লশুন ॥ ভাবপ্র° ॥

রস্যা—রাশ্না ॥

রহস্যা—রাশ্না ।

রাইসরিষা—সরিষা দ্র° ।

রাধুনি—অজমোদা; বনযমানী, ধান্যা-  
দি বর্গের ঔষধি শাকবি° ।

রাঙচিতা গাছ—রক্তচিরক দ্র° ।

রাখালশা—[ স° ইন্দ্রবারুণ ; হি°  
ছোট ইন্দ্রবারুণ ; মা° পেইকুমমুট্রি;  
তে° ইতি-পদক-কা ] ইন্দ্রবারুণী  
দ্র° ।

রাংচিতা—চিতাগাছ ।

রাগচূর্ণ—খদির গাছ, *acasia catechu*.

রাগধ—তৈরণীক্ষুপ ।

রাগদানি—মসুর ।

রাগপদৃশ—১ বন্ধুলি গাছ, ২ রক্তায়ান ।

রাগপদৃশী—জবা ।

রাগী—[ স° রাগিন ] তৃণধান্যবি°  
॥ রাজনি° ॥

রাজন—রজন ফুল ।

রাঙ্গাগুঞ্জা—লাল কুচ ।

রাজানটিয়া—লাল নটে শাক, *amarantus atropurpureus*.

রাজামৃগ—রক্তমৃগ ।

রাজামৃগাই—গুল্মভেদ, *celasciaer istata*.

রাজাল—শকরকন্দ আলু ।

রাজাশাক—*amarantus gang-ticus*.

রাজকন্দম্ব—কন্দম্ববি° ।

রাজকন্যা—কেবিকাপদৃপ ।

রাজকশেরু—সুগন্ধী তৃণ ।

রাজকুলক—পটোল লতা ।

রাজকুম্ভাড—বার্তাকী ।

রাজকোল—নারকেল কুল ।

রাজকোষাতক—কিঙা ফল ।

রাজ কোষাতকী—[ হি° ধিয়াতোরই ]

কিঙা ॥ মদনবিনোদ ॥ পর্যায়—

হস্তিপর্ণকা, পীতপদুপিকা,

ধামার্গব, কেশফলা, মহাজননী,

সপীতক ।

রাজখজুরী—পিণ্ড খজুরিকা

॥ রাজনি° ॥

রাজক্ষবক—রাইসবেঁর শাকবি° ।

রাজগিরি—শাকবি° ॥ রাজনি° ॥

রাজচম্পক—পুষ্পাগবক্ষ ।

রাজজম্বু—১ পিণ্ডখজুর, ২ বড়

জামগাছ, গোলাপ জাম ।

রাজজীরক—জীরকভেদ, *c. trilocularis*.

রাজতরঙ্গী—বড় গেউতী ।

রাজতরু—১ কর্ণিকার বক্ষ, সেঁদাল গাছ, ২ আরগন্ধ (?) ।

রাজতরুণী—পদুপবি° ॥ রাজনি° ॥

রাজতাল—গুবাক গাছ, সুপারি গাছ, *areca faufel* । ২ বৃহৎ তাল-গাছ ।

রাজতিমিশ, রাজতোমিশ—তরমুজ, কাকড় ।

রাজদুর্বা—বড়দুর্বাঘাস ।

রাজধতুরক—কনকধতুরা ।

রাজধান্য—১ হেমন্তিক ধান্যবি° ।

২ শ্যামাধান ।

রাজন্য—ক্ষীরিকাগাছ, *mimusops karkl, Rox.*

রাজপটোল, রাজপটোলী—মধুর পটোল, *trichosanthes dioeca*.

রাজপর্ণী—গন্ধভাদলিয়া ।

রাজপলাণ্ড—লালপেঁয়াজ ॥ রাজনি° ॥

পর্যায়—জবনেট, নৃপাহবর, রাজ-

প্রিয়, মহামূল, দীর্ঘপত্র, রোক,

নৃপেট, নৃপকন্দ, নৃপপ্রিয়, রক্ত-

কন্দ, মহাকন্দ, রাজেট ।

রাজপত্র—১ ক্ষীরিকাবক্ষ, ২ মহারাজ

চত বৃক্ষ ।

রাজপট্টিকা—শুক্লবর্ণিকা ।

রাজপট্টী—১ কটুতৃণবী, ২ জাতী,  
৩ মালতী ।

রাজপদ্ম—নাগকেশর পদ্মবৃক্ষ,  
mesua ferrea.

রাজপদ্মী—১ করুণীবৃক্ষ, ২ বন-  
মল্লিকা, ৩ জাতীপদ্ম ।

রাজপ্রম—১ 'করুণীপদ্মবি', ২  
রাজপলাডু ।

রাজফাণ্ডুক—নাগরংগবৃক্ষ ।

রাজফল—১ পটোল, ২ রাজান্নবৃক্ষ, ৩  
রাজাদনীবৃক্ষ [সং ক্ষীরিণী]  
ক্ষীর খেজুর mimusops  
hexandra.

রাজফলা—জম্বু ।

রাজফলগু—কাকডুমুর গাছ ।

রাজবদর—১ রক্তামলক, ২ নারকেল  
কুল, ৩ রাজকোল, মধুরফল  
॥ রাজনিং ॥

রাজবলা—গন্ধভাদুলিয়া ।

রাজভট্টিকা—হাপট্টীবৃক্ষ ।

রাজভদ্রক—১ পরিভদ্রকবৃক্ষ, ২ নিম্ব-  
বৃক্ষ, ৩ কুন্দুরকবৃক্ষ (?), ৪ শ্বেত  
আকন্দ ।

রাজভোগ—শালিধান্যবিং ।

রাজভোগ্য—প্রিয়ালবৃক্ষ, chironjia

sapida, buchanania latifol-  
ia, rox.

রাজমাষ—বরবাটি, dolichos sinen-  
sis ॥ রাজনিং, রাজবং ॥

রাজমদগ—উত্তরমদগ ।

রাজবলা—গন্ধভাদুলিয়া, paederia  
foetida.

রাজবল্লভ—১ রাজাদনী, ২ রাজান্ন, ৩  
রাজবদর ।

রাজবল্লী—উচ্ছে ।

রাজবৃক্ষ—১ আরংবধবৃক্ষ, ২ পিয়াল  
গাছ, ৩ লক্ষ্যসিঙ্গ; ৪ শ্যোণাক  
গাছ ।

রাজশণ—পাট ।

রাজশাক, রাজশাকণিকা—তেতোশাক ।

রাজশালি—হৈমন্তিক ধান ।

রাজশিম্বী—সাদা শিম ।

রাজশুক্ক—হৈমন্তিক ধান্যবিং ।

রাজসর্বপ—সর্ববিং ॥ রাজনিং ॥

রাজাতন—পিয়াল গাছ ।

রাজাদন—১ ক্ষীরিকা, ২ পিয়াল, ৩  
কিংশুক ।

রাজাদনফল—ক্ষীরিণী গাছ, খিনী-  
গাছ ।

রাজাদনী—ক্ষীরিণী বা রাজফল  
॥ রাজনিং ভাবপ্রং ॥

রাজাদি—উদ্ভিদভেদ ।

রাজান্ন—অশ্বদেবশোভন শালিধান্যবি°

॥ রাজনি° ॥

রাজান্ন—আম্রবি° ॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥

পর্যায়—রাজফল, শ্মরান্ন, কোকি-

লোৎসব, মধুর, কোকিলানন্দ,

কানেট, নৃপবল্লভ ।

রাজান্ন—অন্নবেতস ।

রাজলাবু—মিঠালাউ ॥ মদনবিনোদ ॥

পর্যায়—মহাতুম্বী, মধুরালাবুনী,

শাফালাবু, তুম্বক, ভক্ষালাবু,

অলাবুনী, মিষ্টতুম্বী ।

রাজালুক—মহাকন্দ ।

রাজান্ন—১ চীনের করবীফল, ২ রাজা-

দনীবৃক্ষ, ৩ শ্বেতাকবৃক্ষ ।

রাজিকা—১ রাজসর্ষপ, রাইসর্ষে

॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ ২ কৃষ্ণসর্ষপ,

৩ কৃষ্ণোদম্বর ।

রাজিকাফল—গৌরদর্ষপ ।

রাজিফলা—চীনােকটী (?) ।

রাজিলফলা—এবীরুভেদ (?) ।

রাজী—১ রাজিকা, ২ রক্তসর্ষপ ।

রাজীফল—১ পটোল, ২ তিস্তপটোল,

রাজীক—রাজসর্ষপ ।

রাজীবিনী—*helumbium specio-*

*sum.*

রাজেশ্বর—রাজগিরা শাক ।

রাজেশ্বর—পটোল ।

রাজেশ্বর—১ ধান্যবি°, ২ রাজপলাওড়,

৩ কদলীবৃক্ষ, ৪ পিণ্ডখজুর ।

রাজোদেজনসংজক—ভূতাকৃশবৃক্ষ ।

রাজী—নীলী (?) ।

রাধ—ময়নাগাছ ।

রাতক—অগুরু ।

রাতিপদুপ—উৎপল ।

রাতিহাস—শ্বেতোৎপল ।

রাত্রী—হরিদ্রা ।

রাধা—আমলকী ।

রাধাচুড়া—[ইং gold mohur tree]

*poinciana*. কৃষ্ণচুড়া গাছের

মত প্রায় কিন্তু গাছ ও ফুল বড় ।

কিন্তু কেহ কেহ একে বিলিতী

কৃষ্ণচুড়া বলে ।

রামক—জলাপামার্গ ।

রামকদলী—রামকলা, পাকাফল

লালবর্ণ ।

রামকান্ত—রামশরতৃণ, ইক্ষুভেদ ।

রামকাঠা—বৃক্ষবি° *quercus semi-*

*serrata*.

রামচ্ছদনক—মদনবৃক্ষ ।

রামঠ—১ আকরোট গাছ, ২ মদনফল,

৩ অপামার্গ ।

রামণ—তিস্কৃক ।

রামতরায়—*hibiscus edulis*.

রামতরুণী—সেউতীফুল ।

রামতিল—*verbesina sativa*.

রামতুলসী—*ocimum gratissimum*.

রামদুলিয়া—*elaecarpus aristatus*.

রামপুগ—গুদাকবি°। পর্যায়—  
কামীন, মর্নিপুগ, সুরেবট।

রামবাশ—তুর্গবি°। গাছ আনারসের  
মত, মধ্যে একটি বাঁশের মত সরল  
দণ্ড পুষ্পগচ্ছ মাথায় করিয়া  
উঠে। ভারতের পশ্চিমাংশে  
পথের ধারে দেখা যায়।

রামবাণ—১ শরবৃক্ষভেদ ২ ইক্ষুভেদ।

রামবেগুন—বেগুন গাছের মত।  
পাতা কটাময়, সাদা ফুলযুক্ত  
শাকবি°। *solanum ferox*.

রামশর—শরবৃক্ষবি°। রাজনি°।

রামা—১ বৈতকণ্টকারী, ২ অশোক, ৩  
সাতলা (?), ৪ তমালপত্র।

রামালিঙ্গনকাম—রক্তবাটি।

রামাবামাশ্চিঘাতক—অশোকবৃক্ষ।

রাম—*sinapis racemosa*.

রাল—[ হি° কিংলি ] খনোর গাছ,  
*mimosa rubicaulis*.

রালকার—সালবৃক্ষ।

রাসভবান্ধনী—আরবদেশীয় যাইগাছ।  
উইল°। তিস্তরস উষধীষ°।

রাশ্না—[ স° মলরাশ্না, পত্ররাশ্না,  
তুণরাশ্না, কুঙ্কটীকন্দ, রক্ত  
পত্রিকা; হি° সরহাতি; তে°  
কানাপাবাদানিকা; সাঁওতাল—  
দারীবাঁকী; তা° অন্তবদাপর ]  
লতাশাকবি°। তেতুল প্রভৃতি  
গাছের কাণ্ডে ও শাখায় যে উদ্ভিদ  
জন্মে তাকে রাশ্না বলে।

*ophiorrhiza mungos*.

পর্যায়—নাকুলী, সুরসা, সগন্ধা,  
গন্ধনাকুলী, নকুলেটা, ভূজঙ্গাক্ষী,  
ছত্রাকী, সবহা, রস্যা, শ্রেয়সী,  
রসনা, রসা, স্বেগন্ধী, মলা,  
রসাত্যা, অতিরসা, দ্রোগগান্ধিকা,  
সপগন্ধা, সপাক্ষী, পলঙ্ঘা।

প্রকারভেদ—১ বাংলা দেশের রাশ্না  
—কাঁটা আমরুল, *vanda roxburghii*. ॥ ভাবপ্র° ॥ ২ কঙ্কণ-  
দেশের রাশ্না—*saccolabium wightianum*, s. *praemorsum*. ৩ বোম্বে দেশের রাশ্না—  
*tylophora asthmatica*.

রাটা—[ ইং *rata* ] নিউ জিল্যান্ডের  
একপ্রকার রক্তকাঠ ও লোহিত  
পুষ্পপ্রসূ সুবৃহৎ গাছ।

রিঠা—[ স° রিটক, রিটা, ফেনিল,  
অরিটক; হি° রিঠা; তা° পামান



কটাই ; তে° কৃষ্ণকুড় কয়লা ;  
গুজ° অরিন্ধা ; ইং soapnut  
tree ] রিঠা, আরণ্য বৃক্ষবি°,  
sapindus trifoliatum. রিঠা  
ব্যবহারে মাথার উকুন মরে ও  
মাথার চুল পরিষ্কার হয় । প্রকার-  
ভেদ—১ বড় রিঠা—s. emargi-  
antus, s. trifoliatum. মধ্য-  
ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে জন্মায় ।  
বাংলায় খুব কম । পাতা লোমশ,  
ফল ২-৩টি পরস্পর অপযুক্ত । ২  
ছোট রিঠা—s. mukorissi. উত্তর-  
ভারতে জন্মায়, বাংলায় খুব কম ।  
পাতা রোমহীন, ফল লম্বা একটি  
কিংবা জোড়া । ৩ রিঠাকরঞ্জ ।  
রীঠাকরঞ্জ দ° ।

রিপদ্ব্যস্তনী—কুচুইলতা, abrus  
precatorius.

রিণ্ট, রিণ্টক—রক্তশিখর গাছ ।

রীঠা—রীঠাকরঞ্জ । পর্যায়—গুচ্ছক,  
গুচ্ছপুষ্পক, গুচ্ছফল, অরিন্দ,  
মঞ্জল্য, কৃ°ভবীজক, প্রকীৰ্ণ,  
সোমবৎক, ফেনিল ।

রীঠাকরঞ্জ—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

রুচক—১ বাতুলদ্রুক্ষ, ২ বীজপদর ।

রুচির, রুচিরো—লবঙ্গ ।

রুচিরাজন—শোভাজন ।

রুচা—১ কতকবৃক্ষ, ২ শালিধান্য ।

রুজাকর—কামরাজ্য ।

রুজাসহ—ধনবন বৃক্ষ ।

রুদীক্ষকা, রুদন্তী—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

রুদ্র—হুড়হুড়ে গাছ ॥ বৈদক° রাজব° ॥

রুদ্রজটা—[ স° ঈশ্বরী, অক°মূল্য ; ম°

ঈশ্বরী ; তা° ইশুরামূল্য ;

স°ওতাল—ভেদীজানেটেট ] ঈশের

মূল, aristolochia indica

lin, মোরী ॥ রাজনি° ॥ শি°বাদি-

বগের দীর্ঘায়ু ছোট বৃক্ষবি° ।

পর্যায়—রোদ্রী, জটা, রুদ্রা, সোম্যা,

সুবহা, ঘনা, ঈশ্বরী, রুদ্রলতা, স্-

পত্রা, স্নুগন্ধপত্রা, সুরভি, শিবাঙ্কা,

পত্রবল্লী, জটাবল্লী, রুদ্রাণী,

নেত্রপদ্মকরা, মহাজটা, জটরুদ্রা ॥

অম° শব্দ° ॥ পাঁচ হতে নয় পর্ণ° ।

পর্ণ° ছোট-ছোট । ফুল লাল, ছোট ।

বর্ষাকালে ও শীতকালে দুবার

ফোটে । শব্দটিতে তিনটা হইতে ছটা

পৰ্ণ° গাট থাকে । ফুলের

বেটা বাকিয়া এই গাট চাপিয়া

থাকে । জলাশয়ের তীরে ছায়াবৃত

স্থানে প্রায়ই জন্মায় ।

রুদ্রপ্রিয়—হরীতকী ॥ বৈদ্যব° ॥

রুদ্রলতা—রুদ্রজটা, মোরী ।

রুদ্রা—রুদ্রজটা ।

রুদ্রাক্ষ—[ স° রুদ্রাক্ষ ] বৃহৎ আরণ্য  
বৃক্ষবি°, *elaecarpus ganitrus*.  
॥ রাজর্জনি° ॥ পর্ষায়—তৃণমেরু,  
অমর, পদ্মপচামর। এই গাছের শব্দক  
ফলে জঁপবার মালা হয়। ফল  
অবৃন্দময়। ফলের পর্ষায়—  
সর্গাক্ষ, শিবাক্ষ, ভূতনাশন,  
পাবন; নীল-কন্ঠাক্ষ, হরাক্ষ,  
শিবাপ্রিয়।

রুদ্রাঘাস—[ স° দীর্ঘরোহিষক ] অগ্ন্য-  
ঘাস, রুদ্রাঘাস, *cymbopogon*  
*shoenanthes*. তৃণবি°। ৩-৬  
ফুট উচ্চ। বর্ষাকালে ফুল ও  
শীতকালে ফল হয়। পঞ্জাব, দক্ষিণ  
ভারত, বিহার ও বঙ্গদেশে নানা  
স্থানে জন্মে।

রুক্ষগাখিকা—১ কাল ছোলা, ২ লঙ্কা  
নামক শিমবীধান্য, তেওড়া।

রুক্ষদর্ভ—হরিদর্ভ, শরপত্র দর্ভ।

রুক্ষপত্র—শাখোট গাছ।

রুক্ষ স্বাদু ফল—ধ্রুবন বৃক্ষ।

রুক্ষা, রুক্ষী—দিশিত বৃক্ষ।

রুপিকা—শ্বেতাক বৃক্ষ।

রুবুদক—এরুডবৃক্ষ; *ricinus*  
*communis*.

রুষক—বাসক।

রুহা—তৃণবি°, *penicum dactylon*.

রৈচক—১ জয়পাল বৃক্ষ, ২ তিলক  
গাছ।

রৈচনক—১ কম্পিলক, ২ জঁশ্বর।

রৈচনা; রৈচনী—কাম্পিল।

রৈচনী—১ কাম্পিল, ২ কালাজনী;  
৩ দম্ভিতবৃক্ষ; ৪ শ্বেতত্রিবৃতা, ৫  
বটপত্রী।

রৈচী—১ কম্পিলক, ২ অকোট।

রৈগুদকদম্ব—ধূলিকদম্ব

রৈউম—[ ইং *rheum*; ফা° রৈবন্দ ]  
উচ্চবৃক্ষবি°। *rheum emodi*.  
হিমালয় প্রদেশে জন্মে। মূল  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত।

রৈউচিনি—[ ফা° রৈবান্দিচিনী; হি°,  
গুজ° রয়দুনচেন; তা° বরিয়ন্তু,  
কলগু° ] *rhubarb rheum*;  
বৃক্ষবি°। হিমালয় প্রদেশে জন্মে।

রৈবত—স্বর্ণাল বৃক্ষ।

রোগাশিলিপন—সোনাল গাছ।

রৌচক—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°, ভাঁড়উর  
(নেপাল জাত) ॥ ভাবপ্র° ॥

রৌচনফল—বীজপুরুক।

রৌচনফলা—চিড়িটা; ফুটি।

রৌচনা—১ রক্তকল্লার ২ কৃষ্ণশালমলী।

রৌচনী—১ আমলকী, ২ শ্বেতত্রিবৃতা,  
৩ দম্ভী।

রৌড়া—[ স° রৌড়া, রয়না, হরিণ-

হাড়া, পিস্তরাজ ; হি° রোহেড়া ;  
 ম° রোহিড়া ; গুজ° রোহিডো ; ক°  
 থরডুমল ; মন্থল ; তে° মন্থল-  
 মোদুলচেট্টা ] রোড়া, *amoorah*  
*rohitaka*, *andersonia* f.  
 ফুলের রং ভেদে দু প্রকার—(১)  
 সাদা ফুলের রোড়া—[ স° শূক  
 রোহিতক, *the male tree* ] এর  
 ফল হয় না। (২) দাড়িমফুলের  
 রংয়ের রোড়া—[ স° রোহিতক  
 (*the female tree*) ] এর ফল  
 হয়। ফল গোলাকার, পীত  
 রংয়ের। ফল বসন্তকালে ফোটে।  
 পর্যায়—রোহিতক, রোহিতক,  
 রোহিত, কুশালমলি, কুটশালমলি,  
 বিরেচন।

রোদজিকা—ষবাস।

রোদনী—দুরালভ।

রোধিন—বৃক্ষভেদ।

রোধ—লোধ।

রোধপুষ্ক—১ মধুক বৃক্ষ, ২ রোধ  
 ফুল।

রোধপুষ্ক—১ লোধ ফুল; ২ শাল  
 ধান্য।

রোধপুষ্কিনী—ধাতকী গাছ।

রোপণ—ভূধামন।

রোপ্যাতিরোপ্যা—ধান্যব° ॥ রাজব° ॥

রোম—তেজপত্র।

রোমকন্দ—পিঁড়াল।

রোমফলা—চ্যাড়শ।

রোমবল্লী—আলকুশী।

রোমশপত্রা—দেবতাড়া বৃক্ষ।

রোমশ ফল—চ্যাড়শ গাছ।

রোমশমূলিকা—হরিদ্রা।

রোমশা—১ দণ্ডা বৃক্ষ (?), ২ কঁকড়।

রোমহর্ষণ—বিভীতকবৃক্ষ।

রোমাণিকা—রুদ্রতী গাছ।

রোমাল—পিঁড়াল।

রোমালবিটপীন—কোকণ দেশের  
 কুম্ভী বৃক্ষ।

রোল—১ পানীয়ামলক, ২ আদ্র শৃষ্ঠী,  
 ৩ তালীশ পত্র।

রোহণপর্বা—বল্লিদর্বা।

রোহণ—[ স° পত্রাশ্র, রোহিণী ; হি°  
 রোহণ ; বো° রোহিত ; গুজ°  
 রোহিণা, তা° ভেদস-মারাম, শেম-  
 মরাম ; তে° গুর্মি ] রোড়া,  
*soymida febrifuga* juss.  
 মূল্যবান কাণ্টউৎপাদক সবুজ  
 পত্রাচ্ছাদিত উদ্ভিদ। এই গাছের  
 ছাল ব্যবহৃত হয়। ছোট নাগপদর,  
 ত্রিবাকুর প্রভৃতি স্থানে জন্মে।

রোহণদ্রুম—চন্দন গাছ।

রোহিকাপ্রয়—মহাকরুণ।

রোহিণ—১ ভূতৃণ, ২ বটবৃক্ষ, ৩  
রোহিত গাছ, ৪ কটফল গাছ, ৫  
অশ্বথ গাছ ।

রোহিণী—১ কাশ্মরী (?), ২ হরিতকী,  
রোহিণ—লভাভেদ ।

রোহিতক—[ হি° রোহেরা, গুজ°  
রোহিডো ] রয়না, হরিনহরা,  
পীতরাজ, কড়ার, রোড়া, কুসুম-  
গল । দাড়িম পদ্যপক গাছ ।  
mediaceae বর্গের । বৃহৎ বৃক্ষ,  
বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জন্মে ।  
আসাম, বর্মী, মালাকাত্তে জন্মে ।

রোহিতক—দাড়িম পদ্যপক গাছ, রোড়া,  
রয়না, কড়ার, কুসুমগল, amoorā  
rohitaka, andersonia r.  
॥ রাজনি° ভাবপ্র° ॥ পর্যায়—  
রোহী, প্রীহশত্ৰু, দাড়িমপদ্যপ বৃক্ষ,  
রোহীতক, রোহিণ, কদাশ্মলি,

দাড়িম, সদাপ্রসন্ন, কুটশাশ্মনি-  
বিরোচন, শাশ্মলিক ।

রোহিতেজ—রোহিতবৃক্ষ ।

রোহীতক—রোহিতক দ্র° ॥

রোহণ, রোহনী—[ স° রোহণ ; হি°  
রোহণ ; ও° সোহাণ, সোয়াম ;  
ইং Indian red wood ] soy-  
mida febrifuga. নিম্বাদিবর্গের  
উচ্চবৃক্ষবি° । পশ্চিম ভারত ও  
মধ্য ভারতে জন্মায় । কাণ্ড সোজা,  
ছাল লাল রংয়ের ও তিক্ত ।  
সার কাঠ লাল দৃঢ় । পাতায় ৩-৬  
জোড়াপর্ণ । পর্ণ ২-৪ ইঞ্চি লম্বা,  
ফল লম্বা, পাঁচখণ্ডে ফেটে যায় ।  
বীজ চেঁটা, পক্ষযুক্ত ।

রোহিণ—চন্দন গাছ ।

রোহিষ—[ স° রোহিষ ] ১ তৃণবি°,  
২ রক্তচৈত্রক ॥ ভাবপ্র° ॥

[ ল ]

লকচ—লকুচ গাছ ।

লকট—[ ইং loquat ] গোলাপবর্গের  
ছোট ফলতরুবি°, eriobotrya  
japonica. চীন ও জাপানের  
গাছ ।

লকুচ—ডহুরা, ডেউয়া, মাদার ॥ রাজনি°  
বৈদ্যক° ॥ ardocarpus lacoc-  
cha. পর্যায়—লিকুচ, শাল,  
কষায়ী, ডহু, দৃঢ়বৃক্ষল, কাশী,  
শর, শুল্কশ্চ ।

- লক্ষণা—১ শ্বেতকণ্টকারী, ২ জবাগাছ, ৩ মদুচুন্দ গাছ ।  
 লক্ষ্মীতাল—গ্রীতালবৃক্ষ ।  
 লক্ষ্মীনারায়ণ—নাগদোনা; *crinum asiaticum* ॥ বেল° ॥  
 লক্ষ্মীপদ্ম—পদ্ম ।  
 লক্ষ্মীফল—বিলববৃক্ষ ।  
 লক্ষ্মীবৎ—১ পনস গাছ, ২ শ্বেত রোহিত বৃক্ষ, ৩ অশ্বথ গাছ ।  
 লক্ষ্মীশ—আম্রবৃক্ষ ।  
 লঘু—১ কৃষ্ণাগরু, ২ লামজ্জক, ৩ পিড়িংশাক ।  
 লঘুকোঙ্কল—*pimenta acris*.  
 লঘুকণ—শুক্লজীরক ।  
 লঘুকণ্টকী—লজ্জাবতী লতা; *mimosa pudica*.  
 লঘুককন্দ—মেটে ফুল, *zizyphus*.  
 লঘুকণী—[ হি° মদুরহারি ; ম° ঘোর-বেল ] মর্গা, লঘুকণিকা ; লতানে গাছ । পাতা—১ থেকে ২ ইঞ্চি লম্বা, কিনারা করাতির মত ।  
 লঘুকাম্বৰ্ঘ—কটফল গাছ ।  
 লঘুচিভিটা—ছোট কঁকড় । *colocyth.*  
 লঘুচছদা—মহাশতাবরী ।  
 লঘুদন্তী—ছোট দন্তী বৃক্ষবি° ।  
 লঘুদ্রাক্ষা—কাকলী দ্রাক্ষা, কিনামিস ।  
 লঘুপদ্মমূল—১ শালপর্ণী, ২ পৃষ্ণিপর্ণী, ৩ বৃহতী, ৪ কণ্টকারী, ৫ গোক্ষুর ।  
 লঘুপত্রক—তোচনী ।  
 লঘুপত্রকলা—লঘুডুম্বরিকা ।  
 লঘুপত্রী—অশ্বথ গাছ ।  
 লঘুপর্ণী—১ মর্বা, ২ শতমূলী ।  
 লঘুপাকিন—চিনে ধান ।  
 লঘুপাঠা—[ স° অম্বোষ্ঠ ; হি° হাত-জোড়ী ; তে° পাঠা ] একলেজা, *clissampelos pareira* lin. লতানে গাছ । ডাঁটা সরু সরু, লোম আছে । ফুল বর্ষা ও শরৎ কালে ও ফল শীতকালে ।  
 লঘুপাণ্ডুর পদ্মপক—দীপান্তর খজুরিকা ।  
 লঘুপিচ্ছিল—কাণ্ডনগাছ ।  
 লঘুপদ্ম—ভূমিকদম্ব ।  
 লঘুফল—ছোট ডুমুর ।  
 লঘুবদর—ক্ষুদ্রকোলিফল, মেটোকুল । ভাবপ্র° রাজনি° ॥ পর্যায়—সুক্ষ্মফল, বহুদর, সুক্ষ্মপত্র, দৃশ্যপর্ণ, মধুর, দরহার, শিথিপ্রিয় ।  
 লঘুবদরী—ভুবদরী ।  
 লঘুব্রাক্ষী—ছোট ব্রাক্ষী । পর্যায়—জলোন্মবা, সুক্ষ্মপত্র ।  
 লঘুমস্ত—গনিয়ারি, *premna*

spinosa.

লঘুদলতা—১ উচ্চ, ২ অনন্তমূল।

লঘুশমী—শমীবৃক্ষভেদ।

লঘুনাদাড়ববাহা—ছোট ডুমুর।

লঘুদী—পিড়িং শাক।

লক্ষা, লক্ষামরিচ—[সংকটুবীরা, তীক্ষ্ণা;  
তীব্রশক্তি; হি° লালমির্চি; তা°  
গোলকন্ডা; তে° মিরচাকরা; ফা°  
কিল-ই-সুখ; অ° কিল্কিল  
অহমর্; ও° লক্ষা; ইং red  
pepper, chilli, cayene.]

লক্ষা, capsicum minimum.

বছানাদিবর্গের কৃষিজাত শাকবি°।

আমেরিকা এর আদি জন্মস্থান।

পতু°গীজরা প্রথমে ইহা ভারতে  
আনেন। প্রকারভেদ—১ লক্ষা,

c. annum. বর্ষায়, ফল

লক্ষা, পাকলে লাল, হলদে ও

বেগুনে হয়। ২ অন্যজাতি c.

frutescens. ফল সোজা, ২।৩ টা

ফলে, পাকলে লাল হয়। ৩

কাফুরী লক্ষা—আফ্রিকা দেশ

থেকে আনীত। লক্ষা মোটা ও

ফাপা। ৪ ধান লক্ষা বা ধানী-

লক্ষা—ছোট, খুব ঝাল। ৫ সর্ষ-

মণি লক্ষা।

লক্ষারিকা—পিড়িংশাক।

লক্ষাসিজ—[সং লক্ষাসিজ; হি° বর্জক  
সেহুড; গুজ° রণশির; তা°  
তিরকুল্লী; তে° কড়াচেমুডু; ইং  
milk bush] লক্ষাসিজ, euphor-  
bia tirucalli, জটালক্ষা দ্র°।

লক্ষোপিকা, লক্ষোয়িকা—পুকা।

লক্ষফুল—গুণ্ণভেদ, lonicera  
quinquelocularis.

লক্ষকারিকা—লজ্জালদলতা।

লজ্জকা—বনকাপাস, gossypium

লজ্জরী—লজ্জালদকা।

লজ্জা, লজ্জাবতী—[সং লজ্জালদ, স্পর্শ  
লতা; ম° লাজ্জালদ; গুজ° রিসা-  
মণি; তা° লাজিরৌ; তে° অটু-  
পট্টি; ইং sensitive plant]  
কুলদিবর্গের গুণ্ণজাতীয় ক্ষুদ্রবৃক্ষ-  
বি°, mimsa pudica. কণ্টকপূর্ণ  
পাতা ছলে নুয়ে পড়ে। লতার  
গায়ের কাটাগুলি নীচের দিকে  
অবনত। পর্যায়—রক্ত পাদী,  
শমীপত্রা, স্পৃঙ্খা, খদির-  
পত্রিকা, সঙ্কোচিনী, সমগ্রী,  
নমস্কারী, প্রসারিণী, সমুপর্ণী,  
খদিরী, গুণ্ণমাণিকা, লজ্জা,  
লজ্জরী, স্পর্শলজ্জা, অশ্রুরোধিনী,  
রক্তমূলা; তাম্রমূলা স্বগুপ্তা,  
অজবিকারিকা, মহাভীতা, বশিনী,



মহোষাধি । লজ্জালু, \*পর্শলতা  
নামে ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ রাজর্জিন° ॥  
mimosa pudica.

লজ্জরী, লজ্জকা—লজ্জালুকা ।

লঙ্ঘন—eleusine coracana.

লটুকন, লটকান—ছোট গাছবি°, bixa  
orellana. আমেরিকা আদিভূমি-  
স্থান । প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে  
ভারতে আনীত হয়েছে । এখন  
দক্ষিণ ভারতে প্রচুর জন্মে । পাতা  
বড়, শিরাগুলি বহু, ফুল শাদা,  
সবুজ আভাষুক্ত এবং লাল হয় ।  
ফল পাকিলে ফেটে যায় । ফলের  
মধ্যে বীজ বহু পরিমাণে থাকে—  
এই বীজের গায়ে ( aruatta,  
annatto ) এক রকম লাল রং  
থাকে । রং কাঁচা । ফুলে ৫,  
১০টি দল ।

লতা—লতানে গাছ । [ স° বল্লী,  
বল্লি, বেল্লি ] পর্যায়—বীরুধ,  
গুল্মিনী, উলপ । বিভিন্ন লতানে  
গাছ—১ প্রিয়ংবদ, ২ পুষ্কা-  
পিড়িং শাক, ৩ অশনপর্ণী, ৪  
জ্যোতিষ্মতী, ৫ লতাকন্তরিকা,  
৬ মাধবীলতা, ৭ দূর্বা, ৮ কৈব-  
র্তিকা, ৯ সারিবা, ১০ বহতী, ১১

শ্বেতসারিবা, ১২ শ্বেতঘৃথিকা, ১৩  
জাতীফুলের গাছ, ১৪ রক্তপটল  
গাছ ।

লতাকদম—লতাৰি°, urtica nauci-  
flora.

লতাকরঞ্জ—কন্টকীবৃক্ষবি° ॥ রাজর্জিন° ॥  
guilandina banduc. পর্যায়—  
দুঃপর্শ, বীরাখা, বজ্রবীজক, ধন-  
দাক্ষী, কন্টফল, কুবেরাক্ষী ।

লতাকন্তুরী—[স° লতাকন্তুরী, জটা-  
কন্তুরী; হি° মসক-ভিদি;  
মসকদানা; তা° কটুককন্তুরী]  
কাল কন্তুরী, hibiscus abel-  
moschus. বর্ষজীবী উদ্ভিদ ।  
২-৩ ফুট উচ্চ ॥ ফুলের গন্ধ  
মৃগনাভির গন্ধের ন্যায় । জুন  
থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত ফুল ও  
ফল হয় ।

লতাণী—ককটশৃঙ্গী ।

লতাভ্রমুর—figus vagans.

লতাতরু—১ নারঙ্গ, ২ তালগাছ, ৩  
শালগাছ, ৪ তরুলতা ।

লতাতাল—হেঁতাল গাছ ।

লতাপনস—তরমুজ । পর্যায়—চেলাক,  
চিত্রফল, সুখাণ, রাজভোম্বিষ,  
নাটায় ।

লতাপকটী ডুমুর—*ficus hederacea*.

লতাপর্ণী—১ তালমূলা, ২ মোরী ।

লতাপলাশ—[ হি° পলাসমতী, মা° পলাশ ভেলা ; গুজ° ভেল-খাকর ]

লতাপলাশ, হস্তিকর্ণপলাশ, *butea superba*, Rox. এই গাছ

পলাশের মত কেবল অপর গাছে উঠিয়া থাকে । পাতা হাতির

কানের মত বলিয়া হস্তিকর্ণ্য ।

উড়িয়া, ককনদেশ, বঙ্গদেশ, চট্টগ্রাম প্রভৃতিতে জন্মে ।

লতাপৃষ্ঠা—পিড়িংশাক ।

লতাফটকী—[ সি° কটতী, জ্যোতিষ্মতী ;

হি° নয়্যাফটকী ; কানছোটি ; ও° ফটফটিকা ; তা° মন্দুকোটুম ]

আরণ্য প্রতানীবি°, *cardiospermum halicacabum*. বর্ষ-

জীবী লতানে উদ্ভিদ । পাতা

বিধা ত্রিপর্ণ, ফল তিন কোষা ও

কোটায় মত । শাখা নত, শীতের

সময় ছাড়া সব সময় ফুল ও ফল

হয় । পর্যায়—তেজোবতী, বহু-

রসা, কনকপ্রভা, তীক্ষ্ণা, সুবর্ণ-  
নকুলী, সুরলতা, সুরতৈলা, শৈল-  
সুতা, সুবেসা, কঙ্কালী, অগ্নিগভ°,  
কাকান্ডী, সৌম্যা, প্রীফলী, লবণ

কিংশূকা, রায়সাদনী, গীলতা,  
পীততৈলা ॥ অমর° শব্দ ॥

লতাবল—পটোল ।

লতাবৃহতিকা—বৃহতীলতা ।

লতাভদ্রা—ভদ্রালীবৃক্ষ ।

লতামউয়া—*achyranthes alternifolia*.

লতামরুৎ—পৃষ্ঠা ।

লতামাধবী—মাধবীলতা ।

লতামাল—*uvaria fornicata*.

লতামুহুরী—মারিষাদিবর্গের বর্ষায়ু-  
শাকবি°, *digera arvensis*.

ইহা অনেকটা আপাং গাছের  
ন্যায় । রাস্তার ধারে ও ক্ষেতের  
মাঝে জন্মায় ।

লতাক°—হরিৎ পলা°ডু, দৃদ্রুম (?) ।

লতাবৃক্ষ—শল্লকীগাছ ।

লতাশব্দতরু—লতাশালবৃক্ষ ।

লতাশথ—শালগাছ ।

লতি আম—আম্রলতিকা, *willonghbeia edulis*.

লবদস্তা, লববীজা—সিংহলী  
পি°পলী ।

লব্ধা—তিক্তদুঃস্বী ।

লব্বাকটি হরিণাবাটানা—বৃক্ষভেদ ।

লব্বানটী জাম—জামবি°, *eugenia claviflora*.

ললনাপ্রিয়—কদম্ব ।

লব—১ জাতীফল, ২ লবঙ্গ, ৩  
লামজ্জক (?) ।

লবঙ্গ—[সং লবঙ্গ ; হি° লোঙ্গ ; কো°  
লঙ্ ; ম° লবঙ্গ ; গুজ° লবীজ ;  
ক° লবঙ্গকলিকা ; তে° লবঙ্গল ;  
তা° কিরম্বেল ; ফা° মেহবাং ; অ°  
করণফুল ; ই° cloves] লবঙ্গ,  
eugenia caryophyllata,  
caryophyllus aromaticus.  
জম্বুকাদিবর্গের বৃক্ষবি° ॥ ভাবপ্র°  
রাজনি° ॥ পর্যায়—দেবকুসুম, শ্রী-  
সংজ্ঞ, শ্রীপ্রসন্ন, লবঙ্গক, লবঙ্গ-  
কলিকা, দিব্য, শেখর, লব, শ্রীপদ্ম,  
রুচির, বারিসম্ভব, ভূঙ্গার, গীর্বাণ  
কুসুম, চন্দনপদ্ম, বাণকুসুম,  
তীক্ষ্ণপদ্ম ॥ শব্দক° ॥ লবঙ্গগাছ  
মলক্কী দ্বীপপুঞ্জ ও জাঞ্জিবার দেশে  
জন্মে। এদেশে প্রায় বাঁচে না।  
অধুনা দক্ষিণ ভারতে ও লঙ্কাদ্বীপে  
অল্প অল্প জন্মায়। এর ৯১০  
বছরে প্রথম মৃদুল হয়। লবঙ্গ,—  
লবঙ্গ গাছের কণ্ডনল বা মৃদুল  
(calyx tube) ; এগুলি লাল  
রঙের হলে রোদে শুকিয়ে বিক্রি  
হয়। এর ওপরে যে গোলাকার  
বস্তু থাকে তাকে লবঙ্গফুল বলে।

প্রকারভেদ—বনলবঙ্গ—বন্যাশাকবি°  
ludurgia parviflora, jussiaea  
suffruticosa. ভিজ়ে ক্ষেতে  
জন্মে। ফুল হলদে, ফল অল্প,  
ফলের ওপর দল।

লবঙ্গক—লবঙ্গ।

লবঙ্গলতা—[ হি° কাণ্ডোল ] কৃপা।  
নারায়াদিবর্গের লতানিয়া গাছবি°,  
luvunga scandens. বর্ষজীবী  
লতানে উদ্ভিদ। কাণ্ড কাঠের  
মত শক্ত। পাতা ত্রিপল্ল, ফুল  
সাদা ও সুগন্ধী, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ  
মাসে ফোটে। ফল প্রায় লেবুর  
আকার। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট ও  
ত্রিপুরায় হয়। খাসিয়া পাহাড়ে,  
বর্ষায় জন্মায়।

লবঙ্গকিংশুক—মহাজ্যোতিষ্মতী।

লবণতৃণ—লোণাঘাস। পর্যায়—  
লোমতৃণ, তৃণাল, পটুতৃণ,  
অম্বকাণ্ড।

লবণা—১ মহাজ্যোতিষ্মতী, ২  
চান্দেদরী, আমরুল, ৩ লবণশাক।

লবণোথা—হুজ্যোতিষ্মতী ছোট লতা-  
কটকী।

লবণী—anona reticulata. পর্যায়—  
গ্রীষ্মজা, অগ্নিমা।

লবলী—নোয়াড় ফলগাছ ॥ রাজব ॥

পৰ্যায়—সুগন্ধা, শব্দ,  
কোমলবলকলা ।

লবান—[ আ° লবান ; ই° benzoin ]  
গুগ্গলুবি°; styrox benzoin.  
মালয় দ্বীপে এই গাছ জন্মে ।  
সেখান থেকে ভারতে আসে ।  
আসাম, ব্রহ্মদেশে ও মালয়  
দেশের আর এক গাছ থেকে  
লবানের মত সুগন্ধ নির্বাস  
(storax—শিলাক্স) পাওয়া যায় ।  
পৰ্যায়—তুরস্ক, বাবন, ধূম্র, সিহ-  
লক, পীতসার, কপিঞ্জ ।

লশুন—রসুন ॥ রাজনি° ॥ পৰ্যায়—  
মহৌষধ, গুঞ্জন, অরিস্ট, মহাকন্দ,  
রসোনক, রসোন, স্নেহ কন্দ,  
ভূতল, উগ্রগন্ধ ।

লসা—হরিদ্রা ।

লাউ—[স° অলাব, ইক্ষাকু, তুস্বী;  
হি° কটুতুস্বী, কদ্র; ম° গোরব-  
তুস্বী, কদ্র; ম° গোরবতুস্বী;  
তা° সোরাঙ্কই; তে° সোরাঙ্কয়া;  
ইং bottle gourd] কুম্ভাভাদি-  
বর্গের কৃষিজাত শাকবি° । লতানে  
গাছ, lagenaria vulgaris.  
অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় ।  
পাতার ব্যাস ৬ ইঞ্চি, ৫টি কোণ-  
বিশিষ্ট । পৰ্যায়—গোরক্ষতুস্বী,

গোরক্ষী, ক্ষীরতুস্বী, দীর্ঘবৃত্ত  
ফলা; মহাফলা, ক্ষীরগণী ॥ রাজনি° ॥  
সমগ্র ভারতে চাষ হয়—কাম্বীর  
কুমায়ুন পর্যন্ত । প্রকারভেদ—  
১ মিষ্টলাউ—[গোরক্ষতুস্বী, ক্ষীর-  
তুস্বী] । ২ কটুলাউ—ইক্ষাকু,  
ভূতুস্বী । বর্ষাকাল হইতে শীত-  
কাল পর্যন্ত ফুল ও ফল হয় ।

লাকুচ—ডেউয়াফল, লকুচ, ardocar-  
pus lacucha.

লাক্ষাতরু—পলাশগাছ ।

লাক্ষাপ্রসাদ—পট্টিকালোধ ।

লাক্ষাপ্রসাদন—রক্তলোধ । পৰ্যায়—  
ক্রমক, পট্টিকা, পট্টী ।

লাক্ষাবক্ষ—১ কোশাম্র, জলপাই গাছ;  
২ পলাশগাছ ।

লাঙ্গল—১ পদ্মপৰ্বি°, ২ তালগাছ ।

লাঙ্গলকী—বিষলাংগুলিয়া ।

লাংগলাখ্য—বিষলাংগুলিয়া ।

লাংগলাস্থয়া—লাংগুলিয়া ক্ষুদ্র ।

লাংগলিকা—১ দ্বিষলাংগলী, ২ বিয-  
লাংগলী ।

লাংগলিকী—বিষলাংগুলিয়া ॥ রাজব° ॥

পৰ্যায়—অগ্নিশিখা, অগ্নিজ্বালা,

লাংগলিকা, লাংগলী, গৈরী, দীপ্তা,

হিলিনী, গভ্রঘাতিনী, অগ্নিজিহ্বা,

ইন্দ্রপদ্পে, অগ্নিমুখী, বহিশিখা ।

লাংগলিন্—নারকেল ।

লাংগলী—১ জলজ শাকবি° । ২ পদ্ম-  
লাংগলাকৃত, কাঁচড়া শাক; ৩ শাল-  
পর্ণী । পর্যায়—শারদী, তোয়-  
পিপ্পলী, শকুনাদনী, জলাংগী,  
জলপিপ্পলী, পিস্তলা, শ্যামাদিনী,  
মৎস্যগন্ধা, কলিকারী ।

লাংগলীকা—পট্টনিপণী° ।

লাজ, লাজা—ভৃষ্টধানা, খই, খই দ্র° ।

লাবাক্ষক—ব্রীহিভেদ ।

লাব্দ, লাব্দ—অলাব্দ ।

লামজ্জক—বীরণমূল ॥ রাজনি° ।

পর্যায়—সুনাল, অমুনাল, লব,  
লঘু, ইষ্টিকাপথিক, শীঘ্র, দীর্ঘ-  
মূল, জলাশয় ।

লালকরবী—[ স° রক্তকরবীর ] করবী  
দ্র° ।

লালকটিবাটানা—দেবদারুভেদ, quer-  
cus armata.

লালকাসন্দা—একপ্রকার কাসদুন্দে ।

লালকেশুরিয়া—গুচ্ছবি° ।

লালগরাণিয়া—dioscorea purpuri.

লালঘড়ী—গুচ্ছভেদ ।

লালচিতা—ওষধিবৃক্ষ ।

লালকাউ—কাউবি°, tamarix dioica.

লালতরুলতা—বর্ষায় লতাবি° । ফুল  
ঘোর লাল হয় ।

লালনটিয়া—নটেশাকের প্রকারভেদ ।  
amarantus gangeticus.

লালপুই—পুইশাকের প্রকারভেদ ।  
পুইশাক দ্র° ।

লালমুর্গা—মুর্গা দ্র° ।

লাললক্ষ্মারিচ—মরিচ দ্র° ।

লাললতাকদম্ব—urtica globulifera.

লালবেড়েলা—বেড়েলা দ্র° ।

লালশকরাকন্দ—শকরাকন্দ আলু ।

লালশেলিগু—শাকবি° ।

লালশ্যামা—তুণবি° ।

লালসর্বজয়া—can indica.

লালসারণী—গুচ্ছভেদ, trianthema  
obcordata.

লিকদুচ—১ চক্র, ২ ডহু, ডেহুরা ফল ।

লিঙ্ক—কপিথবৃক্ষ ।

লিঙ্কজা—লিঙ্কনীলতা ।

লিঙ্কবধ—কপিথগাছ ।

লিঙ্কবিধ—আপাং, achyranthes  
aspera.

লিঙ্কবিধা—অপামার্গ ।

লিঙ্কসমুদাতা—লিঙ্কনীলতা ।

লিঙ্কহনী—মুর্বা ।

লিঙ্কসী—[ স° শিবলক্ষী ; হি° পণ্ড-  
গুরিয়া ] শিবলক্ষী ॥ রাজনি° ॥

লতাবিশেষের ছোট খসখসে ফল-  
বীজ । শিবলিঙ্কের মত দেখতে ।

লিচুফল—[ ইং litchi ] আম্রা-  
দিবর্গের উচ্চবৃক্ষবিং, *nephelium litchi*. বাংলা, আসাম ও  
সাহারাণপুর্বে উৎকৃষ্ট লিচু জন্মে।

লিম্বাপা—পাতিলেবু ॥ রাজবঁ ॥

লুআড় (দেশজ)—*phylanthus longifolia*.

লুঙ্গ—ছোলছলেবুর গাছ।

লুঙ্গায়—মাতুলুঙ্গায়।

লুঙ্গু—ছোলছলেবু।

লুঙ্গু—গুম্ভভেদ; *casearia glomerata*.

লুগিয়া—*portulaca oleracea*.

লুটক—নটেশাক।

লুতারি—দুগ্ধফেনীক্ষুপ।

লুখাই—শ্রীতালবৃক্ষ।

লুখাপত্র—তালগাছ।

লুবু—নিবু দ্রু।

লুফী—লিফিনীলতা।

লোচক—১ কদলী, ২ মূবী (?)।

লোচন—জীরক।

লোচনী—মহাপ্রাণিকা, মূন্ডরী।

লোচমস্তক—১ রুদ্রজটা, ; ২ অজ-  
মোদা।

লোটো—চুকাপালং শাক।

লোটিকা—চুকাপালং শাক।

লোড়ী—*phyllanthus longifolius*.

লোণতৃণ—লবণতৃণ।

লোণা—১ ক্ষুদ্রাণ্টিকা—২ আমরুল  
শাক।

লোণাভাটী—*solanum pubescens*.

লোণাণ্টা, লোণিকা—ক্ষুদ্রাণ্টিকা, খুদে-  
লুনিয়া লোনীশাক।

লোণিকা—১ আমরুল, ২ চুকাপালং।

লোণী—*portulaca quadrifolia*.

লোনিয়া দ্রু।

লোধ—[ সঁ লোধ; হিঁ লোধ; মঁ

লোধ; গুজঁ লোধবু; কঁ লোধ; ]

তেঁ তেল্লোলোধগুট্টেগু; অঁ

মুনাম; ওঁ লোধু ] লোধ কাঠ,

*symplocos racemosa* ॥

রাজনিঁ রাজবঁ, ভাবপ্রঁ। ছোট

অরণ্যবৃক্ষবিং। বাঙলায় কচিং

দেখা যায়। আসামে, নিশ্ন হিমা-

লয়, ব্রহ্মদেশে ও ছোটনাগপুরের

অরণ্যে জন্মায়। পাতা চিকণ,

একান্তর। ফুল ঈষৎ হলদে

রঙের ও সুস্বাদু, শীতকালে

ফোটে। লোধ গাছের ছালে এক

রকম রং পাওয়া যায়। শাবর-

লোধ মালবের শাবর দেশে জন্মায়।

প্রকারভেদ—১ শ্বেতলোধ। পর্যায়

—গালব, শাবর, তিরীট, তিব্ব,

মার্জন। ২ রক্তলোধ। পর্যায়—



লোধ, ভিন্নতরু, তিলক, কান্ত-  
কীলক, হেমপদ্মক, ভিল্বী,  
শাখরক ।

লোধকবৃক্ষ—লোধ ।

লোধপদ্ম—মউলগাছ ।

লোধপদ্মক—শালিধান্যবি° ।

লোধপদ্মনী—ক্ষুদ্র খাইফুল ।

লোনিয়া, লোনী—[ স° লবনিকা ]

নর্দনিয়া, portulaca. ছোট

বর্ষায় শাকবি° । পীতত ভূমিতে

জন্মান্ন । পাতা মসৃণ, ফুল ছোট

হলে রংয়ের । বর্ষাকালে ফোটে ।

প্রকারভেদ—১ ছোট লোনিয়া, p.

quadrifida. পাতা ছোট, ফুল

চতুর্দল, একটি একটি করে হয় ।

গাট লোমশ । ২ বড় লোনিয়া—

p. oberacea. পাতা একটু বড়,

ফুল পঞ্চদল, গাট লোমশ । বিহার

অঞ্চলে এক জাতের লোনিয়া জন্মে,

দীর্ঘায়ু ।

লোমককটী—অজমোদা ।

লোমফল—চালতা ।

লোমশ—মউ আলু ।

লোমশকান্তা—কাঁকড়া ।

লোমশচ্ছদ—দেবতাড়ি গাছ ।

লোমশপত্রা, লোমশপত্রিকা—পীত-  
দেবদানী ।

লোমপদ্মক—শিরীষ গাছ ।

লোমশা—১ কাকজম্বা, ২ জটামাংসী,

৩ বচা, ৪ শূকশিখী, ৫ মহামেদা,

৬ কাসীম (?), ৭ শাকিনীভেদ, ৮

অতিবলা, ৯ শনপদ্মী, ১০

এবায়ু, ১১ গন্ধমাংসী, ১২

কাঁকড়া, ১৩ মোরী ।

লোমশা—বচ ।

লোহদ্রাবিন—অম্রবেতস ।

লোহমারক—শালিগ্ধাক, achyran-  
thes triandra.

লোহিতপদ্মক—দাড়িমবৃক্ষ ।

লোহিতশতপত্র—লালপদ্ম ।

লোহিতা—রক্তপদ্মবা ।

লোহিতা—কম্পিতবৃক্ষ ।

লোহিতোৎপল—রক্তপদ্ম ।

লোহিতা—ধান্যবি° ।

[ শ ]

- শকদ্রুম—[ স° শকদ্রুম ] বকুলগাছ ।  
 শকরকন্দ—মিষ্টআলু, রাঙাআলু ।  
 আলু দ° ।  
 শকলাদনী—১ কটুকা, *wrightea antidyenterica*, ২ লতানে গাছ, *jussiena repens*.  
 শক্তিপর্ণ—*echites scholaris*.  
 শক্তুফলা—শমীবৃক্ষ, *mimosa sumatran*.  
 শকদ্রুম—১ দেবদারু, ২ কুটজবৃক্ষ, কুরচিগাছ, ৩ অজুনগাছ ।  
 শকুপাদপ—কুটজগাছ ।  
 শকুবলী—রাখালশশা ।  
 শকুস্টা—পীত হরিতকী ।  
 শকুশন—ভাঙ° ॥ রাজব° ॥  
 শকুতরু—শালবৃক্ষ ।  
 শকুপদুপী—তৃণবি° । ওষধিবি° ।  
 শকুথালুক—শাখ° আলু, শাখের মত আকার ও রঙ । আলু দ° ।  
 শকুথনী—১ শ্বেতপদ্মাগ, ২ শিরীশ গাছ ।  
 শকুটী—বনআদা, আমাদা ॥ রাজনি° ॥  
 [ গন্ধপলাশী (কাশ্মীর) ], কান্ধার, কপূরগন্ধী কন্দবি°, গন্ধমূলী ।  
 শকুিবৃক্ষ—অন্নহরিদ্রা, আমহলদ ।

- শণ—[ হি° শৃণ ; তা° শনজলবেল্ল ; জনদ্ ; ম° শন ] বর্ষজীবী উদ্ভিদ, *crotalaria juncea*.  
 পাতা পশমের ন্যায়, লোমযুক্ত, ফুলের স্তবক ফাঁক ফাঁক । ১০-১২টি ফুল ডাঁটার মাথা পর্যন্ত জন্মে ।  
 বর্ষাকালে ফুল ও শীতকালে ফল হয় । পর্যায়—শণ, মালাপদুপ, কটুতিস্তক, নিশাবন, দীঘশাখ, অকারী, দীঘপল্লব ॥ রাজনি° ॥  
 প্রকারভেদ—বনশণ [ হি° ঘাঘরী, বুনফুলিয়া, শণশুলী ; ম° থিলি-হিলা ; স° শণপদুপ ] *c. verrucosa*. বর্ষজীবী উদ্ভিদ । শীতের সময় ফুল ও ফল হয় । পর্যায়—শণপদুপী, বৃহৎপদুপী, শণিকা, শণঘণ্টিকা, পীতপদুপী, স্থলফলা, লোমশা, মালাপদুপিকা ॥ রাজনি° ॥  
 শণপণী—*pentaptera tomentosa*.  
 শণপদুপী—শণহুলী ক্ষুদ্র গাছ ॥ রাজনি° ॥  
 শণহুলী—ক্ষুদ্রগাছ ।  
 শণালু—চারাবি°, *cassia fistula*.  
 শতকৃষ্ণ—চারাবি°, *phylis fixnosa*.  
 শতগ্রন্থী—দুবী ।

শতপ্তী—চারাবিঁ, *galedupa arbo-rea*.

শতচ্ছদ—শতদল পদ্ম ।

শতদল—বহুসংখ্যক পাপড়িযুক্ত পদ্ম ।

শতধা—[ ইং bent grass ] তৃণবিঁ  
*panicum dactylon*.

শতপত্রী—সেউতিফুল ॥ রাজনিঁ ॥

শতপর্বা—কটুকা ।

শতপুষ্পা—১ শলুফা শাক, শলুফা,  
*peucedanum graveolens*, ২  
মৌরী ॥ ভাবপ্রঁ ॥

শতবীর্ষা—১ শ্বেতদর্বা, ২ লতাবিঁ ।

শণকাবলী—ক্ষুদ্র গাছবিঁ, *pathos officinalis*.

শতমূলী—[সঁ শতাবরী; হিঁ সফেদ-  
মূলী; শতওয়ার; মঁ আস-  
বলী; তেঁ চল্প] এদিক ওদিক  
গড়ানো বৃক্ষারোহী লতাবিঁ.  
*asparagus racemosus*, গাছ  
খুব লম্বা, অনেক শাখা-প্রশাখা-  
যুক্ত, শিকড় আলদ্র মত । কাটা  
সোজা ও বাঁকা । পাতা ছোট ।  
শাখা কণ্টকিত । শরৎকালে ফুল  
ও ফল হয় । সচরাচর নদীর ধারে  
জন্মায় ।

পর্বা—শতাবরী,

শতপদী, পীবরী, ইন্দীবরী, বরী,  
ভীরু, উর্ধ্বকণ্ঠী, দ্বীপ্যা, জটা-

মূল্য, শতাহ্বা, শতনেত্রিকা,  
তেজোবল্লী, মহোদনী, অভীরা,  
ঋষ্যগতা, লঘুপর্ণিকা ॥ রাজনিঁ  
ভাবপ্রঁ ॥ সমগ্র ভারতে জন্মায় ।

শতাবরী—শতমূলী দ্রঁ ।

শতাবীরু—উল্টুধুসর পদ্রিপকা ।

শমির—ক্ষুদ্র শমীবৃক্ষ, ছোট শাইগাছ ।

শমী—[ সঁ শমী; হিঁ ছিকুর, বান্দ; গুজ্জু সেমরু; মঁ শমী; ওঁ

সভন্দল; তেঁ শমী; তাঁ জাম্বু]

শাইগাছ, *prosopis specigera*

lin. কাটাযুক্ত মাঝারি আকারের

উদ্ভিদ । শাখা-প্রশাখা অবনত ও

ধুসরবর্ণ, কাটা কোনটায় অধিক বা

কোনটায় অল্প পরিমাণ । ফুল

ছোট, বোটার থাকে । শীতকালে

ফুল ও ফল হয় । পর্বার—শাস্তা,

তুন্দা, শিবেশা, নৌ, কেশমথনী,

তনুনটা, শভকরী, শকুর্ফালিকা,

শকরী, শাপাপশমনী, শিবাফলা,

সুপদ্রা, সুখদা, সুভদ্রা, মংগল্যা,

সুরভিরস ॥ রাজনিঁ ॥ ২ ইন্টা, ৩

ঈশানী ।

শমীধান্য—ধান্যবিঁ ॥ ভাবপ্রঁ ॥

শমীপত্রা—লজ্জাল বা লজ্জাবতীলতা ।

শম্বর—১ চিত্রকবৃক্ষ, ২ অজুর্নবৃক্ষ,

৩ লোম্ববৃক্ষ ।

শম্বরচন্দন—চন্দনবি° ॥ রাজনি° ॥

শম্মির—চারাবি°, cordia myxa.

শর—[স° ইক্ষুর, শর, বাণ; হি° কাঁড়া; ম° সারন; তে° গুন্দু] মৃগজত্ব, খাগড়া, saccharum sara, s. munja. বহুবর্ষজীবী তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। বহুদেশে নদীর ধারে ও পাতত জমিতে জন্মায়। ফুল সাদা কেশে ফুলের মত। ব্রাহ্মণদের পৈতের সময় এর পাতা ব্যবহৃত হয়। পর্যায়—মৃদুপত্র, মৃদপত্র, নাড়ী, নাল, তৃণধ্বজ, কীচক, পোটগল, মৃদুচুহুদ, শর, বাণ, ইক্ষু, কাণ্ড, উৎকট, সায়ক, শতপর্বা, বংশপত্র, নালবংশ, ক্ষুর, ইক্ষুর, ক্ষুরিকা পত্র, বিশিখ ॥ রাজনি° ॥ শরের মত আর এক প্রকার গাছ আছে তাকে 'খড়ি' বলে, s. fuscum roxb.

শরট, সরট—কদম্বশাক।

শরপুংখা—নীলী গাছের ন্যায় বৃক্ষবি°।

শবরী—হরিদ্রা।

শলফাশাক - শতপুংপী দ্র°।

শল্য, শল্যক—মদনবৃক্ষ, ময়না গাছ, কাঁটা গাছ, vanguria spinosa.

শল্লকী—বাবলাগাছ। পর্যায়—আশু-পত্রী, ইভাকা, ইভ্যা, ইভিকা।

শশ—লোধগাছ।

শশা—[স° রূপসী; হি° ক্ষীরা, বালসক্ষীরা; ম° তৌসীককটী; ও° কষ্ট-আরি; তা° দোজ-কইয়া; তে° দোসাকয়] কাকুড় জাতীয় ফলবৃক্ষবি°, cucumis sativa. lln. বর্ষজীবী লতা, শক্ত লোমযুক্ত। ফল ফিকে সবুজ-বর্ণ বা শাদা। ফলে অনেক বীজ থাকে। লম্বা, মসৃণ। ভাদ্রমাসে মাচায় যে শশা হয় তাকে 'ভাদুরে শশা' বলে আর চৈত্র মাসে জমির চাষে যা হয় তাকে 'ক্ষিতি শশা' বলে। পর্যায়—রূপসী, পীত-পুংপী, কটাল, রূপককটী, বহুফলা, কোশফলা, তুন্দিলফলা ॥ রাজব° ॥ ভারতের সবত্র জন্মে। প্রকারভেদ—রাখালশশা—[স° ইন্দ্রবারুণী; হি° ছোটী ইন্দ্রাবরণ; তা° পেটুঁমু-মুট্টি; তে° ইতি-পদক-কা] বনলতাবি°, citrullus colocynthis schrad. গাছের ডাঁটা ও পাতা লোমযুক্ত, পাতা তরমুজের পাতার মত খিঁড়ত, তরমুজের মত গোলাকার ফল,

আকারে ছোট, কাঁচা অবস্থায় গায়ে  
ডোরা থাকে । শীতকালে ফুল ও  
ফল হয় । পর্যায়—ঐন্দ্রী, ইন্দ্র-  
বারুণী, অরুণা, মৃগাদনী, গবাদনী,  
ক্ষুদ্রসহা, ইন্দ্রচিভিটা, শক্রবলী,  
পীতপদুপী, রক্তেৰাবদ, হেমপদুপী  
॥ শব্দ° রাজনি° ॥

শঙ্কুল—চারাবি°, *galedupa arborea*.

শস্যধ্বংসী—তৃণগাছ, *cedrela*  
*tunna*.

শাহিকাটা—[স° শমী, সমী ; ও° শমী]  
শাহিগাছ, *acacia suma ham*.  
মধ্যমাকার গাছ, শুষ্ক শ্বেতবর্ণ ।  
ফুল সাদা । বর্ষাকালে ফুল ও  
শীতকালে ফল হয় । ছোট নাগপত্র  
ও বাঙলাদেশে হয় ।

শাখআল—আল দ্র° ।

শাকতরু—সেগদন গাছ ॥ রাজনি° ॥

শাকবিষ—বার্তাকু ।

শাকবীর—পতিক গাছ ।

শাখিমূল গাছ—অশ্বি গাছ ।

শাকান্ন—তেঁতুল গাছ ।

শাখোট—শ্যাওড়া গাছ, *streplus*  
*asper*.

শাখীরাম—শাখোটবৃক্ষ । শ্যাওড়া  
গাছ ।

শা-জীরা—শাদাজীরা । জীরা দ্র° ।

শান্তা—আমলকী ।

শাবর—১ লোধ গাছ ॥ ২ cowach.

শারদী—ছাতিম গাছ ।

শাবিবা—১ অনন্তমূল ; ২ শ্যামালতা,  
ও ব্রাহ্মী ।

শাল—[ স° অশ্বকর্ণ, কৌশিক ; হি°  
শালু, শাল, শাখ ; বো° রল ;  
ম° গুণ্ণিল ; তা° কুণ্ণিলয়ম ;  
তে° গুণ্ণিলম ] দীর্ঘ সরল গাছ,  
*shorea robusta gaertn*. এই  
গাছে ফাঙ্গনে মাস ব্যতীত সব  
সময়েই পাতা থাকে । ছোট গাছের  
ছাল মসৃণ, বড়গাছের ছাল পুরু ।  
ফুল সাদা ও ফল লম্বা । পর্যায়—  
জরণদ্রুম, অশ্বকর্ণ, তাক্সাপ্রসব,  
শস্যসংবরণ, ধন্য, দীর্ঘপত্র,  
কুশিক তরু, কৌশিক ॥ রাজনি° ॥  
প্রকারভেদ—পীতশাল—[ স°  
অসন ; হি° অসনা ; ও° পিয়াশাল ;  
ম° হুলি ; গুজ° বিয়া ; তা°  
ভেজাই, তে° পিদিগ ] বৃহদাকার  
গাছ । *pterscarpus marsu-*  
*pium*. গাছ ৩০—৪০ ফুট  
উচ্চ । শরৎকালে পাতা ঝরে যায় ।  
আঠা লালবর্ণ, পাতা লোমযুক্ত ।  
বর্ষাকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে

ফল হয় । পর্যায়—অমন; মহাসর্জ,  
সৌরি, বন্ধুকপুষ্পক, প্রিয়ক,  
প্রিয়শালক, নীলক ॥ রাজনিং ॥  
মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, মাদ্রাজ,  
রাজমহল পাহাড়, বিহারে জন্মায় ।

শালগম—মূলশাকবিং, turnip.

শালপর্ণী—শালপাণি গাছ ॥ রাজনিং;  
ভাবপ্রং ॥, মাষপর্ণী ।

শালপাইন—একমূলা ; শালপাণি ।

শালপাণি—[সং শালপর্ণী; হি  
শালদন, শালপান, সারবান্ ; মং  
সালবন ; ওং শারপর্ণি ; সাং—  
তান্দি ] ছোট-গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ,  
desmodium gangeticum.  
গুল্ম ৩-৪ ফুট উচ্চ । পাতা লম্বা ।  
সাধারণত কোপেঝাড়ে হয় । সমস্ত  
বাঙলা দেশে ও হিমালয়ের সান্দ্র-  
দেশেও জন্মায় । পর্যায়—সুদলা,  
সুপত্রিকা, স্থিরা, নোম্যা, ব্রীহি-  
পর্ণিকা, সুরূপা, শূভপত্রিকা,  
শালিদলা, বাতয়ী, কুমুদা, বিদা-  
রিগন্ধা, অংশুমতী ॥ ভাবপ্রং ॥

শালসার—গাছবিং ।

শালাণ্ডি—লতানে গাছ, শাণ্ডে শাক,  
যার পাতা ব্যঞ্জে ব্যবহৃত হয় ।  
achyranthes triandra.

শালানি—গুল্মবিং । hedysarum

gangeticum.

শালি—ধান্যবিং, ১ রক্তশালি, ২ দশ-  
ভূজাত শালিধান; ৩ বাপিজাত  
শালিধান ।

শালিণ্ড—শালাণ্ডি দ্র° ।

শালুক, শালুক—জলজ উদ্ভিদবিং,  
হেলাফুল । শর্দিধি, কুমুদ ফুল !  
nymphaea lotus lin. প্রকার-  
ভেদ—১. সুদিকুল—অনুষ্ণ ।  
উৎপল, বানিপুষ্প হিমাক্ষ;  
নিশাফুল । ২ সাদা নালফুল—  
খবলোৎপল, কল্লার, কৈরব,  
চন্দ্রাক্ষ, ইন্দ্র কমল । ৩ নীল  
নালফুল—নীলোৎপল, উৎপলক,  
কুবলয় ইন্দীবর, অসিতোৎপল ।  
ছোট সুর্দিদির নাম—উৎপলিনী,  
কৈরাবনী, কুমুদ্বতী, চন্দ্রকটা,  
কুবলয়িনী, নীলোৎপলিনী ।

শালেয়—মৌরী, মধুরিকা ।

শাল্মনি, শাল্মলী—শিমূল গাছ দ্র° ।

শাল্মনি পত্রক—সপ্তচ্ছেদবৃক্ষ, ছাঁতিম  
গাছ ।

শিংশপা—[ তাং জানক্, গুজ°  
শিশম্ ] শিশুগাছ । শিশুনাগ ।

শিংশপ—শিশুগাছ ।

শিউলি—শেফালিকা ।

শিখিণ্ডিনী—মল্লিকাফুল ।



শিখরিণী—মল্লিকাফল ।

শিখাবর—কাঁঠাল গাছ ।

শিখিমন্ডল—বৃক্ষবিং, *tapia*  
*crataeva*.

শিখিমোদা—বাঁধুনী ।

শিগ্র—[সং শোভাজন, সজিনা; হি°  
সজনা] সজনে, *moringa ptery-*  
*gosperma gaertr.* সজিনা দ্র° ।

শিগাড়া—[সং শৃঙ্গাটক; হি°  
শিগাড়া; ইং *water nut*]  
পানিফল ।

শিতচার—শাকবিং, *marsilea*  
*dentata*.

শিতসাবক—[ইং *ebony*] আবলুস  
কাষ্ঠবৃক্ষ, কাফতিন্দুক, *dios-*  
*pyros glutinosa d. tomen-*  
*tosa*.

শিবদারু—দেবদারু ।

শিবপ্রিয়—১ বকবৃক্ষ, ২ বিল্বপত্র ।

শবমল্লী—মল্লিকাভেদ, *sesbana*  
*grandifolia*.

শিবশেখর—মল্লিকাভেদ ।

শিবা—১ আমলকী, ২ হরিতকী, ৩  
হরিদ্রা, ৪ মেথী, ৫ শমী, ৬  
শ্যামালতা, ৭ জুই আমলা, ৮  
আমড়া, ৯ নীলদর্বা ।

শিবাস্মৃতি—চারাবিং, *celtis ori-*

*entalls*.

শিম—[সং শিম্বী; হি° শিম; বো°  
পোটি; ম° নিবাবানি; তা°  
অভরাই; তে° অন্নপ] লতানে  
গাছ, *dolichos lablab*; গাছ  
জড়াইয়া অপর গাছে বা ভাড়া  
বাঁধিয়া দিলে জন্মে । পাতা  
দেখিতে শাকাল, গাছের পাতার  
মত । ফুল সাদা, শৃংগটিতে ৫-৭  
টা বীজ থাকে । পর্যায়—মধুর  
শ্বেতনিঃপাব, মাধবীকা, মধুশকরা,  
মূলশিম্বী, সিতা, মধুশকরা  
পলঙ্কবা । সমগ্র ভারতে জন্মায় ।

শিমূল, শিমূল—[রক্ত° শিঙলী;  
হি° সেমূল, শিমুর] শাক্মলী ।  
শিমূল দুই প্রকার—শ্বেত  
শিমূল ও রক্ত শিমুর । ১ শ্বেত  
শিমূল—[সং ধব; হি° সফেদ  
শিমূল, হানিপর; তা° ইনাভাম্;  
তে° বুরুগ-সান্না] বৃহদাকার  
কণ্টকাবৃত কাণ্ডবিশিষ্ট বৃক্ষ,  
*erlodendron anfractu-*  
*sums*, শরৎকালে পাতা ঝরে ।  
পাতা ঘন ঘন, ফল লম্বা কাঁচা  
কলার মত । পর্যায়—ধব, ঘটি,  
নন্দিতরু, ধুবন্ধর । ২ রক্ত শিমূল  
—লাল শিমূল [সং শাক্মলী,

মোচা ; হি° শেমদুর, শেম্বন ; ও°  
শিমদুরী ; বো° সাউর ; তে° শভর ।  
শমর ; গুজ° রতো, [ শিমলো ]  
লাল শিমদুল, অতি বৃহৎ শক্ত  
কাঁটামুক্ত বিশাল বৃক্ষ, *salimalia*  
*malabarica*. বীজ ফলের মধ্যে  
তুলার মধ্যে আসে । একটা ফলে  
অনেক বীজ থাকে । বীজ হইতে  
তেল বাহির হয় । পৰ্যায়—  
শাল্মলী, চিরজীবী, পিচ্ছিল, রক্ত-  
পুষ্পক, নমাচ, কষ্টকদ্রুম, রম্য-  
পুষ্প, সমদ্রুম ॥ রাজনি° ॥

শিশ্ব, শিশ্বী—এরকা, শিম দ্র° ।

শিয়াকাটা, শিয়ালকাটা—[ স° শৃগাল-  
কষ্টক ; তে° ব্রহ্মদন্তিচেট্ট ;  
গুজ° পীলটখতুরা ; ইং *mexi-*  
*ana*. ] শেয়ালকাটা, *argemone*  
*mexicana*.

শিয়াকুল, শেয়াকুল ( দেশজ )—স°  
শৃগাল কোঁল] শেকুল, কষ্টকীবৃক্ষ-  
বি° । সৈয়াকুল দ্র° ।

শিরাপত্র—কংবেল, *feronia ele-*  
*phantium*.

শিরাল—অম্লফল ।

শিরালক—ঋদ্র বৃক্ষবি°, *cissus*  
*quadrangularis*.

শিরীষ—[ স° শূকতরু, কপীতন ;

হি° শিরিন্ । শিবই ; ও° টিনিয়া ;  
ম° চিকোল ; তে° দ্দিচিরম্ ; ভা°  
কট্-ভোখি ] কাঁটামুক্ত বড় গাছ ।  
*albizzia labbek benth*. গাছ  
৫০-৬০ ফুট উচ্চ । পাতা মসৃণ,  
লোমযুক্ত, অবনত । আগলকী  
পাতার মত পাতা, ফুল হলদে  
আভাষুক্ত । বর্ষাকালে ফুল ও  
শীতকালে ফল হয় । পৰ্যায়—  
শীতপুষ্প, ভিণ্ডক, মৃদুপুষ্পক,  
শুকেষ্ট, শূকতরু, বিষহস্তা,  
উদ্দানক, শাকিনীফল, মধুপুষ্প,  
বৃন্তপুষ্প ; লোমপুষ্পক  
॥ রাজনি° ॥ ভারতে সর্বত্রই  
জন্মান ।

শিলাকণী—কুন্দক, কুন্দরুবৃক্ষ,  
*boswellia thurifera*. পর্যায়  
—গন্ধাবিরজা, কুন্দরু, কুন্দরু,  
কুন্দ, থোটিরস, মৃদুকুন্দ, লোবান,  
তৈলাখ্য, শিলারস, কুন্দরুক ।

শিলারস—কুন্দরু বৃক্ষ ।

শিলিপকা—তুর্গবি° ॥ রাজনি° ॥

শিলীন্ধ, শিলীন্ধক—বেণের ছাতা ।

শিশু—[ স° শিশুপা ; হি° শিশই ;  
শীশব ; গুজ° শিশম ; ম° কালা-  
সিংসপা ; ভা° নক্ক কট্টাই ; তে°  
শিশুকরুব ] শিশু গাছ ; *dalber-*

gia sissoo, roxb. গাছ ৫৫-৬০  
ফুট উচ্চ। পাতা বসন্তকালে  
ঝরে। গাছের কাঠ শক্ত,  
সাধারণত গরুর গাড়ি তৈরী হয়।  
পাতার ডাঁটা বাঁকা; পাতা শক্ত,  
মসৃণ, লোমাবৃত। গ্রীষ্মকালে  
ফুল ও শীতকালে ফল। সচরাচর  
হিমাচল প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, আসাম  
ও বঙ্গদেশে জন্মায়। পর্যায়—  
শিংশপা, মহাশ্যামা, কৃষ্ণসারা,  
ধূম্মিকা, তীক্ষ্ণসারা, ধীরা,  
কপিলা, কৃষ্ণশিংশপা ॥ রাজনি° ॥  
শিশুক—শিশু গাছ।  
শিশুপালক—উদ্ভিদবি°, nauclea  
cordifolia.  
শিহালা—শেওলা, জলজ উদ্ভিদ।  
শীঘ্রজন্মা—রক্তকরণ, caesalpinia  
bonducella.  
শীত—১ ক্ষুদ্র গাছ, ২ নিম্নগাছ, ৩  
চারাবি°, marsilea quadrifolia.  
শীতক—চারাগাছ, marsilea dentata.  
শিতপর্ণী—cleome pentapylla.  
শীতপল্লব—ardisea salanacea.  
শীতপল্লবা—বনজাম, premna  
herbacea.  
শীতপাকী—sida cordifolia.  
শীতপুষ্প—১ শিরীষ গাছ, ২ অগন্ধ

তৃণ, ৩ আকন্দ।  
শীতবকল—বজ্রডুমুর।  
শীতভীরু—আরবীয় মল্লিকা।  
শীতল—১ চম্পক, michella cham-  
pacha. ২ ক্ষুদ্রবৃ°, cordia  
myxa. ৩ বেগার মূল।  
শীতশিব—শমীগাছ।  
শীঘ্রগন্ধ—বকুল, mimusops elengi,  
শীবল—জলজ বৃক্ষ, vallisneria.  
শীর্ণবৃক্ষ—তরমুজ ॥ রাজবি° ॥  
শুকতরু—শিরীষ গাছ।  
শুকদ্রুম—শিরীষ গাছ।  
শুকপিপ্পা—গোলাপজাম, জম্বু,  
eugenia jambu.  
শুকফল—আকন্দ।  
শুকপুষ্প—ইন্দুকমল।  
শৃঙ্গ—১ ডুমুর, ২ আমড়া।  
শৃঙ্গবল্লিকা—menispermum  
glabrum.  
শূনকচিল্লী—শাকবি° ॥ রাজনি° ॥  
শূদ্রপুষ্পে—[সি° বৈতপদন'বা] পদন'বা  
শাক।  
শূদ্রফা—শতপুষ্পা, মধুরসা।  
শূষধী—উচৈছ।  
শূষনি—শাকবি°।  
শূকধান্য—শূয়াষদ্রু ধান বা যবাদি।  
শূকপিপ্পা—আলকশূষী।

শুকর্ণিশ্বী—আলকৃশী ।

শুগারি—ইগুদীবৃক্ষ ।

শুরণ—ওলবি° ।

শুলশঙ্ক—এরুডগাছ ।

শুলী—তৃণবি° ।

শুলকটক—শেয়ালকাটা গাছ । পাতা  
কাটা কাটা, ফুল পীতরঙ ।  
meticar poppy.

শুলকোলি—শেয়াকুল গাছ । কটকী-  
লতা । পাতা লোমশ ও ফুল  
পীতভ, ফল কুঁচের মত ছোট ও  
গোল, zizypus oenopia.

শুলগাটক—[ স° অনুকন্দ ; হি°  
শিহারা, ইং water nut ]  
পানিফল, জলকটক ।

শুলগনী—১ মল্লিকা গাছ, ২ জ্যোতি-  
মতী লতা ।

শুলী—লতাবি° ।

শেওড়া—শাখোটবৃক্ষ ।

শেওলা—লতানিয়া গাছবি°, ২ শৈবাল ।

শেঁকুল, শেকুল—শেয়াকুল ।

শেনঘন্টা—এরুডপত্রিকা ।

শেপুন্নে—শপুন্নে দ্র° ।

শেফালিকা—১ শিউলীফুলের গাছ,  
nyctanthes arbor-tristis. ২  
নীলসিদ্ধবার ।

শেব—শেউফল, আপেল ।

শেলু—শাকবি°, cordia myxa.

শেবল, শেবাল—জলজ উদ্ভিদ ।

শৈবাল—শেওলা, জলজ উদ্ভিদ, valli-  
sneria octandra, blyxa o.

শৈরীয়ক—গুন্মবি°, baleria cris-  
tata.

শৈলিপলুবৃক্ষ—আখোট গাছ ।

শৈলেয়—শিলাজাত পদ্রুপ ।

শোণাগাছ—[ স° পৃথুশিখর ] পীত-  
বৃক্ষ, দীর্ঘ বৃন্তবৃক্ষ, oroxylum  
indicum.

শোভনক—শোভাজনবৃক্ষ ।

শোভনরঞ্জন—অতিতীক্ষ্ণ, সজনে-  
গাছ ।

শোভাজন—সজিনাগাছ ।

শোলা—জলজ ক্ষুপবি° [ ইং spong-  
wood ] । প্রকারভেদ—১ কাঠ-  
শোলা—দীর্ঘ ও কিছদ শক্ত, সরু  
দণ্ড শোলাগাছ । ২ ফুলশোলা—  
কোমলত্বক্ শোলাগাছ । খেলনা  
তৈরী হয় ।

শোলফ—শুলফা শাক ।

শ্যাকুল (দেশজ)—শেয়াকুল কটক-  
ময় লতা ।

শ্যাম—১ মরিচ, ২ সিদ্ধলবণ  
। রাজনি° ।

শ্যামপত্র—তমাল, *xanthocymus pictorius*.

শ্যামমাড়া—আখ দ্র° ।

শ্যামলতা—লতাবি° । উৎপলশারিবা; *echites fruteocens*.

শ্যামা—অনন্তমূল, ঋক্ষগন্ধা । প্রকার-ভেদ—১ প্রিয়দ্রু, ২ গুড়ুচী, ৩ কৃষ্ণবৃৎ, ৪ পিপ্পলি, ৫ হরিদ্রা, ৬ নীলপদনর্বা, ৭ তুলসী, ৮ পদ্মবীজ, ৯ নীলা, ১০ কস্তুরী, ১১ গোরোচনা; ১২ সোমলতা, ১৩ গন্ধুদ্রা; ১৪ লতাকস্তুরী; ১৫ কাক-জম্বা, ১৬ শিংশপা; ১৭ সোমবাহী; ১৮ গুগ্গল, ১৯ হরিতাল ।

শ্যামাক—তৃণধান্যবি° ॥ রাজনি° ॥

শ্যামাদিবর্ণ—[ বৈদ্যকে ] মহাশ্যামা, তৈউড়ী, দস্তী, শিথিনী, তিলক; কম্পিলক; রম্যক, ক্রমুক, পুগ-শ্রেণী, গবাক্ষ, রাজবৃক্ষ, কয়ল, ভহরকরঞ্জ, গুড়ুচী, সপ্তলা, ছগ-লাস্ত্রী, সুধা, সুবর্ণক্ষীরা ।

শ্যামালতা—অনন্তমূলজাতীয় লতাবি° ।

প্রিয়ংগুলতা, অতিমৃদুলতা, *ichnocarpus frutescens*.

শ্যোনক, শ্যোনাক—শোনা গাছ, *bignonia indica*.

শ্রী—[ বৈদ্যক ] ১ বিল্ব, ২ লবঙ্গলতা,

৩ পদ্ম; ৪ সরলবৃক্ষ ।

শ্রীকন্দা—পর্যায়—পথ্য, কুমারী, সপ-দমনী, বন্দ্যা; পরা, ভূতহস্ত্রী ।

শ্রীতাল—তালবৃক্ষ-সদৃশবৃক্ষবি°, *co-rypha latifolia*.

শ্রীপর্ণ—গণিয়ারী বৃক্ষ ।

শ্রীপর্ণ—১ গাভারী গাছ, ২ কটফল-বৃক্ষ; ৩ শাল্মলী; ৪ পুষ্টিপর্ণা; ৫ চাকুলে ।

শ্রীপদ্ম—লবণ ॥ রাজব° ॥; পদ্মকাষ্ঠ ।

শ্রীপ্রিয়—আম্ ।

শ্রীফল—বেল ॥ রাজনি° ॥

শ্রীফলা, শ্রীফলী—আমলকী, আমলা ॥ রাজনি° ॥

শ্রীবল্লী—কাটাগাছ ॥ রাজনি° ॥, বিল্ব ।

শ্রীভদ্রা—মুতা ।

শ্রেয়সী—আকনাদি ।

শ্রেয়সী—কেয়াফুলের গাছ. লতাবী ॥ রাজনি° ॥

শ্বেতকণ্টকারী—শ্বেতবর্ণ পদ্মযুক্ত কণ্টকারী গাছ ।

শ্বেতকন্দা—আতাইচ ।

শ্বেতকরবীর—সাদা করবী পদ্ম গাছ, অজবীজভৃৎ ।

শ্বেতকাণ্ডন—কবুদার ।

শ্বেতকিনিহী—মহাশ্বেতা ॥ রাজনি° ॥ গাছ

শ্বেতকুমড়া—সাদা কুমড়া ।	শ্বেতভাড়া—অপরাজিতা ।
শ্বেতকরুটক—সাদা কাঁটি ফুল ও গাছ ।	শ্বেতশরপুংখা—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি° রাজনি° ॥
শ্বেতকুটজ—সাদা কুরিচ গাছ ।	শ্বেতশাল্মলী—সাদা শিমূল, white cotton tree.
শ্বেতখাদির—সাদা খয়ের, পাপাড়ি খয়ের ॥ রাজনি° ॥	শ্বেতশিংশপা—সাদা শিশু গাছ ।
শ্বেতগঞ্জা—সাদা কুঁচ ॥ ভাবপ্র° ॥	শ্বেতশিগ্র—[ horse radish ] সাদা সজনেগাছ ।
শ্বেতগম্বী—সাদা ঘোষলতা ।	শ্বেতশিম্বী—রাজশিম্বী ।
শ্বেতচন্দন—সাদা চন্দন; santalum album.	শ্বেতশূরগ—সাদা ওল ।
শ্বেতচামর—কাশতৃণ, কেশেবাস ।	শ্বেতসিরিষা—রাইসর্বে ।
শ্বেতজীরক—সাদা-জিরে ।	শ্বেতহাড়হুড়ে—অৰুপুংখী ।
শ্বেতদুর্বা—সাদা দুর্বাঘাস ।	শ্বেতা—১ অতিবিষা ॥ রাজনি° ২ অপরাজিতা, ৩ শ্বেতকন্টকারী, ৪ শ্বেতদুর্বা ।
শ্বেতপদ্ম—সাদা পদ্ম ।	শ্বেতান্নি—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥
শ্বেতপদুনবা—সাদা শূপুন্বে ।	শ্বেতাক—সাদা আকন্দ ॥ রাজনি° ॥
শ্বেতবৃহতী—সাদা বেগুন ।	শ্বেতাস্মক—কফেল ।
শ্বেতবেড়ো—[ হি° খিরটী, বরিলার, বীজবন্দ ; ইং horn-beam lesus, heart-leaved sida ] সাদা বেড়ো ।	শ্বেতেক্ষু—সাদা আক ॥ ভাবপ্র° ॥
	শ্বেতোৎপল—ক হ ল র রাজবি° ভাবপ্র° ॥

[ য ]

যড়ভুজা—খরবুজা ফল ॥ রাজনি° ॥	যটিক—ধান্যবি° ।
------------------------------	-----------------

[ স ]

সংবত—বৃক্ষবি°, terminalia bellerica.	সংবিষা—অতিবিষা, aconitum ferox.
সংবাটিকা—জলজ গুল্ম, trapa bipinnosa.	সকট—সাখোট, ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°, tropes aspera.



সকটক—শেবাল, শেওলা, *vallisneria*.

সকৃৎফলা—কদলী, কলা ॥ রাজনি°  
রাজব° ॥

সকৃৎবীৰ—একবীর ।

সকৃৎফলা; সন্তফলী—শমীগাছ, *mimosa suma*.

সখ—*mimosa catechu*.

সখোটক—সাখোট ।

সকোচন—লজ্জালত ।

সকোচিকা—জলজ গুল্ম, *trapa bipinosa*.

সকিগ্রা—মুন্ডাকণী, *salvinia cuculleta*.

সজিনা—[স° শোভাজন, শিগ্র; হি°  
সজনা, শোয়ানজন; ও° মুনশি,  
বো° পীতসেউবা; তা° মরুংগা;  
তে° মরুং; ক° মরুংগা] সজনেগাছ,  
*hyperanthera morunga*,  
*moringa pterygosperma*,  
*gaertn*. মাঝারি গাছ । ২০-২৪

ফুট উচ্চ, ত্বক ও কাঠ নরম । এক  
জাতীয় সজিনা আছে, উহার ফুল  
লাল, তাকে মধুশিগ্র বলে । ফুল  
লম্বা ১-১৪ ইঞ্চি, ১টি শিরাবিশিষ্ট;  
ধূসরবর্ণ বা কালবর্ণ । আর এক  
প্রকার । তার নাম নাজনা ।

পৰ্ণায়—শিগ্র, হরিত শাক, শাক-  
পত্র । প্রকারভেদ—১ কালশিগ্র—

শোভাজন, নীলশিগ্র, কৃষ্ণশিগ্র,  
সুখামোদ । ২ রক্তশিগ্র—রক্তক,  
বহুলহৃদ, স্নগন্ধকেশর, মৃগারি ।

৩ শ্বেতশিগ্র—সিতাহর, স্তম্ভল,  
শ্বেত মরিচ, রোচন, মধুশিগ্রক ।

ভারতের সকল স্থানে চাষ হয় ।

সংকদম্ব—বৃক্ষবি, *nauclea cordifolia*.

সদাফলা—কুলিবেগুন, দকো বেগুন  
॥ রাজনি° ॥ যজ্ঞভূমুর ।

সদাভদ্রা—গুল্মবি°; *gmelina arborea*.

সনপণী—চারাগাছ, *marsilia quadrifolia*.

সনামক—মোরফ গাছ, *hyperanthera morunga*.

সন্ধ্যামণি—কৃষ্ণকলি, কেটকলি, *mirabilis jalapa*. কৃষ্ণকলি দ্র° ।

সন্নভদ্র—পিয়াল গাছ, *buchanania latifolia*.

সমিষ্কার—পিয়ালগাছ ।

সপেটা—[ ইং *sopota* ]—*achras sopota*. বকুলাদিবর্গের বৃক্ষ-  
বি° । জ্যামেকা ঘীপের গাছ ।  
অধুনা ভারতের উদ্যান মধ্যে

রোপিত হইয়াছে । সুন্দর গাছ ।  
 সপ্তচ্ছদ—ছাতিম গাছ ॥ রাজনি° ॥  
 সপ্তনামা—আদিভাত্তা, হুড়হুড়িয়া ।  
 সপ্তভদ্র—শিরীষগাছ, *acacia sirisa*.  
 সপ্তলা—পারুল বা পাটলা গাছ ।  
 সবহা—তেউড়ী গাছ ।  
 সমর্থক—[ ইং *aloe wood*] *amysis agallocha*.  
 সমণ্টিল—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥  
 সরংগুজা, সরংগোজা [ ইং *niger sheed* ]—সোমরাজ্যাদিবর্গের বর্ষায় শাকবি°, *guizotia abyssinica*. আফ্রিকা ইহার আদি জন্মস্থান । অধুনা ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই ইহার চাষ হইতেছে । ফুল হলদে রংয়ের, শীতকালে ফোটে । ফল বা বীজ অল্প চোটা, লম্বা, বীজে তেল হয় । সরিষার তেলের চেয়ে পাতলা ।  
 সরল—[স° সরল, পীতদ্রু, পুতিকার্ত্ত ; ইং *pine*] উচ্চ বৃক্ষবি°, *pinus longifolia*. হিমালয় প্রদেশে জন্মান্ন । দেবদারু গাছের মত দেখিতে । কাঠের রং ঈষৎ হলদে । কাঠ চোয়াইয়া তাম্বিন ( *terpentine* ) হয় । বানিস করিতে লাগে । ২ দেবদারু ।

সহকার—আম ।  
 সরিষপ্, সরিষা—[ স° সর্বপ, ত্বরী, আফ্রোটা, হি° সর্সো ; ও° সোরিষ ; ম° মোহরী ; বিহার ও উত্তরবঙ্গে—তোরী ] সরিষা, সর্বপ, *brassica napus*. সর্বপ পত্রশাক, কৃষিজাত শাকবি° । ইহার বীজ হইতে তেল হয় (*rape seed*), ফুল হলদে রংয়ের ছোট ছোট ॥ সর্বপ দ্র° ॥ প্রকারভেদ—রাই-সরিষা—[ স° রাজিকা ; হি° রাই ; লাই, সফেদ-সরসো ; ম° রায়ী ; মোহরী শ্বেতশিষম, গুজ° শরশব ; তে° কদাড ] *brassica campestris*, *b. juncea*, *Indian mustard*. বর্ষজীবী উদ্ভিদ । সরিষা ছোট ও খয়ের রঙের তেল কাঁকাল ।  
 সরীব—*sarsaparilla*,  
 সর্জ—শাল গাছ ।  
 সপদ্রুংষ্ট্র—দন্তীবৃক্ষ ।  
 সপাক্ষী—গম্ধনাকুলী গাছ ॥ ভাবপ্র° ॥ *opioxyton serpentina*.  
 সপিণী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥  
 সর্বপ—[ ইং *mustard*] *sinapis dicotone*, *brassica napus*.

সরিষা দ্র°। সর্বপ সাধারণত  
দুইপ্রকার—১ সিন্ধার্থ—*synapis*  
*elba*, *brassica campestris*.  
(ক) শ্বেতসিন্ধার্থ—[স° আসুরী,  
কটুস্নেহ ; হি° সফেদ সরসো ;  
ম° শ্বেতশিরস্ ; গুজ্জ° শরশব ;  
ক° তিলির সাসেব ; তে°  
কদাও ; তা° অজল্দ ; অ° উকৈ  
অবীরদ্ ; কা° সর্বফ্]। সাদা  
সরষে। গাছ ও ফল বড়। শরটী  
মোটা। পাতায় লোম নাই।  
*Indian colzas or sarson*.

২ রাজিকা—[স° রাজক্ষবক,  
রাজসর্বপ ; হি° রাই, লাই ; গুজ্জ°  
রাই জম্বুসরী ; ক° সাসিরাই ; ম°  
মোহরী ; তে° বর্ণালী ; অ° খাদল]  
রাই সরিষা, রাইসর্ষে, *synapis*  
*nigra*, *brassica juncea*.  
সরিষা ছোট ও খয়রা। ৩ বড়রাই  
—*synapis rumosa*. কৃষ্ণ-  
রাজিকা—*brassica nigra*.  
(ভারতে হয় না)। শ্বেত  
সরিষার চেয়ে রাই সরিষা  
ঝাঁঝাল বেশী। ইহার বীজ ও তেল  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। ৪ বন-  
রাই—*synapis divaricata*.  
সিঁগী—ক্ষুদ্র বৃক্ষবি°।

সর্বজয়া—[স° দেবকিনি ; সর্বজয় ;  
হি° কিওয়ারা, সর্বজয়া ; ম° দেব-  
কেলি ; তা° কালভলাই ; তে°  
কুষাতামারা] *canna indica*.  
হরিদ্রাদিবর্ণের পদ্পবৃক্ষবি°।  
জলাভূমিতে জন্মায় এবং ক্রমশ ঝাড়  
হইয়া জঙ্গল হয়। পাতা দীর্ঘ।  
ফুল লাল ; দ্বিষং হলদে রংয়ের  
আমেজযুক্ত। বীজ (*Indian*  
*shot*) গোল। ফুলে অর্ধকেশর  
তাহাও আবার একটি দলের গায়ে  
লাগান থাকে।

সলপ—[ও° স্যালোপা ; মাল° আনা-  
পোনা ; তে° জিনিগুজাটু ; তা°  
ইরামবানাই] গোল সাগদ, *caryota*  
*urens*. তামাদিবর্ণের বৃক্ষবি°।  
দেখিতে অতি সুন্দর। পাতা  
বড় বড়। উত্তর বাঙলা, গ্রিহৃত ও  
উড়িষ্যা প্রদেশের অরণ্যে জন্মায়।  
ইহার কাণ্ড হইতে দেশী সাবু  
পাওয়া যায়। কোন কোন স্থানে  
ইহাকে 'গোল-সাগদ' গাছ বলে।

সল্লকী—[*gum olibanum tree*]  
*boswellia thurifera*.

সহদেবী—ছোট কুর্কসমা, *verno-*  
*nia cineria* lin. বৃক্ষবি°  
। রাজনি°।

সাকুরদ—[ স° সাকুরদ ] বৃক্ষবি°  
 ॥ রাজনি° ॥

সাগদ, সাবদ—[ হি°, ও° সাবদ ; মালয়  
 সাবদ ; পতু° সাগদ ; ইং sago  
 palm ] তালাদিবর্গের বৃক্ষবি° ।

সাতলা—বৃক্ষবি° ॥ রাজনি° ॥

সাদনী—কটুকা ।

সাপলা—[ ইং water lily ] কুমুদ ।

সাবলা—বৃক্ষবি° ।

সারগী—চারাবি°, *paederia fetida* .

সারতরু—কলাগাছ, *musa sapien-*  
*tum* .

সারিষা—[ স° অনন্তমূল । ॥ রাজনি° ॥  
 লতানে গাছ, *echites frute-*  
*scens* .

সাল—[ স° অম্বকণ° ] *shorea*  
*robusta* . উত্তর পশ্চিম ভারত,  
 পঞ্জাব, আসাম, মধ্যভারত, গোদা-  
 বরী পর্যন্ত দেশে জন্মায় ।

সালই—গদগদুল ।

সালপর্ণী—[ স° শালপর্ণী ] *desm-*  
*odium gangeticum* . শিম্বাদি  
 বর্গের আরণ্য বৃক্ষবি° । পাতা  
 গোড়ায় গোল ক্রমশ লম্বা । সাল  
 পাতার মত, ফুল ছোট, বেগুনে  
 রংয়ের । অন্য জাতের ফুল সাদা,  
 জোড়া জোড়া হয় । শিম্বিতে

৫/৬টা বীজ থাকে । শীতকালে  
 পাকে ।

সালপদ্প—গুল্মবি°, *hibiscus mut-*  
*abilis* .

সালেপ মিসরী—[ স° সালিমকন্দ ;  
 আ° সালব মিসরী ] সালেমিমিষ্ট্রী,  
*orchis mascula* . রাস্নাদিবর্গের  
 কয়েক জাতি ভূমিজ শাকবি° ।  
 পারস্য দেশ ও অফগানিস্তানে  
 জন্মায় । ইহার এক নিকট জাতি  
 উত্তর ভারতে জন্মে । সালেপ  
 মিসরী অল্প মিষ্ট ।

সিংহ—১ বেগুন, *solarum mel-*  
*ongena* . ২ গুল্ম, *justicia* .  
 ॥ উইল ॥

সিংহকেশর—চারাগাছ, *mimusops*  
*elengi* .

সিংহনাদক—চারাগাছ, *hedysarum*  
*albagi* . ॥ উইল ॥

সিংহপর্ণী—চারাগাছ, *gusticia adh-*  
*enatoda* .

সিংহপুচ্ছি—চারাগাছ, *hedysarum*  
*lagopodioides* . ॥ উইল ॥

সিংহমুখী—বাসক দ্র° ।

সিংহী—কটকারী ।

সিকোনা—[ ইং cinchona ] আচ্ছদ°  
 কাদিবর্গের বৃক্ষবি° । আমেরিকা

[ স ]

ইহার আদি জন্মস্থান। অধুনা  
দার্জিলিং ও দক্ষিণ নীলগিরিতে  
সরকার দ্বারা চাষ হইতেছে। গাছের  
ছাল থেকে সিস্কোনা ঔষধ হয়।

সিজ—[ স° সীহুড, স্নুহী; হি°  
সিজ; ও° সিজ ] মনসাগাছ।  
প্রকারভেদ—১ তেকাটা সিজ। ২  
বোড়াসিজ, লঙ্কাসিজ—[ হি°—  
সেহুড, ও° সিজ ] *euph-  
orbia tirucalli*. গাছ ১২১৪  
হাত উঁচু হয়। গাছে বাঁটা নাই।

সিতদুর্বা—সাদাফুলযুক্ত বক্র তৃণ-  
বি°।

সিতপাটীলকা—শুক পাটলা গাছ  
৥ রাজনি° ॥

সিতপদ্ম—১ তৃণবি°, *cyperus  
rotundus*, ২ টগর পদ্মপত্র,  
৩ তৃণবি°, *saccharum spon-  
taneum*.

সিতপদ্ম—আরবীয় যুথি।

সিতমরিচ—সাদা মরিচ ৥ রাজনি° ॥

সিতবর্ষাভূ—পুনর্নবা শাক।

সিতমাষ—শিমবি°, *dolichos  
catjang*.

সিতাবর—সুবর্ণ শাক ৥ রাজনি° ॥

সিতাশোভ—সাদা পদ্ম।

সিতালতা—সাদাফুলযুক্ত দর্বাঘাস।

সিন্ধি—[ স° শরাদন, সিন্ধি, ইন্দ্রাসন;  
হি° ভাঙ্গ, ভাঙ্গা; ও° পাক;  
গুজ° ভাংগো, চরস; তে° কলম-  
ঘেটু ] সিন্ধি, ভাং; *cannabis  
sativa*. ছোট গাছ বিশেষ।  
ভারতবর্ষ ও এশিয়ার অন্যান্য  
অনেক দেশে অরণ্যে জন্মায়।  
গাছের মঞ্জরীর নাম গাজা। আগ  
থেকে স্নতা ও দড়ী তৈয়ারি হয়।  
বীজ হইতে তৈল হয়। পদ ও শত্রী  
পদ পিষি গাছে হয়। সিন্ধি  
গাছের পাতা [হি° সবজী  
ঠান্ডাই]।

সিন্দুক—ক্ষুদ্রবৃক্ষবি°, *vitex  
negunda*.

সিন্দুবার, সিন্দুবার—[ স° নিশুডী;  
সিন্দুবার ] *vitex negundo*.  
নিসিন্দা ৥ রাজনি° ॥ নিসিন্দা  
দ্র°। ক্ষুদ্র গুল্মবি°। পর্যায়—  
ইন্দ্রসুরস, নিসিন্দা, ইন্দ্রসুরিস,  
ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রাণী ৥ রাজনি° ॥

সিন্দুর—চারাবি°, *lythrum fruti-  
cosum*.

সিন্দুরপদ্মপী—পদ্মপত্র বৃক্ষবি° ৥ রাজনি° ॥

সিন্দুবেষণ—চারাবি°, *gmellna  
arborea*.

সিন্দু—শিমগাছ।

সিল্ককা—কুন্দগাছ ।

সীধুপদুপ—কদম ।

সুকটকা—ঘতকুমারী গাছ ॥ ভাবপ্র° ॥

সুকন্দ—১ পিঁয়াজ, ২ কেশর ঘাস ।

সুকর্ণিকা—উদ্ভিদবি°, *salvania cucullata*.

সুকাণ্ড—কারবেল, করলা; উচ্ছে, কাকরোল ।

সুকুমারী—কঙ্কজুড়িয়া ।

সুখদর্শন—[ হি° সুখদর্শন ; তা° বিব-  
মন্ডিল ] গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ,  
*crinium zeylanicum*, *c.*  
*latifolium*. বহুবর্ষ জীবিত  
থাকে । গ্রীষ্ম-বর্ষা কালে ফুল ও  
পরে ফল হয় । পর্যায়—সুদর্শনা,  
সোমবল্লী, চক্রাহা, মধুপর্ণিকা  
॥ ভাবপ্র° ॥ ২ নাগদোলা ॥ বেল° ॥,  
*c. asiaticum*. উড়িয়া, ছোট  
নাগপুর, জঙ্গলে জন্মে । বঙ্গ-  
দেশে বাগানে দেখা যায় ।

সুখমুনিয়া—[ হি° সুখমুনিয়া ; আ°  
সুখমুনিয়া ] কলম্বাদিবর্গের  
আরগল্যতাবি° [ *scammony* ],  
*convolvulus scammonia*.  
গুজরাত প্রদেশের অরণ্যে জন্মায় ।  
অন্যস্থানে খুব কমই দেখা যায় ।  
ইহার শিকড় কাটিলে যে রস বাহির

হয় তাহা ডাক্তারী ঔষধে লাগে ।

সুগন্ধা—১ সুগন্ধী তুল, ২ তুলসী  
গাছ, ৩ ঝংই ।

সুতিক্তক—১ চিরতা, ২ মাদার গাছ ।

সুদাণ্ডিকা—গোরক্ষী নামে ক্ষুদ্র বৃক্ষ  
॥ রাজনি° ॥

সুখদর্শন, সুদর্শন—বৃহৎ পদুপ শাক-  
বি°, *crinum defixum*, *c.*  
*asiaticum*. জলাশয়ের ধারে  
প্রায়ই জন্মায় । ফুল বড় বড়,  
সাদা, রাত্রে গন্ধ বাহির হয় । কেশর  
৬টি । ফুলের নীচে ফল । পাতা  
লম্বা তরবারীর মত ॥ ইহার এক  
জাতি—*c. latifolium*. আজ-  
কাল প্রায়ই বাগানে রক্ষিত হয় ।  
ইহার পাতা ৪/৫ আঙ্গুল চওড়া ।  
ফুল সাদা, ধার ঈষৎ গোলাপী  
রংয়ের ।

সুদর্শনা—পদ্মগুলগ বৃক্ষ ॥ রাজনি°  
ভাবপ্র° ॥

সুদীর্ঘধর্মী—উদ্ভিদবি°, *marsilia*  
*quadrifolia*.

সুধা—সফাসিজ গাছ, পীংহিরদ্রা ।

সুন্দর—[ স° সুন্দর ]—সুন্দরী, সুন্দরী,  
*heritiera minor*. পাটলাদি-  
বর্গের আরগ্যতরুবি° । কাঠ শক্ত,  
লাল । নিম্ন বঙ্গে প্রচুর দৃষ্ট হয় ।



ব্রহ্মদেশ ও মালয় দ্বীপের সমুদ্র-  
তীরেও জন্মায়।

সুপারী, সুপারী, সুপারী—[ স°  
গদ্বাক, খপদর; তে° পাকায়;  
তা° পকুক, কোটাই-গফ্ফদ;  
ও° গদ্বা; উদ্দ° সুপারী; হি°  
সুপারী; ম° সুপারী; মালয়  
—সিরিহ; ব্রহ্ম° কদন; ইং  
areca nut ] সুপারি, areca  
catechu. তালাদিবর্গের বৃক্ষ  
বি°। দেখিতে সুন্দর। দক্ষিণ  
ভারতে ইহার চাষ হয়। বাংলা ও  
পূর্ব বাংলায় জন্মে। গাছের কাণ্ড  
৩০-৪০ ফুট উচ্চ। কোন ডাল-  
পালা নাই। পাতা ৪-৯ ফুট লম্বা;  
অনেক শাখা-প্রশাখা। পর্ষায়—  
পদগ, ক্রুমক, দীঘপাদপ, বকল  
তরু, চিকণ। প্রকারভেদ—চিকা-  
সুপারী—[ স° চিকন, চিকনা,  
চিকণ, চিকী; হি° চিকী; ম°  
চিকন সুপারী ]

সুপুপ—১ মাদার গাছ, ২ শিরীষ গাছ

সুপুপী—১ কলা, ২ লবঙ্গ।

সুপ্রতিষ্ঠিত—যজ্ঞভূম্বর।

সুফল—১ কংবেল, ২ পেয়ারা, শিমবি°।

সুবচলা—[ স° অতসী ] linum  
utilatissimum. সুবাবত° দ°।

সুবর্ণ—[ ইং thorn apple ] cassia  
fistula. ২ ঘটকুমারী, সোনালু  
দেখ।

সুবর্ণপুপ—[ globe amaranth ]  
১ ঘঁই, ২ সুগন্ধিতৃণ, ৩ ঘট  
কুমারী, ৪ তেউড়ী।

সুভগ—১ অণোক গাছ, ২ চাঁপা গাছ।

সুভগা—১ আরবীষ ঘঁই, ২ তুলসী।

সুভাজন—সজিনা গাছ।

সুরনায়কা—আম-আদা গাছ।

সুরপর্ণ—[ স° মাচাঁপটী ] ঔষধ  
বৃক্ষবি°।

সুমন—আমবৃক্ষ।

সুমন—১ যব, ২ ঘঁই।

সুমনা—১ যব, ২ নিম গাছ, ৩ বড় ঘঁই।

সুরজফল—কাঠাল।

সুরজন—সুপারি, areca catechu.

সুরবল্লী—[ স° সুবল্লী; তে° সুব-  
বুলি; ও° সুববুলি ] আচ্ছাদি  
বর্গের শাখাবহুল শাকবি°। ক্ষেৎ-  
পাপড়া গাছের মত। মলের ছালে  
লাল রং হয়। উড়িষ্যা ও মাদ্রা-  
জের সমুদ্রতীরে বালিতে জন্মায়।

সুরভী—১ ঘটকুমারী, ২ তুলসী, ৩  
ঘঁই।

সুরভীদারু—আমাদাগাছ।

সুরভীপত্রা—গোলাপজাম, eugenia

jambu.

সুরভীরসা—ঘৃতকুমারী ।

সুরাজক—চারাবিঁ, eclipta pro-  
trata.

সুরাণ্ড—দেবদারু বৃক্ষ ।

সুরেণ্ড—১ শালবৃক্ষ, ২ পদ্মগার্বি ।

সুর্ষাণ—[ সঁ সুর্নিষগক, শিতাবরী,  
শিখী; ওঁ সুনসুর্নিয়া; হিঁ  
শিবিয়ারী, চৌপতিরা; মঁ কুড়ু;  
গুজ্ঞঁ ওঁটিশন; কঁ খণ্ডকাতরা ]  
শার্কিবিঁ । marsilea quadrifo-  
lia. জল ও বর্দমস্ত স্থলে জন্মে ।  
ফুল হয় না । পাতা চতুর্পর্ন ।  
পাতায় চারি পর্ন । বঙ্গদেশের  
সর্বত্র জন্মে-পুকুরের কিনারায় ও  
ভিজে জমিতে বা ধানক্ষেতে ।  
পর্ষাণ—শিতাবরী, শিতাবর,  
সুচ্যাহ, সুচিপত্রক; শিখী, বল্ল,  
কুর্দট, মেধাকুণ্ড, কুর্দট ॥ রাজনিঁ ॥

সুর্ষাণ আলু—আলু দ্রু ।

সুর্ষবী, সুর্ষবী—১ উচ্ছে; ২ জীরা, ও  
কালজীরা; nigella indica.

সুর্ষেণ—১ ফলবিঁ, carrisa caran-  
das, ২ তেউড়ি ।

সুর্ষার—খয়েরবিঁ ।

সুর্করী—মস (moss) জাতীয় উদ্ভিদ,  
lycopodium imbricatum.

সুর্কমা—ভুই জাতীয়বিঁ ।

সুর্চিপদ্মে, সুর্চীপদ্মে—ফলবিঁ, pa-  
ndanus odoratissimus.

সুর্ষভক্ত, সুর্ষভক্তক—পুংপবিঁ; pe-  
ntapetes phoenicea.

সুর্ষমনি—গাছবিঁ; hibiscus phoe-  
niceus.

সুর্ষমুখী—[ ইং sun flower ]  
সোমরাজ্যাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবিঁ;  
halianthus annus. সাধারণত  
উদ্যানেই জন্মায় । ফুল হলদে  
রংয়ের, বীজে তেল থাকে । কোন  
কোন স্থানে ইহাকে 'রাধাপম'  
বলে ।

সুর্ষলতা—[ হিঁ হুর্লহুর্ল ] লতাবিঁ;  
cleome viscosa.

সুর্ষাবর্ত—[ সঁ—সুর্ষাবস্ত, সুর্ষালা,  
আদিত্যভক্তা, সুর্ষাবল্লী; হিঁ হুর্  
গুজ; কোঁ গুলটিয়া; মঁ সুর্ষ-  
ফুল; ওঁ সুর্ষজমুখী; কঁ হুর্ব-  
হুর্ব; তাঁ নাহিকুন্ডাঘ; তেঁ  
কুন্ডাভিমন্টা, সুর্ষকাস্তিমু; ফাঁ  
ওলে আফতাব্ পরস্ত; অঁ অরদ-  
মদন হুর্ডহুর্ড, বনশালতে; ইং  
dog mustard sticky ] cleome  
viscose, gynandropsis  
pentraphylla ফুলভেদে

[স]

দুইপ্রকার। যথা—১ শ্বেতপদুপী  
হুড়হুড়ে—[স° ব্রহ্মসুন্দরী] *cleome viscosa*. ইহার পশুপত্র।

২ পীতপদুপী হুড়হুড়ে—  
*gynandropsis pentraphylla*  
(according to Jaffray) এক  
হাত দেড় হাত উচ্চ বৃক্ষ। শাখা  
ও পাতা লোমশ ও চট্‌চটে।  
বীজ অতি ক্ষুদ্র সরিষার ন্যায়।

সেউতী—[স° সেবতী, শতপত্রী]  
*rosa moschata*. পদুপ বৃক্ষ।  
দেশী গোলপ। ফুল সাদা সুগন্ধ,  
বহুদল।

সেখিনী—[স° মৃগেবীরু] পদুপ-  
বৃক্ষ।

সিংহলীলতা—উৎকৃষ্ট।

সেগুন, সেগোন—[স° শাক; খরপত্র।  
হি° শগুন; বো° খরপত্র; ম°  
সোয়ে; কন্যা—নেগর; আসাম-  
চিংজাও; ও° সিঙ্গুর; তা°  
টেকর; তে° পেডাটেক; ই° teak]  
গাম্ভীর্যাদিবর্গের বৃহৎ বৃক্ষ।  
গাছ ৮০ থেকে ১৫০ ফুট উচ্চ।  
মাঝের কাঠ হলুদে রং পরে লাল  
হয়; কোমল কিন্তু দীর্ঘকালস্থায়ী।  
পাতা লম্বা, ডিম্বাকৃতি। বসন্তে  
পাতা করিয়া যায়। ফল পোষ

মাসে পাকে। পর্যায়—শাক; ক্রকট-  
পত্র, খরপত্র, অতিপত্রক, মহীসহ,  
শ্রেষ্ঠ কাঠ, শিরসার, গুহদ্রুম।  
দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতের  
অরণ্যে জন্মে। ডাল কাটিয়া  
পুতিলেও গাছ জন্মায়। ব্রহ্মদেশ  
ও যবদ্বীপজাত সেগুন প্রসিদ্ধ।

সেতুভেদী—দন্তীবৃক্ষ, *croton poly-*  
*andrum*.

সেটোলীন—[ইং *santonin*] *arti-*  
*mlsia maritima*. পশ্চিম  
হিমালয়ে জন্মায়। কৃমির  
ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

সেথফুল—ফলবৃক্ষ।

সোঁদাল, সোঁদাল—[স° আরগরু;  
চতুরঙ্গলা, শ্বর্নাঙ্গ; হি° আমল-  
টাস, আমলতাস, গিরমালাই; ও°  
সুন্যারি, সন্দারি; ম° বাহড়া;  
গুজ° গরমল; তা° কোলি, কউ;  
তে° সুবনম] কাণ্ডাদিবর্গের  
ক্ষুদ্র বৃক্ষ। সোনাঙ্গ গাছ,  
*cassia fistula*. মধ্যমাকার গাছ;  
২৫-৩০ ফুট উচ্চ। কাণ্ড সরল,  
গাছের ডাল নরম ও অবনত, ফুল  
কাঁচা সোনার রঙ; সুগন্ধযুক্ত, ফল  
লম্বা, পাকিলে লাল হয়। কাণ্ড  
শক্ত, নীল। পর্যায়—কর্ণিকার,

রাজতরু, সুবর্ণক, সম্পাক, রাজ-  
বৃক্ষ, প্রগ্রহ, সুফলা, পবিব্যাধ,  
ব্যাদিরপদ, স্বর্ণপদ্প, স্বর্ণদ্রু,  
হেমপদ্প, নৃপদ্রুম, আরেবত,  
আরগব, মহারাজদ্রুম । রাজনি°  
শব্দ° ॥

সোনাগাছ, সোনালা—[ স° আমলতাস,  
সুবর্ণ, আববধ; রাজকৃষ্ণ, সম্পাক ;  
হি° অসলতাম্ ঘনবহেড়া ; কো°  
কানাইলাড়ি, বাসরলাঠি ; ম°  
বাহবা, বাবাচ্যা, সত্ৰাতিলগব ;  
গুজ° গরমানো, রগমালোনা,  
গোল ; ক° বড়িলবাহবাহেগাক;  
তে° রেলকায়ী ; অ° খ্যারেচম্বর ;  
ও° সন্দরী, শোনারী ; আ°  
কানাইলাড়ী ; ইং purging  
cassia ] সোঁদাল, cassia  
fistula, cathartocarpus  
fistula. কাণ্ডাদিবর্গের অতি  
ক্ষুদ্র বৃক্ষ। যেখানে সেখানে  
জন্মায়। পক্ষকার পাতা প্রায়ই  
৩৬ জোড়া হয়। ফুল বৈশাখ-  
জ্যৈষ্ঠে হয়, কাঁচা সোনার রং, ফল  
প্রায় একহাত লম্বা, কাঁঠ শক্ত,  
লাল। প্রকারভেদ—ছোট  
সোনালা—[ স° কণিকা র ]  
কনিয়ার।

সোনালা—[ হি° সন্ডামাকী, সনা ;  
ম° সোনালা ; আ° সেনা ; ইং  
senna ] cassia angustifolia  
কাণ্ডাদিবর্গের ছোট বৃক্ষবি° ।  
দক্ষিণ ভারতে ইহার চাষ হয়

সোঁদাল—সোঁদাল দ্র° ।

সোভাঙ্গন—শোভাঙ্গন, সজিনা গাছ ।

সোমপত্র—তুর্গবি°, saccharum  
cylindricum.

সোমবল্ল—কটফল, কদর, ২ খয়ের  
বি° ।

সোমবম্পরী—[ ইং moon-plant ]  
সোমলতা চারাবি°, sarcostema  
viminalis.

সোমবল্লী—সোমলতা দ্র° । পর্যায়—  
মহাগুহ্ম, যজ্ঞশ্রেষ্ঠা, ধনুলতা,  
সোমাহী, গুহ্মবল্লী, বিজাপ্রিয়া,  
সোমক্ষীরা, যজ্ঞাঙ্গা । দাক্ষিণাত্যে  
ও শুল্ক পর্বতীয় প্রদেশে জন্মে ।  
পত্রহীন গুহ্ম, শাখায় অনেক  
গাঁঠ আছে ।

সোমরাজ—[ স° সোমরাজী, বাকুচী,  
অবলগুজা, চন্দ্রলেখা, কৃষ্ণফলা,  
পুতিফলা ; হি° বুরুচি, বকুচি,  
বকুচিদানে, কালোজী ; কো° সরাই  
তিতা ; ম° বাবিচি, বাউচি, কালো  
জীরা ; গুজ° কড়বীজি, কাদ-

[স]

বোজ্জিরি; ক° বাউচিনে; তে°  
কিড্ডিঙ্গিরি, অম্ভজলাকারা; তা°  
কটুসিরাগম্] হাকুচ, বাকুচি,  
শিম্বাদিবর্গের গ্রাম্য বন্য বর্ষায়  
শাকবিশেষ। পর্ষায়—বাকুচি,  
সোমরাজী, সোমবল্লী, সুবল্লিকা,  
সিতা; সিতাবরী, চন্দ্রলেখা, চান্দ্রী;  
সুত্রতা, কুষ্ঠহস্ত্রী, কোম্বোজী,  
ঐন্দবী, চন্দ্রাভিষা ॥ রাজনি° ॥  
purple fleabane; serratula  
anthelurintica, vernonia a.  
আসাম প্রদেশে; কোচবিহারে জন্মে,  
শীত কালে হয়। ফল কাল;  
জীরার মত।

সোমলতা—[ স° সোমবল্লবী, মৎস্যাক্ষী  
বিজাপ্রিয়, ইন্দ্রলেখা, ইন্দ্রলেখা,  
সোমক্ষীরি; হি° সোমবল্লী; ম°  
রগসের; ইং moon plant ]  
অকাঁদিবর্গের আরণ্য লতাবি°।  
পাতা নাই। ডাটা আধ ইঞ্চি মোটা,  
শাখাবহুল। ফুল সাদা গন্ধহীন;  
প্রায় আকন্দ ফুলের মত। শীত-  
কালে ও বর্ষায় দুইবার ফুল ধরে।  
ছোটনাগপুরে জন্মে। উড়িষ্যাও  
কচ্ছিৎ দৃষ্ট হয়।

সোরগুজা—সরগুজা দ্র°।

সৌগন্ধিকা—[ ইং blue lotus ]

কমল দেখ।

সৌবর্ণভেদিনী—প্রিয়দ্রু চারাবি°।

সৌভাজন—সাঁজনা।

সৌম্য—ষষ্ঠ ডুমুর।

স্থলপদ্ম, স্থলপদ্মিনী— স্থলপদ্ম,  
গুরুবি°। hibiscus mutabilis.

স্থলমঞ্জুরী—আপাঙ গাছ; আপাঙ দ্র°।

স্থলশৃংগাট—চারাবি°, tribulus lan-  
uginosus.

স্থানচণ্ডা—চারাবি°, ocimum  
pilosum.

সিন্ধদারু—দেবদারু গাছ, pinus-  
longifolia.

সিন্ধপত্র—কুল বা বদর গাছ।

স্পর্শলজ্জা—লজ্জালতা।

স্পর্শা—ককালি বৃক্ষবি°।

স্ফুজ—আবলুস কাষ্ঠ বৃক্ষ, diospy-  
ros glutinosa.

স্বগুপ্তা—আলকুশী গাছ।

স্বর্ণপদ্ম—১ চাঁপা গাছ, ২ সোনালী  
গাছ, ৩ বাবলা গাছ।

স্বর্ণপদ্মপা—বিষলাক্ষলিয়া।

স্বর্ণকলা—চাঁপাকলা।

স্বর্ণক্ষীরী—[ স° ইভরা, ইভবা ]  
ঔষধি বৃক্ষবি°।

স্বর্ণমুহি—[ স° হেমমুখিকা, হেম  
পুষ্পিকা; হি° পিঠমালতি; বো°

স্বভগ্ন ধাই ; ম' সোনেজুই ]  
সুস্কর লেমমবৃত্ত খাড়া গুল্ম ।  
*jasminum humillis.* গাছ  
দেখিতে অতি সুন্দর । ছাল পাতা  
ধূসরবর্ণ, কাঠ সাদা ।

স্বর্ণলতা—[ স' অমরাবেল, আকাশ  
বল্লী ; হি° আকাশবেল ; ম' অমর-  
বেল ; তে° শীতাম্মা-পাউ-নল ]  
আলোকলতা, পত্রশ্যো জড়ানো  
লতা, *cuscuta reflex.* Rox.  
শাখা নরম, গোলাকার, হরিদ্রাবর্ণ,  
ফুল সাদা, ছোট বোঁটাগ্ন থাকে ।  
ফুল এক স্থানে গুচ্ছবন্ধ হয় ।  
ফুল সৌগন্ধযুক্ত । পষাণ—

খবল্লী, আকাশবল্লী, ব্যোমবল্লেকা,  
অশ্বশ, বল্লীপষাণগ, আকাশ  
নামপূর্বা ॥ রাজনি° ॥, স্বর্ণজীবন্তী ।

স্বয়ংগুপ্তা—আলকুশী গাছ ।

স্বপফলা—[ স' অপরাজিতা ]

স্বাতী—বহুশাখ তৃণবি°, *penniset-  
um setasum.* ধান্যবর্গের  
বর্ষায়ু ঘাস বিশেষ । মোটা ও  
বহুশাখা সম্ভবত । পাতা সরু  
সরু । ফলে সোঁরা আছে ।

স্বাদুগন্ধা—লতানে গাছবি°, *convol-  
vulus paniculatus.*

স্বাবয়—ডালিম গাছ ।

স্বদজগাক—ছত্রাক, ছাতা ।

[ ২ ]

হংসপদী—[ ইং maiden hair ]  
ক্ষুদ্র গাছবি°, *cissus pedata*;  
*adiantum capillus veneris.*  
হাঁসের পায়ে মত দেখতে বলে এই  
নাম । সাধারণত হিমালয় প্রদেশে  
জন্মে ।

হংসপাদী—গুল্মবি°, *clitoria ter-  
nata.* ॥ উইল ॥

হংসবতী—লতানে গাছ, *nerium  
odorum* ॥ উইল ॥

হংসরাজ—ক্ষুদ্র গাছবি°, *adiantum  
venustum.* পাতা ঝিল্লিযুক্ত,  
কয়েক অংশে বিভক্ত । পষাণ—  
হংসপদী, হংসপাদী, কীটমাতা,  
ত্রিপাদিকা ।

হয়মারণ—অশ্বগাছ ।



হয়ানন্দ—মৃগ, মাষকলাই ।

হরকুচ কাটা—[ স° হরিকসা ; হি°

হরকুচ কাটা ; তা° কোনিমুল্লী ;

ম° মারাণ্ডী ; তে° এটিবিলা ]

হারগোজা, *acanthus ilicifoli-*

*us*. গুল্মবি° । সবুজপাতা ।

গ্রীষ্মকালে ফুল ও ফল হয় । নদীর

কিনারায় জন্মায় ।

হরিচন্দন—দেবতরুবি° ।

হরিতাল, হরিতালিকা—তৃণবি°, *pan-*

*icum dactylon*.

হয়ের—[ স° বন্যতিস্তিকা ; বসনবল্লী,

বসদানী ] হয়ের, *cocculus*

*villosus*. লতানে গাছ ; প্রায়

সকল স্থানে হয় । ডাটা লম্বা,

কোমল ও সূক্ষ্ম লোমাবৃত । ফুল

পাতার গোড়ায় গুচ্ছবন্ধ থাকে ।

হরিতাল—দুর্বাঘাস ।

হরিদ্রা—[ স° রজনী ; কো° হলদি ;

ম° হৃষ্টদ ; গুড়জ° হলদর ; ক°

অশিনা ; তে° পসুহ ; ফা° জবদ-

চোর ; ও° হলদ ], *termeric*

*murmeric, curcuma longa*.

প্রকারভেদ—১ কপূরহরিদ্রা ২

বনহরিদ্রা—[ অরণ্য হলদি ; হি°

জল্লী হলদী ; তে° , তা° কস্তুরি-

মানজন ] বর্ষজীবী গুল্মজাতীয়

উদ্ভিদ । জল্লী হলদি, বন হলদী

*c. aromatica*. পাতা চওড়া,

নীচের পিঠ রোমশ ; ৩ আন্বগাশ্ব

হরিদ্রা—আম-আদা, *c. amoda*.

৪ দারুহরিদ্রা—[ দাবী, হরিদ্রা ]

দারুহলদি, *berberis asiatica*.

৫ কালাহলদি—নীলকণ্ঠ, *c.*

*caesia*. ফুল ফিকে হলদিবর্ণ ও

ছোট, পাতার খোল লালচে ।

পষাণ—হরিদ্রা, হরিদ্রজনী, বর্ণ-

বর্ণা, সুবর্ণা, শিবা, কাণ্ডী,

বর্ণিনী, দীর্ঘরাগা, হরিদ্রী, পীতা,

বরাণী, গোরী, জনিষ্ঠা, বরা,

বর্ণদাত্রী, হরিতা, কুমিল্লা, বিষয়ী,

বরবর্ণিনী, মজল্যা, লক্ষ্মী, ভদ্রা,

হরবিলাসিনী, শোকা, শোভনা,

সুভাগা, শ্যামা, যৌষিৎপ্রিয়া,

জয়ন্তিকা, বিলাসিনী ॥ রাজনি° ॥

এই উদ্ভিদের বর্ষার প্রারম্ভে ফুল

হয় । সমগ্র ভারতে চাষ হয় ।

হরিদ্রাভ—বৃক্ষবি°, *pentaptera*

*tomentosa*.

হরিনামা—মৃগবি° ।

হরিনেত্র—শ্বেতপদ্ম ।

হরিতকী—[ স° হরীতকী, অভয়া ;

হি° হংবে, হবড়া ; কো° কশাল ;

ম° হিরডা ; হতুকী ; গুড়জ° হরডে ;

ক'অনিলের; তে' করকাপ; তা' কদুকাই; কড়কে; ও' হরিডা; কাবেরী; প্রা' কলরা; ফা' হলৈলে কলঞ্জীরে জবী অক্ষর; ই' chebulic or black myrobalam ] হতু'কী; হরিতকী; terminalia chebula. গাছ ৪০-১০০ ফুট উচ্চ। কাঠ শক্ত; ধূসরবর্ণ ও সবুজ আভাযুক্ত। শীতকালে পাতা পড়ে যায়। ফলের আকৃতি সমস্তগুলি সমান নয়—কোনটা লম্বা, কোনটা বেঁটে। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। পাকা ফলকে বলে হতু'কী। কাঁচাকে বলে জাঙ্গী হতু'কী। প্রকারভেদ—১ শ্বেত হরিতকী। ২ কৃষ্ণহরিতকী; black myrobalam. ৩ জংলী হরিতকী [ স' চেতকী ] কাঁচা হরিতকী। আয়ুর্বেদে সাত রকম হরিতকী—১ বিজ্জয়া (লাউয়ের মত গোল), ২ রোহিণী (গোলাকার); ৩ পত্না (পাতলা ছাল বিশিষ্ট), ৪ অমৃত (শাঁসাল ও মাংসাল); ৫ অভয়া (পঞ্চরেখাবিশিষ্ট); ৬ জীবন্তী (স্বর্ণবর্ণ), ৭ চেতকী (ত্রি রেখা যুক্ত)। পর্যায়—হরিতকী, হিমবতী, জয়া, জীবপ্রিয়া, জীব-

নিকা, জীবন্তী, জীব্যা, অভয়া, শিবা, চেতনিকা, রোহিণী, পথ্যা প্রপথ্যা, পত্না, প্রাণদা, অমৃত ভিষ্মরা, দিবা, বিজ্জয়া, কায়স্থ্য ॥ রাজনি ॥ বয়ড়া, অজুর্ন প্রভৃতি বৃক্ষের ন্যায় বৃক্ষ। ভারতবর্ষে প্রায় সকল স্থানেই জন্মে। বর্ষে বর্ষে পাতা ঝরিয়া পড়ে।

হলকসা—দ্রোণপদুস্পী; ঘলঘসে, leucas linifolia spreng. বর্ষ-জীবী ঘনপত্রবিশিষ্ট উদ্ভিদ। প্রকারভেদ—১ বড়ঘলসসে, l. cephalotes s. ২ ছোট ঘলঘসে lanica l. aspera. পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, পর্বতীয় প্রদেশে জন্মায়। হলদেবরবী—পীঠরবী, কলকে ফুল, thevetia nerifolia. করবীদ্র°।

হলদেবসস্ত—[ গুজ' ভিটাচাটি; ম' ঢোল; বো' গজাদার ] বর্ষায়ু গুল্ম, lindenbergia urticaefolia lehn. গুল্ম ৮-১০ ইঞ্চি উচ্চ হয়। কাণ্ড ও পাতা লোমযুক্ত, শাখা বহুপত্রবিশিষ্ট। প্রত্যেক গাটে গাটে ফুল হয়। সমগ্র ভারতে পুরাণে ঘেওলালে, নদীর কিনারায় জন্মে। ফুল ছোট হলদে রংয়ের। কেশর ৪ ২টি বড়, ২টি ছোট।

হারিপ্রসন্ন—কন্দব, কন্দমগছ, *mauclea cadamba*.

হস্তিকন্দ—এক প্রকার বৃহৎ মূল।

হস্তিকর্ণ—১ এরশবৃক্ষ। ২ কিংশুক গাছ।

হস্তিকর্ণদল—কিংশুকবৃক্ষ, পলাশ গাছ, *butea frondosa*.

হস্তিকর্ণপলাশ—[ স° লতাপলাশ ; হি° পলাশলতা ; গুজ° ভেল-থাকর ; তে° টিগি-মোথু ; বো° পলাশভেলা ] লতাপলাশ, *butea superba*. এই গাছ পলাশের মত। কেবলমাত্র লতাইয়া অপর গাছে উঠে। গাছের কাণ্ড মানুষের উরুর মত মোটা। পাতা ও ফুল প্রায় সমান। উড়িয়া, বঙ্গ, কক্সনদেশ, বর্মী প্রভৃতিতে জন্মে।

হস্তিকর্ণা—কন্দশাক।

হস্তিকোলি—কুলবি°।

হস্তিবোধলতা—ঐতী।

হস্তিপর্ণী—১ মোরটলতা, ২ লাউ, কুমড়া।

হস্তিশূড়ী—হাতিশূড়ী, *heliotropium indicum*.

হাকুচ—[ স° বাকুচী, সোমরাজী, সোমবল্লী, বৃচ্চিক হাকুচ, তিক্তবীজ ] গুজ°-বি°, হাকুবীজ,

বৃচ্চিন্দানা, সোমরাজী, *serrata anthelmintica*, *psoralea corylifolia*.

সরল বর্ষজীবী গুজ°। গাছ ১—৬ ফুট উচ্চ, পাতা শক্ত ও ঈষৎ গোলাকার, ফুল হলদে, শীতকালে ফুল ও গ্রীষ্মকালে ফল হয়।

হাকুচকাটা—বাসকাদিবর্গের আরণ্য শাকবি°, *acanthus ilicifolias*. কষ্টকপূর্ণ। পাতা বহুধাছিন্ন। ফুল নীল রংয়ের। বর্ষাকালে ফোটে। জলার ধারে, খালের ধারে জন্মায়। কেশর ৪টি, ২টি বড় ২টি ছোট।

হাজারমণি—[ স° তাম্রবল্লী ] *phyllanthus urinaria*. বর্ষায় শাকবি°। ভূ-ই-আমলার মত গাছ। পাতা ছোট ছোট। ফুল ছোট ঈষৎ সবুজ বর্ণ। ফুলে বোঁটা নাই। বার মাস ফল ( ঘস্ঘসে ) ফলে। প্রায়ই গাছের ছায়ার জন্মে। গাছ শীতকালে বেশী জন্মে। পাতা ঘন-ঘন, নরম ও সূক্ষ্ম লোমবৃন্ত।

হাড়জোড়া—[ স° গ্রীষ্মমান, অস্থি-ভঙ্গী বজ্রবল্লী : ও° হাড়জোড়া,

পাৰোঁরি; তেঁ নাল্লৈড়; মঁ  
 তিধারী; হিঁ হড়সকারী, হমোড়;  
 গুজঁ তরধারী ] আরণ্য চতুষ্কোণ  
 বোঁহণী বিঁ। *vitis quadrang-  
 ularis*, *classus q.* পাতা এক  
 পাশে, শিকড় আর এক পাশে।  
 লতানে উদ্ভিদ। অনেকদূর পর্যন্ত  
 বিস্তৃত হয়। কখনও কখনও পত্রহীন  
 দেখায়। পাতার কিনারা করাতে  
 মত। ফল গোলাকার, লাল; রসাল  
 মটরের মত। পর্যায়—গ্রীষ্মমান  
 অস্থিসংহার, বজ্রাঙ্গী, অস্থি-  
 শৃঙ্খলা ॥ ভাবপ্রঁ ॥ বহুদেশে  
 সর্বত্র বনে জঙ্গলে দেখা যায়।

হাতাজুড়ি—[ সঁ হস্তজ্যোড়ি ]

হাতিচোক—*heliathus tuberosa*.

হাতিশুঁড়; হাতিশুঁড়া—[ সঁ হস্তিশুঁড়ী,  
 সঁ পত্রিকা. হস্তিশুঁড়া; হিঁ

হাতিশুঁড়া; তাঁ তলশুঁড়ি, নাগ-

দন্তী—হাতিশুঁড়া; তেঁ তেলকটুকা

গুজঁ—হাতিশুঁড়না ] হাতিশুঁড়া।

*heliotropium indicum*, *h.*

*cordifolium*. বন্যবর্ষায় ক্ষুদ্র

শাকবিঁ। ফুল নীল রংয়ের।

পাতার রস ঔষধার্থে ব্যবহৃত।

মঞ্জরীতে দুই সারি ফুল জন্মে।

হানাজুড়ী—[ সঁ পাষণভেগন ]

বৃক্ষবিঁ।

হাপরমালি—[ সঁ আশ্ফাতা, ভদ্রবল্লী ;

হিঁ রামশর ; তেঁ পলা-মাল্লী-

তিব্বা, ইং *wild variety of*

*jasmine* ] তগরাদিবর্গের

লতানো ক্ষুদ্রপরিঁ, *vallaris*

*heynei*, *echites dichotoma*,

মাটিতেই পাঁড়িয়া থাকে। শৃঙ্খ

ভূমিতে জন্মে। ডালের গাঁট

থেকে শিকড় বাহির হইয়া মাটির

মধ্যে প্রবেশ করে। পাতার রোম

নাই এবং কর্কশ; ছাল ফিকে।

পাতার উপর দিকে চিক্কণ।

পাতা ছিঁড়িলে সাদা আটা

বাহির হয় ডালেও সেইরূপ।

ফুল সাদা; গন্ধ বকুলের মত। রাঢ়ে

এই ফুল দিয়া মেয়েরা রত পূজা

করে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে

দুবার ফোটে। ফল লম্বা, খোল

পূর অশযুক্ত।

হাকুন—[ সঁ দন্তী ; হিঁ হকুম ; মঁ

দান্তি ; বেঁ জাম্বলকোটা ; তাঁ

নিরাদিমুট্ট। তেঁ নাগদন্তী ]

দন্তী; *baliosperinum axill-*

*are blume*. গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ।

পাতা চাগড়ার মত শক্ত। কিনারা

দাঁতযুক্ত। ছোটনাগপুত্র, বিহার,

ত্রিহৃত, দক্ষিণ ভারত, বর্মা, বঙ্গ  
প্রভৃতিতে জন্মে।

হালিস—বড় চারা গাছ, *aegiceras*  
*fragrans*, পেনিনসুলায়, জাভায়  
জন্মায়। ২ ছোট-চারা গাছ, *a.*  
*majus*. গজার খারে জন্মায়।

হালিম—[সং চন্দ্রসুর, চন্দ্রিকা; হি°  
চানসউর, হালিম; প° শারগদ্বাঙ্গ;  
ম° অহলিড; গুজ° অশালিড;  
তা° আলিভেরাই; তে° আদেল;  
ইং *cross*] সর্বপাদিবর্গের শাকবি°,  
*lepidium sativum*. ঘনপাতা-  
যুক্ত। ফুল ছোট সাদা। বিহার  
প্রদেশে ইহার চাষ হয়। শূটী  
চেষ্টা; দল ২টা। পর্বাস—  
চন্দ্রিকা, চম°হস্তী, পশুমেহন  
কাঁহিকা, নন্দিনী, কারবী, ভদ্রা,  
বাস্তুপুপা, স্রবাসরা ॥ ভাবপ্র°।  
সমগ্র ভারতে ও তিব্বতে ইহার  
চাষ হয়।

হিংগ্, হিংগ্—হিং, হিংগ্। প্রকারভেদ  
—বাহলীক (*Balkh*) দেশজাত  
বাহলীক হিংগ্—*ferula alliacea*.  
২ হিংড়া—পারস্য, অফগানিস্তান  
ও পঞ্জাব দেশজাত—রামঠ হিংগ্,  
*ferula foetia*. হিংগ্ গাছের  
আঠাকে হিং বলে। ৩ নাড়ী

হিংগ্—[সং বংশপত্রী] তৃণবি°  
ধান্যাদিবর্গের শাকবিশেষ।  
গাছের মূল ইহাতে প্রাপ্ত নিষাসকে  
হিং বলে (*asafetida*)। গম্বিরজা  
এক প্রকার হিংগ্ (*galbanum*)।

হিঙ্গুল—[সং সুরত, হংসপাদ]।

হিজল, হিজল—[সং হিজল,  
নিচল, নদীজ, নদীকান্ত, দীর্ঘ  
পত্রক, অম্বুজ, অদল; হি°  
সমুদ্রের কল; ও° কঞ্জোলা; তা°  
কদ্‌পদ্ম; কাদাপ্লাই; ম°  
পর্যাল; তে° কনপকনগী, কাদাপ্লাই]  
হিজল, *barringtonia acutan-*  
*gula*, নিচল গাছ; জম্বুকাদিবর্গের  
মধ্যমাকৃতি গাছবি°। ৩০-৪০ ফুট  
উচ্চ। পাতা গোলাকার। গাছের  
ছাল পুরু; ধূসর বর্ণ; কাঠ সাদা,  
নরম। ফুল প্রায় দেড় হাত লম্বা,  
লাল। কাঁচাফল বাদামের ন্যায়  
দোঁধিতে। ভিতরে সাদা শাঁস  
আছে। গ্রীষ্মকালে ফোটে।  
বসন্তকালে পাতা করিয়া যায়।  
জলাশয়ের খারে জন্মায়। বীজ  
ও পাতা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।  
এই গাছকে ভারতীয় 'ওক', গাছ  
বলা হয়। হিমালয় ইহাতে বৃন্দনা  
পর্বত তীরবর্তী প্রদেশ—অযোধ্য



বহু, ২য় ও দক্ষিণ ভারতে  
জন্মে।

হিজলীবাদাম—বাদাম দ্রু।

হিঙ্গা—[ সঁ হিলমোচিকা, উৎপাদিকা ;  
হিঁ হুর'ডল; কোঁ হেলেন্সা ; উস'-  
হিরমিচা ; ওঁ হিডিমিচি ] হিণ্ডে-  
শাক, হেলেন্সা, eubrydra fluc-  
tans, e. hinch. সোমরাজ্যা-  
দিবর্গের জলজ শাকবিঁ। তিস্ত।  
বাংলাদেশে প্রচুর জন্মে। পাতা  
সরু লম্বা। বাঞ্জনাথ বাবহৃত  
হয়।

হিমসাগর—[ সঁ বটপত্রী ; হেমসাগর ;  
হিঁ পাথরচুর ; তাঁ মালাকুলি ;  
তেঁ পিণ্ডচেট্টু ] হিমসাগর,  
হেমসাগর। kalanchoe laci-  
niata দীর্ঘাঙ্গু শাকবিঁ।  
পাথরকুচি, গাছের মত। মাংসল  
উদ্ভিদ। পাতার কাণ্ডের দ্বাৰা  
পক্ষাকারে পাতা পড়ন, করাতে  
মত দীর্ঘাঙ্গু। বর্ষাকালে  
ফুল ও শীতকালে ফল হয়।  
হলদে রংয়ের। দাক্ষিণাত্যে,  
বঙ্গদেশে, পাটনায় জন্মে।

হিলমোচি—শাক, পুঁতিকা শাক,  
hingtsa repens.

হুড়হুড়া—[ সঁ আদিত্যভক্তা, বরিশ্ঠা,

হরহুরা, অক'কাশ্ঠা ; হিঁ বন  
শলতে ; বোঁ হলহুল ; পুজ'  
অনসারিস ] সুর্ষাকর্তা, বর্ষাজীবী  
আরণ্যশাকবিঁ, cleome viscosa.  
পাতা চটচটে রোমশ, ৫০  
আহুল। কাণ্ড নরম, ফুল হলদে  
রংয়ের, পুংকেশর অনেক। শীতকালে  
লম্বা। শীতকালে পড়ো জ্বর-  
গায় জন্মে। আর এক জাতির  
ফুল লাল। ২ শাদা হুড়হুড়ে,  
gynandropsis pentaphylla.  
ফুল শাদা, কেশর ৬টা, শীতকালে  
পতিত জ্বরগায় জন্মে।

হুড়হুড়িয়া—achyranthes as-  
pera.

হেতাল—[ সঁ হিঙ্গাল ] হিতাল,  
হেতাল, phoenix paludosa.  
তাল্যাদিবর্গের স্বর্ষাকালের গাছবিঁ।  
সুন্দরবনে, সমুদ্রের নিকটবর্তী  
অরণ্যে, মহানদী, মোহানার  
নিকটস্থ অরণ্যে জন্মে। ২০ ইঞ্চি  
মোটা ও ১০১২ হাত লম্বা হয়।

হেমতরু—ধাতুরা [ thorn apple ]।

হেমদংশক—যজ্ঞভূম্বর, ficus glome-  
rata.

হেমপ্প—১ অশোকবৃক্ষ, ২ চীনা  
গোলাপ, ৩ চীনাফুল।



হেমপুস্পী—মানার গাছ ।

হেমাঙ্গ—চম্পকবৃক্ষ, *Michelia*  
*champak*.

হেলাফুল—কুমুদ ।

হোপা—[সং দীর্ঘপটোলিকা] চিচিনা,  
*Trichosanthes anguina*.

কষজীবী লতানে গাছ । পর্বায়—  
দীর্ঘপুস্পী, খটাজী, খট্টা, কপাট  
বংশা, কাকোলী, কোলপালিকা,  
খট্টাপাদী । রাজনি ।

হেলিগি—শাকবি, পুতিকা ।

হৈম—হলদে যাই ।

হৈমবত—হরীতকী ।

হোপা—[সং এরকা, ওন্দ্র ; হি  
গোন্দপাটর; মং পানিসবত ; গুজ  
পাল্য ঘাতাজী ; হাং চাম্ব ; ইং

*elephant grass typha*]

শাকবি, *typha elephantina*  
*rox*. জলাশয়ের ধারে জন্মায় ।

পাতা সোজা—সোলার মত ফাঁপা  
ফস্কা । প্রায় ৬।৭ হাত লম্বা ।

ইহার দুইজাতি—১ *typha*  
*elephantina*. পাতা তেকোণা ।

২ *typha angustata*. পাতা  
প্রায় অর্ধগোল । উভয়বঙ্গে ও

রূপানারায়ণ নদীর তীরবর্তী  
স্থানে জন্মে । সচরাচর পুকুরের  
ধারে ও জলাভূমিতে হয় ।

হোরের—[সং হ্রীবের, বালা] বালক  
দেখ ।

হুদিদনী—গাখিবরজা, কুম্ভ ।

# উদ্ভিদ-গোত্রসমূহ

acanthaceae—বানকগোত্র	liliaceae—লিলিগোত্র
anonaceae—আভাগোত্র	magnoliaceae—চম্পকগোত্র
apocyanaceae—করবীগোত্র	mimoseae—বাবুলা উপগোত্র
aroldeae—কচুগোত্র	musaceae—কদলী উপগোত্র
asclepiadaceae—অর্কগোত্র	nymphaeaceae—পদ্মগোত্র
caesalpineae—কাশ্মনগোত্র বা উপগোত্র	orchidaceae—রাশ্নাগোত্র
cannaceae—সর্বজন্মা-উপগোত্র	palmaceae—তালগোত্র
caryophyllaceae—লবঙ্গগোত্র	papaveraceae—শিয়ালকটিগোত্র
compositeae—গেঁদাগোত্র, ভুজ- রাজাদিবর্গ	papilionaceae—শিম্বী উপগোত্র
convolvulaceae—কলস্বীগোত্র	pinaceae—সরলগোত্র
crucifereae—স্বর্ষপগোত্র	ranunculaceae—পদ্মপত্রগোত্র
cucurbitaceae—কুম্ভাভগোত্র	rhamnaceae—বদরীগোত্র
cyanophyceae—নীলহরিৎ শৈবালগোত্র	rosaceae—গোলাপগোত্র
cyperaceae—মুস্তকগোত্র	rutaceae—নিম্বগোত্র
euphorbiaceae—এরুডগোত্র, স্নদুহিআদিবর্গ	sapindaceae—লিচুগোত্র
gramineae—ধানাগোত্র	solanaceae—বারতাকুগোত্র
labiateae—ভুলসীগোত্র	tiliaceae—পাটগোত্র
leguminoseae—শিম্বীগোত্র	umbelifereae—ধান্যাদিগোত্র
	। সা-প-প ।, ছত্রপদ্মপত্রী গোত্র
	। সা-প-প ।
	urticaceae—বটগোত্র
	verbenaceae—সেগুনগোত্র

[ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কেন্দ্রীয় সমিতি কর্তৃক ১৯৩৫  
সালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা—উদ্ভিদবিদ্যা হতে সংকলিত ]

# বৈজ্ঞানিক নামের পরিভাষা

<i>abrus precatorius</i> —কঁচ	<i>amarantus polygamus</i> —চাঁপানটে
<i>acacia arabica</i> —বাবলা	<i>amarantus tristis</i> —নটে শাক
<i>acacia catechu</i> —খয়ের	<i>amorphophallus campanulatus</i> —ওল
<i>acacia concinna</i> —বনরিঠা	<i>amphidonax karka</i> —নুল খাগড়া
<i>acacia farnesiana</i> —বিটখদির	<i>anacardium occidentale</i> —কাজু বাদাম
<i>acacia leucophlea</i> —সাদা বাবলা	<i>anacardium orientale</i> —চিরেতা
<i>acacia minosa</i> —গুরে বাবলা	<i>anacyclus pyrethrum</i> —গাদা- জাতীয়
<i>acacia sirissa</i> —শিরীষ গাছ	<i>androphalis paniculata</i> —কাল- মেঘ
<i>acacia suma</i> —শমী গাছ	
<i>acalypha indica</i> —মস্তাবুদি	
<i>achyranthes aspera</i> —আপাং	
<i>aegle marmelos</i> —বেল	
<i>aeschynomene aspera</i> —শোলা	<i>andropogon serratus</i> —দেওতাড়
<i>aeschynome sesban</i> —জয়ন্তী গাছ	<i>andropogon squorresus</i> —বেণা
<i>agaricus campestes</i> —বেগের ছাতা	<i>anona reticulata</i> —নোনা
<i>agati grandiflora</i> —বকবৃক্ষ	<i>anona squamosa</i> —আতা
<i>agave americana</i> —বিলতি আনা- রস	<i>anusa sativa</i> —আনারস
<i>agave perfoliata</i> —বৃতকুমারী	<i>araches hypogaea</i> —বাদাম
<i>alaristes tribola</i> —আখরোট	<i>argemone mexican</i> —শিয়ালকাটা
<i>allium cepa</i> —পিঁপ্ৰাজ	<i>artemisia vulgaris</i> —নাগদোনা
<i>allium sativum</i> —বসুন	<i>artocarpus integrifolia</i> —কাঁঠাল
<i>aloe indica</i> —বৃতকুমারী	<i>artocarpus lacucha</i> —মানার, লিচু
<i>alstonia scholaris</i> —হাতিম গাছ	<i>asclepias acida</i> —সোমনতা
<i>amarantus gangeticus</i> —লাল নটে	<i>asclepias pseudosarsa</i> —অনন্তমূল
	<i>avena sativa</i> —জই

- averrhoa bilimbi*—কামরাঙা  
*azadirachta indica*—নিমগাছ  
*balsamodendron mukul*—গুগু-  
 গুল  
*barringtonia acutangula*—নিচল  
 গাছ  
*basella alba*—পাইশাক  
*basella cordifolia*—লালপাই  
*bassia longifolia*—মহুয়া  
*baubinia purpurea*—দেবকাণ্ডন  
*baubinia racemosa*—বনরাজ  
*benincasa cerifera*—কুমড়া  
*benincasa cerifera savi*—ছাঁচ-  
 কুমড়া  
*bignonia indica*—শোণাক গাছ,  
 মোরগলতা  
*bignonia scabrella*—মাকাল  
*bignonia suaveolens*—পারুলগাছ  
*boerhaavia diffusa*—পুনর্নবা  
*bombax malabericum*—লালশিমুল  
*brassica oleracea (cauliflora)*—ফুলকপি  
*bryophyllum calycinum*—পাথরকুচি  
*bryonia scabrella*—মাকাল  
*buchananla latifolia*—পিপ্পাল  
*butea frondosa*—পলাশগাছ  
*caesalpinia bonducella*—রক্তকরণ  
*caesalpinia pulcherrima*—কুমুদা  
*cajanus indicus*—অড়হড় গাছ  
*calamus vininalis*—বেতগাছ  
*calcus aromaticus*—পাথরকুচি  
*calotropis gigantea*—আকন্দ  
*camellia theifera*—চা  
*canavalia gladiata*—মাখশিম  
*canavalia virosa*—কালশিম  
*cannabis sativa*—গাঁজা, ভাঙ  
*capparis sepiaria*—গুড়কামাই  
*capsicum frutescens*—খানিলকা  
*carica papaya*—পেঁপে  
*cardiospermum hallicacabum*—  
 জ্যোতিষ্মতী লতা, নুহাক্তি  
*carpopagon pruriens*—আলকুশী গাছ  
*cassia alata*—দাদমদ'নবৃক্ষ  
*cassia angustifolia*—সোনামুখী  
 গাছ  
*cassia fistula*—সৈদাল গাছ  
*cassia tora*—চাকুন্দা  
*cedrus deodara*—দেবদারু, বৃক্ষ  
*chebula retz*—হরিতকী

*chenopodium album* lin

—বেতোশাক

*cinnamomum tamala*—তেজপাতা

*cissus quadrangularis*

—হাড়পোড়া গাছ

*citrullus cucurbita*—তরমুজ

*citrus acid*—গোড়ালেবু

*citrus bergamia*—পাতিলেবু

*citrus decumana*—বাতাবিলেবু

*citrus limetta*—জামিরলেবু

*citrus medica*—লেবু

*clerodendron siphonanthus*—

বায়নহাটিগাছ

*clitoria ternatea*—অপরাজিতা

*coccinia grandis*—তেলাকুচা

*cocos nucifera*—নারিকেল

*coffea arabica*—কাফি

*convolvulus argenteus*

—ছাগল-বেঁটে

*convolvulus reptans*—কলমীশাক

*crocus sativus*—জাফরান

*croton polyandrum*—দস্তীগাছ

*cucumis melo*—খরমুজ

*cucumis momordica*—ফুটি

*cucumis utillissimus*—কাঁকড়

*cuminum cyminum*—জিরে

*curcuma amada*—আমাদা

*curculligo orchoides*—ভালমূলী

*curcuma aromatica*—বনহলুদ

*curcuma reticulata*—আমহলুদ

*cynodon dactylon*—দুর্বা

*dalbergia latifolia*—শ্বেতশাল,

সিতশাল

*dalbergia oujeinensis*

—তিনিশ গাছ

*dalbergia sisso*—শিশুগাছ

*datura alba*—ধূতুরা

*datura jactusa*—কাল ধূতুরা

*daucus carota*—গাজর

*dawny jasmine*—কঁদ

*dioscorea alata*—আলু

*dioscorea globosa*—চুবাড়ি আলু

*diospyros melanoxylon*—কেন্দু

*diospyros tomentosa*—তমাল

*dolichos biflorus*—কুলখ

*dolichos sinensis*—বরবটি

*echites antidyenterica*—কুড়চি

*echites caryophyllata*—মালতী

*echites fruteocens scholaris*—

শ্যামলতা

*elocarpus serratus*—জলপাই

*emblica myrobalan*—আমলকী

*emblica officinales*—আমলকী

*eragrostis cynosuroides*—কঁশ

*erythrina fulgens*—মাধবী  
 পারিজাত  
*erythrina indica*—পালিতে মাধবী  
*eugenia alba*—জামরুল  
*eugenia caryophyllifolia*—ছোট  
 জাম  
*eugenia jambolana*—কালজাম  
*eugenia jambosa*—গোলাব জাম  
*euphorbia linguberia*—মনসাগাছ  
*euphorbia tirucalli*—নকানিছ  
*feronia elephantum*—কংবেল  
*ficus carica*—ডুমুর  
*ficus elastica*—ববারগাছ  
*ficus indica*—ডুমুর  
*ficus glomerata*—বজ্রডুমুর  
*ficus infectoria*—পাঁকুর  
*ficus religiosa*—অশ্বথ  
*flacourtia cataphracta*—ভুই  
 আমলা  
*flacourtia indica*—বৈট  
*gaetnera racemosa*—মাধবী  
*gardenia florida*—গন্ধরাজ  
*gelidium*—বাস  
*gendarussa vulgaris*—নীল  
 নিগাম্ব পুষ্প  
*gentiana chirata*—ত্রিভা  
*gmelia arborea*—গাভারী গাছ

*gossypium herbaceum*—কাপড়  
 তুলা  
*harbia promites*—কাটা গোলাপ  
*heliotropium indicum*—হাতি-  
 শাঁড়া  
*hemidesmus indicus*—অনন্তমূল  
 লতা  
*herpestis monneiria*—ব্রাহ্মীশাক  
*hibiscus mutabilis*—স্থলপদ্ম  
*hibiscus rosa sinensis*—জবা  
*hydrocotyle asiatica*—ধানকুনি  
*hyperanthera morunga*  
 —সজিনা গাছ  
*Indigofera tinctoria*—নীল  
*Impatiens balsaminia*—দোশাটি  
*jasminum ablorescens*—নব  
 মল্লিকা  
*jasminum auriculatum*—জুই  
 বনই  
*jasminum grandiflorum*  
 —জাই, চামেলা  
*jasminum heterophyllum*—নব  
 মল্লিকা  
*jasminum sambac*—বেলফুল  
 মল্লিকা  
*jatropha gossypifolia*—ভেরাডা  
*jonesia asoka*—অশোক ফুল



*justicia genderussa*—বাসক

*justicia polysperma*—ছোট

মেচেতা

*justicia suffruticosa*—বন লবঙ্গ

*kaempferia rotunda*

—ভুইচাঁপা

*kigelia pinnata*—শশা জাতীয়

*lagenaria vulgaris*—সাদে

*lasia heterophylla*—কাঁটা কচু

*lathyrus appaco*—মটর

*lathyrus sativus*—খেসারী

*lens esculenta*—মসুর

*linum usitatissimum*—তিসি,

অভসী

*luffa aegyptica*—খঁড়ুল

*lycopersicum coculentum*—

বিলাতি বেগুন

*mallotus philippinensis*

—পদ্মাগ

*mangifera indica*—আম

*melia azadirachta indica*—

নিমগাছ, ঘোড়ানিম

*melilotus indica*—বনমৌষি

*menispermum cordifolium*—

বিশল্যা

*mentha viridis*—পুদিনা

*mesua ferrea*—নাগকেশর

*michelia champaca*—চাঁপাগাছ

*mimosa arabica*—কাঁটা বাবলা

*mimosa suma*—শমীগাছ

*mimusops elengi*—বকুল

*mirabilis jalapa*—কুম্ভকর্জি

*momordica charantia*

—করলা, উচ্ছে

*morus indica*—তঁতগাছ

*mucuna pruriens*—আলকুশী

*musa sapientum*—কলা

*nelumbium speciosum*—পদ্মজ

*nerium odorum*—করবী

*nicotiana tabacum*—তামাক

*nigella indica*—কালোজিরে

*nipa fruticans*—গোলপাতা

*nux vomica*—কুচিলা

*nyctanthes arbor-tristis*—

শিউলী, শেফালী

*nymphaea caerulea*—নীলকমল

*nymphaea lotus*—কুমুদ

*nymphaea stellata*—ছোট শালদক

*ocimum adscendens*—বনতুলসী

*ocimum bacilicum*

—বাবুইতুলসী

*ocimum canum*—বিশ্বতুলসী

*ocimum glabratum*—গুলাল-

তুলসী

*ocimum gratissimum*—রাম-

তুলসী

*ocimum sanctum*—কৃষ্ণতুলসী

*ocimum villosum*—সাদাতুলসী

*opantia dillenii*—নাগফণা

*oryza sativa*—ধান

*oxalis cerniculata*—আমরুল শাক

*oxytelma esculentum*—দুধলতা

*paaderia foetida*—গাখাল

*pandanus odoratissimus*—

কেভক, কেতকী

*papaver somniferum*—পোস্ত

*passiflora foetida*—বৃন্দকোলতা

*pencedanum graveolens*—

শুল্ফা

*phaseolus melanospermus*—

কালমৃগ

*phaseolus radiatus*—মৃগ

*phoemix sylvestris*—খজুর,

খেজুর

*phyllanthus emblica*—আমলকী

*physalis peruviana*—টেপারি

*pinus devadaru*—দারু, দেবদারু

*piper betel*—পান

*piper cubeba*—কাবাবিচনি

*piper longum*—পিপুল

*piper nigrum*—গোলমরিচ, মরিচ

*pistacia vera*—পেস্তা

*pistia stratiotes*—পানা

*pisum sativum*—ছোট মটর

*plantago ovata*—ইসপগুল

*plumbago rosea*—রাংচিতা

*polianthes tuberosa*—রজনীগন্ধা

*psidium guyava*—পেয়ারা

*pterospermum acerifolium*—

কনকর্চাপা

*pterospermum suberifolium*—

মুচুকুন্দ চাঁপা

*ptychotis ajowan*—যোয়ান

*punica granatum*—ভালিম

*pyrethrum indicum*—চন্দ্রমল্লিকা

*pyrus communis*—নাসপাতি

*pryrus malus*—আপেল

*quamoclit pinnata*—কুঞ্জলতা

*raphanus sativus*—মুলা, শতমুলা

*ricinus communis*—রেড়ি

*rosa damascena*—গোলাপ

*rumex vesicarius*—চুকাপালং

*saccharum officinarum*—আখ

*saccharum sara*—খাগড়াগাছ

*santalum album*—চন্দন

*sapindus trifoliatus*—রিঠা

*schleichera trijuga*—কদুমফুল

*seasamum indicum*—তিল

*neesamum majus*—কালতিল  
*sesbania grandiflora*—বকফুল  
*sesell indicum*—বনজোয়ান  
*shorea robusta*—গম্বাক, বনা  
*sida alba*—নগবলা  
*sida rhombifolia*—বেড়েল  
*solanum jacquini*—কটিকারী  
*solanum diffusum*—কটিকারী  
*solanum longum*—কুলিবেগুন  
*solanum melongena*—বেগুন  
*sorghum vulgare*—জ্বর  
*spinacia oleracea*—পালংশাক  
*spondias dulcis*—বিলিতি আমড়া  
*spondias mangifera*—আমড়া  
*swertia chirata*—চিরতা  
*tabernaemontana coronaria*  
 —তগর  
*tagetes patula*—গদি  
*tamarindus indicus*—তেতুল  
*tamarax gallica*—বনকাউ  
*tamarax indica*—কাউ  
*targia involucrata*—বিহুটি  
*terminalia arjun*—অজর্নি গাছ

*terminalia bellerica*—বরুড়া  
*terminalia catapha*  
 —জলী বাদাম  
*tinospira cordifolia*—গুলফ  
*trichosanthes cucumerina*—  
 কুঁদরি  
*trichosanthus dioeca*—পটোল  
*trigonella foenum-graecum*—  
 মেথি  
*trifolium indicum*—ছোট মেথি  
*triticum vulgare*—গম  
*uticularia fasciculata*—কাঁজ  
*valeriana jatamansi*—জটামাংসী  
*vinca rosea*—সদাবাহার  
*vitex negundo*—নিসিন্দা  
*vitis vinifera*—দ্রাক্ষা, আগুর  
*wedelia calendulacea*—ভুজরাজ  
*wrightia-antidysenterica*  
 —ইন্দ্রধনু  
*zea mays*—জন্নার, মকা  
*zingiber casumunar*—বনআদা  
*zingiber officinale*—আদা  
*zizyphus jujuba*—কুল

## গ্রন্থগঞ্জী

- Balfour, Ed. : Cyclopaedia of India, 5 vols. (2nd, 1871-73)
- Brandis, D : Indian Trees ( 1906 )
- Chopra, R. N : Indigenous Drugs of India ( 1933 )
- Cooke, T : The Flora of the Presidency of Bombay (1903-08)
- De, Kanailal, Rai Bahadur : Indigenous Drugs of India (1896)
- Dutta, Udaychand : Materia Medica of the Hindus (1877)
- Dymock, W : Pharmacographia Indica, 4 vols. ( Lond. Bom. & Cal. 1889-93), The Vegetable Materia Medica of Western India ( 1885 )
- Ghose, S. C. : Drugs of Hindustan.
- Hooker, J. D. : The Flora of British India, 7 vols., (Lond. 1875-79)
- Khorl, R. N : Materia Medica of India, 2 vols.
- Kirtikar, K. R. & Basu, B. D. ; Indian Medicinal Plants (1911)
- Partridge, E. A. : Forest Flora of the Hyderabad State (1911)
- Piddington, H : An English Index to the Plants of India (Cal. 1832)
- Prañ, Major D : Bengal Plants ( Cal. 1903 )
- Roxburgh, Dr. William : Flora Indica (Cal. 1871)
- Sen, Nagendra Nath, Kaviraj : The Aurvedic System of Medicine (Cal. 1901)
- Waring, E. J. : Pharmacopaea of India (Lond. 1868)
- Watt, G : Dictionary of Econ. Products of India (1819-96)
- Wight, R : Illustrations of Indian Botany, 2 vols. (1850)
- অনেকাৰ্থসংগ্ৰহ—হেমচন্দ্র সর্গি ( ১১-১২ খ্রীঃ শতাব্দী )
- অভিধান-চুড়ামণি— ( বৈদ্যাককোষ )—নরহরি শৰ্মা



- জাতিধানরম্মালা—হলারুধ ( ১০-১১ খ্রী. শতাব্দী )  
 অমরকোষ—অমরসিংহ ( ৫-৬ খ্রী. শতাব্দী ) এইচ. টি. কোলরুধ সম্পাদিত ( ১৮৮৩ )  
 জ্যোতিষহর—১ম বাগ্‌ভট ( ২-৩ শতাব্দী ); বিজয়কৃষ্ণ সেন সম্পাদিত  
 আর্যবেদপ্রকাশ—মধুসূদন গুপ্ত সম্পাদিত  
 কল্পদ্রু কোষ—  
 কালিদাসের গ্রন্থাবলী—  
 চক্রবর্ত্ত বা সর্বসারসংগ্রহ—চক্রপাণিদত্ত ( ১১ খ্রী. শতাব্দী ) কৃত প্যারীমোহন  
 সেনগুপ্ত অনূদিত ( ১২৯৬ )  
 চরক-সংহিতা—চরকমুনি-কৃত ( ১ম শতাব্দী ) ভুবনমোহন বনাক প্রকাশিত  
 দ্রব্যগুণশিক্ষা—নগেন্দ্রনাথ সেন সংকলিত  
 নিন্দান ( রুগ্নিনিচয় সংগ্রহ )—মাধবকর ( ৭-৮ শতাব্দী )  
 পৰ্যায়নানার্থকোষ—জটধরাচার্য  
 বংগসেন—  
 বনৌষধিদপ্তর—কবিরাজ বিরাজকুমার গুপ্ত কাব্যতীর্থ  
 বাঙলাদেশের গাছপালা, ৩ খ.—কবিরাজ ইন্দ্রভূষণ সেন  
 বৈদ্যকশব্দসিদ্ধ—  
 ভাবপ্রকাশ—ভাবমিশ্র ( ১৫-১৬ শতাব্দী ), অনুবাদক—কালীশচন্দ্র সেন ( ১৮৫৭ )  
 ভারতীয় বনৌষধি—ড° কালীপদ বিন্বাস ও এককর্ডি ঘোষ  
 মেদিনীকোষ—মেদিনীকর, সোমনাথ শর্মা সম্পাদিত ( ১৯২৫ )  
 রত্নসমুচ্চয়—বিত্তীয় বাগ্‌ভট কৃত ( ১৩-১৪ খ্রী. শতাব্দী )  
 রাজনিঘণ্ট—মদনপাল  
 শব্দকল্পদ্রুম—রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ( ১৮৫২ )  
 শব্দচাম্রিকা—  
 শব্দবত্তাবলী—মথুরেশ পাণ্ডিত  
 সমর্থকোষ, ২ খ.—জীবনকৃষ্ণ সেন  
 স্মৃতি-সংহিতা—নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত সম্পাদিত

## কতকগুলি প্রচলিত উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থান

[ প্রাচীনকালে বাণিজ্যসূত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ভারতে বিদেশীদের আগমন হত। তাঁদের খেয়ালবশে কিছু কিছু বিদেশী গাছ ভারতে রোপিত হয়। বিদেশ থেকে আনীত বলে প্রচলিত কতকগুলি গাছের নাম এখানে উল্লেখিত হল, তার মধ্যেও কিছু কিছু মতানৈক্য আছে।—সহ-সংকলক ]

আফগানিস্তান, পারস্য—পালংশাক; পিয়াজ, রসুন, হিং, শা-জের  
আফ্রিকা—অড়হড়, গদিফুল (মতান্তরে ফরাসী দেশ), গিনিঘাস, গুগুগুল (মতান্তরে—আরব, ভারত), তরমুজ (মতান্তরে ভারত), তিল (মতান্তরে—সিংহল), তেঁতুল, পালং (মতান্তরে—আফগানিস্তান)।

আমেরিকা—আনারস, পেঁপে (নিউগিনি), বাদাম, কাজুবাদাম, আতা, গোলআলু, ভুট্টা, তামাক, টেপারি (পেরু), পেয়ারা, মেহগিনি, টোম্যাটো, কচুরিপানা, কঁদমকোলতা, বকুল (মতান্তরে—ভারত), লঙ্কা, কুইনাইন, কককলি

আরব ও তুরস্ক—খেজুর

ইউরোপ—বাঁধাকপি, গাজর (মতান্তরে—এশিয়া)

ইটালি—মসুর

গ্রীস—আফিং

চীন—গম্ভীরাজ, কমলালেবু, কাফি, চা, আঁসফল, লিচু

জাপান—ছাঁচিকুমড়া

পলিনেশিয়া—বিলিতী আমড়া

পারস্যদেশ—ইসপাগুল, জাফরান

বেলজিয়াম—ডালিম; মেদী

মলকাস্বীপ—পাথরকুচিগাছ, ক্রোটন, লাল খয়ের, জায়ফল

মাদাগাস্কার দ্বীপ—কুশকুমড়া

মালয় দ্বীপপুঞ্জ—পান, সুপারি, কিঙা, আখরোট, জামরুল

মেক্সিকো—সুন্দরী ফুল (?)

স্বদ্বীপ, সিংহল—তিল, বাতাবীলেবু, আম (মতান্তরে—ভারত), ছাঁচিকুমড়া

সাইবেরিয়া—গাজরা





## গ্রন্থকার-পরিচিতি

অমলাচরণ বিদ্যাভূষণ ( ১৮৭৯-১৯৪০ )—শিক্ষা—প্রবেশিকা ( কেশব একাডেমি ), এফ এ ( মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন ) ও কাশী-নরেশের চতুঃপাঠী ( কাশী ), বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ । অল্প বয়স হতে ভাষা শিক্ষায় আগ্রহী । স্বগৃহে মৌলভীর কাছে উর্দু, ফার্সী ও আরবী, এডওয়ার্ড সাহেবের কাছে গ্রীক ভাষা শিক্ষা, পরে নিজ চেষ্টায় অসমীয়া, ইতালী, ওড়িয়া, জাপানী, জার্মান, তেলগু, তামিল, পতুগীজ, পালি, প্রাকৃত, ফরাসী, লাতিন, রুশ, হিন্দী প্রভৃতি মোট ২৬টি ভাষায় বৃত্তপাতি লাভ । ১৮৯৭ খ্রী. 'ট্রান্সলেটিং ব্যুরো' ( বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ সংস্থা ) স্থাপন । ১৯০১ খ্রী. এডওয়ার্ড ইনস্টিটিউশন নামে প্রথম ভাষা বিদ্যালয় ও সাধারণ বিদ্যালয় স্থাপন ও উভয়ের অধ্যক্ষ ( ১৯০১-১৯১৪ ) । লাতিন ভাষার অধ্যাপক, মিশনারিদের ডোডটন কলেজ ( ১৯০৩-১৯০৪ ), দি ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনে স্বেচ্ছ, জার্মান ভাষার ও দর্শন শাস্ত্রের, হিন্দু ও শিখ যুগের ইতিহাসের অধ্যাপক ( ১৯০৬-১৯০৭ ), পালি, বাংলা, হিন্দী অধ্যাপক, মেট্রো-পলিটান ইনস্টিটিউশন ( অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ ) ( ১৯০৫-১৯৪০ ) । গ্রিপদুরার রাজসরকারে ৭ বছর 'রাজ-ঐতিহাসিক' পদে অধিষ্ঠিত ।

কোষগ্রন্থ ও সাময়িক পত্র সম্পাদনা : শিক্ষা-কোষ ( ১৯০৭-১৯০৮ ), বঙ্গীয় মহাকোষ ( ১৩৪১-৪৫ ), বাণী ( মা, ১৩১২-১৩১৮ ), ভারতবর্ষ ( মা. ১৩২০-২১ ), সঙ্কল্প ( মা. ১৩২১ ), Indian Academy of Art ( ত্রৈমা. ১৯২০-২১ ), মর্মবাণী ( সাপ্তা ১৩২২ ), শ্রীগোবিন্দ-সেবক ( অন্যতম, মা, ১৩২৫-১৩৩৪ ), কায়স্থ-সমাজ ( অন্যতম, মা ১৩৩২ ), পঞ্চপদ্য ( মা, ১৩৩৬- ১৩৪০ ), শ্রীভারতী ( মা, ১৩৪৫-৪৬ ) । কয়েকটি গ্রন্থ : প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, ভারতসংস্কৃতির উৎস-ধারা, সরস্বতী, বাংলার প্রথম ইত্যাদি ।